



John Adams  
Library.



IN THE CUSTODY OF THE  
BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF N<sup>o</sup>


ADAMS  
80.2

V. 2









CHRISTIANI WOLFII,

POTENTISSIMI SUECORUM REGIS HASSIÆ LANDGRAVII  
CONSILIARII AULICI, MATHEMATUM AC PHILOSOPHIÆ IN  
ACADEMIA MARBURGENSI PROFESSORIS PRIMARII, PROFESSORIS  
PETROPOLITANI HONORARII, SOCIETATUM REGIARUM  
PARISIENSIS, BRITANNICÆ ATQUE BORUSSICÆ SODALIS,

ELEMENTA  
MATHESEOS


UNIVERSÆ.

TOMUS SECUNDUS,

*Qui MECHANICAM cum STATICA, HYDROSTATICAM,  
AEROMETRIAM atque HYDRAULICAM complectitur.*

EDITIO NOVA,

PRIORI MULTO AUCTIONIOR ET CORRECTIOR.



GENEVÆ,

Apud MARCUM-MICHAELEM BOUSQUET ET SOCIOS.

---

M D C C X X X I I I.

MATHEMATICS


28.10.2

10.12



10.12.2





# PRÆFATIO.




OVA hæc Matheſeos Elementa eo fine conſcripſimus, ut Mathematicum cultores palmarias Matheſeos univerſæ veritates labore facili intra breve temporis ſpatium ſibi familiares reddere ac methodi verioris ideam lucidam animo comprehendere valeant: Ita enim futurum conſidimus, ut ad legendos quosvis Autores, qui de rebus Mathematicis commentati ſunt, apti efficiantur, & iudicio pollentes ad quaſcunque à Matheſi diverſas Scientias ſeveriùs & fructuoſiùs tractandas accedant. Atque eodem conſilio novæ huic Elementorum Editioni plurima adjeci, quæ in priore non leguntur, ut adeò totum opus in Duos Tomos diviſum antea, in quatuor nunc ſecari opus fuerit. Prodit jam Tomus Secundus, qui *Mechanicam*, *Hydroſtaticam*, *Aërometriam* & *Hydraulicam* complectitur, atque adeò Motum & Æquilibrioſum ſolidorum ac fluidorum exponit. Veteres,

præeunte ARCHIMEDE in Libris de Æquiponderantibus & Insidentibus humido, ultrà æquilibrium gravium non progressi sunt, primusque fuit GALILÆUS, qui eorum inventis aliquid addere ausus motum gravium ad notiones distinctas & fœcundas revocavit, usum curvarum in cognitione Naturæ Mathematica clarissimo spécimine demonstrans. Patebat jam magis via ad Mathematicam Naturæ cognitionem, & Geometria indivisibilium uberius exulta tandemque ad Analysin certam revocata terebatur, ut sublimiora ingenia ad veritates maximè abstrusas atque abditas accederent. Admiranda igitur de Motu solidorum ac fluidorum hodie prostant inventa, sed ita ab Inventoribus proposita, ut ab iis tangendis arceantur Tyrones & quotquot in Mathesi consensescere, omneque tempus suum consumere prohibentur. Nostrium fuit præcipua illa inventa, quibus in Mathesi non datur sublimius, cum primis principiis evidenter connexa proponere, ut, qui sedato animo in Elementis nostris tractandis progreditur eo, quo conscripta sunt, ordine, illa eâdem facilitate perspiciat, quâ quæ facillima erant in anterioribus perspexerat. Eâ de causâ Mechanica imprimis & Hydraulica plurimis accessionibus in novâ hac Editione aucta. Ita Theoriam de Motu gravium effecimus generalem, ut, cum in priore Editione tantummodò cum GALILÆO motum uniformiter acceleratum exposuerimus, nunc ad accelerationem quacunque lege factam illam extenderimus. Addidimus Methodos investigandi Centrum gravitatis in spatiis mixtilineis & in perimetris figurarum rectilinearum, tendentiamque mediam in Motu composito, ut alia taceamus. Integrum Caput octavum de descensu & ascensu corporum

porum in lineis curvis, quod præclara, maximè continet ævi  
hujus inventa, loco conveniente inferuimus. Theoriam de  
motu Penduli ex sublimioribus inventis effecimus uberio-  
rem: Id quòd etiam circà Theoriam de Centro oscillationis curæ  
nobis cordique fuit. Eadem nobis dicenda sunt de Motu  
projectorum & de Motu corporum ex percussione. Inprimis  
autem Theoria de Viribus centralibus uberrimè à nobis per-  
tractata, cujus antea primas tantummodò lineas duxeramus.  
Caput decimum - quartum integrum de Resistentia medi  
nunc demùm accedit. Non commemoramus ea, quæ pas-  
sim adspersa à nobis fuère: Quæ de causâ de Hydrostaticæ  
& Aërometriæ accessionibus specialiora non præferimus.  
Hydraulicæ tandem Theoriam non uno modo reddidimus  
amplio-rem, eamque duobus integris Capitibus de Cursu  
fluminum & de Percussione fluidorum auximus. Ac hoc  
pacto finem, quem intendimus, nos consecutos esse spera-  
mus. Cur ex intervallo demùm prodeat Tomus Secundus,  
causæ in vulgus notæ sunt, ut de iis dicere supervacaneum  
existimem. Operam daturi sumus, ut Tomus Tertius, etsi  
mole Secundum superaturus, celerius sequatur, si Deo ita  
visum fuerit. Nullus verò dubito non defuturam in hoc  
Secundo Tomo materiam, in qua interea industriam suam  
exerceant Mathematicum cultores, donec Tertius comparue-  
rit. Continentur in hoc Tomo, quæ ad Naturæ cogni-  
tionem magnum momentum afferunt: Utut ingens quoque  
eorum farrago sit, quæ ad vitæ non minùs jucunditatem,  
quàm necessitatem utilia. Quotquot igitur animum habent  
sciendi cupidum, ex materiis, de quibus hic instituitur  
tractatio, plurimum voluptatis percipient. Neque ullus du-

bito fore, ut, qui cum attentione in iis discutiendis versati fuerint, Artem inveniendi ipso usu sibi sint comparaturi, quâ deinceps extrâ Mathesin felicissimè utentur. Dabam MARBURGI CATTORUM die 28. Martii Anno 1733.





# TYPOGRAPHUS LECTORI S.



*Perarum nostrarum negligentiam, speramus, non expostulabis, BENEVOLE LECTOR. Vix enim ad nos delatus est Tomus alter horumce Matheseos Elementorum ex Germania, cum subito, omnibus posthabitis, Typographos & Calchographos Operi adinvimus, nec labori nec sumptibus parcentes, modo desiderio tuo fieret satis: Id. quod nobis est & erit semper cordi. Omnem adhibuimus curam, ut nitida & erroribus vacua prodiret ista Editio: Nulla tamen, fatemur, diligentia fieri potuit, quin Erratorum Index necessarius foret. Tot enim mendis scatebat HALLENSIS Editio, ut omnia simul tollere nostram superaverit industriam. Ceterum gaudemus, Intelligentium judicio, tantum abesse ut deteriores reddat Editionem nostram Index hujusmodi, quem vitio nobis vertere*

*volue-*


voluerunt invidi, ut contra, vel hoc unico nomine, aliis  
præponendam censeant. Hic enim maximè valet istud, pec-  
catum agnitum esse condonatum.

Monemus interim, vix ullos esse in Editione nostra errores,  
quibus non dederit occasionem Hallensis; ut utramque Editio-  
nem conferentibus evidenter patebit.

TYPOGRAPHUS  
LECTORI




Faint, mirrored text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. The text is largely illegible due to its low contrast and orientation.



# ELEMENTA MECHANICÆ ET STATICÆ.

P R Æ F A T I O.



PLERISQUE Autoribus, qui Mechanicæ Elementa in usum tyronum explicarunt, non omnis Motus ratio habetur, sed ejus tantum, qui vel Virium, vel Temporis aliquo compendio, ope Machinarum perficitur. Nec improbandum est eorum institutum, si quidem plura docere non intendunt, quam quæ in construendis & examinandis Machinis usum præbere possunt.

*Wolffii Oper. Mathem. Tom. II.*

A

Quo-

Quoniam tamen nobis constitutum est, Matheseos Elementa dare non modo ad usum vitæ humanæ sed & ad profectum Scientiarum, Physicæ præsertim sufficientia; ideò consultum duximus, ut de iis quoque tractaremus, quæ ad illustrandam Motus doctrinam hætenus inventa. Hæc enim necessaria sunt ad Naturæ cognitionem, ut sine iis certa obtineri nunquam possit, cum in Motu plurimorum Phænomenorum ratio contineatur. Ipsarum vero etiam Machinarum consideratio minimè negligenda ab eo, qui cum laude in Physicis aliquandò versaturus, cum Motus corporum organicorum explicatio frustra sine his principiis tentetur. Quanta felicitatis humanæ pars Motuum Scientiæ superstruatur, Experientia clarissime loquitur. Huic enim acceptum ferimus, quod pecudes & corpora inanimata peragant, quæ nos necessitatibus vitæ humanæ impulsæ non sine maximo sudore perageremus. Eum igitur in finem non solum Machinarum simplicium (quod vulgò fieri solet) rationem omnem fideliter exposui; verum etiam hinc inde annotavi, quæ ad earum constructionem scitu necessaria sunt, & desideratam hætenus in istiusmodi Elementis tractationem de Potentiarum ad Machinas applicatione addidi. Quos rerum naturalium cognitio parum juvat, his solis contenti præterire possunt Motus regulas: Machinarum enim Vires sine iis plerumque plenè intelligent. Quamvis vero nonnulli Staticam à Mechanicâ sejungant; consultiùs tamen visum fuit sororio vinculo utramque connecti, cum ita demonstrationes nexu pulchriori concatenare liceret.



# ELEMENTA MECHANICÆ.

## CAPUT PRIMUM.

### *De Motu Æquabili.*

#### DEFINITIO I.

I. **M**ECHANICA est Scientia, Motus. *Staticam* vocant nonnulli ejus partem, quæ de Æquilibrio Solidorum agit.

#### DEFINITIO II.

2. *Quies* est permanentia corporis in eodem loco. *Motus* vero est continua loci mutatio.

#### SCHOLION.

3. *Moveri nempe dicitur corpus, si successive aliis atisque corporibus quiescentibus, aut ejusdem corporis quiescentis partibus fit contiguum.*

#### DEFINITIO III.

4. *Gravitas* est nifus deorsum versus centrum terræ.

#### DEFINITIO IV.

5. *Gravitatio* est pressura, quam corpus in aliud sibi subjectum vi Gravitatis suæ exercet.

#### DEFINITIO V.

6. *Massa* corporis est materia ipsi cohærens, hoc est, quæ una cum corpore movetur & gravitat.

#### DEFINITIO VI.

7. *Moles* seu *Volumen* est expansio corporis secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem.

#### COROLLARIUM.

8. Invenitur adeo per regulas Geometriæ.

#### DEFINITIO VII.

9. *Vis Motrix* seu *Vis* simpliciter est principium motus, seu id, unde motus in corpore pendet. Dicitur *viva*, si cum motu actuali conjungitur, qualis est in globo cadente. *Mortua* vero vocatur, si ad motum producendum tendit quidem, verum motum actu nondum producit, seu quæ in solo nifu seu conatu ad motum consistit, qualis est in globo ex filo suspensio & in elatere tenso, quod se restituere nititur.

## SCHOLIUM.

10. Hanc Virium distinctionem dudum agnoscere inter homines plebejos Molitores nostrates. Mortuam enim vocant aquam in alveo stagnantem aut segniter admodum fluentem; vivam vero, quæ impetu concepto rotis molendinorum circumagendis sufficit. Acutissimus Leibnitijs cum magnum momentum in ea situm esse deprehenderet ad motuum doctrinam rite tradendam, eandem in Mechanicam introduxit (a).

## DEFINITIO VIII.

11. Tempus hic voco eam temporis partem, qua motus durasse supponitur.

## DEFINITIO IX.

12. Spatium est linea, quam mobile instar puncti consideratum motu suo describere concipitur.

## DEFINITIO X.

13. Velocitas seu Celeritas est ea Vis motricis affectio, qua mobile aptum redditur dato tempore spatium datum percurrendi.

## COROLLARIUM.

14. Celeritas adeo dupla est, qua eodem tempore spatium duplum describitur; tripla, qua triplum; quadrupla, qua quadruplum describitur & ita porro in infinitum in quacunque multiplicium vel submultiplicium specie.

## SCHOLIUM I.

15. Nimirum celeritas tanto major censetur ab omnibus, quanto majus spatium eodem tempore percurrit mobile. Ponamus mobile A intervallo unius minuti secundi percurrere intervallum duorum pedum. Sit aliud mobile B, quod intervallo unius secundi percurrat spatium trium pedum. Ultero fatebuntur omnes

celeritatem ipsius mobilis B majorem esse celeritate alterius A.

## SCHOLIUM II.

16. Mobile in momento quovis temporis celeritatem habet, cumque omnes corporis partes eadem celeritate progrediantur, quod satis patet attendenti, celeritas quasi per totam mobilis massam diffusa concipitur, ita ut eadem in singulis partibus existat. Proprie loquendo est gradus vis motricis.

## DEFINITIO XI.

17. Linea directionis est, juxta quam corpus progredi nititur.

## DEFINITIO XII.

18. Velocitas sumta cum directione dicitur Conatus.

## SCHOLIUM.

19. Unde conatus censetur major, quo major est celeritas.

## DEFINITIO XIII.

20. Vis resistendi dicitur, quæ in contrarium, seu juxta oppositam directionem Vis cujuscunque alterius agit.

## SCHOLIUM.

21. Opponuntur directiones, quæ in contrarias plagas tendunt.

## DEFINITIO XIV.

22. Quantitas motus, momentanea scilicet, est factum ex celeritate in massam. Leibnitijs appellat Quantitatem motionis.

## SCHOLIUM.

23. Pendet nimirum quantitas motus & à quantitate massæ, & à quantitate celeritatis, ita ut in eodem corpore motus existimetur major, si major est celeritas, qua movetur; & in duobus corporibus, quorum eadem est celeritas, ejus motus major sit, cujus massæ quantitas major est.

(a) Act. Erudit. An. 1695. p. 194.

DEFINITIO XV.

24. *Motus æquabilis est, si mobile continuo eadem celeritate fertur.*

AXIOMA I.

25. *Nihil est sine ratione sufficiente, cur potius sit, quam non sit.*

SCHOLION.

26. *De hoc principio plura diximus in Ontologia seu Philosophia prima integro Capite 2. Sect. 1. Part. 1. Et in Mechanica idem jam olim tacite supposuit Archimedes in libris de Æquiponderantibus.*

AXIOMA II.

27. *Si mobile eadem celeritate movetur equalibus temporibus equalia spatia describit.*

SCHOLION.

28. *Cum enim mobile per celeritatem aptum reddatur ad datum spatium dato tempore percurrendum. (§. 13.); nulla sane ratio est, cur temporibus equalibus, quibus eandem celeritatem habet mobile, diversa spatia describere deberet. Describit adeo eandem (§. 25.) Axiomatis hujus veritatem apertius stabilimus in Philosophia prima (§. 656. Ontol.); ubi etiam Scientiarum Mathematicarum principia demonstrativa ratione à priori ex notionibus simplicioribus deduximus.*

AXIOMA III.

29. *Si duo mobilia eadem celeritate feruntur, eodem tempore equalia spatia describunt.*

SCHOLION.

30. *Patet idem per Axioma primum (§. 25.) Conferatur de eadem Philosophia prima. (§. 660.)*

THEOREMA I.

31. *In motu æquabili Spatia à mobili percursa sunt ut Tempora.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam motus æquabilis, (*per hypoth.*) mobile continuo eadem celeritate movetur (§. 24). Quare si tempore  $t$  describit spatium  $f$ , alio tempore  $t$  priori æquali describit quoque spatium  $f$  priori æquale (§. 27.), adeoque tempore bis  $t$  spatium bis  $f$ , immo tempore quocunque multiplici seu submultiplici  $nt(=T)$  spatium  $nf(=S)$ . Sunt igitur spatia  $f$  &  $S$  ut tempora  $t$  &  $T$  (§. 194. *Arithm.*) *Q. e. d.*

THEOREMA II.

32. *Si duo mobilia eadem celeritate & motu æquabili feruntur, spatia descripta sunt ut tempora.*

DEMONSTRATIO.

Si enim mobile A tempore  $t$  percurrit spatium  $f$ , etiam mobile B, quod eadem celeritate fertur, (*per hypoth.*) eodem tempore  $t$  percurrit spatium  $f$  priori æquale (§. 29.) Sed si idem mobile percurrit tempore quocunque alio T spatium S, erit hoc ad alterum  $f$  ut T ad  $t$  (§. 31.) Quare cum spatium  $f$  sit idem, quod à mobili A tempore  $t$  percurritur *per demonstrata*; spatia  $f$  & S, à mobilibus A & B temporibus  $t$  & T descripta, sunt ut tempora  $t$  & T, quibus describuntur. *Q. e. d.*

THEOREMA III.

33. *Si duo mobilia eadem celeritate feruntur, spatia eodem tempore motu æquabili descripta sunt ut celeritates.*

DEMONSTRATIO.

Si enim mobile A tempore  $t$  celeritate  $c$  spatium  $f$  describit; eodem tempore  $t$  celeritate bis  $c$  describit spatium

tium bis  $f$  & celeritate quacunque multiplici vel submultiplici  $nc$  spatium quodcunque multiplex vel submultiplex  $nf$  (§. 31.) Erunt adeo spatia  $f$  &  $S (=nf)$  descripta ut celeritates  $c$  &  $C (=nc)$ . Quare si mobile B eodem tempore  $t$  celeritate  $C$  describit spatium  $S$ : erit adhuc spatium à mobili A descriptum  $f$  ad spatium à mobili B eodem tempore descriptum  $S$  ut celeritas illius  $c$  ad celeritatem huius  $C$ . *Q. e. d.*

## THEOREMA IV.

34. *Spatia à duobus mobilibus peracta sunt in ratione composita temporum & celeritatum.*

## DEMONSTRATIO.

Describat mobile A celeritate  $c$  spatium  $f$  tempore  $t$ , & B celeritate  $C$  spatium  $S$  tempore  $T$ . Ponamus idem mobile B celeritate  $c$  describere spatium  $q$  tempore  $T$ . Quoniam celeritas  $c$  mobilium A & B eadem, erit  $q : f = T : t$  (§. 32.). Et quia spatia  $S$  &  $q$  eodem tempore  $T$  describuntur, erit  $S : q = C : c$  (§. 33.). Ergo  $Sq : fq = TC : tc$  (§. 213. *Arith.*); consequenter  $S : f = TC : tc$  (§. 181. *Arithm.*); consequenter spatia sunt in ratione composita temporum & celeritatum (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

35. Si  $S = f$ ; erit  $CT = ct$ , adeoque  $C : c = t : T$  (§. 299. *Arithm.*), hoc est, si duo corpora motu æquabili æqualia spatia describunt; celeritates habent temporum rationem reciprocam.

## COROLLARIUM II.

36. Si ulterius  $t = T$ ; erit etiam  $C = c$ , adeoque corpora, quæ motu æquabili tempore æquali spatia æqualia percurreunt, æquali celeritate feruntur.

## THEOREMA V.

37. *Duorum corporum motu æquabili latiorum celeritates  $C$  &  $c$  sunt in ratione composita ex directa spatiorum  $S$  &  $f$  & reciproca temporum  $T$  &  $t$ .*

## DEMONSTRATIO.

Est enim  $S : f = CT : ct$  (§. 34.). Quare cum sit  $fCT = Sct$  (§. 297 *Arith.*); erit  $C : c = St : fT$  (§. 299 *Arithm.*) *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

38. Quoniam  $C : c = St : fT$  (§. 37.); erit  $C : c = \frac{S}{T} : \frac{f}{t}$  (§. 181. *Arithm.*) Quare celeritas  $C$  analytice exprimitur per  $\frac{S}{T}$ , hoc est, celeritas est ut spatium per tempus divisum.

## THEOREMA VI.

39. *Si duo corpora motu æquabili lata celeritatibus  $C$  &  $c$  describunt spatia  $S$  &  $f$ , tempora  $T$  &  $t$ , quibus describuntur, erunt in ratione composita ex directa spatiorum & reciproca celeritatum.*

## DEMONSTRATIO.

Quoniam  $S : f = CT : ct$  (§. 34.); erit  $fCT = Sct$  (§. 297 *Arithm.*) Quare  $T : t = cS : Cf$  (§. 299 *Arithm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA VII.

40. *Si spatia  $S$  &  $f$  à duabus mobilibus*

*libus motu æquabili descripta fuerint ut celeritates C & c, tempora T & t erunt æqualia.*

DEMONSTRATIO.

Est enim  $S : f = CT : ct$  (§. 34). Quare si esse debet  $S : f = C : c$ , necesse est ut sit  $T = t$  (§. 178 *Arithm.*). Est vero  $S : f = C : c$  per *hypoth.* Ergo etiam  $T = t$ . *Q. e. d.*

Idem etiam hoc modo ostenditur.  $S : f = C : c$ , per *hypoth.* sed  $S : f = CT : ct$  (§. 34). Ergo  $C : c = CT : ct$  (§. 167 *Arithm.*), consequenter  $I : I = T : t$  (§. 185 *Arithm.*) Quare cum sit  $I = I$ , erit etiam  $T = t$ . *Q. e. d.*

THEOREMA VIII.

41. *Quantitates motus duorum corporum, quæ motu æquabili feruntur, Q & q, sunt in ratione composita celeritatum C & c & massarum M & m.*

DEMONSTRATIO.

Est enim  $Q = CM$  &  $q = cm$  (§. 22). Quare  $Q : q = CM : cm$ , hoc est Q habet ad q rationem compositam ipsius C ad c & ipsius M ad m (§. 159. *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

42. Si  $Q = q$ ; erit  $CM = cm$ , adeoque  $C : c = m : M$  (§. 299. *Arithm.*), hoc est, si quantitates motus duorum mobilium motu æquabili latorum fuerint æquales; celeritates habent rationem massarum reciprocam.

COROLLARIUM II.

43. Quare si ulterius  $M = m$ ; erit etiam  $C = c$ , hoc est, si duorum mobilium ejusdem massæ motu æquabili latorum quantitates motus fuerint æquales; æquali celeritate feruntur.

COROLLARIUM III.

44. Similiter si  $C = c$ ; erit  $M = m$ , hoc est, si duo mobilia eadem celeritate moventur, & fuerint quantitates motus æquales; erunt massæ eorundem æquales.

THEOREMA IX.

45. *Duorum corporum quæ motu æquabili feruntur, celeritates C & c sunt in ratione composita ex quantitatibus motus Q & q directæ & massarum M & m reciproca.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam  $Q : q = CM : cm$  (§. 41) erit  $\frac{Qcm}{cm} = \frac{qCM}{cm}$  (§. 297 *Arithm.*)

Ergo  $C : c = Qm : qM$  (§. 299 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

46. Si  $C = c$ ; erit  $Qm = qM$ , adeoque  $Q : q = M : m$  (§. 269 *Arithm.*), hoc est, si duo mobilia motu æquabili & eadem celeritate feruntur; quantitates motus massarum rationem habent.

COROLLARIUM II.

47. Quodsi ulterius fuerit  $M = m$ ; erit etiam  $Q = q$ , adeoque si duo mobilia æqualem massam habentia motu æquabili & eadem velocitate feruntur; quantitates motus æquales sunt.

THEOREMA X.

48. *In motu æquabili massa corporum M & m sunt in ratione composita ex quantitatibus motus Q & q directæ & celeritatum C & c reciproca.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam  $Q : q = CM : cm$  (§. 41) erit  $\frac{Qcm}{cm} = \frac{qCM}{cm}$  (§. 297 *Arithm.*)

Ergo  $M : m = Q : qC$  (§. 299. *Arithm.*) *Q. e. d.*

Co-

## COROLLARIUM.

49. Si  $M = m$ ; erit  $Qc = qC$ , adeoque  $Q:q = C:c$  (§. 299 *Arithm.*) hoc est, si duorum mobilium motu æquabili latorum massæ fuerint æquales; quantitates motus sunt ut velocitates.

## THEOREMA XI.

50. In motu æquabili quantitates motus  $Q$  &  $q$  sunt in ratione composita ex rationibus directis massarum  $M$  &  $m$  atque spatiorum  $S$  &  $s$  & reciproca temporum  $T$  &  $t$ .

## DEMONSTRATIO.

Quoniam  $C:c = St:st$  (§. 38)

&  $Q:q = CM:cm$  (§. 41)

erit  $CQ:cg = CMS:cmst$   
(§. 213 *Arithm.*)

$Q:q = MSt:msT$  (§. 185  
*Arithm.*) *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

51. Si  $Q = q$ ; erit  $MSt = msT$  adeoque  $M:m = sT:St$ ,  $S:s = mT:Mt$ ,  $T:t = MS:ms$ , hoc est, si duorum mobilium motu æquabili latorum quantitates motus fuerint æquales; 1. massæ eorundem sunt in ratione composita ex directa temporum & reciproca spatiorum: 2. Spatia sunt in ratione composita ex directa temporum & reciproca massarum: 3. Tempora denique sunt in ratione composita massarum & spatiorum.

## COROLLARIUM II.

52. Si præterea  $M = m$ ; erit  $sT = St$ , adeoque  $S:s = T:t$  (§. 299 *Arithm.*) Nempe si duorum mobilium motu æquabili latorum quantitates motus ac massæ fuerint æquales; spatia temporum rationem habent.

## COROLLARIUM III.

53. Si ulterius  $T = t$ ; erit quoque  $S = s$ . Duo igitur mobilia, quorum massæ ac quantitates motus æquales sunt, eodem tempore motu æquabili spatia æqualia describunt.

## COROLLARIUM IV.

54. Si præter  $Q = q$  fuerit  $S = s$ ; erit  $mT = Mt$  (§. 50) adeoque  $M:m = T:t$  (§. 299 *Arithm.*), hoc est, si duo mobilia, quorum quantitates motus æquales sunt, æquabili motu æqualia spatia percurrunt; massæ eorundem sunt temporibus proportionales, vel, quod perinde est, tempora sunt massis proportionalia.

## COROLLARIUM V.

55. Si ulterius  $T = t$ ; erit etiam  $M = m$ , adeoque corporum, quorum quantitates motus æquales sunt & quæ eodem tempore motu æquabili spatia æqualia describunt, massæ æquales sunt.

## COROLLARIUM VI.

56. Si præter  $Q = q$  fuerit  $T = t$ ; erit  $MS = ms$  (§. 50), adeoque  $S:s = m:M$ , hoc est, spatia à duobus mobilibus, quorum quantitates motus æquales sunt, eodem tempore motu æquabili descripta sunt in ratione massarum reciproca.

## THEOREMA XII.

57. In motu æquabili spatia  $S$  &  $s$  sunt in ratione composita ex rationibus directis quantitatuum motus  $Q$  &  $q$  atque temporum  $T$  &  $t$  & reciproca massarum  $M$  &  $m$ .

## DEMONSTRATIO.

Quoniam:  $Q:q = MSt:msT$  (§. 50)

erit  $QmsT = qMSt$  (§. 297 *Arithm.*)

Unde  $S:s = Qm:qT$  (§. 299  
*Arithm.*) *Q. e. d.*

COROL-

COROLLARIUM I.

58. Si  $S = f$ ; erit  $QTm = qtM$ , a. leoque  $Q : q = tM : Tm$ ,  $M : m = QT : qt$ ,  $T : t = qM : Qm$  (§. 299. *Arithm.*). Quodsi adeo duo mobilia motu æquabili per æqualia spatia feruntur; erunt 1. quantitates motus in ratione composita ex directa massarum & reciproca temporum: 2. massæ in ratione composita quantitatum motus atque temporum: 3. tempora in ratione composita ex directa massarum & quantitatum motus reciproca.

COROLLARIUM II.

59. Si præter  $S = f$  fuerit  $M = m$ ; erit  $QT = qt$ , adeoque  $Q : q = t : T$  (§. 299 *Arithm.*). Nimirum duorum mobilium, quorum massæ æquales sunt, quantitates motus sunt in ratione temporum reciproca, quibus per æqualia spatia feruntur.

COROLLARIUM III.

60. Si præter  $S = f$  fuerit  $T = t$ ; erit  $qM = Qm$  (§. 58.), adeoque  $Q : q = M : m$  (§. 299 *Arithm.*) Duorum itaque mobilium, quæ per æqualia spatia æquali tempore motu æquabili feruntur, quantitates motus massis præportionales sunt.

THEOREMA XIII.

61. Corporum motu æquabili latorum massæ  $M$  &  $m$  sunt in ratione composita ex rationibus directis quantitatum motus  $Q$  &  $q$  atque temporum  $T$  &  $t$  & reciproca spatiorum  $f$  &  $S$ .

DEMONSTRATIO.

Quoniam  $Q : q = MSt : mft$  (§. 50): erit  $Qmft / T = qMSt$  (§. 297 *Arithm.*) Unde  $M : m = QTf : qtS$  (§. 299 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

62. Si  $M = m$ ; erit  $QTf = qtS$ , adeoque  $Q : q = tS : Tf$ ,  $S : f = QT : qt$  &  $T : t = qS : Qf$

(§. 299 *Arithm.*), hoc est, duorum mobilium æquabili motu latorum, quorum inaffæ æquales, 1. quantitates motus sunt in ratione composita ex directa spatiorum & reciproca temporum: 2. spatia sunt in ratione quantitatum motus & temporum composita: 3. tempora sunt in ratione composita ex directa spatiorum & reciproca quantitatum motus.

COROLLARIUM II.

63. Si præter  $M = m$  fuerit  $T = t$ ; erit  $qS = Qf$ , adeoque  $Q : q = S : f$  (§. 299 *Arithm.*), hoc est quantitates motus duorum mobilium, quorum massæ æquales sunt, spatiis æquali tempore peractis proportionales sunt.

THEOREMA XIV.

64. In motu æquabili tempora  $T$  &  $t$  sunt in ratione composita ex rationibus directis massarum  $M$  &  $m$  atque spatiorum  $S$  &  $f$  & reciproca quantitatum motus  $Q$  &  $q$ .

DEMONSTRATIO.

Quoniam  $Q : q = MSt : mft$  (§. 50): erit  $Qmft / T = qMSt$  (§. 297 *Arithm.*) Une  $T : t = qMS : Qmf$  (§. 299 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

65. Si  $T = t$ ; erit  $qMS = Qmf$ , adeoque  $Q : q = MS : mf$ ,  $M : m = Qf : qS$  &  $S : f = Qm : qM$  (§. 229 *Arithm.*), hoc est, si motus æquabilis duorum mobilium fuerit æquiditurnus; erunt 1. quantitates motus in ratione massarum & spatiorum composita: 2. massæ in ratione composita ex quantitatum motus directa & spatiorum reciproca: 3. spatia in ratione composita ex directa quantitatum motus & reciproca massarum.

## SCHOLIUM.

66. *Suadeo tyronibus, ut hactenus demonstrata numeris illustrent: ita enim futurum, ut facilius eorundem vim animo comprehendant. Ponamus itaque corpus A, cujus massa sit ut 7, e. gr. 7. librarum, tempore 3 secundorum emetiri spatium 12 pedum, & corpus aliud B, cujus massa sit ut 5, tempore 8 secundorum emetiri spatium 16 pedum: habebimus  $M=7, T=3, S=12, m=5, t=8, f=16$ , adeoque  $C=4, c=2$  (§. 38.),  $Q=28, q=10$  (§. 22). Hinc utique deprehenditur.*

$$C:c = St : fT \quad (\S. 37.)$$

$$4:2 = 12.8 : 16.3 = 4:2$$

$$S:f = CT : ct \quad (\S. 34)$$

$$12:16 = 4.3 : 2.8 = 12:16$$

$$T:t = cS : cS \quad (\S. 39)$$

$$3:8 = 2.12 : 4.16 = 1.3 : 2.4 = 3:8$$

$$C:c = Qm : qM \quad (\S. 45)$$

$$4:2 = 28.5 : 10.7 = 4.1 : 2.1 = 4:2$$

$$M:m = Qc : qC \quad (\S. 48)$$

$$7:5 = 28.2 : 10.4 = 7.1 : 5.1 = 7:5$$

$$S:f = TQm : tqM \quad (\S. 57)$$

$$12:16 = 3.28.5 : 8.10.7 = 3.4.1 :$$

$$8.2.1 = 12:16$$

$$M:m = TQs : tqS \quad (\S. 61)$$

$$7:5 = 3.28.16 : 8.10.12 = 3.7.2 :$$

$$1.10.3 = 7:5$$

$$Q:q = MSt : mST \quad (\S. 50)$$

$$28:10 = 7.12.8 : 5.16.3 = 7.4.1 : 5.2.1 \\ = 28:10$$

*Eodem modo illustantur singula Theorematum Corollaria.*

*Sit enim  $S=12, T=6, f=8, t=4$ ; erit  $C=12:6=2$  &  $c=8:4=2$ , consequenter ob  $C=c$  (§. 32)*

$$S:f = T:t$$

$$12:8 = 6:4$$

*Sit  $S=12$  &  $f=12$ . Quoniam  $S=CT$  &  $f=ct$  (§. 34); si  $C=2$  &  $c=3$ , erit  $T=6$  &  $t=4$ . Habemus adeo (§. 35)*

$$C:c = t:T$$

$$2:3 = 4:6$$

*Si pro  $S$  &  $s$  ponatur  $Q$  &  $q$ , pro  $T$  &  $t$  vero  $M$  &  $m$ ; idem exemplum illustrabit primum Theorematis 8 corollarium (§. 42). Iisdem observatis exemplum precedens in Corollarium primum Theorematis quinti quadrat.*

*Sit denique  $Q=12, q=8, M=4, m=4$ ; erit  $C=12:4=3$  &  $c=8:4=2$ , (§. 22) adeoque (§. 49)*

$$Q:q = C:c$$

$$12:8 = 3:2$$

## CAPUT II.

*De Motu uniformiter accelerato & retardato.*

## DEFINITIO XVI.

67. **M**otus acceleratus est, qui nova capit celeritatis incrementa. Uniformiter acceleratus est, qui temporibus æqualibus æqualia continuo capit celeritatis incrementa.

## COROLLARIUM I.

68. In motu adeo uniformiter accelerato celeritates sunt ut tempora, quibus acquiruntur.

## COROLLARIUM II.

69. Quare si tempuscula Elementaria fuerit  $dt$  &  $dT$ ; celeritates Elementares iis respondentes  $dc$  &  $dC$ ; erit  $t:T = c:C$  (§. 192 *Arithm.* & §. *prac.*) Sunt enim  $t$  &  $T$  summæ ipsorum  $dt$  &  $dT$ ,  $c$  &  $C$  vero summæ ipsorum  $dc$  &  $dC$  (§. 178. 67 *Arithm.*)

## DEFINITIO XVII.

70. *Motus retardatus est, cujus ce-*  
le-



lertas decrefcit. *Uniformiter retardatus* dicitur, fi continua celeritatis decre-  
menta fuerint temporibus proportiona-  
lia.

A X I O M A I I.

71. *Corpus femel quiefcens nunquam* movebitur, nifi aliunde ad motum con-  
citetur: femel autem motum eadem ve-  
locitate & fecundum eandem directio-  
nem moveri perget, nifi à caufa aliqua  
ftatum fuum mutare cogatur.

S C H O L I O N.

72. Hæc fatis manifefta funt ex axioma-  
te omnis Philofophiæ fundamentali, quod nihil  
fit fine ratione fufficiente (§. 25): quemad-  
modum idem oftendimus in *Cofmologia*. Nec  
experientia eidem repugnat, cum femper ra-  
tio assignari poffit tam motus retardati, quam  
directionis mutatae, modo omnes circumftan-  
tias fatis perpendamus.

C O R O L L A R I U M I.

73. Corpus itaque, quod nonnifi impul-  
fu femel facto movetur, per lineam rec-  
tam moveri debet.

C O R O L L A R I U M I I.

74. Quodfi vero per curvam incedit,  
duplici vi urgeatur necesse est, altera nem-  
pe, qua progredetur fecundum lineam  
rectam, altera vero, qua à motu rectili-  
neo continuo retrahitur.

A X I O M A I I I.

75. Si nifus & renifus duorum cor-  
porum fuerint aquales; motus nullus  
fubfequitur, fed corpora fe mutuo im-  
pellentia juxta fe invicem quiefcunt.

A X I O M A I V.

76. Si corpus motum fecundum ean-  
dem directionem, qua movetur, impel-  
litur, motus acceleratur (§. 67).

A X I O M A V.

77. *Corpus motum à vi refiftente re-*  
*tardatur* (§. 20. 50).

O B S E R V A T I O I.

78. *Gravitas corporum eadem eft in*  
*qualibet à fuperficie telluris diftantia, in*  
*qua experimentum capere licet: quam*  
*in pofterum Intervallum non nimis*  
*magnum dicemus.*

O B S E R V A T I O I I.

79. *Gravia descendunt motu accele-*  
*rato.*

T H E O R E M A X V.

80. *Si corpus ex quiete motu uni-*  
*formiter accelerato fertur, fpatia funt*  
*in ratione duplicata temporum.*

D E M O N S T R A T I O.

Designet recta AB tempus, quo  
motus mobilis acceleratur & rectæ ad  
AB applicatæ PM, BC fint ut celeri-  
tates in fine temporis AP, AB acqui-  
fitæ. Quoniam motus uniformiter ac-  
celeratur & motus à quiete incipit,  
*per hypoth.* erit  $AP:AB=PM:BC$   
(§. 68). Sunt vero PM & BC ad AB  
perpendiculares *per construct.* adeoque  
inter fe parallelæ (§. 256 *Geom.*). Est  
igitur ABC triangulum (§. 268 *Geom.*).  
idque rectangulum (§. 91 *Geom.*),  
Ponamus *pm* effe alteri lineæ PM infi-  
nite propinquam: celeritates PM & *pm*  
non different nifi quantitate infinite  
parva *mR* in fine tempufculi *Pp* atque  
adeo tempufculo toto *Pp* eadem cele-  
ritate fertur mobile (§. 4. *Analyf.*);  
confequenter motus ifto tempufculo  
æquabilis eft (§. 24.) Enimvero in

Tab. I.  
Fig. I.

motu æquabili spatium est ut tempus ductum in celeritatem (§. 34. *Mech.* & §. 159. *Arithm.*), adeoque spatium à mobili tempusculo  $Pp$  confectum ut rectangulum  $Pp$   $RM$  (§. 375 *Geom.*); consequenter cum singulis tempusculis, quibus  $AP$  constat, ipsi  $Pp$  æqualibus istiusmodi parallelogrammula respondeant, quæ simul sumpta aream triangularem  $APM$  conficiunt (§. 99 *Analys. infin.*), area  $APM$  exprimit spatium à mobili tempore  $AP$  confectum. Ex eadem ratione triangulum  $ABC$  exprimit spatium à mobili tempore  $AB$  confectum. Sunt igitur spatia temporibus  $AP$  &  $AB$  descripta ut triangula  $APM$  &  $ABC$ , consequenter ob eorundem similitudinem (§. 268 *Geom.*), in ratione duplicata rectorum  $AP$  &  $AB$  (§. 398. *Geom.*), hoc est, temporum. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

81. Quoniam in motu uniformiter accelerato celeritates sunt ut tempora (§. 68); spatia erunt etiam in ratione duplicata celeritatum in fine temporum, quibus describuntur, acquisitarum (§. 80).

## COROLLARIUM II.

82. In motu uniformiter accelerato tempora sunt in ratione subduplicata spatiorum (§. 159 *Arithm.* & §. 80 *Mech.*)

## COROLLARIUM III.

83. Etiam celeritates in fine temporum sunt in ratione subduplicata spatiorum illis descriptorum (§. 159 *Arithm.* & §. 81 *Mech.*).

## THEOREMA XVI.

84. *Spatia, quæ corpus motu uniformiter accelerato percurrit, crescunt tem-*

*poribus æqualibus secundum numeros impares 1, 3, 5, 7, 9, &c.*

## DEMONSTRATIO.

Si tempora, quibus corpus motu uniformiter accelerato progreditur, fuerint ut 1, 2, 3, 4, 5, &c. spatium intra momentum 1 confectum erit ut 1, intra duo percursum ut 4, intra tria ut 9, intra quatuor ut 16, intra quinque ut 25 &c. (80). Quodsi ergo subtrahas spatium intra minutum unum percursum à spatio intra duo confecto 4; remanebit spatium minuto secundo respondens 3. Eodem modo reperitur spatium minuto tertio absolutum  $9 - 4 = 5$ , spatium quarto respondens  $16 - 9 = 7$ , quod quinto convenit  $25 - 16 = 9$  &c. & ita porro (§. 83. *Analys.*). Spatium ergo minuti primi est ut 1, secundi ut 3, tertii ut 5, quarti ut 7, quinti ut 9, &c. adeoque spatia corporis motu uniformiter accelerato progredientis temporibus æqualibus augentur secundum numeros impares 1, 3, 5, 7, 9, &c. *Q. e. d.*

## THEOREMA XVII.

85. *Corpora gravia in medio non resistente per intervalla non nimis magna motu uniformiter accelerato descendunt.*

## DEMONSTRATIO.

Cum gravia descendant motu accelerato (§. 79); Vis gravitatis ea continuo impellere debet (§. 76). Est vero gravitas in intervallo non minis magno eadem (§. 78). Quare gravia eodem modo temporibus æqualibus deorsum impelli debent (§. 25). Itaque

fi tempusculo primo impelluntur celeritate  $c$ , etiam secundo celeritate  $c$ , impellentur, immo etiam tertio, quarto, quinto & alio quocunque æquali. Quoniam vero medium non resistit *per hypoth.* celeritatem semel acquisitam constanter retinent (§. 71), adeoque temporibus æqualibus æqualia continuo celeritatis incrementa capiunt, consequenter motu uniformiter accelerato descendunt (§. 67) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

86. Sunt igitur spatia descensus ex quiete in temporum (§. 80), itemque in velocitatum ratione duplicata (§. 81.) & secundum numeros impares 1, 3, 5, 7, 9, &c. crescunt (§. 84).

COROLLARIUM II.

87. Tempora vero, itemque velocitates sunt in ratione spatiorum subduplicata (§. 82. 83).

SCHOLION I.

88. Dum gravia descendere supponimus in medio non resistente, ab omni externo impedimento abstrahimus, quocunque tandem nomine veniat & à quacunque causa ortum trahat. Unde motum quoque secludimus, quo, ob vertiginem Telluris in Astronomia adstruendum, in transversum rapiuntur gravia ipso descensus tempore: quamvis in intervallo non nimis magno nulla inde in descensum gravium irregularitas irrepit.

SCHOLION II.

89. GALILÆUS GALILÆI, qui legem descensus corporum gravium ratiocinando invenit, eandem quoque experiētiis consonam apprehendit. (a) In tabula scilicet lignea duos circiter cubitos longa canalem excavavit uno digito paulo latiore, agglutinata intus membrana, ne scabritie sua pilam aeneam bene politam in descensu remoraretur. Eam

(a) In Dialogis de motu locali Dial. 3. p. m. 157. 158.

postea supra planum horizontale uno, duobus & pluribus cubitis successive elevarit, & tempus, in qua pila per canalem descendeat, accurate dimetiens, iteratis vel centies experimentis, didicit spatia decursa semper esse ut temporum quadrata. Notandum vero spatia computanda esse non in longitudine, sed in altitudine plani, vi eorum, quæ inferius demonstrabuntur.

SCHOLION III.

90. Eadem experimenta modo tamen diverso sæpius cum GRIMALDO suo repetiit Joh. Baptista RICCIOLUS (b) plurimos Globos cretaceos ejusdem molis, pondere 8 unciarum, ex diversarum turrium aut adium fenestris dimittens & tempus descensus perpendiculari vibrationibus dimetiens. Perpendiculari vibrationes numeravit cum GRIMALDO à transitu caudæ Leonis per Meridianum usque ad alterum transitum, ut certo constaret, quot vibrationes penduli respondeant quodlibet minutis temporis. Etenim eodem pendulo deinceps usus in observationibus Astronomicis, antequam Horologia oscillatoria ab HUGENIO fuissent inventa. Experimenta sequens repræsentat Tabella.

Vibrationes Penduli.	Tempus		Spatium in fine temporis.	Spatium singulis temporibus confectum.
	"	"	Ped. Rom.	Ped. Rom.
5	0	50	10	10
10	1	40	40	30
15	2	30	90	50
20	3	20	160	70
25	4	10	250	90
6	1	0	15	15
12	2	0	60	45
18	3	0	135	75
24	4	0	240	105

B 3

SCHO-

(b) Almagest Nov. Tom. I. lib. 2. c. 21. prop. 4. fol. 89. 90.

## SCHOLIUM IV.

91. Cum adeo experimenta RICCIOLI in observando maxime exercitati in tanto intervallo instituta Theoria apprime consentiant; vix attendenda esse videntur, quæ in contrarium affert (c) DECHALES, qui se expertum scribit, uno minuto semisecundo grave descensu suo confecisse pedes  $4\frac{1}{4}$ , duobus  $16\frac{1}{2}$ , tribus 36, quatuor 60, quinque 90, sex 123. Sufficit, quod ipse à resistèntia aëris irregularitatem deducat, quam in demonstratione insuper habuimus.

## THEOREMA XVIII.

92. Si grave in medio non resistente per intervallum non nimis magnum descendit, spatium ab eo decursum est subduplum ejus, quod eodem tempore motu uniformi cum ea velocitate conficitur, quam in fine temporis grave acquirit.

## DEMONSTRATIO.

Concipiatur recta AB, quæ tempus integrum descensus representet, in partes quotcunque æquales divisa, & ad abscissas AP, AQ, AS, AB applicentur rectæ PM, QI, SH, BC, quæ sint ut celeritates cadendo in istis temporibus acquisitæ. Quoniam itaque AP:AQ=PM:QI; AP:AS=PM:SH &c. (§.85.): & rectæ PM, QI, SH, BC inter se parallelæ (§.256 Geom.); erit ABC triangulum (§.268 Geom.). Et spatium tempore AB percursum est ut triangulum ABC: quemadmodum ex demonstratione Theorematis 15. (§.80.) constat. Spatium vero eodem tempore AB celeritate BC uniformiter descriptum cum sit ut rectangulum ABCD (§.34); erit utique

(c) Staticæ lib. 2. prop. 11. Mund. Matth. Tom. II. f. 275.

istud ad hoc ut 1 ad 2 (§.386 Geom.) Q. c. d.

## COROLLARIUM.

93. Spatium igitur, quod tempore ipsius AB dimidio celeritate BC in fine temporis AB à gravi acquisita conficitur, æquale est spatio, per quod grave ex quiete tempore AB integro descendit.

## PROBLEMA I.

94. Dato tempore, quo grave ex altitudine data descendit, spatia definire, quæ singulis istius temporis partibus conficit.

## RESOLUTIO.

Sit altitudo data =  $a$ , tempus =  $t$ , spatium parte temporis 1 confectum  $x$ ; erit (§.86).

$$1 : t^2 = x : a$$

---


$$t^2 x = a$$

---


$$x = a : t^2$$

Est adeo spatium parte temporis prima confectum  $a : t^2$ , adeoque decursum parte secunda =  $3a : t^2$ , tertia descriptum =  $5a : t^2$  &c. (§.86).

E. gr. supra in experimentis Riccioli (§.90) intra 4 secunda globus cretaceus descendit ex altitudine 240 pedum. Spatium igitur primo secundo confectum =  $240 : 16 = 15$ , spatium confectum secundo =  $15 \cdot 3 = 45$ , confectum tertio =  $15 \cdot 5 = 75$ , confectum denique quarto =  $15 \cdot 7 = 105$ . Est autem  $15 + 45 + 75 + 105 = 240$ .

## PROBLEMA II.

95. Dato tempore, quo grave in medio non resistente per spatium datum descendit, determinare tempus, quo aliud spatium datum in eodem medio conficiet.

RESO-

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Cum spatia sint ut quadrata temporum (§. 86), queratur ad spatium per quod grave dato tempore descendit, spatium quod in quaestione est, & quadratum temporis dati numerus quartus proportionalis, (§. 302 *Arithm.*), qui erit quadratum temporis quaesiti.

2. Quare si inde extrahatur radix quadrata (§. 269 *Arithm.*) prodibit ipsum tempus quaesitum. *Q. e. i. & d.*

E. gr. Globus cretaceus in experimentis *Riccioli* (§. 90.) intervallo 4 minutorum descendit per spatium 240 pedum; quaeritur, quo tempore confecturus sit spatium 135 pedum? Invenietur hoc tempus =  $\sqrt{(135:16:240)} = \sqrt{(135:15)} = \sqrt{9} = 3.$

PROBLEMA III.

96. Dato spatio, quod grave in medio non resistente dato aliquo temporis intervallo confecit, determinare spatium, quod intra aliud temporis intervallum datum emetitur.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Cum spatia sint ut quadrata temporum (§. 86); queratur ad quadratum temporis, quo grave per datum spatium descendit, ad quadratum temporis quo aliud quaesitum emetiri debet, atque ad spatium datum numerus quartus proportionalis (§. 272 *Arithm.*): qui erit spatium quaesitum.

E. gr. Per experimenta *Riccioli* Globus cretaceus intervallo duorum secundorum confecit spatium 60 pedum: quaeritur quantum spatium confecturus sit intervallo 4 secundorum? Reperietur spatium quaesitum  $16. 60 : 4 = 4. 60 = 240.$

THEOREMA XIX.

97. Si corpus fertur motu uniformiter retardato, spatium dimidium ejus percurrit quod motu uniformi eodem tempore conficeret.

DEMONSTRATIO.

Concipiatur tempus datum representans recta AB in partes quotcunque aequales divisa & ad eam applicentur rectae BC, SH, QI, PM, quae sint ut velocitates temporis partibus o, BS, BQ, BP, BA respondententes, ita ut dimissis perpendicularibus HE, IF, MG rectae CE, CF, CG, CB sint ut celeritates temporibus HE, FI, GM, AB, hoc est, BS, BQ, BP, BA amissae. Quoniam CE:CF=EH:FI & CG:CB=GM:BA (§. 70); erit ABC triangulum (§. 268 *Geom.*) Quodti Bb fit tempusculum infinite parvum, motus erit uniformis, adeoque spatium a mobili descriptum ut areola BbcC, consequenter spatium tempore AB confectum ut triangulum ABC, quemadmodum ex Demonstratione Theor. xv. (§. 80) constat. Enimvero spatium a mobili celeritate BC tempore AB uniformiter descriptum est ut rectangulum ABCD (§. 34) Ergo illud hujus dimidium (§. 386. *Geom.*) *Q. e. d.*

Tab. I.  
Fig. 1.

THEOREMA XX.

98. Spatia motu uniformiter retardato descripta temporibus equalibus secundum numeros impares retrogrado ordine decrescunt.

DEMONSTRATIO.

Percurrat mobile tempusculo primo spatium 7 pedum; dico, quod secun-

Tab. I.  
Fig. 1.

do

do confecturum sit spatium 5 pedum, tertio spatium 3, quarto spatium unius, si motus uniformiter retardetur. Sint enim partes axis trianguli æquales BS, SQ, QP, PA ut tempora, semiordinatæ BC, SH, QI, PM ut celeritates in initio temporis cujuslibet: erunt trapezia BSHC, SQIH, QPMI, &  $\Delta$  PAM ut spatia temporibus istis descripta: quod patet ex Demonstratione Theorematis præcedentis (§. 97). Sit igitur  $BC=4$  &  $BS=SQ=QP=PA=1$ ; erit  $SH=3$ ,  $QI=2$ ,  $PM=1$  (§. 70),  $BSHC=(4+3)1:2=\frac{7}{2}$ ,  $SQIH=(3+2)1:2=\frac{5}{2}$ ,  $QPMI=(2+1)1:2=\frac{3}{2}$  (§. 400 *Geom.*),  $PAM=\frac{1}{2}$  (§. 392 *Geom.*), consequenter spatia aequalibus temporibus descripta sunt ut  $\frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}$ , hoc est, ut 7. 5. 3. 1 (§. 178 *Arithm.*) *Q. e. d.*

## THEOREMA XXI.

99. Si ad altitudinem AE applicentur celeritates PM, ES, descensu uniformiter accelerato per spatia AP, AE acquisita, locus celeritatum AMS erit Parabola.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam AP & AE sunt spatia & PM, atque ES celeritates descensu per ea acquisitæ; erit  $AP:AE=PM^2:ES^2$  (§. 81), hoc est, quadrata semiordinatarum sunt ut abscissæ. Est igitur AMS Parabola. (§. 402 *Anal. fin.*) *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

100. Quoniam in motu uniformiter accelerato celeritates sunt ut tempora (§. 68); si ad spatia AP, AE applicentur tempora

PM, ES, quibus describuntur, curva temporis AMS erit itidem Parabola.

## PROBLEMA IV.

101. *Daia celeritate mobilis in motu quomodocunque accelerato per tempus, invenire spatium.* Tab. Fig.

## RESOLUTIO.

Designet in axe curvæ AP tempus & semiordinata PM celeritatem eodem acquisitam, sitque AMS locus celeritatum. Ducatur *pm* ipsi PM infinite propinqua. Fiat  $AP=t$ ,  $PM=c$ , erit  $Pp=dt$  & Elementum  $PMmp=cdt$  (§. 98 *Analys. infin.*). Enimvero quoniam tempusculo *dt* motus est æqualis; erit spatiolum à mobili descriptum  $=cdt$  (§. 34), consequenter *scdt* five area AMP designabit spatium tempore AP descriptum. Quare si detur celeritas *c* per tempus *t*, non alia re opus est, quam ut valore hoc in Elemento *cdt* substituto formula summetur.

E. gr. Sit *c* ut  $t^n$ : erit  $cdt=t^n dt$ , adeoque  $scdt=\frac{1}{n+1}t^{n+1}$ . Sunt igitur spatia APM & AES temporibus AP & AE decursa ut  $\frac{1}{n+1}t^{n+1}$  ad  $\frac{1}{n+1}T^{n+1}$ , consequenter ut  $t^{+1}$  ad  $T^{n+1}$  (§. 187 *Arithm.*), adeoque ob  $t^n=c$  ut *ct* ad *CT*. Habemus itaque hoc

*Theorema.* Si celeritas in motu continuo accelerato acquisita fuerit in ratione quacunque multiplicata vel submultiplicata temporis; spatia sunt in ratione composita celeritatum atque temporum.

PROBLEMA V.

102. *Data celeritate mobilis motu continuo, sed quomocunque accelerato lati per spatium, invenire tempus.*

RESOLUTIO.

Si celeritas =  $c$ , tempus =  $t$ , spatium  $r$ , Elementum spatii  $dr$  tempusculo  $dt$  percursum est  $cdt$  (§. 101.) Habemus itaque

$$\frac{cdt}{dt} = \frac{dr}{\frac{dr}{c}}$$

$$t = \int \frac{dr}{c}$$

Quare si celeritas detur per  $r$ , non alia re opus est, quam ut valore hoc in Elemento  $dr:c$  substituto formula summetur.

E. gr. Sit in Hypothesi BALIANI  $c$  ut  $r$ , erit  $dr:r = dt$ , adeoque  $t = \int \frac{dr}{r} = lr$  (§. 243 *Analys. infn.*). Unde patet

*Theorema.* Si in motu accelerato celeritates sunt ut spatia, tempora sunt ut eorum logarithmi.

Et quia  $\int \frac{dr}{r}$  est spatium Hyperbolicum per latus potentiae Hyperbolae 1 divisum; ideo (§. 120 in *Analys. in fin.*)

*Theorema.* In hypothesi BALIANI, in qua celeritates sunt ut spatia, tempus exhibetur per spatia Hyperbolica, adeoque ejus determinatio à quadratura Hyperbolae pendet.

Similiter si celeritas fuerit in ratione multiplicata vel submultiplicata quacunquē spatii, hoc est,  $c$  ut  $r^n$ ; erit  $dt = dr:r^n$

$$= r^{-n} dr, \text{ consequenter } t = \frac{1}{-n+1} r^{-n+1}$$

$$= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{r}{r^n} \text{ adeoque } T:t = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{R}{R^n}$$

$$: \frac{1}{1-n} \cdot \frac{r}{r^n} = \frac{R}{R^n} \cdot \frac{r}{r^n} = \frac{R}{C} : \frac{r}{c} = Rc : rC$$

*Theorema.* Si celeritates acquisitae fuerint in ratione quacunquē multiplicata vel submultiplicata spatiorum, erunt tempora in ratione composita ex directa spatiorum & reciproca celeritatum per spatia ista acquisitarum.

SCHOLIUM.

103. VARIGNONIUS, *Geometra eximius*, (a) doctrinam de motu accelerato & retardato *Analysi generali* absolvens varia dedit exempla, quae ad exercendam *Analysin* faciunt, etsi in *Mechanica*, ubi in *Hypothesibus naturae* exemplo GALILAEI acquiescere poteramus, nullum habeant usum. Quamobrem ut Tyrones ad solutiones *Problematum Physico-Mathematicorum* praeparemus, utque intelligant principia in his *Elementis* stabilita ad talia sufficere; unum alterumque exemplum evoluta *Analysi* cum primis principiis *Matheseos* connexum exhibere lubet.

PROBLEMA VI.

104. *Si tempora sint ut abscissae AP & celeritates istis acquisitis ut semiordinate PN curvae ANS ejus naturae, ut semiordinate PN sit ad semiordinate Hyperbole aequilaterae PM in ratione quacunquē multiplicata vel submultiplicata dimidii axis AC ad abscissam CP à centro C computatam: invenire spatia dato tempore descripia.*

Tab. XIII. Fig. 122. a

C RESO-

(a) In *Comment. Acad. Reg. Scient. An. 1727.* p. 293. & seq

RESOLUTIO.

Ex superioribus (§. 101) liquet spatia quaesita esse ut aream APN, adeoque pendere à quadratura curvæ datæ ANS. Quoniam itaque AMR est hyperbola æquilatera, cujus axis transversus AB, centrum C; si fiat AC = a, AP = t; erit BP = 2a + t, adeoque ob AP.PB = PM<sup>2</sup> (§. 507 *Analyf.*) PM<sup>2</sup> = 2at + t<sup>2</sup>, consequenter PM = √(2at + t<sup>2</sup>). Quare cum porro sit per hypoth.

$$CP^n : AC^n = PM : PN$$

(a + t)<sup>n</sup> : a<sup>n</sup> = √(2at + t<sup>2</sup>) : PN, erit PN = a<sup>n</sup>√(2at + t<sup>2</sup>) : (a + t)<sup>n</sup> = c. Est nempe c celeritas tempore AP acquisita, quam PN repræsentat per hypoth. Quare si in Elemento spatii PNnp = cdt (§. 101) substituatur valor ipsius c; prodibit Elementum speciale a<sup>n</sup>dt√(2at + t<sup>2</sup>) : (a + t)<sup>n</sup>. Totum adeo negotium huc redit, ut hoc Elementum summabile reddatur, quantum datur. Fiat itaque

$$\begin{aligned} a + t &= x \\ \text{erit } dt &= dx \\ t &= x - a \\ \hline 2at &= 2ax - 2a^2 \\ t^2 &= a^2 - 2ax + x^2 \\ \hline 2at + t^2 &= x^2 - a^2 \\ \hline \sqrt{2at + t^2} &= \sqrt{x^2 - a^2} \\ (a + t)^n &= x^n \\ \hline \frac{a^n dt \sqrt{2at + t^2}}{(a + t)^n} &= \frac{a^n dx \sqrt{x^2 - a^2}}{x^n} \end{aligned}$$

Fiat porro

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{a^3}{a-z}, & x &= \frac{a^{3:2}}{(a-z)^{1:2}} \\ 2x dx &= \frac{a^3 dz}{(a-z)^2}, & x^n &= \frac{a^{3n:2}}{(a-z)^{n:2}} \\ dx &= \frac{a^3 dz}{2x(a-z)^2} = \frac{a^3 dz (a-z)^{1:2}}{2a^{3:2} (a-z)^2} \\ &= \frac{a^{3:2} dz}{2(a-z)^{3:2}} \\ \hline a^n dx &= \frac{a^{n+3:2} dz}{2(a-z)^{3:2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jam } x^2 - a^2 &= \frac{a^3}{a-z} - a^2 = \frac{a^2 z}{a-z} \\ \sqrt{x^2 - a^2} &= \frac{a z^{1:2}}{(a-z)^{1:2}} \\ \text{adeoque} \end{aligned}$$

$$a^n dx \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{a^{n+5:2} z^{1:2} dz}{2(a-z)^2}$$

Quare tandem habetur

$$\begin{aligned} \frac{a^n dx \sqrt{x^2 - a^2}}{x^n} &= \frac{a^{n+5:2} z^{1:2} (a-z)^{n:2}}{2a^{3n:2} (a-z)^2} \\ &= \frac{1}{2} a^{(5-n):2} z^{1:2} (a-z)^{(n-4):2} dz \end{aligned}$$

Elementum hoc PNnp areæ APN integrabile est, si n fuerit numerus positivus par binario major.

E. gr. Sit n = 4, erit (n - 4) : 2 = 0, adeoque (a - z)<sup>(n-4):2</sup> = (a - z)<sup>0</sup> = 1 (§. 55. *Analyf.*), consequenter

$$\begin{aligned} \text{PNnp} &= \frac{1}{2} a^{1:2} z^{1:2} dz, \\ \text{adeoque ANP} &= \frac{1}{2} a^{1:2} z^{3:2} \\ &= \frac{1}{3} z \sqrt{az}. \end{aligned}$$

Jam quia

$$\begin{aligned} x^2 &= a^3 : (a - z) \\ a^3 - z &= a^3 : x^2 \\ z &= a - a^3 : x^2 \\ az &= (a^2 x^2 - a^4) : x^2 \\ \sqrt{az} &= a \sqrt{x^2 - a^4} : x. \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3} z \sqrt{az} = \frac{a^2 (x^2 - a^4) \sqrt{x^2 - a^4}}{3x^3}$$

Por-



Porro

$$\begin{aligned} x &= t + a \\ x^2 &= t^2 + 2at + a^2 \\ x^2 - a^2 &= t^2 + 2at \\ \frac{1}{2}x\sqrt{ax} &= \frac{a(t^2 + 2at)\sqrt{(t^2 + 2at)}}{3(a+t)^3} \\ &= \text{ANP} \end{aligned}$$

SCHOLIION.

105. Apparet adeo, exemplum hoc non alium habere usum, quam ad exercendum calculum summatorium. Et idem quoque de sequentibus patebit.

PROBLEMA VII.

106. Si celeritas tempore  $t$  acquisita fuerit ut  $t^{n-1} : (t^n + a^{2n})$ , determinare spatium  $r$ .

RESOLUTIO.

Quoniam  $dr = cdt$  (§. 101) erit  $dr = t^{n-1} dt : (t^{2n} + a^{2n})$ . Ut Elementum integrabile reddatur, fiat

$$\begin{aligned} t^{2n} &= a^{2n-2} x^2 \\ \text{erit } t &= a^{(n-1):n} x^{1:n} \end{aligned}$$

$$dt = \frac{1}{n} a^{(n-1):n} x^{1:n-1} dx$$

Porro ob  $t^{n-1} = t^n : t$

$$\begin{aligned} t^{n-1} &= a^{n-1} x : a^{(n-1):n} x^{1:n} \\ &= a^{(nn-2n+1):n} x^{(n-1):n} \end{aligned}$$

$$t^{n-1} dt = \frac{1}{n} a^{n-1} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{t^{n-1} dt}{t^{2n} + a^{2n}} &= \frac{\frac{1}{n} a^{n-1} dx}{a^{2n-2} x^2 + a^{2n}} \\ &= \frac{\frac{1}{n} a^{1-n}}{x^2 + a^2} dx \end{aligned}$$

Quare spatium  $r = \frac{1}{n} a^{1-n} \int \frac{dx}{x^2 + a^2}$ .

Si tangens arcus circuli fuerit  $x$ , ra-

dius  $a$ , erit  $\int \frac{a^2 dx}{x^2 + a^2}$  arcus (§. 185 *Analyf. in fin.*), ut adeo quadratura curvæ, quæ spatium  $r$  exhibet, pendeat à rectificatione arcus circuli.

VARIGNONIUS formulam, quæ exprimit arcum in relatione ad tangentem reducit ad aliam, quæ eundem arcum exhibet in relatione ad sinum versum: id quod fit hoc modo. Sit

$$\begin{aligned} x &= a\sqrt{(2a:y-1)} \\ &=: a(2ay^{-1}-1)^{1:2} \end{aligned}$$

erit  $dx = -a^2 y^{-2} dy : \sqrt{(2ay^{-1}-1)}$   
Elementum hoc in præsentem casu sumendum est positivum, quia crescente  $x$  decrescit  $y$ , consequenter ipsius  $y$  differentiale  $-dy$ .

$$\begin{aligned} \text{Porro } x^2 &= 2a^3 : y - a^2 \\ x^2 + a^2 &= 2a^3 : y \end{aligned}$$

Quamobrem

$$\begin{aligned} \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \frac{a^2 y dy}{2a^3 y \sqrt{(2ay^{-1}-1)}} \\ &= \frac{1}{2a^2} \cdot \frac{ady}{\sqrt{(2ay-y^2)}} \\ \frac{1 \cdot a^{1-n} dx}{n \cdot x^2 + a^2} &= \frac{1}{2na^{n+1}} \cdot \frac{ady}{\sqrt{(2ay-y^2)}} \end{aligned}$$

PROBLEMA VIII.

107. Data celeritate  $c$  tempore  $t$  acquisita, quæ sit ut  $t^{n-1} : (t^{2n} - a^{2n})$ , invenire spatium  $r$ .

RESOLUTIO.

Quia  $dr = cdt$  (§. 101)

$$\text{erit } dr = t^{n-1} dt : (t^{2n} - a^{2n})$$

Ponatur ut ante (§. 104)

$$\begin{aligned} t^{2n} &= a^{2n-2} x^2 \\ \text{reperietur } \frac{t^{n-1} dt}{t^{2n} - a^{2n}} &= \frac{1}{na^{n-1}} \cdot \frac{dx}{x^2 - a^2} \end{aligned}$$

prorsus ut ante. Ponatur porro

$$x = a\sqrt{(2ay - 1 + 1)}$$

reperietur  $\frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{dy}{2a\sqrt{(2ay + y^2)}}$  ut  
ante, adeoque tandem

$$dx = \frac{1}{2na + 1} \cdot \frac{ady}{\sqrt{(2ay + y^2)}}$$

Ponatur denique

$$v - a = y$$

$$\text{erit } v^2 - 2av + a^2 = y^2$$

$$2av - 2a^2 = 2ay$$

$$v^2 - a^2 = y^2 + 2ay$$

$$\sqrt{(v^2 - a^2)} = \sqrt{(y^2 + 2ay)}$$

$$\frac{dv}{2v} = \frac{dy}{2y}$$

$$\frac{dv}{\sqrt{(v^2 - a^2)}} = \frac{dy}{\sqrt{(y^2 + 2ay)}}$$

Quoniam  $a^2 dv : 2\sqrt{(v^2 - a^2)}$  est  
sector Hype. bolicus CAM, abscissis à  
centro computatis (§. 179 *Analys. in-*  
123.a *fin.*) erit dimidius Axis Hyperbolæ  
æquilateræ =  $a$  &  $CP = v$ , conse-  
quenter  $a^2 dy : \sqrt{(y^2 + 2ay)}$  exprimit  
eundem sectorem CAM, abscissa AP  
existente  $y$ . Patet itaque determina-  
tionem spatii in casu præsentè pende-  
re à quadratura hyperbolæ.

### SCHOLIUM I.

308. Apparet ex his Problematis, quam  
utile sit formulas omnes Elementorum Ar-  
cum, segmentorum & sectorum pro sectio-  
nibus conicis aliisque curvis descriptu facilio-  
ribus atque cognitarum proprietatum repe-  
rire, sibi que familiares reddere, ut formulæ  
non summabiles ad eas tanquam simpliciores  
reduci possint, quemadmodum & paulo ante  
vidimus (§. 105) posse constructiones curva-  
rum ad alias descriptu faciliores reduci, per  
quas construuntur: cujus rei exempla quoque  
dedimus in Algebra (§. 245. & seqq. *Analys.*  
*infin.*)

### SCHOLIUM II.

109. Potest etiam sectoris CAM Elementum  
independenter à formula  $a dv : \sqrt{(v^2 - a^2)}$   
invenire hoc modo. Sit  $AC = CB = a$ ,  $AP$   
 $= y$ , erit  $PB = 2a + y$ , consequenter ob  
 $PM^2 = AP \cdot PB$  (§. 507 *Analys. finit.*) =  $2ay$   
 $+ y^2$ .  $PM = \sqrt{(2ay + y^2)}$ , qua in  $\frac{1}{2} CP$   
 $= \frac{1}{2}(a + y)$  ducta prodit area trianguli  $CMP$   
 $= (a + y)\sqrt{(2ay + y^2)}$ .

Ergo  $CmM + mMPp = \frac{1}{2} dy \sqrt{(2ay + y^2)}$   
 $+ \frac{ady + ydy \cdot a + y}{\sqrt{(2ay + y^2)}^2} = \frac{2aydy + y^2 dy + \frac{1}{2} a^2 dy}{\sqrt{(2ay + y^2)}}$

Jam  $mMPp = dy \sqrt{(2ay + y^2)} =$   
 $\frac{2aydy + y^2 dy}{\sqrt{(2ay + y^2)}}$  Ergo  $CmM$  Elementum sec-  
toris  $CMA = \frac{\frac{1}{2} a^2 dy}{\sqrt{(2ay + y^2)}} = \frac{a^2 dy}{2\sqrt{(2ay + y^2)}}$

### DEFINITIO XVIII.

110. In motu continuo accelerato  
celeritatis incrementum tempusculo  
quocunque infinite parvo successive  
nascitur. Quamobrem quantitas mo-  
tus eodem genita resolvitur in innume-  
ras alias æqualibus illius tempusculi  
particulis natas. Particulæ istiusmodi  
Elementares quantitates motus tempus-  
culo infinite parvo genitæ dicuntur *Sol-*  
*licitatio ad motum.*

### COROLLARIUM.

111. Quodsi ergo istæ particulæ ponan-  
tur æquales quatenus spectantur ut effec-  
tus ab eadem causa tempusculis æquali-  
bus producti; si sollicitatio ad motum di-  
catur  $g$ , erit nisus Elementaris seu quan-  
titas motus tempusculo  $dt$  genita =  $gdt$ .

### PROBLEMA IX.

112. Data accelerationis lege, de-  
terminare sollicitationem ad motum.

RESO-

RESOLUTIO.

Si sollicitatio sit  $g$ , erit quantitas motus tempusculo  $dt$  genita  $= gdt$  (§. III). Sit incrementum celeritatis tempusculo isto  $= dc$ , massa mobilis  $= m$ . Quoniam tempusculo infinite parvo  $dt$  motus æquabilis supponitur; erit quantitas motus eodem genita  $= mdc$  (§. 22). Habemus itaque  $mdc = gdt$ , adeoque  $g = mdc : dt$ .

Quare si ex data accelerationis lege determinetur  $dt$  per  $ac$  vel contra, prodibit valor ipsius  $g$ .

E. gr. In Hypothesi GALILÆANA gravium seu in motu æquabiliter accelerato celeritas  $c$  est ut tempus  $t$ , adeoque  $dt$  ut  $dc$ . Quare  $g$  ut  $mdc : dc$ , hoc est, ut  $m$ . Quare patet

*Theorema.* In Hypothesi GALILÆANA gravium seu in motu æquabiliter accelerato sollicitatio ad motum est ut massa, adeoque constans.

Si fuerit

$$c \text{ ut } t^n$$

$$\text{erit } \frac{dc = nt^{n-1} dt}{g = \frac{mdc}{dt} = \frac{mnt^{n-1} dt}{dt}}$$

$$= nmt^{n-1}$$

$$= nmt^n : t$$

$$= nmc : t$$

*Theorema.* Si celeritas crescit in ratione temporis multiplicata, erit sollicitatio ad motum ut factum ex massa in celeritatem ductum ulterius in exponentem dignitatis temporis directe & ut tempus reciproce: hoc est, si duo fuerint mobilia, sollicitationes ad motum erunt in ratione composita ex directa massarum & celeritatum in exponentes dignitatis temporum ductarum, & reciproca temporum, nempe ut  $\frac{NMC}{T}$  ad  $\frac{nmc}{t}$  seu ut  $NMCt$  ad  $nmcT$ .

PROBLEMA X.

113. Data sollicitatione ad motum, invenire mobilis motu continuo accelerato lati tum velocitatem in locis singulis, tum tempus, quo mobile ad locum datum pervenit.

RESOLUTIO.

Sit recta, per quam mobile fertur, AB & normaliter ad eam applicata AC, PN &c. sint ut sollicitationes ad motum in A, P &c. PM sit ut celeritas à mobili in P acquisita. Ducatur  $pn$  ipsi PN infinite propinqua & dicatur  $PN = g$ ,  $AP = r$ ,  $PM = c$ , massa mobilis  $= m$ ; erit  $Pp = dr$ . Sit porro tempusculum, quo mobile per  $Pp$  descendit,  $= dt$ : quia motus in spatiolo  $Pp$  æquabilis supponitur, erit

Tab. XIII. Fig. 122.b

$$c = dr : dt (\text{§. 37}) \ \& \ g = mdc : dt (\text{§. 112}).$$

$$\frac{cdt = dr}{dt = dr : c} \quad \frac{gdt = mdc}{dt = mdc : g}$$

$$\frac{dr}{c} = \frac{mdc}{g}$$

$$\frac{gdr = mdc}{fgdr = \frac{1}{2}mc^2}$$

Est vero  $fgdr$  area APNC &  $\frac{1}{2} c^2 = \frac{1}{2} PM^2$ . Quare si mobile fuerit idem, erit APNC ut  $PM^2$  (§. 181 *Arithm.*).

Habemus itaque

*Theorema.* Si mobile quacunq; sollicitatione urgetur, velocitas ejus in fine spatii dati AP acquisita est ut recta, quæ potest aream sollicitationum APNC, seu est in ratione subduplicata hujus areæ.

Porro tempus  $t$  reperitur hoc modo:

$$c = dr : dt \quad \frac{\int gdr}{2\int gdr} = \frac{1}{2} mc^2$$

$$\frac{2\int gdr}{m} = c^2$$

$$\frac{\sqrt{2\int gdr}}{\sqrt{m}} = c$$

$$dr : dt = \sqrt{2\int gdr} : \sqrt{m}$$

$$\frac{dr}{\sqrt{2\int gdr}} = \frac{dt}{\sqrt{m}}$$

$$\frac{dr}{\sqrt{2\int gdr}} = dt$$

$$\int dr \cdot \frac{1}{\sqrt{2\int gdr} : \sqrt{m}} = t$$

Quodsi ergo fiat  $PL = \frac{1}{\sqrt{2\int gdr} : \sqrt{m}}$ .  
 seu mobili existente eodem, =  
 $1 : \sqrt{2\int gdr}$ , area DAPLE designabit tem-  
 pus.

Ponamus jam  $AQ = R$ ,  $QS = G$ , erit  
 $C = \sqrt{2\int GdR}$ , mobili existente eo-  
 dem, ut massa poni possit  $I$ , aut ejus  
 nulla habenda sit ratio. Erit adeo

$$C : c = \sqrt{2\int GdR} : \sqrt{2\int gdr}.$$

$$\text{Sed } PL : QO = \frac{1}{\sqrt{2\int GdR}} : \frac{1}{\sqrt{2\int gdr}}$$

$$= \sqrt{2\int gdr} : \sqrt{2\int GdR}$$

$$\text{Ergo } PL : QO = c : C$$

Habemus itaque

*Theorema.* Si mobile quacunq; sollicitatione movetur motu continuo accelera-  
 to, erunt tempora  $QO$  &  $PL$ ; quibus  
 spatia data  $AQ$  &  $AP$  conficit, celeritatibus  
 in fine illorum spatiorum acquisitis reci-  
 proce proportionalia, nempe ut  $PMad$   $QT$ .

#### SCHOLIUM I.

114. Consentit Analysis cum iis, que  
 NEWTONUS (a) demonstravit, nisi quod is  
 vim centripetam vocet, quod nos sollicita-  
 tionem appellamus. Communiter enim Ma-  
 thematici celeritatem sumunt tanquam effec-

tum vis motricis eidem proportionalem, at-  
 que adeo quantitatem motus tanquam men-  
 suram vis illius. Quare cum NEWTONUS  
 vim illam consideret ut urgentem mobile ver-  
 sus aliquod punctum fixum, eam centripetam  
 appellat. Alii in casu descensus gravium gra-  
 vitationem vocant, quia gravitas consideratur  
 ut causa acceleratrix motus gravium & cele-  
 ritas momentis singulis descendentem superac-  
 cedens tanquam effectus illius causæ.

#### SCHOLIUM II.

115. Ex Theorematis per Problema præ-  
 sens erutis omnia deducere licet, qua de mo-  
 tu gravium in Hypothesi GALILÆANA sive  
 in alia quacunq; demonstrantur. Etenim in  
 Hypothesi GALILÆANA est  $c$  ut  $t$ , adeoque  
 $dc$  ut  $dt$ . Jam  $gdr = cdc$  (§. 113). Ergo  
 $gdr = cdt$ , consequenter  $gdr : dt = c$ , adeo-  
 que ob  $dr : dt = c$  erit  $gc = c$ . Cum adeo sit  
 $g = 1$ , gravitas in Hypothesi GALILÆANA  
 constans, hoc est, Elementa singula, ex qui-  
 bus quantitas motus tempusculo infinite parvo  
 constat sunt inter se aequalia. Jam quia  $g = 1$ ,  
 erit in eadem Hypothesi  $\int gdr = \int dr = \frac{1}{2} c^2$ , hoc  
 est,  $r$  ut  $c^2$ , (§. 181 Arithm.) quemadmodum  
 supra (§. 86). Similiter cum in Hypothesi  
 Baliani sit  $c$  ut  $r$ ; erit  $gdr = rdr$  (§. 113),  
 adeoque  $g = r$ . Jam initio descensus  $r = 0$ :  
 ergo  $g = 0$ , hoc est sollicitatio ad motum ini-  
 tio nulla est, seu phrasi communi Mathematicorum  
 gravitas nulla est: quod cum sit ab-  
 surdum, Hypothesis Baliana impossibilis.

#### COROLLARIUM I.

116. Quoniam  $\sqrt{2\int gdr} = APNC$  conti-  
 nuum crescit, semiordinata  $PL = 1 : \sqrt{2\int gdr}$   
 continuo decrescit. Jam cum sit in  $A$ ,  
 $dr = 0$ ; erit  $AD = 1 : 0 = \infty$ . Est igitur  $AD$   
 asymptotus curvæ temporis  $ELF$ .

#### SCHOLIUM III.

117. Hinc patet ratio, cur curva tempo-  
 ris  $ELF$  ita fuerit delineata, ut cum axe  $AB$   
 non concurrat, sicuti curva celeritatum  $AMH$ ,  
 neque rectam  $AD$  ad axem  $AB$  normalem se-  
 cet, sicuti curva sollicitationum  $CNG$ .

(a) In Princip. Phil. Natural. Mathemat. Lib. 1.  
 Prop. 39. p. 120. edit. ult. Anglic.

COROLLARIUM II.

118. Cum sit  $gdr = cdc$  (§. 113), adeoque  $g = cdc : dr = PM. MR : Pp$ . Sollicitatio ad motum in quacunq[ue] accelerationis Hypothesi erit ut subnormalis curvæ celeritatum (§. 35. *Analys. infin.*)

PROBLEMA XI.

119. Si sollicitatio centralis sit distantie à centro AD, PD &c. proportionalis. invenire velocitatem in quovis puncto P & tempus descensus per AP.

RESOLUTIO.

Quoniam AD:PD=AC:PN per hypoth. scala sollicitationum centralium DC est linea recta & figura ADC triangulum (§. 268 *Geom.*). Sit AD = a, AP spatium descensus = r, PN sollicitatio in P = g, erit PD = a - r. Est vero PN ut PD per hypoth., adeoque g ut a - r. Quare cum sit (§. 113).

$$\begin{aligned} \frac{gdr}{\int gdr} &= \frac{\frac{1}{2}c^2}{\int \frac{1}{2}c^2} \\ \text{erit } \frac{fad r - \int r dr}{ar - \frac{1}{2}r^2} &= \frac{\frac{1}{2}c^2}{\frac{1}{2}c^2} \\ \frac{2ar - r^2}{\int (2ar - r^2)} &= c \end{aligned}$$

Jam cum AD = a, AP = r: si ex centro D radio AD describatur Quadrans AIH, erit semiordinata PI =  $\sqrt{(2ar - r^2)}$  (§. 377 *Analys. finit.*). Habemus itaque sequens

*Theorema.* Si sollicitatio centralis sit proportionalis distantie locorum à centro, velocitates in fine spatii acquisitæ sunt sinibus arcuum respondentium proportionales, circuli quadrante ex centro per locum initialem descripto.

Porro  $dr = cdt$  (§. 101).

Sed  $c = \sqrt{(2ar - r^2)}$  per demonstrata

$$\begin{aligned} \text{Ergo } \frac{dr}{dt} &= dt \sqrt{(2ar - r^2)} \\ dt &= dr : \sqrt{(2ar - r^2)} \end{aligned}$$

$$t = \int \frac{dr}{\sqrt{(2ar - r^2)}}$$

Quoniam  $as \frac{dr}{\sqrt{(2ar - r^2)}}$  est arcus AI (§. 157 *Analys. infin.*); erit tempus descensus per AP ut arcus circuli AI. Habemus itaque sequens.

*Theorema.* In Hypothesi Problematis tempora descensus per spatia AP sunt ut arcus circuli AI ex centro D descripti.

Quodsi species curvæ celeritatum AMG desideretur, fiat AC = b. Cum sit AD:AC = DP:PN per hyp.

$$\begin{aligned} a:b &= a-r: \\ \text{erit } PN &= g = (ab - br) : a = b - br : a \\ \text{Sed } \frac{1}{2}c^2 &= \int gdr \text{ (§. 113)} \\ \text{Ergo } \frac{1}{2}c^2 &= \int bdr - \int brdr : a \\ &= br - br^2 : 2a \end{aligned}$$

Patet itaque (§. 421 *Anal. finit.*) sequens

*Theorema.* In Hypothesi Problematis locum celeritatum AMG esse Ellipsin, cujus parameter 2AC est dupla sollicitatio initialis, axis 2AD dupla distantia mobilis initio descensus à centro.

Si a = r, erit  $GD^2 = 2ab - 2a^2b : 2a = 2ab - ab = ab$ , adeoque  $GD = \sqrt{ab}$ . Cum itaque GD sit Axis dimidius, conjugatus (§. 423. *Anal. finit.*); erit in D centrum Ellipseos & AMG ejus quadrans.

COROLLARIUM.

120. Cum arcus AI & AH exponant tempora, quibus corpus quodvis per spatia AP & AD descendit, si sollicitationes fuerint distantis à centro proportionales, per idem spatium corpus quodvis eodem tempore descendit, motu ex quiete ab eodem termino incipiente.

SCHOLIUM.

121. Omnia hæc consona sunt iis, quæ NEWTONUS (a) demonstravit.

CAPUT

(b) In Princip. Natural. Mathm. lib. 1. prop. 38. p. 119.

Tab. XIII. Fig. 123. b

## CAPUT III.

*De Centro Gravitatis.*

## DEFINITIO XIX.

122. **C**entrum gravitatis est, per quod corpus dividitur in duas partes æquiponderantes. Dicitur autem pars una *æquiponderare* alteri, si neutra alteram movet.

## COROLLARIUM I.

123. Quodsi ergo descensus centri gravitatis impeditur, grave quiescit.

## COROLLARIUM II.

124. Quare si corpus ex centro gravitatis suspenditur, grave non movetur.

## COROLLARIUM III.

125. Totam corporis gravitatem in centrum gravitatis coactam supponere licet, adeoque pro corpore gravi solum centrum gravitatis surrogari potest in demonstrationibus.

## DEFINITIO XX.

126. *Diameter gravitatis* est recta transiens per centrum gravitatis.

## COROLLARIUM.

127. Intersectio itaque duarum diametrorum determinat centrum gravitatis.

## DEFINITIO XXI.

128. *Planum gravitatis* est figura plana, in qua situm est centrum gravitatis.

## COROLLARIUM.

129. Communis ergo intersectio duorum planorum gravitatis aut plurium est diameter gravitatis.

## DEFINITIO XXII.

130. *Gravia homogenea* sunt, quorum gravitates sunt voluminibus proportionales.

E. gr. Si grave dividas in partes quotcumque volumine æquales; singulæ erunt quoque pondere æquales.

## DEFINITIO XXIII.

131. *Gravia heterogenea* sunt, quorum gravitates non sunt voluminibus proportionales.

E. gr. Si totum grave dividas in partes quotcumque volumine æquales; singulæ inter se non erunt pondere æquales. Aut si duorum gravium partes sumas volumine æquales & eadem sint pondere inæquales; gravia inter se heterogenea sunt, licet in se homogenea esse possint.

## DEFINITIO XXIV.

132. *Centrum magnitudinis* est punctum, per quod linea vel figura dividitur in duas partes æquales.

## THEOREMA XXII.

133. *Corpora quævis gravia ex quiete in medio non resistent eodem tempore per idem spatium cadunt.*

## DEMONSTRATIO.

Descendat grave A per spatium  $r$ : erit tempus descensus ut  $\sqrt{r}$  (§. 87). Descendat etiam grave B per idem vel æquale spatium  $r$ : erit etiam tempus descensus ut  $\sqrt{r}$  (§. 87). Si ergo spatium descensus ex quiete idem est, tempus etiam descensus idem est. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

134. *Idem observatione confirmatur. Nam in spatio ab aëre vacuo (quod quomodo obtineatur, in Aërometria docemus) levissima plumula eodem tempore ex data altitudine descendit, quo Globus plumbeus. Imo si corpora magna & ponderosa in aëre per aequalia intervalla demittantur, eodem tempore pavimentum attingunt, modo altitudines sint mediocres, monente HUGENIO (a). Pendulorum inprimis experientia id doceri potest. Unde experimenta quibus RICCIOLUS Globos argillaceos 20 unciarum, & chartaceos, sed argillacea testa superindictos, mole istis aequales, sed pondere subduplos per intervallum 280 pedum demittens contrarium probare conatur (b) ideo non consentiunt, quia resistentia aëris in utroque Globorum genere fuit admodum diversa.*

COROLLARIUM.

135. Quoniam corporum gravium ex quiete cadentium celeritates in fine temporis acquisitæ sunt ut tempus (§. 85); velocitates gravium descendentium ex quiete dato tempore æquales sunt.

THEOREMA XXIII.

136. *Materia, quæ cum corporibus movetur, etiam cum ipsis gravitat.*

DEMONSTRATIO.

Quia velocitates gravium descendentium dato tempore æquales sunt (§. 135); quantitates motus in fine illius temporis sunt ut materiæ, quæ cum ipsis movetur, quantitates (§. 46). Jam vero gravitas est nifus versus centrum terræ (§. 4), qui adest, ubi motus ex quiete inchoatur, adeoque illud quod quantitati motus accedit,

(a) In Horologio oscillatorio. part. 4. Prop. 5.  
(b) Alm-g. Nov. Tom. I. Lib. 2. c. 21. Prop. 1. f. 89.

consequenter sollicitatio ad motum (§. 110). Sed sollicitatio est etiam massæ proportionalis (§. 112). Ergo materia, quæ cum gravibus movetur, etiam cum ipsis gravitat. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

137. *Liquet jam veritas Definitionis quintæ (§. 6).*

COROLLARIUM I.

138. *Massa igitur corporum recte æstimatur per pondus.*

COROLLARIUM II.

139. *Cum in corporibus homogeneis gravitates voluminibus proportionales sint (§. 130); quantitates motus in iis sunt in ratione composita celeritatum & voluminum (§. 45) & si eadem celeritate ferantur, ut volumina (§. 46): in quibus vero quantitates motus æquales sunt, eorum celeritates rationem voluminum reciprocam habent (§. 42).*

COROLLARIUM III.

140. *Massa invariata pondus non mutatur, quomocunque varietur figura.*

AXIOMA V.

141. *In homogeneis, quæ secundum longitudinem in partes similes & æquales secari possunt, Centrum gravitatis idem est cum Centro magnitudinis.*

COROLLARIUM.

142. *Quodsi ergo linea recta AB bifariam secetur in C; erit C centrum gravitatis.* Tab. I. Fig. 2.

SCHOLIUM.

143. *Tale corpus homogeneum, quod secundum longitudinem in partes similes secari potest, est e. gr. Cylindrus plumbeus. Si enim longitudo AE concipiatur in tres partes æquales ED, DC & CA vel quotcunque plures* Tab. I. Fig. 3.

D

plures

plures divisa; secabitur in Cylindros æquales, cum eorum bases & altitudines æquales sint (§. 535 Geom.) atque similes, cum altitudines sint ut diametri basium (§. 570. Geom.).

## THEOREMA XXIV.

Tab. I.  
Fig. 4.

144. Si centra gravitatis duorum corporum A & B jungantur recta AB centri gravitatis communis C distantia BC & CA à centris gravitatis particularibus B & A sunt reciproce ut pondera A & B.

## DEMONSTRATIO.

Ponamus enim rectam AB divisam esse in C in ratione reciproca ponderum A & B. Sit e. gr. pondus A 6 librarum, pondus B 2, & AC:CB = 1:3. Concipiatur recta AB utrinque producta in D & E, donec BD = AC & AE = CB; erit EC = CD (§. 88 Arithm.). Concipiatur porro recta ED in 8 partes æquales divisa, quot nempe librarum sunt pondera junctim sumta, & quoniam gravitas non mutatur, quomocunque varietur figura (§. 140), gravitas corporum A & B per rectam ED æqualiter diffusa concipiatur, centris gravitatis manentibus in A & B. Diffundetur adeo gravitas ipsius B per FD & gravitas ipsius A per EF uniformiter (§. 142), consequenter pondera A & B junctim sumta rectam ED representabunt. Hujus vero centrum gravitatis commune est in C (§. cit.). Ergo idem est centrum gravitatis commune ponderum A & B. Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

145. Quodsi gravitates corporum A & B fuerint æquales, centrum gravitatis com-

mune C erit in medio rectæ AB centra gravitatis conjungentis.

## COROLLARIUM II.

146. Quia A:B = BC:AC; erit A.AC = B.BC. Unde patet vires æquiponderantium æstimandas esse per factum ex massa in distantiam à centro gravitatis. Factum hoc Momentum ponderum vulgo vocant.

## SCHOLION.

147. Theorema hoc utilissimum experimento non ineleganti illustrari potest. Ex ligno parentur parallelepipeda plura inter se æqualia & quorum latitudo sit dupla profunditatis, longitudo vero sextupla latitudinis: quamvis necesse non sit, ut hæ rationes accurate observentur, sufficit enim longitudinem aliquoties excedere reliquas dimensiones. Parentur præterea alia quædam: unum sit longitudinis dupla, alterum tripla, tertium quadrupla & ita porro. Quodsi parallelepipedum longitudinis dupla colloces super latere prismatis trigoni, ita ut latus prismatis ipsum dividat in partes æquales AC & CB; partes AC & CB æquiponderabunt: quo ipso Axioma (§. 141) confirmatur. Collocetur porro parallelepipedum tripla longitudinis DE ea lege super prisma, ut ejus latus ipsum dividat in partes DF, FE, quæ sunt in ratione subdupla: pars FE præponderabit. Quodsi vero tria parallelepipeda simplicis longitudinis ipsi DF super imposueris; quatuor parallelepipeda duobus FK, KE in unum FE conjunctis æquiponderabunt. Est enim ipsius FE centrum gravitatis in K & ipsius DF in medio L per experimentum primum. Distantia igitur centrorum gravitatis à fulcro LF & FK sunt ut DF & FE seu ut pondera (§. 130 Mech. & 573. Geom.). Est ergo ibi centrum gravitatis commune, ut habet Theorema nostrum (§. 144). Eodem modo deprehenduntur 9. prismata sibi mutuo superimposita æquiponderare uni IH, cujus longitudo illorum longitudinis tripla, & ita porro.

Tab. I.  
Fig. 5

COROL-



COROLLARIUM III.

Tab. I. 148. Quoniam  $A : B = BC : AC$  (§. 144);  
 Fig. 4. erit etiam  $A + B : A = BC + AC : BC$   
 (§. 190. *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

149. Reperitur adeo centrum gravitatis commune duorum ponderum  $C$ , si factum ex pondere uno  $A$  in distantiam centrorum gravitatis separatorum  $AB$  ( $= AC + CB$ ) dividatur per summam ponderum  $A$  &  $B$  (§ 302 *Arithm.*). Sit e. gr.  $A = 12$ ,  $B = 4$ ,  $AB = 24$ ; erit  $BC = 24$ .  $12 : 16 = 18$ .

COROLLARIUM V.

150. Quodsi pondus  $A$  detur & distantia centrorum gravitatis particularium  $AB$  una cum centro gravitatis communi  $C$ , reperitur pondus  $B = A$ .  $AC : BC$  (§. 302 *Arithm.*), hoc est, si momentum ponderis dati dividatur per distantiam ponderis quaesiti  $B$  à centro gravitatis communi (§. 146). Sit e. gr.  $A = 12$ ,  $BC = 18$ ,  $AC = 6$ ; erit  $B = 6$ .  $12 : 18 = 12 : 3 = 4$ .

PROBLEMA XII.

Tab. I. 151. Ponderum plurimum datorum  
 Fig. 6.  $a, b, c, d$  centrum gravitatis commune in recta  $AB$  determinare.

RESOLUTIO.

1. Quæratum centrum gravitatis commune duorum ponderum  $a$  &  $b$  (§. 149): quod sit in  $F$ .
2. In  $F$  concipiatur applicari pondus  $a + b$  duobus reliquis  $a$  &  $b$  æquale (§ 125) & quæratum porro in recta  $FE$  centrum gravitatis commune ponderum  $a + b$  &  $c$  (§. 149): quod sit in  $G$ .
3. Denique in  $G$  concipiatur applicari pondus  $a + b + c$  duobus  $a + b$  &  $c$  æquale (§. 125) & quæratum inter

ipsum & pondus  $d$  centrum gravitatis commune in recta  $GB$  (§. 149): quod sit in  $H$ .

Est adeo  $H$  centrum gravitatis commune ponderum  $a, b, c$  &  $d$ . Patet etiam, quomodo sit progrediendum, si plura pondera dentur.

Sit e. gr.  $a = 20$ ,  $b = 10$ ,  $c = 15$ ,  $d = 5$ ,  $AC = 9$ ,  $CE = 6$ ,  $EB = 12$ : erit  $AF = b$ .  $AC : (a + b) = 10$ .  $9 : 30 = 3$ , adeoque  $FC = 6$  &  $FE = FC + CE = 12$ . Hinc reperitur  $FG = c$ .  $FE : (a + b + c) = 15$ .  $12 : 45 = 4$ . Quare  $GE = FE - FG = 8$  &  $GB = GE + EB = 20$ . Invenitur adeo  $GH = d$ .  $GB : (a + b + c + d) = 5$ .  $20 : 50 = 2$ . Unde  $HB = GB - GH = 18$  & (ob  $AB = AC + CE + EB = 27$ )  $AH = 9$ .

PROBLEMA XIII.

152. Duobus ponderibus  $D$  &  $E$  Tab. I.  
 extra centrum gravitatis commune in Fig. 7.  
 $C$  suspensis, determinare quodnam eorum & quantum præponderet.

RESOLUTIO.

1. Quodlibet pondus ducatur in distantiam suam à centro suspensionis, nempe  $D$  in  $AC$  &  $E$  in  $BC$ : ex qua parte factum majus prodit, versus eam est præponderatio.
2. Factum minus à majore subtrahatur: erit residuum præpondium.

E. gr. Sit  $D = 30$  librarum,  $E = 20$ ,  $AC = 2$ ,  $BC = 4$ : erit  $D \cdot AC = 60$ ,  $E \cdot BC = 80$ , adeoque  $E$  præponderat in  $B$  momento ut 20.

DEMONSTRATIO.

Sit  $AC : CB = d : md$  & pondus  $D = mp$ ; æquiponderabit eidem in  $B$  pondus  $p$  (§. 144). Sed pondus  $E$  majus est quam  $p$ . Dicatur ergo excessus

fus  $r$ , ita ut sit  $E = p + r$ . Quoniam momentum ipsius  $r$  æquale est momento ponderis in A eidem æquiponderantis, hoc vero reperitur  $mrd$  (§. 146); excessus momenti ponderis E supra momentum alterius D est  $mrd$ . Sed  $mrd$  est differentia inter  $mpd$  &  $mpd + mrd$ , hoc est, inter D. AC & E. BC. Relinquitur adeo excessus momenti ipsius E supra momentum alterius D, si factum D. AC ex E. CB subtrahitur. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

153. Ponderum D & E itaque extra centrum gravitatis in C suspensorum momenta sunt in ratione composita ipsorum met ponderum D & E & distantiarum à puncto suspensionis AC & CB.

## COROLLARIUM II.

154. Ponderis itaque ex ipso puncto C suspensi momentum respectu reliquorum D & E nullum est, seu eadem ratione D & E inter se ponderant, ac si pondus in C plane abesset, quia scilicet distantia ejus nulla est.

## PROBLEMA XIV.

Tab. I. Fig. 8. 155. Determinare præponderationem, ponderibus pluribus  $a, b, c, d$  extra centrum gravitatis in C suspensis.

## RESOLUTIO.

1. Ducantur pondera  $c$  &  $d$  in suas distantias à puncto suspensionis CE & EB: summa dabit momentum ponderum  $c$  &  $d$  junctim, seu ponderationem versus dextram (§. 153).
2. Ducantur quoque pondera  $a$  &  $b$  in suas distantias AC & CD: summa denuo dabit ponderationem versus sinistram (§. cit.)

3. Quodsi ergo ponderationem majorem à minore subtrahas, relinquetur tandem præponderatio quæsitæ. E. gr. Sit  $AC = 6$ ,  $DC = 4$ ,  $CE = 5$ ,  $CB = 8$ ,  $a = 12$ ,  $b = 15$ ,  $c = 20$ ,  $d = 8$ : erit ponderatio versus dextram  $= c. EC + d. CB = 20. 5 + 8. 8 = 164$ ; versus sinistram  $= a. AC + b. DC = 12. 6 + 15. 4 = 132$ . Præponderant ergo  $c$  &  $d$  versus dextram momento ut 32.

## PROBLEMA XV.

156. Ponderibus quocumque extra Tab. Fig. 8. centrum gravitatis in C suspensis & versus dexteram præponderantibus, determinare punctum F, ex quo si summa omnium ponderum suspendatur, eadem maneat præponderatio versus dextram, quæ fuerat ante in dato ponderum  $a, b, c, d$  situ.

## RESOLUTIO.

1. Inveniatur momentum, quo pondera  $c$  &  $d$ , vel quocumque fuerint, versus dextram præponderant (§. 155).
2. Cum momentum summæ ponderum in F suspendendæ eidem æquale esse debeat; momentum modo inventum erit factum ex CF in summam ponderum (§. 153). Quare si per summam ponderum dividatur; quotus erit distantia CF, ex qua suspendenda est ponderum summa, ut eadem maneat præponderatio, quæ fuerat ante (§. 210 Arithm.).

E. gr. Sint omnia ut in Problemate præcedente erit momentum, quo pondera versus dexteram præponderant 32. Quodsi hoc divides per summam ponderum 55, quotus  $\frac{32}{55}$  est distantia CF quæsitæ.

COROL-

COROLLARIUM.

ab. I. 157. Si Elementa figurarum, quale  
 fig. 9.  $mMn$ , concipiantur instar ponderum ad  
 axem  $AE$  appensorum & in vertice  $A$   
 punctum suspensionis; determinabitur  
 punctum in  $AE$ , ex quo summa omnium  
 ponderum suspenſa eodem modo ponderat  
 ac tota figura, hoc est centrum gravi-  
 tatis (§. 125), summa momentorum om-  
 nium pondusculorum per summam pon-  
 dusculorum divisa (§. 153). Sit enim  
 $AP = x$ ,  $MP = y$ ,  $Pp = dx$ ; erit  
 unum pondusculum  $2ydx$ , summa om-  
 nium  $2fydx$ , momentum unius pondusculi  
 $2yxdx$  (§. 153), summa omnium  $2fyxdx$ ,  
 consequenter distantia centri gravitatis à  
 vertice  $AF = \frac{2fyxdx}{2fydx} = \frac{yxdx}{ydx}$ . Quodsi adeo dif-  
 ferentialia  $yxdx$  &  $ydx$  integrentur, ut  
 in Analyſi Infinitorum docuimus, cen-  
 trum gravitatis determinatur.

PROBLEMA XVI.

ab. I. 158. Determinare centrum gravita-  
 fig. 10. tis in triangulo  $BAC$ .

RESOLUTIO.

Ducatur recta  $AD$  basin  $BC$  bifa-  
 riam secans in  $D$ . Quoniam  $\triangle BAD$   
 $= \triangle DAC$  (§. 440 *Geom.*): utrumque  
 in totidem ponduscula ad communem  
 axem  $AD$  eodem modo utrinque ap-  
 plicata resolvi potest; adeoque cen-  
 trum gravitatis  $\triangle BAC$  erit in  $AD$  (§.  
 122). Illud igitur ut determinetur, fiat  
 $AD = a$ ,  $BC = b$ ,  $AP = x$ ,  $MN = y$ ;  
 erit (§. 397 *Geom.*)

$$AP : MN = AD : BC$$

$$x : y = a : b$$

Hinc  $y = bx : a$ . Ducatur  $AE = c$  per-  
 pendicularis ad  $BC$ , erit  $AD : AE$   
 $= AP : AQ$  (§. 396 *Geom.*), adeo-  
 $AQ = cx : a$  &  $Qq = cdx : a$ . Unde  
 momentum  $yxdx = cbx^2 dx : a^2$  &  $fyxdx$

$= cbx^3 : 3a^2$ , quæ summa per aream  
 trianguli  $AMN = cbx^2 : 2a^2$  (§. 392  
*Geom.*) divisa dat distantiam centri  
 gravitatis à vertice  $= \frac{2acb x^3}{3a^2} : 3acb x^2$   
 $= \frac{2}{3}x$  (§. 157). Quodsi pro  $x$  substi-  
 tuatur  $a$ ; prodibit distantia centri gravi-  
 tatis totius trianguli à vertice  $\frac{2}{3}a = \frac{2}{3}AD$ .

PROBLEMA XVII.

159. Determinare centrum gravita-  
 tis in Parabola.

Tab. I.  
 Fig. 9.

RESOLUTIO.

Ad Parabolam est

$$ydx = a^{1/2} x^{3/2} dx \text{ (§. 103 Anal. infin.)}$$

$$xydx = a^{1/2} x^{5/2} dx$$

$$\int xydx = \frac{2}{5} a^{1/2} x^{5/2}$$

$$\text{sed } \int ydx = \frac{2}{3} a^{1/2} x^{3/2} \text{ (§. cit.)}$$

$$\text{Ergo } \int xydx : \int ydx = \frac{2}{5}x = AF \text{ (§. 157).}$$

PROBLEMA XVIII.

160. Determinare centrum gravita-  
 tis in omnibus Parabolis superiorum ge-  
 nerum & curvis agnatis in infinitum.

RESOLUTIO.

In infinitis Parabolis & curvis agna-  
 tis est (§. 105 *Analyſ. infinit.*).

$$ydx = a^{n:r} x^{m+r} dx$$

$$xydx = a^{n:r} x^{(m+r)+r} dx$$

$$\int xydx = \frac{r}{m+2r} a^{n:r} x^{(m+2r)+r}$$

$$\int ydx = \frac{r}{m+r} a^{n:r} x^{(m+r)+r} \text{ (§. cit.)}$$

$$\int xydx : \int ydx = \frac{m+r}{m+2r} x = AF \text{ (§. 157)}$$

E. gr in Paraboloido cubicali  $m = 1$ ,  $r$   
 $= 3$  (§. 519 *Analyſ. finit.*) Ergo  $AF = \frac{4}{5}AP$ .

In Paraboloido surdefolidali  $m = 1$ ,  $r$   
 $= 5$ . Ergo  $AF = \frac{6}{11}AP$ .

In Paraboloide biquadratico  $m = 1$ ,  $r = 4$ . Ergo  $AF = \frac{5}{9} AP$ .

Si fuerit  $ax^2 = y^3$ ; erit  $m = 2$ ,  $r = 3$ ,  $AF = \frac{5}{8} AP$ .

Si  $ax^3 = y^4$ ; erit  $m = 3$ ,  $r = 4$ ,  $AF = \frac{7}{11} AP$ .

Si  $ax^4 = y^5$ ; erit  $m = 4$ ,  $r = 5$ ,  $AF = \frac{9}{14} AP$ .

### COROLLARIUM.

161. Distantia ergo centri gravitatis à basi

$$FP \text{ est } = x - \frac{m+r}{m+2r} x = \frac{mx + 2rx - mx - rx}{m+2r} \\ = \frac{r}{m+2r} x.$$

E. gr. in Parabola Apolloniana  $m = 1$ ,  $r = 2$ . Ergo  $PF = \frac{2}{3} AP$ .

In Paraboloide cubicali  $m = 1$ ,  $r = 3$ . Ergo  $PF = \frac{3}{7} AP$ .

In curva, ad quam  $ax^2 = y^3$ ,  $m = 2$ ,  $r = 3$ . Ergo  $PF = \frac{3}{8} AP$ .

### PROBLEMA XIX.

162. Determinare centrum gravitatis in Parabola exteriore AST.

#### RESOLUTIO.

Si  $AQ = x$ ,  $QM = y$ , Parameter  $= 1$ ; erit (§. 388. *Analys. finit.*)  $x^2 = y$  & hinc

$$xydx = x^3 dx$$

$$sxydx = \frac{1}{4} x^4$$

$$fydx = \frac{1}{3} x^3$$

$$sxydx : fydx = \frac{3}{4} x = \frac{3}{4} AQ = AL.$$

### PROBLEMA XX.

163. Determinare centrum gravitatis in infinitis Parabolis exterioribus superiorum generum & aliis curvis agnatis.

#### RESOLUTIO.

Si Parameter  $= 1$ , pro infinitis Parabolis superioribus & curvis agnatis est  $x^r = y^n$  (§. 519 *Analys. finit.*).

Quare

$$ydx = x^{r/n} dx$$

$$xydx = x^{(r+n)/n} dx$$

$$sxydx = \frac{nx^{(r+2n)/n}}{r+2n}$$

$$fydx = \frac{n}{r+n} x^{(r+n)/n}$$

$$sxydx : fydx = \frac{r+n}{r+2n} x = AL.$$

E. gr. in Paraboloide cubicali  $r = 3$ ,  $n = 1$ .

Ergo  $AL = \frac{4}{5} AQ$ .

In Paraboloide biquadratico  $r = 4$ ,  $n = 1$ .

Ergo  $AL = \frac{5}{9} AQ$ .

In Paraboloide surdefolidali  $r = 5$ ,  $n = 1$ .

Ergo  $AL = \frac{6}{7} AQ$ .

In curva, ad quam  $x^2 = y^2$ ,  $r = 3$ ,  $n = 2$ .

Ergo  $AL = \frac{5}{7} AQ$ .

In curva, ad quam  $x^4 = y^3$ ,  $r = 4$ ,  $n = 3$ .

Ergo  $AL = \frac{7}{10} AQ$ .

### PROBLEMA XXI.

164. Determinare centrum gravitatis in curva, ad quam  $b^2 y = bx^2 - x^3$ .

#### RESOLUTIO.

Quoniam  $ydx = (bx^2 dx - x^3 dx) : b^2$  (§. 99 *Analys. infinit.*)

$$xydx = (bx^3 dx - x^4 dx) : b^2$$

$$sxydx = x^4 : 4b - x^5 : 5b^2 = (5bx^4 - 4x^5) : 20b$$

$$fydx = x^3 : 3b - x^4 : 4b^2 = (4bx^3 - 3x^4) : 12b^2$$

$$sxydx : fydx = \frac{12b^2(5bx^4 - 4x^5)}{20b^2(4bx^3 - 3x^4)}$$

$$= \frac{15bx - 12x^2}{20b - 15x} = AF$$

Est adeo  $20b - 15x : 15b - 12x = x : AF$ .

### PROBLEMA XXII.

165. Determinare centrum gravitatis cujuslibet arcus circuli.

RESO-

RESOLUTIO.

ab. I. Sit  $Mp$  ad  $AB$  normalis ipsi  $DP$  infinite propinqua; erit arcus  $DM$  infinite parvus. Sit chordæ  $DE$  arcus dati  $DHE$  diameter  $AB$  parallela, quæ instar axis consideretur, ad quem ponduscula  $MD$  applicata, quorum adeo momenta erunt ut  $MD. PD$ . Quoniam itaque ad radium  $HC$ , qui arcum  $DE$  in  $H$  (§. 291 *Geom.*) bifecat, ponduscula & numero & momento æqualia utrinque disponuntur; transit is per centrum gravitatis (§. 122). Sit jam  $PC = DG = x$ ,  $DC = a$ , erit  $DR = Pp = dx$ . Jam cum sit angulus  $CDM$  rectus (§. 319 *Geom.*), &  $PDE$  itidem rectus (§. 230 *Geom.*), adeoque  $PDC = RDM$  (§. 91 *Arithm.*), sintque etiam anguli  $DRM$  &  $DPC$  recti per construct. erit  $MD : DR = DC : PD$ , (§. 267 *Geom.*) & hinc reperietur  $MD.PD = DR.DC = adx$  (§. 297 *Arithm.*). Summa ergo momentorum arcus  $DH$  est  $ax = DC.DG$ , quæ divisa per arcum  $DH$  centri gravitatis  $F$  distantiam à centro circuli  $C$  determinat (§. 157.) Est itaque arcus  $DH : DG = DC : CK$ .

Quodsi pro  $DH$  ponatur quadrans  $AH$  & pro  $DG$  radius  $AC$ ; prodibit distantia centri gravitatis semiperipheriæ  $AC^2 : AH$ , hoc est, distantia hæc  $CF$  est tertia proportionalis ad quadrantem & radium.

PROBLEMA XXIII.

166. Determinare centrum gravitatis in sectorè circuli  $ACB$ .

RESOLUTIO.

Ex antecedentibus liquet, si  $DC$  sectorem bifariam secet, centrum gravitatis fore in recta  $DC$ . Ducatur radio  $PC$  arcus  $PNM$  & radio  $pC$  alius  $pnm$  alteri infinite propinquus. Quoniam segmentum annulare est pondusculum ex centro  $C$  suspensum, & quidem simul differentiale sectoris; erit momentum arcus  $PNM$  ductum in  $Pp$  seu  $Nn$  momentum segmenti annularis  $PNM mnp$ ; hoc est, differentiale momenti sectoris. Jam momentum arcus  $ADB = 2AC.AE$  & momentum arcus  $PNM = 2PC.Pn$  (§. 165) &  $\triangle ACB = EC.AE$  atque  $\triangle PCM = Pn.Cn$  (§. 392 *Geom.*) Est igitur  $\triangle ACB : \triangle PCM = EC.AE : Cn.Pn$  & momenta arcuum  $ADB$  &  $PNM = AC.AE : PC.Pn$  (§. 181 *Arithm.*). Est vero  $AC : PC = EC : Cn$  (§. 268 *Geom.*). Ergo  $\triangle ACB : \triangle PCM = AC.AE : PC.Pn$  (§. 184 *Arithm.*), consequenter momentum arcus  $ADB$  est ad momentum arcus  $PNM$  ut  $\triangle ACB$  ad  $\triangle PCM$  (§. 167 *Arithm.*), hoc est, ut  $AC^2$  ad  $PC^2$  (§. 399 *Geom.*) Sit jam arcus  $AD = p$ ,  $AC = a$ ,  $AE = b$ ; erit momentum arcus  $ADB = 2ab$  (§. 165). Sit porro  $PC = x$ ; reperietur per modo demonstrata momentum arcus  $PNM = 2abx^2 : a^2 = 2bx^2 : a$ , momentum vero segmenti annularis  $PMnp = 2bx^2 dx : a$ . Hujus summa  $2bx^3 : 3a$  est momentum sectoris  $CPM$ . Quare si fiat  $x = a$ , erit momentum sectoris  $CAB = 2a^3b : 3a = \frac{2}{3}a^2b$ , quo per summam ponderum seu aream sectoris  $ACB = ap$  divisio,

Tab. II.  
Fig. 12.

vifo,

vifo, prodibit distantia centri gravitatis sectoris  $ACB = 2ab : 3p = 2AC$ .  $AE : 3AD$ . Est vero  $AC : AE : AD$  distantia centri gravitatis arcus à centro circuli  $CF$  (§. 165). Distantia igitur centri gravitatis sectoris à centro circuli est ad distantiam centri gravitatis arcus ut 2. ad 3.

## COROLLARIUM.

Tab. I. Fig. II. 167. Distantia ergo centri gravitatis semicirculi à centro circuli  $C$  est  $\frac{2}{3} AC$ :  $AH$  (§. 156). Quare ut  $\frac{2}{3} AH$  seu arcus  $60^\circ$  ad  $\frac{2}{3} AC$  ita  $\frac{2}{3} AC$  ad distantiam centri gravitatis semicirculi à centro circuli (§. 185 *Arithm.*).

## PROBLEMA XXIV.

Tab. I. Fig. II. 168. Invenire centrum gravitatis segmenti  $DHED$ .

## RESOLUTIO.

1. Quæratum centrum gravitatis trianguli  $DCE$  (§. 158): quod sit in  $L$ .
2. Quæratum centrum gravitatis sectoris  $DCEHD$  (§. 166): quod sit in  $F$ .
3. Cum  $F$  sit commune centrum gravitatis trianguli  $DCE$  & segmenti  $DEHD$ ; quæratum ad segmentum  $DEHD$ , triangulum  $DCE$  &  $LF$  quarta proportionalis  $FK$ : erit  $FK$  distantia centri gravitatis segmenti  $K$  à centro gravitatis sectoris  $F$  (§. 144). Exprimenda vero est ratio segmenti ad triangulum lineis rectis: quod quidem accurate præstare licebit data circuli quadratura.

## PROBLEMA XXV.

169. Invenire centrum gravitatis Lunulæ Hippocratis  $ADBEA$ .

## RESOLUTIO.

1. Quæratum centrum gravitatis semicirculi  $ADB$  (§. 156): quod sit in  $G$ . Tab. II. Fig. 13
2. Quæratum porro centrum gravitatis segmenti  $AEBFA$  (§. 168): quod sit in  $H$ .
3. Cum adeo  $G$  sit centrum gravitatis commune Lunulæ Hippocratis  $ADBEA$  & segmenti  $AEBFA$ ; quæratum ad Lunulam, segmentum &  $HG$  quarta proportionalis  $GI$ : erit  $GI$  distantia centri gravitatis Lunulæ  $I$  à centro gravitatis semicirculi  $G$  (§. 144). Exprimenda vero est ratio segmenti  $AEBFA$  ad Lunulam  $ADBEA$  lineis, nisi numeris utamur.

## PROBLEMA XXVI.

170. Invenire centrum gravitatis in Tab. I. Fig. 9  
Parabolâ truncatâ  $SMNH$ .

## RESOLUTIO.

1. Quæratum centrum gravitatis Parabolæ  $MAN$  (§. 159): quod sit in  $F$ .
2. Quæratum item centrum gravitatis Parabolæ  $SAH$  (§. *cit.*) quod sit in  $O$ .
3. Quoniam centrum gravitatis commune Parabolæ  $MAN$  & Parabolæ truncatæ  $SMNH$  in  $O$ ; quæratum porro ad Parabolam truncatam  $SMNH$ , Parabolam  $MAN$  & distantiam  $FO$  quarta proportionalis  $OK$ : erit in  $K$  centrum gravitatis Parabolæ truncatæ (§. 144).

## SCHOLION.

171. Patet eadem methodo, quam nunc uno alteroque exemplo illustravimus, semper inveniri centrum gravitatis differentiarum figurarum, quarum centra gravitatis dantur.

RESO-

PROBLEMA XXVII.

Tab. II.  
Fig. 14.

172. Invenire centrum gravitatis in Parallelogrammo & Parallelepipedo.

RESOLUTIO.

- I. Ducantur diagonales AD & EG, itemque CB & HF. Quoniam diagonalis utraque AD & CB parallelogrammum ACDB bifariam dividit (§. 137 *Geom.*); utraque per centrum magnitudinis (§. 132) adeoque & gravitatis transit (§. 122); consequenter in I est centrum gravitatis parallelogrammi (§. 141). Eodem modo patet in K esse centrum gravitatis parallelogrammi EFGH. Similiter quia tam planum CBFH quam ADGE parallelepipedum bifariam dividit (§. 537 *Geom.*) utrumque per centrum gravitatis ejus transit (§. 141); adeoque communis intersectio IK est diameter gravitatis (§. 126).
2. Dividatur IK bifariam in L. Quoniam planum transiens per L & basibus parallelum parallelepipedum bifariam dividit (§. 535 *Geom.*); per centrum gravitatis transit (§. 141) adeoque in L gravitatis centrum est.

SCHOLIUM.

173. Attendentibus statim manifestum est, non absimili modo centrum gravitatis in prismatibus & cylindris reperiri, esseque illud punctum medium rectæ centra gravitatis basium oppositarum conjungentis. In polygonis autem regularibus centrum gravitatis idem esse cum centro circuli circumscribendi, facile quoque intelligitur. Quemadmodum vero centrum gravitatis segmentorum & sectorum, imo lunularum circuli per superiora

Wolffi Oper. Mathem. Tom. II.

inveniri potest; ita per Problema præsens constat, quomodo variorum segmentorum cylindricorum centrum gravitatis inveniri possit, quorum nempe bases sunt circuli segmenta, sectores, annuli, lunule.

PROBLEMA XXVIII.

174. Invenire centrum gravitatis Coni & Pyramidis.

Tab. II.  
Fig. 15.

RESOLUTIO.

Centrum gravitatis Coni esse in axe AC satis claret ex superioribus. Si  $AP = x$ ;  $Pp = dx$  & pondusculum in cono est  $prx^2 dx : 2a^2$  (§. 198 *Analys. infinit.*), adeoque momentum ejus  $prx^3 dx : 2a^2$  (§. 153). Hinc summa momentorum  $prx^4 : 8a^2$ , quæ per summam ponderum  $prx^3 : 6a^2$  (§. 198 *Analys. infinit.*) divisa dat distantiam centri gravitatis portionis AMN à vertice  $A = 6a^2 prx^4 : 8a^2 prx^3 = \frac{3}{4}x = \frac{3}{4}AP$ , adeoque coni integri centrum gravitatis distat à vertice  $\frac{3}{4}AC$ .

Eodem prorsus modo invenitur distantia centri gravitatis à vertice in pyramide  $= \frac{3}{4}AC$ .

PROBLEMA XXIX.

175. Invenire centrum gravitatis Conoidis parabolici ABCD ex rotatione parabole AMBC circa axem AC geniti.

Tab. II.  
Fig. 16.

RESOLUTIO.

Pondusculum conoidis  $MNnm = pxdx : 2r$  (§. 202 *Anal. infinit.*) adeoque momentum  $= px^2 dx : 2r$  (§. 153), consequenter summa momentorum  $= px^3 : 6r$ , quæ per summam ponderum  $px^2 : 4r$  (§. 202 *Analys. infinit.*) divisa dat distantiam centri gravitatis

E por-

portionis conoidicæ AMPN à vertice  
 $A = 4rpx^3 : 6rpx^2 = \frac{2}{3}x$ . Est adeo distantia centri gravitatis à vertice in conoide parabolico  $ABD = \frac{2}{3}AC$ .

PROBLEMA XXX.

176. *Invenire centrum gravitatis conoidis paraboloidici ex rotatione paraboloidis cujuscunque AMBC circa axem AC geniti.*

RESOLUTIO.

Pondusculum Conoidis paraboloidici indefinitum est  $px^{2+m}dx : 2r$  (§. 202 *Analys. infinit.*), adeoque momentum ejus  $px^{(2+m):m}dx : 2r$  (§. 153). Hinc summa momentorum  $mrx^{(2m+2):m} : (4m+4)r$ , quæ per summam ponderum  $mrx^{(2+m):m} : (2m+4)r$  (202 *Anal. infinit.*) divisa dat distantiam centri gravitatis portionis conoidicæ MAN à vertice  $A = (2m+4) mrx^{(2+2m):m}$ :

$$(4m+4) mrx^{(2+m):m} = \frac{m+2}{2m+2} x$$

$$= \frac{m+2}{2m+2} AP, \text{ consequenter in integro}$$

$$\text{Conoide } \frac{m+2}{2m+2} AC.$$

Sit e. gr.  $m = 2$ , erit  $AH = \frac{2}{3}AC$ :

Sit  $m = 3$ ; erit  $AH = \frac{5}{8}AC$ .

Sit  $m = 4$ ; erit  $AH = \frac{3}{5}AC$ .

Sit  $m = 5$ ; erit  $AH = \frac{7}{12}AC$ .

PROBLEMA XXXI.

177. *Invenire centrum gravitatis segmenti spheræ.*

RESOLUTIO.

In segmento spherico pondusculum  $= pxdx - px^2dx : 2r$  (§. 199 *Analys. in-*

*finit.*), adeoque momentum ejus  $px^2dx - px^3dx : 2r$  (§. 153). Unde summa momentorum  $\frac{1}{3}px^3 - px^4 : 8r = (8rpx^3 - 3px^4) : 24r$ , quæ per summam ponderum  $\frac{1}{2}px^2 - px^3 : 6r = (6rpx^2 - 2px^3) : 12r$  (§. 199 *Analys. infinit.*) divisa definit distantiam centri gravitatis à vertice  $= 12r(8rpx^3 - 3px^4) : 24r(6rpx^2 - 2px^3) = (8rx - 3x^2) : (12r - 4x)$ . Est adeo ut  $12r - 4x$  ad  $8r - 3x$ , hoc est,  $3r - x$  ad  $2r - \frac{3}{4}x$  (§. 185 *Arithm.*) ita  $x$  ad distantiam centri gravitatis à vertice.

COROLLARIUM.

178. Quodsi pro  $x$  substituatur  $r$  seu semidiameter spheræ, prodibit distantia centri gravitatis à vertice in hemispherio  $(8r^2 - 3r^2) : (12r - 4r) = 5r^2 : 8r = \frac{5}{8}r$ . Eodem modo si pro  $x$  substituatur  $2r$ , spheræ integræ centrum gravitatis reperitur distare à vertice semidiametro  $r$ , hoc est, idem cum centro spheræ.

PROBLEMA XXXII.

179. *Invenire centrum gravitatis Conoidis hyperbolici.*

RESOLUTIO.

In Conoide hyperbolico pondusculum  $= pbdx : 2r + pbx^2dx : 2ar$  (§. 208 *Anal. infinit.*), adeoque momentum ejus  $pbx^2dx : 2r + pbx^3dx : 2ar$  (§. 153). Quare omnium momentorum summa  $pbx^3 : 6r + pbx^4 : 8ar = (4apbx^3 + 3pbx^4) : 24ar$ , quæ per summam ponderum  $pbx^2 : 4r + pbx^3 : 6ar$  (§. *Analys. infinit. cit.*)  $= (6apbx^2 + 4pbx^3) : 24ar$  divisa distantiam centri gravitatis à vertice determinat  $(4apbx^3 + 3pbx^4) : (6apbx^2 + 4pbx^3) = (4ax + 3x^2) : (6a + 4x)$ . Est adeo ut



$6a + 4x$  ad  $4a + 3x$ , ita  $x$  ad distantiam centri gravitatis à vertice. Constat vero esse  $a$  axem transversum hyperbolæ genitricis,  $x$  altitudinem conoidis, seu illius abscissam (459 *Anal. flu.*).

PROBLEMA XXXIII.

180. *Invenire centrum gravitatis segmenti spheroidis elliptici.*

RESOLUTIO.

In spheroide elliptico pondusculum  $pbx dx : 2r - pbx^2 dx : 2ar$  (§. 203. *Analys. infinit.*), adeoque momentum ejus  $pbx^2 dx : 2r - pbx^3 dx : 2ar$  (§. 153). Quare momentorum summa  $pbx^3 : 6r - pbx^4 : 8ar = (4apbx^3 - 3pbx^4) : 24ar$ , quæ per summam ponderum  $pbx^2 : 4r - pbx^3 : 6ar$  (§. 203 *Analys. infinit.*)  $= (6apbx^2 - 4pbx^3) : 24ar$  divisa distantiam centri gravitatis à vertice determinat  $(4apbx^3 - 3pbx^4) : (6apbx^2 - 4pbx^3) = (4ax - 3x^2) : (6a - 4x)$ . Est adeo ut  $6a - 4x$  ad  $4a - 3x$ , hoc est, ut  $a - \frac{2}{3}x$  ad  $\frac{2}{3}a - \frac{1}{3}x$  ita  $x$  ad distantiam centri gravitatis à vertice. Denotat autem  $a$  axem majorem ellipsis genitricis, seu ipsum axem majorem spheroidis;  $x$  autem altitudinem segmenti, seu portionem axis inter verticem & basin interceptam.

COROLLARIUM I.

181. Quodsi pro  $x$  ponatur  $a$ , prodit pro centro gravitatis totius spheroidis elliptici  $(4aa - 3aa) : (6a - 4a) = aa : 2a = \frac{1}{2}a$ . Est nempe in medio axe.

COROLLARIUM II.

182. Sphæræ igitur & spheroidis elliptici communem axem habentium centrum gravitatis idem est (§. 178).

COROLLARIUM III.

183. Si pro  $x$  ponatur  $\frac{1}{2}a$ , prodit distantia centri gravitatis in dimidio spheroide à vertice  $(\frac{4}{2}aa - \frac{3}{2}aa) : (6a - \frac{4}{2}a) = \frac{1}{2}aa : 4a = \frac{1}{8}a$ , eadem adeo quæ in hemisphærio (§. 178). Nam si ut ibi fiat  $a = 2r$ , erit  $\frac{1}{8}a = \frac{1}{4}r = \frac{1}{8}r$ .

PROBLEMA XXXIV.

184. *Invenire centrum gravitatis in Cono truncato BMND & in pyramide truncata.*

Tab. II  
Fig. 15

RESOLUTIO.

1. Inveniatur centrum gravitatis Coni AMN (§. 174): quod sit in F.
2. Inveniatur quoque centrum gravitatis Coni majoris BAD (§. cit.): quod sit in G.
3. Quærat ad Conum truncatum BMND, Conum minorem MAN & FG quarta proportionalis GH: erit in H centrum gravitatis Coni truncati (§. 144).

Patet autem, rationem Coni truncati BMND ad minorem MAN lineis esse exprimendam, nisi numeris utamur.

SCHOLIUM.

185. Eadem methodo centrum gravitatis reperies in conoidibus truncatis, itemque in spheræ & spheroidibus truncatis. Enimvero quamvis multa adhuc ea de re addi possent; filum tamen abrumpi consultum ducimus, cum ex hæcenus dictis facile eruantur, nec multum in praxi habeant usum. Adjiciemus itaque tantummodo adhuc methodum centrum gravitatis aut punctum ipsi in superficie corporis cujuscunque respondens Mechanice explorandi, quantum ad praxin sufficit.

PROBLEMA XXXV.

186. *Determinare centrum gravitatis Mechanice in corpore quocunque.*

## RESOLUTIO.

Tab. II. I. Super fune extenso aut latere prismatis trigoni FG corpus datum HI huc illucque promoveatur, donec partes utrinque æquilibrentur: planum, cujus latus KL, transit per centrum gravitatis (§. 124).

2. Super eodem corpus mutato situ æquilibretur: erit MN denuo latus plani per centrum gravitatis transeuntis (§. cit.).

Intersectio adeo rectarum MN & KL determinat punctum O in superficie corporis quaesitum, quod nempe est in diametro gravitatis (§. 126).

*Aliter.*

Tab. II. I. Corpus datum O ita collocetur super tabula horizontali, ut, si vel minimum ultra terminum CD promoveretur, decideret: erit recta CD in plano gravitatis (§. 124).

2. Imponatur idem corpus eidem tabulæ, ut nunc longitudo AB, quemadmodum ante latitudo CD, sit lateri tabulæ parallela & vel minimum ultra terminum AB promotum decidat: erit recta AB in plano gravitatis (§. cit.).

Communis adeo intersectio rectarum AB & CD in superficie corporis punctum C centro gravitatis imminens determinat (§. 129).

*Aliter.*

Laminæ centrum gravitatis invenies, si cuspidi alicujus styli eam imposueris & ultro citroque promoveris, donec partes utrinque æquilibrentur. Erit enim in puncto, quo sustentatur, centrum gravitatis (§. 124).

## COROLLARIUM.

187. Corporis adeo humani in directum extensi centrum gravitatis, vi modi primi, observante BORELLO (a), inter nates & pubim existit. Quare totius corporis gravitas ibi colligitur, ubi genitalibus natura concessit locum.

## SCHOLIUM.

188. Quoniam subinde etiam in applicatione methodi superioris distantia centri gravitatis à duobus planis in figuris planis, à tribus autem in solidis, ut illic per intersectionem duorum, hic trium normalium prodeat centrum gravitatis; ideo unum saltem exemplum apponimus, ut quomodo id fiat in aliis inde intelligatur. Et quia in corporibus suspendendis utile etiam est nosse perimetrorum centra gravitatis; ideo nec inconsultum videtur uno alteroque exemplo docere, quomodo methodus antea tradita & exemplis illustrata (§. 157 & seqq.) huc applicetur.

## PROBLEMA XXXVI.

189. Invenire centrum gravitatis in spatio parabolico mixtilineo APM.

## RESOLUTIO.

Sit AR ad axem AB normalis & semiordinata  $pm$  alteri PM infinite propinqua. Quæraturo primo distantia centri gravitatis ab axe AB, nempe QL. Cum Elementum  $PMmp$ , quod pro parallelogrammulo habetur (§. 98. Anal. infinit.) consideretur instar pondusculi ad axem librationis AB in P suspensi, erit momentum ejus  $= PMmp. \frac{1}{2} PM$  (§. 146), centro gravitatis in medio parallelogrammuli extante (§. 172). Sit jam  $AP = x$ ,  $PM = y$ , erit  $Pp = dx$ , adeoque  $PpmM = ydx$ , consequen-

Tab  
XII  
Fig.  
124

(a) De motu animalium part. I. Prop. 134. p. m. 167.

quenter momentum pondusculi  $\frac{1}{2}y dx$ . Jam in parabola  $y^2 = x$ , Parametro existente 1 (§. 388 *Anal. finit.*) atque hinc  $2ydy = dx$ . Quare momentum pondusculi  $\frac{1}{2}y^2 dx = y^3 dy$ , eorumque summa  $= \frac{1}{4}y^4$ . Jam arca APM seu summa omnium pondusculorum  $= \int y dx = \int 2y^2 dy = \frac{2}{3}y^3$ . Ergo  $QL = \int \frac{1}{2}y^2 dx : \int y dx$  (§. 157)  $= 3y^4 : 8y^3 = \frac{3}{8}y$ . Quare si fiat  $AD = \frac{3}{8}PM$  & ex puncto D ducatur DL ipsi AB parallela; erit in ea centrum gravitatis spatii mixtilinei APM.

Ducatur jam porro ex centro gravitatis O parallelogrammuli PMmp ad AR normalis OK, & consideretur instar pondusculi ad axem librationis AR suspensi, erit PMmp. OK momentum ejus  $= xy dx$ . Est vero in parabola  $y = x^{1/2}$  (§. 392 *Analys. fin.*). Ergo momentum pondusculi  $= x^{3/2} dx$ , consequenter eorum summa  $= \int xy dx = \frac{2}{5}x^{5/2}$ . Jam arca APM seu summa omnium pondusculorum  $\int y dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$  (§. 103 *Analys. infinit.*). Ergo  $DL = \int xy dx : \int y dx$  (§. 157)  $= 3x^{5/2} : 5x^{3/2} = \frac{3}{5}x$ . Quare si fiat  $AQ = \frac{3}{5}AP$  & in Q erigatur normalis QL ipsi DL paulo ante determinatæ occurrens in L; erit L centrum gravitatis spatii mixtilinei AMP, hic quidem parabolici.

PROBLEMA XXXVII.

190. *Invenire centrum gravitatis Perimetri trianguli.*

RESOLUTIO.

Tab. XIII. Fig. Sit triangulum ABC æquilaterum, 125. vel Ifoſcele.

126. I. Bisecentur rectæ in D, E & F: erunt puncta ista centra gravitatis laterum AB, AC & BC (§. 142).

2. Ducatur recta DE: qua in G bifariam divisa, erit G centrum gravitatis commune rectarum AB & AC (§. 145).

3. Concipiatur in G pondus duabus rectis AB & AC instar ponderum consideratis æquale, & in F pondus rectæ BC æquivalens fiatque ducta recta GF ut  $AB + AC + BC : BC = GF : GH$ : erit in H centrum gravitatis commune trium rectarum AB, AC & CB (§. 151).

PROBLEMA XXXVIII.

191. *Invenire centrum gravitatis perimetri figurae irregularis cujuscunque,* Tab. XIII. Fig. v. gr. *Pentagonæ.* 127.

RESOLUTIO.

1. Bisecentur singula latera AE, ED, DC, CB, BA, in G, F, K, I, H, erunt in istis divisionum punctis eorum centra gravitatis particularia (§. 142).

2. Connectantur puncta G & H recta GH fiatque  $AB + AE : AE = GH : HL$ ; erit in L centrum gravitatis laterum AB & AE commune (§. 151).

3. Jungantur puncta L & F recta FL, fiatque  $AB + AE + ED : ED = LF : LM$ ; erit in M centrum gravitatis commune laterum AB, AE & EF (§. cit.)

4. Jungantur porro puncta M & I recta MI, fiatque  $AB + AE + ED + BC : BC = MI : MN$ ; erit in N centrum gravitatis commune laterum AB, BC, AE & ED (§. cit.)

5. Denique jungantur puncta N & K recta NK; fiatque  $AB + BC + CD + DE$

+DE+EA:DC= NK:NO; erit in O centrum gravitatis commune totius perimetri (§. cit.).

## SCHOLIUM.

192. Me non monente apparet, hac ratione determinari posse centrum gravitatis commune ponderum quorumcunque quomocunque in eodem plano sitorum.

## THEOREMA XXV.

193. Omnis figura sive superficialis, sive solida, quæ motu lineæ aut figuræ generatur, æquatur factò ex magnitudine generante in viam ejus centri gravitatis, seu lineam, quam centrum gravitatis describit.

## DEMONSTRATIO.

Concipiamus pondus totius magnitudinis generantis in centro gravitatis collectum (§. 125); erit totum pondus motu illius productum æquale factò ex pondere moto in viam centri gravitatis. Sed cum lineæ & figuræ instar gravium homogeneorum considerentur; pondera ipsarum sunt ut volumina (§. 230), adeoque pondus motum est magnitudo generans, pondus productum genita. Quare figura genita æquatur factò ex magnitudine generante in viam ejus centri gravitatis.  
*Q. e. d.*

*Aliter.*

Idem etiam Analytice ostenditur de solido rotatione genito hoc modo. Sit AP= $x$ , PM= $y$  & ratio radii ad peripheriam circuli = $r:p$ ; erit solidum rotatione genitum = $\int py^2 dx:2r$  (§. 197 *Anal. infin.*). Sit jam in L centrum gravitatis & PS= $QL$  distantia

ejus ab axe AB; erit peripheria circuli radio PS descripti via rotationis centri gravitatis. Quare cum sit PS= $\frac{1}{2}fy^2 dx:fydx$  (§. 189); erit via rotationis centri gravitatis = $\int pfy^2 dx:2r\int fydx$ . Quare si in hanc viam ducatur planum generans  $\int fydx$ ; erit solidum rotatione genitum = $\int pfy^2 dx:2r$ , ut ante.

## COROLLARIUM I.

194. Hinc cum parallelogrammum ABDC describatur, si recta AB juxta ductum alterius AC motu sibi semper parallelo descendat (§. 102. & 233 *Geom.*) & ex Coroll. II. Theor. XXVI. (315.) independenter ab his constet, viam centri gravitatis E æqualem esse rectæ FE ad CD perpendiculari, hoc est, altitudini parallelogrammi (§. 217 *Geom.*); area ejusdem æquatur factò ex basi CD seu linea describente in altitudinem EF.

Tab. I  
Fig. 19

## SCHOLIUM I.

195. Hæc consona sunt iis, quæ de parallelogrammorum areis investigandis demonstrata sunt in Geometria (§. 370. 375. 387. *Geom.*)

## COROLLARIUM II.

196. Eodem modo liquet, omnium corporum, quæ à figura plana quacunque juxta ductum alicujus rectæ AC descendente describuntur, soliditatem haberi, si planum describens per altitudinem multiplicetur.

## SCHOLIUM II.

197. Hæc denuo consentiunt cum iis, quæ de prismatis & cylindris dimetiendis in Geometria demonstrata sunt (§. 539 & 541 *Geom.*)

## COROLLARIUM III.

198. Cum circulus describatur, si radius CL circa centrum C rotetur (§. 131 *Geom.*); centrum vero gravitatis radii CL sit in medio F (§. 141); via centri gravitatis est peripheria

Tab. II  
Fig. 20

peripheria

pheria circuli X radio subduplo descripta, consequenter area circuli æquatur factò ex radio CL in peripheriam radio subduplo CF descriptam.

SCHOLIUM III.

199. *Hæc iis consentanea esse, quæ in Geometria de circulo demonstrata sunt* (§. 410 Geom.), statim patet consideranti, quod peripheria radio subduplo descripta sit peripheriæ integro descriptæ dimidia (§. 412 Geom.).

COROLLARIUM IV.

b. II. g. 21. 200. Si rectangulum ABCD circa axem AD rotetur, ipsum quidem cylindrum, latus vero BC cylindri superficiem describit (§. 465 Geom.). Est vero centrum gravitatis rectæ BC in medio F (§. 141) & centrum gravitatis plani generantis in medio G rectæ EF; via adeo hujus est peripheria circuli radio EG, illius vero peripheria circuli radio EF descripta. Quare superficies cylindri est factum ex altitudine BC in peripheriam circuli radio EF descriptam sive basin, ut in Geometria demonstravimus (§. 516 Geom.): soliditas vero cylindri est factum ex rectangulo generante ABCD in peripheriam circuli radio EG, qui est ipsius EF seu semidiametri cylindri subduplus, descriptam.

SCHOLIUM IV.

201. *Sit altitudo plani describentis, adeoque cylindri, BC = a, semidiameter basis DC = r, erit EG = ½r & , posita ratione semidiametri ad peripheriam = 1 : m, peripheria radio ½r descripta = ½mr. Ducta igitur ½mr in aream rectanguli AC = ar; erit soliditas cylindri = ½amr². Est vero ½mar² = ½r. mr. a & ½r. mr area circuli radio DC descripti. Constat ergo cylindrum reperiri æqualem factò ex basi in altitudinem, ut in Geometria (§. 541) demonstratum.*

COROLLARIUM V.

b. II. g. 15. 202. Similiter cum centrum gravitatis

rectæ AB sit in medio M (§. 141) & superficies conii describatur, si triangulum ABC circa axem AC rotetur (§. 467 Geom.); sitque præterea PM = ½BC (§. 268 Geom.), superficies conii æqualis est factò ex ejus latere AB in peripheriam radio PM; seu semidiametri baseos BC subduplo descriptam.

SCHOLIUM V.

203. *Sit BC = r, AB = a, ratio radii ad peripheriam 1 : m; erit PM = ½r & peripheria hoc radio descripta = ½mr. Ducta igitur ½mr in latus conii AB, prodit superficies ½amr. Sed ½amr est etiam factum ex ½a & mr. Ergo superficies conii producitur ex peripheria baseos in latus dimidium, ut in Geometria (§. 519) demonstratum.*

COROLLARIUM VI.

204. Si triangulum ACB circa axem AB rotetur, conum describit (§. 467 Geom.). Sed si CB divisa bifariam in D ducatur recta AD, fiatque AO = ⅔AD; erit in O centrum gravitatis (§. 158). Æquatur ergo conii soliditas factò ex triangulo CAB in peripheriam radio PO descriptam (§. 191). Est vero AD : AO = DB : OP (§. 268 Geom.). Sed AO = ⅔AD & DB = ½CB per demonstr. Ergo OP = ⅔DB = ⅓CB.

Tab. II. Fig. 22.

SCHOLIUM VI.

205. *Sit CB = r, AB = a, ratio radii ad peripheriam = 1 : m; erit OP = ⅓r, peripheria hoc radio descripta ⅓mr, Δ ACB = ½ar, adeoque soliditas conii ⅓mr. ½ar = ⅓amr². Est vero etiam ⅓amr² = ⅓r. mr. ⅓a, seu factum ex basi conii in tertiam altitudinis partem, ut in Geometria aliunde demonstratum (§. 548 Geom.).*

SCHOLIUM VII.

206. *Elegans hoc Theorema, quod inter præcipua seculi superioris in Geometria inventa referri solet, jam olim PAPPUS com-*

memoravit (a); sed PAULUS GULDINUS, è Soc. Jesu, expressius plurimorum exemplorum inductione ostendit (b). Usi sunt eodem Geometra, præsertim ante inventum à LEIBNITIO calculum summatorium, cum GULDINO, quemadmodum indicaverat PAPPUS, in dimetiendis solidis & superficiibus motu rotationis circa axem fixum genitis: sed idem usum habere adhuc potest in quibusdam casibus, ubi calculi summatorii ope idem difficilius præstaretur. Ego in tyronum gratiam

exemplis tritis regulam illustrare volui, ut vim ejus tanto facilius animo comprehenderent, simulque ostendi, eidem locum esse, si magnitudines alio, quam rotationis motu generentur, quemadmodum fieri posse à GULDINO etiam annotatum reperio (c): unde nec cum PAPPO ad solum rotationis motum Theorema restrinxi. Illustris LEIBNITIUS (d) invenit, succedere quoque negotium, si axis vel centrum continuo mutetur, durante motu generante.

## CAPUT IV.

### De Quiete & Lapsu Corporum gravium.

#### DEFINITIO XXV.

207. **L**inea horizontalis vera est, cujus singula puncta à centro Telluris aequaliter distant.

#### COROLLARIUM.

208. Linea horizontalis est arcus circuli ex centro Telluris per punctum datum descripti (§. 37. 41. *Geom.*).

#### DEFINITIO XXVI.

Tab.II. Fig.20. 209. **L**inea horizontalis apparens BD est recta, quæ veram in dato puncto A tangit.

#### COROLLARIUM.

210. Est adeo ad semidiametrum telluris in puncto contactus A perpendicularis (§. 304 *Geom.*).

#### DEFINITIO XXVII.

211. **L**apsus est mutatio situs vi gravitatis.

#### THEOREMA XXVI.

212. *Si corpora gravia versus cen-*

*trum terra nituntur, linea directionis eorundem ad lineam horizontalem est perpendicularis & contra.*

#### DEMONSTRATIO.

- I. Si corpora gravia versus centrum terræ nituntur, linea directionis eorundem semidiametro telluris in directum jacet (§. 17). Ergo ad lineam horizontalem tam veram (§. 209 *Mech.* & §. 38. *Anal. infin.*), quam apparentem perpendicularis (§. 209) *Quod erat unum.*
- II. Si linea directionis gravium ad horizontalem perpendicularis; semidiametro telluris in directum jacet (§. 206). Continuat igitur in centrum telluris incidit (§. 470 *Geom.*) *Quod erat alterum.*

#### COROLLARIUM.

213. Cum terra sit propemodum spherica, ut in Geographia demonstratur, ingentes marium tractus, immo omnium fluidorum tractuumque terrestrium æquilibrium

(a) Sub finem Præfat. ad Lib. 7 Collect. Mathem.  
(b) Lib. 2. & 3. de Centro Gravitatis.

(c) Lib. 2. c. 8 Prop. 3 f. 147.

(d) In Actis Erud. An. 1695. p. 493.

bilium superficies in omnibus suis punctis à centro Telluris æqualiter absunt (§. 471 *Geom.*). Quare cum experientia confitet, gravia per lineas perpendiculares ad superficiem aquarum descendere; gravia niti versus centrum Telluris inde evincitur.

SCHOLIUM.

214. Quodsi Terra figura non sit perfecte spherica, ex descensu perpendiculari gravium concludi nequit, quod versus centrum illius nitantur: cum in solo circulo, cujus rotatione sphaera generatur, normales ad peripheriam in centro concurrant (§. 38 *Analyf. infinit.*). Sed suo loco, ubi de figura Telluris agemus, patebit, utique assumi posse citra erroris assignabilis periculum, gravia niti versus centrum Terræ. Immo in Staticis sufficit, descensum perpendicularem ad libellam aquarum experientia constare.

COROLLARIUM II.

215. Quoniam pro corpore gravi, salva gravitate, solum gravitatis centrum substitui potest (§. 125); linea directionis corporis gravis est recta ex centro gravitatis ad lineam horizontalem sive apparentem, sive veram perpendiculis.

PROBLEMA XXXIX.

b. II. 216. Data semidiametro Telluris AC vel LC una cum longitudine lineæ horizontalis apparentis AD, determinare distantiam puncti extremi D à linea horizontali vera AL.

RESOLUTIO.

1. Quadrato semidiametri Telluris AC addatur quadratum lineæ horizontalis apparentis AD.
2. Ex aggregato extrahatur radix, quæ erit recta AD (§. 417 *Geom.*).
3. Inde subtrahatur semidiameter CL: quod relinquitur, est distantia li. *Wolffi Oper. Mathem. Tom. II.*

neæ horizontalis apparentis à vera DL.

E. gr. Ponamus semidiametrum Telluris, qualis vulgo statuitur, 860 milliarum Germanicorum & AD unius milliaris: erit

$$AC^2 = 739600$$

$$AD^2 = 1$$

---


$$DC^2 = 739601$$

$$\text{Unde } DC = 860.00057$$

$$CL = 860$$

---


$$LD = 0.00057 \text{ seu } \frac{57}{100000}$$

*Aliter.*

Quoniam  $GD : AD = AD : DL$  (§. 334 *Geom.*); erit  $DL = AD^2 : GD$  (§. 302. *Arithm.*). Est vero DL ipsius GL seu diametri Telluris particula admodum exigua, quippe in distantia milliaris demum  $\frac{57}{100000}$  unius milliaris, seu  $\frac{57}{172000000}$  diametri Telluris. Quamobrem  $AD^2 : GL$  sensibilibiter non differt à  $AD^2 : GD$ . Ut itaque habeatur DL, quadratum lineæ horizontalis apparentis AD dividatur per diametrum Telluris GL.

E. gr. Sit AD 900 pedum Parisinorum seu 129600 linearum (pes enim Parisinus continet 12 digitos, digitus 12 lineas), diameter Telluris juxta PICARDUM (a) 39231564 pedum Parisinorum seu linearum 5649345216. Quodsi ergo  $AD^2 = 16796160000$  per  $GL = 5649345216$  divides, prodibit DL fere 3 linearum.

SCHOLIUM.

217. Hac posteriore methodo PICARDUS (b) tabulam construxit, quam huc transferre in usum futurum libuit. Continet autem columna prima longitudinem lineæ horizontalis apparentis AD in pedibus Parisinis; altera puncti extremi D altitudinem DL supra lineam horizontalem veram AL.

F

AD

(a) *Traité du Nivellement* p. 196.  
 (b) *Loc. cit. c. I. p. 7.*

AD	DL	AD	DL
300 ped.	0 dig. $0\frac{1}{2}$ lin.	3300 ped.	3 dig. 6 lin.
600	$1\frac{1}{2}$	3600	4 0
900	3	3900	4. 8
1200	$5\frac{1}{2}$	4200	5. 4
1500	$8\frac{1}{2}$	4500	6. 3
1800	1. 0	4800	7. 1
2400	1. $9\frac{1}{2}$	5400	8. 11
2700	2. 3	5700	10. 0
3000	2. 9	6000	11. 0

## COROLLARIUM.

218. Si linea horizontalis apparens AD 300 pedes non excedit; citra errorem sensibilem pro vera assumi, consequenter etiam planum aliquod pro horizontali haberi potest.

## PROBLEMA XL.

219. *Explorare, utrum planum aliquod propositum sit horizontale, nec ne.*

## RESOLUTIO.

- Tab. II. Fig. 23. 1. Ex trabeculis ligneis construatur triangulum æquicrurum FCG, continuatis cruribus in AB, quo longius, eo melius.
2. Ex vertice C suspendatur globus plumbeus D & basis trianguli FG dividatur bifariam in E.
3. Libella sic constructa collocetur super plano dato, ita ut cruribus suis AC & CB eidem insistant.
- Dico, si filum CD transeat per punctum medium E, planum esse horizontale.

## DEMONSTRATIO.

Quia globus plumbeus D filum CD gravitate sua extendit, pro linea directionis recte habetur (§. 19). Quodsi

ergo FG bifariam secet in E; erit ad FG perpendicularis (§. 184 *Geom.*). Quoniam vero  $AC = CB$  per construct. adeoque  $AC : CB = CF : FG$ ; erit  $x = 0$  (§. 207 *Geom.*), consequenter AB ipsi FG parallela (§. 255 *Geom.*) & CD etiam ad AB (§. 230 *Geom.*), hoc est, linea directionis globi ad planum, cui libella insitit, perpendicularis. Planum adeo horizontale est. (§ 212).

## SCHOLIUM.

220. *Figura instrumenti variis modis mutari solet, eodem tamen semper manente fundamento. Quemadmodum vero ad praxes Staticas plerumque sufficit; ita inferius Artem libellandi exposituri alia libellarum genera hac accuratiora describemus, quarum beneficio linea horizontalis per tractus amplissimos continuatur.*

## DEFINITIO XXVIII.

221. Per *Basin corporis gravis* intelligo figuram, in cujus perimetro circumcirca terminantur partes incumbentes aut fulcra, quibus ipsa incumbunt.

E. gr. Incumbat corpus grave duobus fulcris quadrangularibus CD & EF; figura CDEF dicetur basis ejus.

## THEOREMA XXVII.

222. *Si linea directionis corporis gravis intra basin cadit, nec corpus pluribus fulcris innixum proprio pondere satis incurvatur; corpus in situ suo acquiescit: sin illa extra basin cadit vel corpus pluribus fulcris innixum proprio pondere satis incurvatur, in eam labitur partem, versus quam cadit centrum gravitatis.*



DEMONSTRATIO.

ab.II. I. Incumbat corpus GB plano cui-  
 ig.25. dam alteri firmo ac stabili AFEB, sitque linea directionis CD. Cum hæc ex centro gravitatis C educatur (§. 215); centrum gravitatis descendere nititur per rectam CD (§. 19). Sed juxta eandem ipsi renititur corpus, cui incumbit, idque satis firmum ac stabile, ut cedere nesciat, *per hypoth.* Descensus adeo centri gravitatis impeditur (§. 75.) adeoque corpus quiescit (§. 123). *Quod erat unum.*

ab.II. II. Incumbant extrema alicujus cor-  
 ig.24. poris duobus fulcris FE & CD, & linea directionis IL intra basin FEDC cadat. Quoniam linea directionis ex centro gravitatis I ducitur (§. 215); centrum gravitatis per rectam IL descendere nititur (§. 19). Sed corpus proprio pondere eo usque incurvari nequit, ut à fulcris recedant ejus extrema, *per hypothes.* Ergo centrum gravitatis impeditur; quo minus descendat; consequenter corpus in hoc situ acquiescit (§. 123). *Quod erat secundum.*

ab.II. III. Cadat linea directionis CM cor-  
 ig.26. poris IL extra basin. Cum centrum gravitatis sit I (§. 215); id secundum rectam CM descendere nititur (§. 19). Quare cum nihil secundum eandem directionem ipsi resistat; actu descendet adeoque corpus labitur in eam partem versus quam cadit centrum gravitatis (§. 211). *Quod erat tertium.*

ab.II. IV. Denique corpus grave duobus  
 ig.24. fulcris EF & DC ita incumbat, ut

linea directionis IL intra basin FEDC cadat. Quoniam linea directionis ex centro gravitatis I ducitur; centrum gravitatis per rectam IL descendere nititur. Quare cum corpus proprio pondere eo usque incurvari possit, ut à fulcris recedat, *per hypoth.* centrum gravitatis actu descendit, adeoque corpus labitur in eam partem, versus quam linea directionis cadit (§. 211). *Quod erat quartum.*

COROLLARIUM.

223. Quo major itaque vis requiritur, ut linea directionis extra basin emoveatur; consequenter, quo longius ea distat à perimetro basis; eo firmitus corpus in loco consistit.

PROBLEMA XLI.

224. *Invenire, utrum corpus grave in dato situ extra lapsus periculum constituatur, nec ne.*

RESOLUTIO.

1. Quaratur centrum gravitatis corporis gravis (§. 186).
2. Ex eo dimittatur perpendicularis in lineam horizontalem atque parentem, juxta Problema XL (§. 219), si opus sit determinandam: quæ erit linea directionis (§. 215).

Quodsi perpendicularum intra basin corporis cadit, extra lapsus periculum constituitur; sin minus, certo ruet in eam partem, versus quam perpendicularum cadit (§. 222).

SCHOLION I.

225. *Hinc ratio apparet, cur turres inclinata BONONIENSIS & PISANA non corruant, etsi illa anno 1110 excitata ad alti-*

itudinem pedum 130 assurgat & perpendicularum à basi intervallo 9 pedum recedat, hæc vero anno 1173 exstructa altitudinem habeat cubitorum 78 & intervallum inter basin atque perpendicularum cubitorum  $7\frac{1}{2}$  admittat: id quod expressius ostendit PAULUS CASATUS (a).

## SCHOLIUM I I.

226. Idem Problema motibus animalium explicandis inservit: qualia inprimis dedit JOHANNES ALPHONSUS BORELLUS (b). E. gr. Cum centrum gravitatis in homine inter nates & pubim existat; linea directionis intra spatium calcaneis interjectum adeoque intra basin cadit, quando erecto corpore utroque pede pavimento insistit: quare in hoc situ firmiter consistit. Enimvero si pes alteruter elevetur, basis definitur spatio, quod pes unus occupat (§. 221). Cedit adeo linea directionis extra basin, nempe versus dexteram, si pes dexter elevetur, consequenter homo super solo pede sinistro stare non poterit (§. 222), nisi corpus in latere sinistro incurvet, quo linea directionis in pedem sinistram retrahatur. Enimvero talia fusius prosequi non est nostri instituti: apprimè autem observanda sunt in picturis & sculpturis.

## SCHOLIUM III.

227. Immo hinc ratio reddi potest multorum in structura corporis animalis occurrentium. E. gr. Cum homo erectus stare ac incedere debeat, necessarium utique fuit, ut planum per medium transiens corpus divideret ipsum in partes utrinque equiponderantes. Unde partes geminate, quales sunt aures, oculi, brachia cum manibus, crura cum pedibus, à lateribus comparent, quæ sui similes non habent, ut frons, nasus, os, mentum, pectus, venter, genitale membrum, medium tenent locum eamque habent figuram,

(a) Mechanic. Lib. I. c. 9. p. 50. & seqq.

(b) De motu Animalium c. 18. usque ad p. 165. & seqq. conf. CASATUM Mechan. Lib. I. c. 11. p. 62. & seqq.

ut in partes æquales & similes, adeoque in equiponderantes, dividi possint.

## DEFINITIO XXIX.

228. Centrum motus est punctum, circa quod grave, aut plura gravia commune centrum gravitatis habentia rotari possunt. Tab. II. Fig. 27.

E. gr. Si pondera P & Q rotari possint circa punctum N ita ut descendente P ipsum Q ascendat; dicetur N centrum motus.

## THEOREMA XXVIII.

229. Distantia IN centri gravitatis ponderis particularis à centro gravitatis communi aut centro motus N, est ad lineam directionis Ip perpendicularis.

## DEMONSTRATIO.

Cum linea directionis Ip corporis p transeat per centrum gravitatis ipsius (§. 215) & grave eodem modo gravitet, in quocunque lineæ directionis puncto centrum gravitatis corporis existat (§. 78); distantia centri gravitatis corporis p à centro motus vel centro gravitatis communi N eadem est, quæ distantia ipsius N à linea directionis. Sed distantia ipsius N à linea directionis Ip est perpendicularis NI (§. 225 Geom.). Ergo eadem perpendicularis NI est distantia centri gravitatis corporis p à puncto N. Q. e. d. Tab. II. Fig. 27.

## PROBLEMA XLII.

230. Dato centro gravitatis C una cum pondere corporis AB, determinare vires in A & B requisitas, ut in situ horizontali sustentetur. Tab. III. Fig. 2

RESOLUTIO.

1. Quærat<sup>r</sup> ad summam distantiarum virium in A & B applicatarum à centro gravitatis corporis sustentati C, pondus ejusdem G & distantiam vis in B applicatæ BC numerus quartus proportionalis: Dico, hunc esse vim in A applicandam.

2. Quare si is subtrahatur à pondere G, relinquetur vis in B applicanda. Sit e. gr.  $G = 300$  librarum,  $AC = 5'$ ,  $CB = 8'$ : erit  $AC + CB = AB = 13'$  adeoque vis in A applicanda  $= G \cdot CB : AB = 300 \cdot 8 : 13 = 184\frac{8}{13}$ , consequenter vis in B  $= 115\frac{5}{13}$ .

DEMONSTRATIO.

Quoniam corpus AB sustentatur à viribus A & B per *hypoth.* necesse est ut eadem vi renitentur; quantum illud deorsum nititur (§. 75). Nititur autem corpus AB deorsum tota vi gravitatis, hoc est, quanta est ponderis G eidem æqualis & ex centro gravitatis C suspensi (§. 125). Ergo vires A & B junctim sumtæ ponderi huic æquantur, consequenter eorum centrum gravitatis commune in C (vi §. cit.). Sed cum linea AB sit horizontalis, per *hypoth.* adeoque linea directionis GC ad eam perpendicularis (§. 215) vires autem in A & B secundum eandem directionem renitentur; erunt quoque earum lineæ directionis ad AB perpendiculares & hinc à centro gravitatis communi C distant intervallis AC & CB (§. 229). Est adeo  $AC + CB : CB = G : A$  (§. 148). Q. e. d.

COROLLARIUM.

231. Corpus adeo AB gravitat in fulcra, à quibus sustentatur, in ratione re-

ciproca distantiarum à centro gravitatis ipsius.

SCHOLIUM.

232. Ne mirentur tyrones, nos ad vires resistentes quascunque & grave sursum urgentes ea applicare, que de ponderibus deorsum nitentibus demonstrata sunt: eodem enim manente effectu, pondera H & I facili negotio, si ita visum fuerit, substitui possunt.

PROBLEMA XLIII.

233. Dato centro gravitatis F corporis IH una cum gravitate ipsius determinare punctum M, quod si plano horizontali incumbat, pondus datum G in L appensum corpus IH ex situ horizontali dimovere nequit. Tab. II. Fig. 18.

RESOLUTIO.

Concipiatur in centro gravitatis F appensum pondus gravitati totius corporis IH æquale (§. 125) & quærat<sup>r</sup> ejusdem atque ponderis dati G centrum gravitatis commune M (§. 149). Quodsi enim punctum M plano horizontali incumbat, pondus G corpus HI è situ suo dimovere nequit (§. 124) Q. e. i. & d.

Sit e. gr. baculi centrum gravitatis F, fitula aqua plena librarum 24, pondus baculi 2,  $LF = 18''$ . Reperietur  $LM = LF \cdot F : (G + F) = 18 \cdot 2 : 26 = 18 : 13 = 1'' 4'''$  fere. Mirum ergo non est (quod Statices ignari mirantur) situlam baculo IH supra mensam posito appensam non decidere.

PROBLEMA XLIV.

234. Dato corporis AB centro gravitatis C una cum pondere ejus G determinare puncta L & M, in quibus supponenda sunt fulcra MN & LO, ut in data ratione premantur. Tab. III. Fig. 28.

## RESOLUTIO.

Sumantur in linea horizontali AB, quæ per centrum gravitatis C transit, rectæ MC & CL in data ratione. Quodsi fulcra MN & LO in punctis hac ratione determinatis supponas, ea premuntur in data ratione (§. 231).

## COROLLARIUM.

235. Quodsi in M & L fulcrorum loco humeros aut manus supponant operarii; pondus portare poterunt, si viribus eo-

rum proportionatum. Unde patet, quomodo onus ferendum in data ratione distribui possit.

## SCHOLIUM.

236. Si pondus ferendum ex longurione extra centrum gravitatis ipsius suspendatur; quarendum est centrum gravitatis commune ponderis atque longurionis, & supposito in eodem pondere utrique equali, reliqua peraguntur ut in resolutione Problematis. Exempla specialia, quibus Problemata hæc illustrantur, dedit STEVINUS (a).

## CAPUT V.

## De Motu Rectilineo composito.

## DEFINITIO XXX.

237. **M**otus simplex est, qui à vi una efficitur.

## DEFINITIO XXXI.

238. Motus compositus est, qui efficitur à viribus pluribus conspirantibus. Dicuntur autem vires conspirare, si directio unius non est opposita directioni alterius, veluti cum radius circuli circa centrum rotari & interea punctum per eam recta incedere concipitur.

## COROLLARIUM.

239. Omnis ergo motus curvilineus est compositus (§. 74).

## DEFINITIO XXXII.

240. Angulus directionis est, quem linea directionis duarum virium conspirantium comprehendunt.

(a) Stræ. Lib. 2. Prop. 7. 8. Operum f. 474. & seqq.

## THEOREMA XXIX.

241. Si mobile A duplici vi urgeatur, altera quidem secundum directionem AB, altera vero secundum directionem AC, ita ut celeritates sint ut latera AB & AC; motu composito diagonalem parallelogrammi AD describit.

Tab.  
Fig. 1

## DEMONSTRATIO.

Si mobile A sola vi secundum AB impressa moveretur, momento primo foret in aliquo puncto rectæ AB, veluti in H, & ad rectam HL ipsi AC parallelam accederet. Si sola vi secundum AC impressa progredieretur, eodem momento foret in aliquo puncto ipsius rectæ AC, veluti in I, & ad rectam IL ipsi AB parallelam accederet. Sed cum directiones virium sibi non opponantur, neutra alteram impedire valet, adeoque eodem momento mobile accedet tum ad HL, tum

tum ad IL, consequenter erit in puncto L, ubi HL & IL concurrunt. Quoniam vero celeritates sunt ut AB ad BD *per hypoth.* & spatia AH & HL eodem tempore descripta sunt ut celeritates (§.33), consequenter  $AH:HL = AB:BD$ ; erit AHL pars trianguli ABD (§.268 *Geom.*), consequenter AL pars diagonalis AD (§.337 *Geom.*). Eodem modo patet, ductis KM & MG ipsis AB & AC parallelis, quod mobile momento secundo futurum sit in M, tandemque in D. Constat ergo propositum. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

242. Quodsi ergo concipiamus rectam AC motu æquabili sibi semper parallelo juxta ductum alterius rectæ AB moveri, ac interea punctum motu æquabili in eadem descendere, punctum representabit corpus, quod duplici vi, juxta directiones AB & AC, celeritatibus, quæ sunt ut AB & AC, movetur, adeoque motu composito describetur triangulum ABD.

SCHOLIUM.

243. Solent igitur nonnulli in demonstrando Theoremate presente punctum in linea AC descendens, dum ipsa interea juxta ductum rectæ AB promovetur, pro corpore sumere, quod duplici vi juxta hypothesein Theorematis movetur: id quod etiam ad juvandam imaginationem utiliter sumi potest, cum sic pateat possibilitas hypotheseos intuitiva ratione.

COROLLARIUM II.

244. Mobile motu composito eodem tempore describit diagonalem AD, quo motu disjuncto describeret latera parallelogrammi AB & AC (§.241).

COROLLARIUM III.

245. Cum circa quamlibet rectam AD parallelogrammum aliquod ABDC construi

possit, constructis nempe triangulis æqualibus ACD & ABD tanquam super basi communi (*vi* §. 337. 205. *Geom.*); omnis motus rectilineus, ubi ad demonstrandum utile fuerit, in compositum resolvi potest.

COROLLARIUM IV.

246. Quoniam vero laterum AC & CD ratio varia esse potest, pro diversitate angulorum CAD & DAB, motu quoque variis modis composito eadem recta AD describi (§.245), adeoque & idem motus rectilineus in varios compositos resolvi potest.

THEOREMA XXX.

247. In motu composito uniformi velocitas à viribus conspirantibus producta est ad velocitatem alterutrius, ut diagonalis AD parallelogrammi ABDC, juxta cujus latera agunt separate, ad latus alterutrum AB vel AC.

DEMONSTRATIO.

Eodem enim tempore, dum vis una conficit latus parallelogrammi AB & altera AC figillatim, conjunctæ conficiunt diagonalem AD (§.241). Est ergo diagonalis AD spatium à viribus conspirantibus dato tempore descriptum (§.12). Sed in motu uniformi celeritates in eodem tempore sunt ut spatia (§.33). Est ergo celeritas à viribus conspirantibus orta ad celeritatem à vi alterutra ortam ut AD ad AB vel AC. *Q. e. d.*

Tab. II.  
Fig. 19.

COROLLARIUM I.

248. Datis itaque viribus conspirantibus, hoc est, data celeritatum ratione per rectas AB & AC magnitudine datas, & directione per easdem rectas positione datas, aut per angulum directionis, datur motus obliqui celeritas & directio, quia diago-

diagonalis & magnitudine & positione datur (§. 339. & seqq. *Geom.*)

## COROLLARIUM II.

249. Non tamen vice versa motu obliquo dato dantur simplices, quia idem ex diversis simplicibus componi potest (§. 245)

## COROLLARIUM III.

250. Motus adeo simplex per diagonalem AD, celeritate ut AD, æquipollet motibus per latera AB & AC, celeritatibus ut AB & AC conjunctis; hoc est, perinde est, siue mobile juxta directionem AD celeritate ut AD, siue simul juxta directiones AB & AC celeritatibus ut AB & AC moveatur (§. 241 246.)

## THEOREMA XXXI.

Tab. III. Fig. 30. 251. In motu composito ab iisdem viribus producto major est velocitas, si angulus directionis minor: illa autem minor, si hic major.

## DEMONSTRATIO.

Sit angulus directionis major BAC, minor FAC. Quoniam vires eadem sunt *per hypoth.* erit AC utrique parallelogrammo AFEC & BACD communis, & præterea AB = AF. Evidens est in hypothese anguli majoris describi diagonalem AD, in hypothese minoris vero ipsam AE & quidem eodem tempore ob AB = AF, (§. 244). Sunt igitur celeritates ut AD ad AE (§. 33). Quare cum AD < AE; velocitas in hypothese anguli majoris minor est, quam in hypothese minoris. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

252. Cum datis cruribus AC & CE cum angulo intercepto ACE, angulus CEA (§. 40. *Trigon.*) & inde porro AE (§. 36. *Trig.*) reperitur; data virium conspiran-

tium celeritate & angulo directionis, in casu quocunque speciali celeritas motus compositi inveniri, consequenter ratio celeritatum, ab iisdem viribus, sub diversis directionum angulis, productarum definiri potest.

## THEOREMA XXXII.

253. Si mobile à duabus viribus secundum directiones AB & AC trahitur, que æquipollent tertia trahenti secundum directionem AD, erunt sollicitationes ad motum inter se reciproce ut sinus angulorum, quos linea directionis BA & AC cum linea directionis tertia AD comprehendunt, & alterutra earum erit ad sollicitationem à media pendentem ut sinus anguli, quem linea directionis alterius cum linea directionis tertia comprehendit ad sinum anguli BAC. Tab. I. Fig. 2.

## DEMONSTRATIO.

Ducatur BD ipsi AC & DC ipsi AB parallela (§. 258. *Geom.*); erit angulus BDA = DAC & ADC = BAD (§. 255. *Geom.*), ac BACD parallelogrammum (§. 102. *Geom.*). Quoniam vires secundum directiones AB & AC trahentes in sollicitando mobili ad motum, seu quatenus mobile ad motum urgent (§. 110), æquipollent vi mobile secundum directionem AD trahenti *per hypoth.* sollicitationes laterales sunt ut AB & BD = AC (§. 335. *Geom.*), media vero sollicitatio ut AD (§. 250). Erunt igitur (§. 33. *Trigon.*) laterales ut sinus angulorum BDA & BAD, & lateralis secundum directionem AB trahens ad mediam secundum directionem AD trahentem ut sinus anguli BDA seu DAC ad sinum anguli ABD

ABD seu BAC (§. 233 *Geom.* & §. 5. *Trigon.*), lateralis vero agentis secundum directionem AC sive BD ut sinus anguli BAD ad sinum anguli BAC. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

254. Sollicitationes sunt in ratione composita massarum & celeritatum initialium (§. 110. 22), consequenter celeritatum in motu equabili, ubi c est ut dc. Recte, per quas exponuntur motus in resolutione compositi in simplices, sunt ut celeritates (§. 250). Quare si per eas exponuntur sollicitationes, massæ corporum, in quibus concipiuntur vires, supponendæ sunt æquales (§. 181. *Arithm.*) id quod semper facere licet, cum corpori cuicunque data celeritate lato, vel data celeritate initiali instructo, dari possit aliud eidem in sollicitatione ad motum æquivalens, quod habet massam datam (§. 146), quia celeritates initiales sunt ut distantia à centro motus. Atque hæc ratio est, cur in præsentate tractatione præcisa massa corporum ea consideramus instar punctorum, in quibus non spectatur nisi celeritas initialis.

DEFINITIO XXXIII.

255. Per *Tendentiam* intelligimus rectam velocitatis & directionis representatricem. Et *Tendentia media* vocatur, quæ in motu composito pluribus datis simul substitui potest.

PROBLEMA XLII.

Tab. XIII. 256. Si mobile A urgetur secundum directiones BA, CA, DA, EA celeritatibus ut AB, AC, AD, AE, determinare directionem & celeritatem mobilis in motu composito, qui ex simplicibus istis resultat, seu datis quotcunque tendentiis AB, AC, AD, AE, invenire mediam AK.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. II.

RESOLUTIO.

1. Per Centrum gravitatis commune G omnium punctorum B, C, D, E, in quibus terminantur tendentiæ mediæ ducatur recta AK indefinita ex centro mobilis A.
2. In hanc ex A transferatur AG toties, quot sunt tendentiæ datæ. Dico AK fore tendentiam mediam.

DEMONSTRATIO.

Ducatur per centrum mobilis A recta RS & ex singulis punctis B, C, D, E atque G demittantur in eam perpendiculares Bb, Cc, Dd, Ee, Gg: tendentiæ BA æquivalentur laterales Bb & bA, secundæ CA laterales Cc & cA, tertiæ DA laterales Dd & dA, quartæ EA laterales Ee & eA (§. 250, 255). Jam cum directiones Bb, Cc, Dd & Ee sibi mutuo non sint contrariæ, tendentiæ cognominæ in determinanda media sunt attendendæ: ex adverso cum directiones bA & cA sint contrariæ directionibus dA & eA, sintque velocitates versus partem S majores velocitatibus versus partem R per *hypotb.* excessus tendentiarum versus S supra tendentias versus R attendendus erit in media determinanda. Jam si parallelogrammum AgGH compleatur; tendentiæ perpendiculares Bb, Cc, Dd & Ee æquivalentur mediæ 4AH & excessus contrariarum fortiorum supra debiliores  $Ae + Ad - Ab - Ac$  æquivalent tendentiæ mediæ parallelæ 4HG (§. 156) ob rationem paulo ante datam (§. 254). Enimvero si AH continuetur in I, donec fiat  $AI = 4AH$  & ducatur IK parallela

G

parallela

ralla ipsi HG, erit etiam  $IK = 4HG$  &  $AK = 4AG$  (§. 268 Geom.). Quare cum tendentiæ laterales AI & IK æquipolleant diagonali AK (§. 250); tendentiæ quoque AB, AC, AD & AE tendentiæ AK æquipollent, adeoque ipsa AK media est (§. 255). *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

257. Ex Demonstratione adeo Problematis præsentis patet, si mobile ad motum urgeatur viribus B, C, D & E eo modo, ut, si B sola ageret, mobile A progrediretur secundum directionem AB celeritate ut AB; si sola C ipsum impelleret, secundum directionem AC

celeritate ut AC; si sola vis D mobile urgeret, secundum directionem AD celeritate ut AD, si denique sola vis E mobile A ad motum concitaret, secundum directionem AE celeritate ut AE; idem mobile A viribus B, C, D, E una agentibus moveri secundum directionem AK celeritate ut AK. Patet vero eodem prorsus modo tendentiam mediam determinari, si plures quotcumque dentur. Opus autem est in Demonstratione resolutione tendentiarum datarum in alias laterales eidem æquipollentes, ut demonstrari possit, AK esse directionem tendentiæ mediæ: quod enim celeritas sit ut 4 AH absque ea patet (§. 156).

## CAPUT VI.

## De Descensu Graviorum in plano inclinato.

## DEFINITIO XXXIV.

258. **P**lanum inclinatum est, quod cum horizontali efficit angulum obliquum.

## DEFINITIO XXXV.

259. Gravitatem absolutam voco, qua corpus descendit libere in medio non resistente, seu in descensu libero ad motum sollicitatur.

## DEFINITIO XXXVI.

260. Gravitatem respectivam appello, qua corpus descendit, parte aliqua ad superandam resistantiam impensa, seu qua in descensu per resistantiam impedito ad motum sollicitatur. Talis est, qua descendit in plano inclinato, ubi pars aliqua ad resistantiam plani vincendam impenditur, seu qua ad motum sollicitatur super plano inclinato.

## THEOREMA XXXIII.

261. Si grave in plano inclinato consistit, gravitas respectiva est ad gravitatem absolutam ut altitudo plani AB ad longitudinem AC. Tab. III. Fig. 3

## DEMONSTRATIO.

Sit CB linea horizontalis. Cum globus D secundum directionem AC descendere nitatur in plano inclinato, libere autem descenderet per rectam DH ad horizontalem CB perpendicularem (§. 212); si erigatur in D, DG perpendicularis ad AC & ducatur GF ipsi AC parallela occurrens ipsi DH in F, exponet DF gravitatem absolutam, DG vero partem, quæ resistantiam plani vincit, & FG gravitatem respectivam (§. 250). Quodsi parallelogrammum DGFE compleatur, erit



erit  $EF = DG$  &  $FG = ED$  (§. 335 *Geom.*). Est igitur gravitas absoluta ad respectivam ut  $DF$  ad  $FG$  sive  $DE$ . Enimvero cum  $DH$  &  $AB$  ad eandem  $CB$  perpendiculares existant *per hypoth.* inter se parallelæ sunt (§. 206 *Geom.*), adeoque anguli  $EDF$  &  $CAB$  æquales (§. 233 *Geom.*). Quoniam vero præterea anguli  $E$  &  $B$  recti sunt, *per hypoth.* erit  $DF : DE = CA : AB$  (§. 267 *Geom.*) Quare gravitas absoluta ad respectivam ut  $CA$  ad  $AB$  (§. 167 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

262. Cum adeo globus  $D$  super plano inclinato gravitate tantum respectiva gravitet, pondus  $L$  juxta directionem longitudini plani parallelam  $DA$  trahens eum retinebit, si fuerit ad ipsum in ratione altitudinis  $AB$  ad longitudinem plani  $AC$ .

COROLLARIUM II.

263. Quodsi longitudo plani  $CA$  sumatur pro sinu toto, erit  $AB$  sinus anguli inclinationis  $ACB$  (§. 3 *Trigon.*) Est igitur gravitas absoluta ad respectivam ponderis super plano inclinato, adeoque etiam pondus  $D$  ad pondus  $L$  juxta directionem  $DA$  ipsum sustentans, ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis.

COROLLARIUM III.

264. Hinc gravitates respectivæ ejusdem corporis super diversis planis inclinatis sunt inter se ut sinus anguli inclinationis. Est enim ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis plani unius, ita gravitas absoluta ad respectivam super eodem (§. 263) & ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis plani alterius, ita eadem gravitas absoluta ad respectivam super hoc plano (§. *cit.*). Quare ut sinus anguli inclinationis planorum, ita sunt gravitates re-

spectivæ ejusdem corporis super iisdem (§. 196 *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

265. Major ergo gravitas respectiva, quo major angulus inclinationis; minor itidem illa est, quo minor hic existit: cum crescentibus angulis crescant, decrescantibus decrescant sinus (§. 58. 301 *Geom.* & §. 2. *Trigon.*).

COROLLARIUM V.

266. Sicut itaque in plano verticali, ubi inclinatio maxima, nempe perpendicularis, gravitas respectiva degenerat in absolutam; ita in plano horizontali, ubi nulla inclinatio, gravitas respectiva prorsus expirat, hoc est, grave secundum longitudinem plani nullum nisum exercet.

COROLLARIUM VI.

267. In plano igitur verticali vis motum impediens ipsi æqualis est: in plano horizontali ad grave retinendum vi nulla opus.

PROBLEMA XLIII.

268. *Invenire sinum anguli inclinationis plani, super quo data vi pondus datum sustentari possit.* Tab. III. Fig. 31.

RESOLUTIO.

Fiat ut pondus datum  $D$  ad vim datam  $L$ , ita sinus totus ad sinum anguli inclinationis plani (§. 262).

E. gr. Sit pondus 1000, vis 50 librarum: reperietur angulus inclinationis  $20^{\circ} 52'$

$$\text{Log. } 1000 = 30000000$$

$$\text{Log. } 50 = 16989700$$

$$\text{Log. Sin. tot. } 100000000$$

Log. Sin. inclin. = 8 6989700, cui in tabulis quam proxime respondent  $20^{\circ} 52'$ .

THEOREMA XXXIV.

269. *Si pondus  $L$  juxta directionem perpendicularem  $AB$  descendit & pondus  $D$*  Tab. III. Fig. 31.

D juxta directionem plano inclinato parallelam attollit; altitudo ascensus ponderis D est ad altitudinem descensus alterius L ut sinus anguli inclinationis C ad sinum totum.

## DEMONSTRATIO.

Ascendat enim pondus D ex C usque in D, erit altitudo, ad quam ascendit, DH. Sed cum pondus L in plano perpendiculari descendat, per *hypoth.* erit altitudo, per quam ipsum descendit, ipsi CD æqualis. Altitudo igitur ascensus ponderis D est ad altitudinem descensus alterius L ut DH ad CD. Enimvero si CD sumatur pro sinu toto, DH est sinus anguli inclinationis C (§. 2 *Trigon.*). Sunt ergo altitudines prædictæ ut sinus anguli inclinationis & sinus totus. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

270. Est igitur altitudo descensus CD ponderis L ad altitudinem ascensus DH ponderis D ut reciproce pondus D ad pondus L ipsi æquiponderans (§. 262).

## COROLLARIUM II.

271. Quare cum sit CD: L = DH: D (§. 297. *Arithm.*) & nisus atque renisus æquiponderantium D & L æquales sint (§. 75); momenta ponderum D & L sunt in ratione composita massarum & altitudinum, per quas in plano sive inclinato, sive perpendiculari vel ascendunt, vel descendunt (§. 159 *Arithm.*).

## THEOREMA XXXV.

Tab. XIII. 272. Si pondera E & D trahentia rectam AB habeant centrum gravitatis Fig. commune in C; erunt ea inter se in 129. ratione reciproca distantiarum CH & CI, nempe E: D = CI: CH.

## DEMONSTRATIO.

Ducantur BF & AG ad rectam AB perpendiculares & ex centrīs gravitatis ponderum D & E rectæ EG & DF ipsi AB parallelæ. Quoniam pondera D & E non aliter trahunt rectam AB ac si planis inclinatis BD & AE incumbere; perinde erit ac si in B suspenderetur pondus juxta directionem perpendicularem BF, quod est ad D ut FB ad BD, & in A suspenderetur pondus juxta directionem perpendicularem AG, quod est ad E ut AG ad AE (§. 261). Sit pondus prius P; alterum Q: erit P: D = BF: BD & Q: E = AG: AE. Enimvero propter parallelismum linearum GE & DF atque AB angulus GEA = HAC & FDB = ABD (§. 233 *Geom.*). Quare cum præterea anguli G & H, itemque F & I sint recti *per construct.* erit BF: BD = CI: CB & AG: AE = CH: CA (§. 267 *Geom.*), consequenter P: D = CI: CB & Q: E = CH: CA (§. 167 *Arithm.*). Jam cum pondera P & Q juxta directionem perpendicularem sint in æquilibrio *per demonstr.* erit P: Q = AC: CB (§. 144), consequenter P: E = CH: CB (§. 198. *Arithm.*) & hinc tandem D: E = CH: CI (§. 200 *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

273. Quoniam pondera D & E sibi invicem æquilibrantur, si sub obliqua quacunque directione rationem reciprocam distantiarum habuerint, hoc est, si D: E = CH: CI (§. 272), est vero E. CH = D. CI (§. 297 *Arithm.*); vires æquiponderantium etiam sub directionibus obliquis æstimandæ.

mandæ sunt per factum ex massa in distantiam à centro gravitatis.

COROLLARIUM I I.

b.II. 274. Si pondera sive ex centro gravitatis communi, sive ex alio quocunque extra illud posito suspendantur; momenta sunt in ratione composita massarum & distantiarum à puncto suspensionis N, nempe in eo situ, quo centrum gravitatis ipsius P descendit per altitudinem IK & centrum gravitatis alterius ponderis Q ascendit per altitudinem OH, ut Q. ON & P. IN (§. 146. 271. 133). Sed cum verticales ad N sint æquales (§. 156 Geom.), & lineæ directionum KI & HO sint ad horizontalem LM in O & I perpendiculares (§. 215); ON : NI = HO : IK (§. 267 Geom.) Quare momenta ponderum Q & P sunt etiam ut Q : HO & P. IK, hoc est, in ratione composita massarum & altitudinum, per quas perpendiculariter centrum gravitatis vel ascendit, vel descendit. Superior igitur (§. 146. 273) constitutâ virium æstimatio cum præsentente consentit.

COROLLARIUM III.

275. Vires adeo æquales sunt, quæ pondera elevant per altitudines ipsis reciproce proportionales.

SCHOLION I.

276. Hoc principium ad demonstrandas machinarum vires sine demonstratione assumit CARTESIUS (a). Ait enim, quod iisdem viribus, quibus pondus v. gr. 100 librarum in duorum pedum altitudinem attolli potest, aliud quoque 200 librarum in unius pedis altitudinem possit elevari.

SCHOLION II.

277. Hinc etiam ratio patet, cur currus onustus difficiliter trabatur super plano inclinato, quam super horizontali: gravatur nimirum ea ponderis parte, quæ est ad pondus totum ipsius in ratione altitudinis ad

longitudinem plani. Ex quo etiam intelligitur, cur idem difficiliter trabatur in via lutosa & arenosa. Ceterum in praxi ratio longitudinis plani ad altitudinem facile definitur. Si enim recta FD sit longitudini Tab. III. plani AC parallela, hoc est, linea directionis currus, atque FC altitudini CD parallela ope perpendiculari definiatur, & ex C ducatur perpendicularis ad DC, erit  $y = 0$  &  $0 = x$  (§. 233 Geom.) hincque  $y = x$ . Quare ob rectos D & B, FC : FD = EA : EB (§. 267. Geom.).

THEOREMA XXXVI.

278. Vires mortuæ sunt in ratione composita massarum & velocitatum.

DEMONSTRATIO.

Vires æquiponderantium cum ad motum producendum tendant, sed non actu moveant pondera, sunt vires mortuæ (§. 9), adeoque in quacunque directione in ratione composita massarum & distantiarum à centro motus (§. 146. 272). Enimvero si ponamus centra gravitatis circa centrum motus tanquam punctum fixum moveri æqualiter, eodem tempore describent arcus distantis proportionales (§. 138. 412 Geom.): qui cum sint celeritatibus proportionales (§. 33); vires etiam mortuæ erunt in ratione composita massarum & celeritatum (§. 185. Arithm.) Q. e. d.

SCHOLION.

279. In conatu jam adest celeritas initialis de, elementum ejus, qua moveretur mobile, si motus actu sequeretur. Quare cum celeritas sit ut elementum ejus de; mirum non est, quod vires hic sint in ratione celeritatum prodiutararum & massarum composita. Sunt nempe in ratione composita massarum & celeritatum initialium, quibus

(a) In Tract. de Mechanica (qui inter posthuma habetur) pag. 13.

*instruuntur, ac ideo etiam celeritatum futurarum, consequenter distantiarum à centro motus, tanquam illis proportionalium.*

## COROLLARIUM.

280. Quodsi ergo massæ æquales sunt, vires mortuæ velocitatum rationem habent.

## THEOREMA XXXVII.

Tab. III. Fig. 33. 281. Pondera E & F super planis inclinatis AG & CB ejusdem altitudinis CD æquiponderantia sunt ut longitudes planorum AC & CB.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam pondera E & F æquiponderant, per *hypoth.* eadem vis, quæ pondus E super plano inclinato AC sustentare valet, etiam alterum F super plano inclinato CB sustentabit, & hæc dicatur V. Est vero  $V:E=DC:AC$  &  $V:F=DC:CB$  (§. 262). Ergo  $E:F=AC:CB$  (§. 196 *Aritm.*). *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

Tab. III. Fig. 34. 282. SIMON STEVINUS (a) ingeniosam affert hujus Theorematis demonstrationem, quam ob miram facilitatem huc transferre libet. Catena, cujus partes exacte ponderant in ratione longitudinis, imponatur triangulo GIH, illud per se patet, partes GK & HK æquilibrari: æquipollet enim GKH catena in punctis G & H suspensa. Quodsi jam IH non æquiponderet ipsi GI, pars præponderans prævalebit, & motus perpetuus catena circa GIH orietur; qui cum sit absurdus, patet partes catene IH & GI, adeoque pondera quævis alia, quæ itidem sint ut longitudes planorum IH & GI æquiponderare. Supponit adeo

(a) Element. Static. Lib. I. Prop. 19. f. 448. Oper. m.

*motum perpetuum esse absurdum, seu id Axiomatis instar sumit.*

## COROLLARIUM.

283. Quodsi communis planorum altitudo CD sumatur pro sinu toto, CB & CA sunt cosecantes angulorum inclinationis A & B (§. 11. *Trigon.*). Pondera igitur F & E super planis inclinatis CB & CA æquiponderantia sunt ut cosecantes angulorum inclinationis. Sunt item reciproce ut sinus angulorum inclinationis A & B (§. 33 *Trigon.*).

## THEOREMA XXXVIII.

284. Grave super plano inclinato descendit motu uniformiter accelerato.

## DEMONSTRATIO.

Gravitas respectiva est ad absolutam in constante ratione (§. 261), cumque adeo hæc non mutetur, (§. 78), illa quoque omni descensus tempore eadem. Quare cum eodem semper modo vis gravitatis grave ad motum sollicitet (§. 25); singulis momentis æqualibus æquales addet celeritates. Grave igitur motu uniformiter accelerato descendit (§. 67). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

285. Sunt igitur spatia descensus in ratione duplicata temporum (§. 80), itemque velocitatum (§. 81).

## COROLLARIUM II.

286. Eadem etiam temporibus æqualibus crescunt secundum numeros impares (§. 84).

## COROLLARIUM III.

287. Tempora vero sunt in ratione subduplicata spatiorum (§. 82), itemque velocitates in eadem ratione existunt (§. 83).

CORO-

COROLLARIUM IV.

288. Spatium quoque à gravi in plano inclinato descendente decursum est subduplum ejus, quod eodem tempore cum velocitate, quam grave in fine ejusdem habet, motu uniformi conficitur (§. 92).

COROLLARIUM V.

89. Descensus adeo gravium super planis inclinatis iislem legibus adstringitur, quibus descensus eorundem in perpendiculari tenetur (§. 86. 87).

SCHOLIUM.

290. Hinc GALILÆUS leges illas exploraturus experimenta sumsit in planis inclinatis (§. 89.): tardior enim, ut in Theoremate sequente demonstratur, est descensus in plano inclinato, & hinc spatia facilius notari possunt.

THEOREMA XXXIX.

291. Celeritas gravis in plano inclinato decidentis in fine temporis dati est ad celeritatem, quam perpendiculariter descendens eodem tempore acquireret, ut altitudo plani inclinati ad longitudinem ejus.

DEMONSTRATIO.

Celeritatis elementa, dum grave per planum inclinatum descendit, producuntur à gravitate respectiva, dum vero perpendiculariter descendit, ab absoluta. Si celeritates sint ut C & c, tempusculum dt, massa mobilis m, gravitas absoluta & respectiva ut G &

g, erit  $G : g = \frac{mdC}{dt} : \frac{mdc}{dt}$  (§. 112),  
 $= dC : dc$  (§. 181 *Arithm.*)  $= C : c$  (§. 187 *Arithm.*). Sed G ad g ut longitudo plani ad altitudinem ipsius (§. 261). Ergo in fine cujusvis temporis t celeri-

tates C & c sunt ut longitudo plani ad altitudinem ejus (§. 167 *Arithm.*)  
*Q. e. d.*

COROLLARIUM.

292. Celeritas gravis perpendiculariter cadentis ad celeritatem in plano inclinato descendentis est in fine ejusdem temporis (incipiendo nimirum à quiete) ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis (§. 33 *Trigon.*)

THEOREMA XL.

Tab. III. Fig. 35.

293. Spatium à gravi in plano inclinato confectum AD est ad spatium AB, quod eodem tempore in perpendiculari percurreret, ut velocitas in plano inclinato ad velocitatem in descensu perpendiculari in fine temporis dati.

DEMONSTRATIO.

Si grave ab initio motus eam celeritatem habuisset, quam in D constitutum habet, duplum ipsius AD spatium confecisset (§. 288). Similiter si ab initio motus eam celeritatem habuisset, quam in B habet, duplum ipsius AB confecisset (§. 92), utrobique nempe motu æquabili. Sunt igitur spatia dupla 2 AD & 2 AB, eodem nempe tempore percurfa, per *hypoth.* ut celeritates (§. 32). Ergo & AD atque AB sunt ut eadem celeritates (§. 167 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

294. Est igitur spatium in plano inclinato percursum ad spatium, per quod grave eodem tempore in perpendiculari descenderet, ut plani altitudo AB ad longitudinem ejus AC, (§. 291), itemque ut sinus anguli inclinationis B ad sinum totum (§. 292).

## COROLLARIUM II.

295. Si ex angulo recto B ad AC perpendicularis demittatur; erit  $AC : AB = AB : AD$  (§. 330. *Geom.*). Quare eodem tempore, quo grave ex A perpendiculariter descendit in B, super plano inclinato perveniet in D (§. 294).

## COROLLARIUM III.

296. Dato igitur spatio descensus perpendicularis in altitudine plani AB, habetur spatium eodem tempore in plano inclinato percurrendum AD, si ex B ad CA perpendicularis dimittatur.

## COROLLARIUM IV.

297. Similiter dato spatio in plano inclinato percursu AD, invenitur spatium AB, per quod eodem tempore grave perpendiculariter decidisset, si ex D perpendicularis erigatur, quæ cum catheto plani AB concurrere punctum B determinabit.

## COROLLARIUM V.

Tab. III. Fig. 36. 298. Cum in semicirculo anguli D, E, F, C, recti sint (§. 317 *Geom.*); grave per omnia plana AD, AE, AF, AC eodem tempore descendit, quo nempe per diametrum AB, si ea fuerit ad lineam horizontalem LM perpendicularis (§. 297).

## PROBLEMA XLIV.

Tab. III. Fig. 35. 299. Dato spatio AD in plano inclinato AC percursu, determinare spatium, quod in alio plano inclinato AF eodem tempore percurreret.

## RESOLUTIO.

1. Ex puncto D erigatur perpendicularis DB occurrens altitudini AB in B: erit AB spatium, per quod eodem tempore caderet perpendiculariter grave (§. 296).
2. Quare si ex B demittatur perpendicularis BE ad planum AF; erit AE

spatium quod in plano inclinato AF conficit grave eodem tempore, quo cadit perpendiculariter ex A in B (§. 295), consequenter & in inclinato AC ex A in D pervenit.  
*Q. e. i. & d.*

## COROLLARIUM.

300. Cum sit AB ad AD ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis C & AB ad AE ut sinus totus ad sinum anguli inclinationis F (§. 294); spatia AD & AE, quæ grave eodem tempore in diversis planis inclinatis percurrere valet, sunt ut sinus angulorum inclinationis C & F (§. 196 *Arithm.*) & reciproce ut gravia per eadem plana descendentia (§. 283), consequenter etiam reciproce, ut longitudines planorum AC & AF æque-altorum (§. 281). Et hinc Problema per calculum variis modis solvitur.

## THEOREMA XLI.

301. *Velocitates, quæ in diversis planis inclinatis eodem tempore acquiruntur, sunt ut spatia eodem tempore percursa.*

## DEMONSTRATIO.

Ducantur ex puncto B altitudinis Tab. III. Fig. res BD & BE; erunt AD, AB & BE spatia eodem tempore percursa (§. 299). Cum adeo sit, ut AB & AC ita velocitas per AD acquisita ad velocitatem per AB acquisitam, & ut AB ad AF ita velocitas per AE acquisita ad velocitatem per AB acquisitam (§. 291), consequenter ob  $AB : AC = AD : AB$  &  $AB : AF = AE : AB$  (§. 330 *Geom.* & §. 169 *Arithm.*), velocitas per AD acquisita ad velocitatem per AB acquisitam

fitam ut AD ad AB & velocitas per AE acquisita ad velocitatem per AB acquisitam ut AE ad AB (§. 167 *Arithm.*); velocitates eodem tempore per AD & AE acquisitæ sunt ut spatia AD & AE isto tempore percurfa (§. 196 *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

302. Velocitates in diversis planis inclinatis eodem tempore acquisitæ sunt ut sinus angulorum inclinationis C & F, reciproce ut pondera per ista plana descendencia, necnon reciproce ut eorundem planorum æque altorum longitudines AC & AF (§. 300).

THEOREMA XLII.

Tab. III. 303. Si grave per planum inclinatum AC ad lineam horizontalem CB pervenit, eandem celeritatem acquisivit, quam in descensu perpendiculari AB usque ad eandem lineam horizontalem CB acquireret.

DEMONSTRATIO.

Demittatur ex B perpendicularis DB; erit AD spatium eodem tempore percursum, quo percurritur AB (§. 296), adeoque celeritas per AB acquisita ad celeritatem per AD acquisitam ut AC ad AB (§. 291). Celeritas vero per AC acquisita est ad celeritatem per AD acquisitam in ratione subduplicata ipsius AC ad AD (§. 285) =  $\sqrt{AC} : \sqrt{AD}$  (§. 159 *Arithm.*). Quare cum sit AC: AB = AB: AD (§. 330 *Geom.*), adeoque AC ad AD in ratione duplicata AC: AB (§. 216 *Arithm.*) =  $AC^2 : AB^2$  (§. 259 *Arithm.*), consequenter  $\sqrt{AC} : \sqrt{AD} = AC : AB$ ; erit

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

celeritas per AC acquisita ad celeritatem per AD acquisitam ut AC ad AB (§. 167 *Arithm.*). Celeritas igitur per AC acquisita est celeritati per AB acquisitæ æqualis (§. 177 *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

304. Grave igitur per diversa plana inclinata AC, AG, AF, cadendo eandem celeritatem acquirit, ubi ad eandem lineam horizontalem CF pervenit.

COROLLARIUM II.

305. Si grave cadit perpendiculariter ex L in I eandem celeritatem acquirit, quam per planum inclinatum HI acquiritur (§. 304). Quare si per planum IK motum continuat, ubi ad I pervenit, eodem modo movebitur, ac si statim ab initio in plano inclinato HK motum fuisset.

Tab. III. Fig. 37.

COROLLARIUM III.

306. Cum tamen motus per planum inclinatum IK tardior sit quam perpendiculum IM (§. 291), grave per LI & IK descendens tardius lineam horizontalem KM attingit, quam si constanter per LM perpendiculariter descendisset (§. 90 *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

307. Quodsi grave descendit per planum inclinatum LM, in M eam velocitatem habet, quam acquireret cadendo per PM (§. 304). Quodsi ergo ubi ad M pervenit, motum suum continuet per MN, nec flexus in M motui officiat, nisi quod directionem mutet; eam in N velocitatem habet, quam acquireret cadendo per PN, vel etiam QN (§. *cit.*). Quamobrem si ex N per NO feratur, perveniens ad lineam horizontalem OR ea velocitate præditum est, quam acquireret per OQ, seu QR (§. *cit.*). Grave igitur per plura plana inclinata contigua LM, MN, ON motum continuans, eam acquirat celeritatem, ac si perpendiculariter per QR descendisset.

Tab. III. Fig. 38.

## COROLLARIUM V.

308. Cum itaque curvæ ex rectis infinite parvis componantur; grave per curvam QS descendens eandem adipiscitur celeritatem, quam ex casu perpendiculari QR acquireret.

## THEOREMA XLIII.

Tab. III. Fig. 35. 309. *Tempus descensus per planum inclinatum AC est ad tempus descensus perpendicularis per AB ut longitudo plani AC ad altitudinem AB: tempora vero descensuum per diversa plana inclinata æque-alta AC & AG sunt ut longitudines planorum.*

## DEMONSTRATIO.

Tempus per AC æquale est tempori, quo motu uniformi percurritur AC dimidia celeritate in C acquisita, & tempus per AB æquale est tempori, quo motu uniformi percurritur eadem AB celeritate dimidia in B acquisita (§. 288). Sed celeritates istæ dimidiæ æquales sunt (§. 303). Tempora igitur sunt ut AC & AB (§. 32). *Quod erat unum.*

Eodem modo ostenditur, tempora descensuum per AC & AG esse ut AC & AG. *Quod erat alterum.*

## THEOREMA XLIV.

Tab. III. Fig. 36. 310. *Si diameter circuli AB fuerit ad lineam horizontalem LM perpendicularis, grave ex quovis peripheria puncto D, E vel C eodem tempore descendit in B, quo nempe diametrum AB percurrit.*

## DEMONSTRATIO.

Demittatur ex C perpendicularis GC: erit tempus, quo GB percurritur, ad tempus, quo BC percurritur, ut BG ad

BC (§. 309). Tempus vero, quo GB percurritur, est ad tempus, quo AB percurritur, in ratione subduplicata BG ad AB (§. 87), hoc est, cum sit  $BG : BC = BC : AB$  (§. 330 *Geom.*) in ratione BG ad BC (§. 216 *Arithm.*). Tempus adeo descensus per GB ad tempus descensus per BC & diametrum AB eandem rationem habet (§. 167 *Arithm.*). Ergo tempus quo percurritur BC æquale est tempori, quo AB percurritur (§. 177 *Arithm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA XLV.

Tab. III. Fig. 3. 311. *Descensus per semicycloidem DEF & per quemcunque ejus arcum DG sunt æquidistanti.*

## DEMONSTRATIO.

Concipiatur arcus DG in partes infinitimas resolutus, quarum una sit  $Mm$ , & semicyclois DEF in numero totidem divisa, quarum una  $Ee$ : erit  $DG : DF = Mm : Ee$  (§. 171 *Arithm.*). Concipiamus porro semicycloidem DF in E & arcum DG in M ita dividi, ut sit  $DF : DG = DE : DM = Ee : Mm$  (§. 167 *Arithm.*). Ducantur denique semiordinatæ TE, te, NM, nm, itemque chordæ in circulo genitore DB, DL, DO. Quoniam  $DF = 2AD$ ,  $DE = 2DB$ ,  $DM = 2DO$  &  $DG = 2DL$  (§. 168 *Analys. infinit.*), &  $DF : DE = DG : DM$  per *hypoth.* erit  $DA : DB = DL : DO$  (§. 181 *Arithm.*) & hinc  $DA^2 : DB^2 = DL^2 : DO^2$  (§. 260 *Arithm.*). Quoniam vero  $DA : DB = DB : DT$  (§. 330. *Geom.*); erit  $DA^2 : DB^2 = DA : DT$  (§. 216. 259 *Arithm.*). Similiter quia  $DA : DL = DL : DH$  &  $DA : DO = DO : DN$ ; erit  $DA^2 : DL^2 = DA$



$= DA : DH$  &  $DA^2 : DO^2 = DA : DN$  (§. *cit. Arith.*), consequenter  $DL^2 : DO^2 = DH : DN$  (§. 196 *Arithm.*) Quamobrem ulterius  $DA : DT = DH : DN$  (§. 167 *Arith.*), &  $AT : DT = HN : DN$  (§. 193 *Arithm.*), adeoque  $AT : HN = DT : DN$  (§. 173 *Arithm.*) &  $\sqrt{AT} : \sqrt{HN} = \sqrt{DT} : \sqrt{DN}$  (§. 260 *Arithm.*). Sed ut  $\sqrt{AT}$  ad  $\sqrt{HN}$  ita velocitas in E ad velocitatem in M (§. 307. 87), ita etiam DB ad DO (§. 310. 301), immo DE ad DM (§. 168 *Analyf. infinit.* & §. 181 *Arithm.*). Ergo velocitas in E ad velocitatem in M ut Ee ad Mm per demonstr. consequenter cum tempus per Ee sit ut spatium Ee per velocitatem in E divisum & tempus per Mm ut spatium Mm per velocitatem in M divisum (§. 37); tempus per Ee æquale est tempori per Mm (§. 185. 149 *Arith.*) & hinc tempus per omnia Ee, hoc est per DE, æquale est tempori per omnia Mm hoc est per DG. (§. 88 *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA XLVI.

Tab. 312. Si plana DC & FH cum horizontalibus CK & HI æquales efficiunt *Fig. 40.* angulos; similiter inclinata sunt.

DEMONSTRATIO.

Cum plana inclinata dicantur, quando cum horizontalibus angulum efficiunt obliquum (§. 258); non alio modo quam per angulos, quos cum horizontalibus suis efficiunt, distingui potest eorum inclinatio (§. 476 *Geom.*), Jam anguli æquales sunt similes (§. 174 *Geom.*), adeoque per eos planorum inclinatio distingui nequit (§. 24. *Arithm.*). Ergo plana, quæ cum suis horizonta-

libus angulos efficiunt æquales, similiter inclinata sunt (§. *cit.*), *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

313. Cum in planis inclinatis similibus DC & FH anguli C & H sint æquales (§. 312) & demissis in horizontales CK & HI perpendicularibus DK & FI anguli K & I recti (§. 78 *Geom.*); erit  $CD : FH = DK : FI$  (§. 267 *Geom.*), hoc est, altitudines longitudinibus proportionales sunt.

THEOREMA XLVII.

314. Si duo gravia per duo aut plura plana AB, BC & EG, GH similiter inclinata & proportionalia incedant, *Tab. III. Fig. 40.* ut nempe sit  $AB : BC = EG : GH$ ; tempora descensus erunt in subduplicata ratione longitudinum AB, BC & EG, GH.

DEMONSTRATIO.

Sit  $AB : BC = a : b$ ; erit ob  $AB : BC = EG : GH$ , per hypoth.  $EG = ma$  &  $GH = mb$ . Cum plana AB & EG sint similiter inclinata, per hypoth. non aliter quam partes ejusdem plani percurruntur, adeoque tempus per AB est ad tempus per EG ut  $\sqrt{a}$  ad  $\sqrt{am}$  (§. 287). Eodem modo ostenditur, esse tempus per BC ad tempus per GH ut  $\sqrt{b}$  ad  $\sqrt{mb}$ , & ita porro, si plura fuerint plana. Quare tempus per  $AB + BC$  est ad tempus per  $EG + GH$  ut  $\sqrt{a + b}$  ad  $\sqrt{ma + mb}$  (§. 192 *Arithm.*) hoc est, ut  $1 : \sqrt{m}$  (§. 181 *Arithm.*) seu ut  $\sqrt{(a + b)}$  ad  $\sqrt{(ma + mb)}$  (§. 178 *Arithm.*): quæ ratio subduplicata planorum  $AB + BC$  &  $EG + GH$ . *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

315. Quoniam  $AB : EG = AP : EQ$  &  $CB : GH = BN : GO$  (§. 313), sunt propor-

portiones inter se similes ob  $AB : EG = CB : GH$  per *hypoth.* erit  $AB + BC : EG + GH = AP + BN : EQ + GO$  (§. 261)  $= [ob AP + BN = DM + MK = DK \& EQ + GO = FL + LI = FI, (§. 226. Geom.)] DK : FI$  (§. 168. *Arithm.*). Tempus igitur per plana similia & proportionalia  $AB, BC$  &  $EG, GH$  cum sit in ratione subduplicata  $AB + BC$  &  $EG + GH$  (§. 314), in

ratione quoque subduplicata altitudinum  $DK$  &  $FI$  existit.

## COROLLARIUM I.

316. Et quia superficies curvæ  $AB$  &  $DE$  similes ac similiter positæ ex innumeris planis infinite parvis proportionalibus & similibus constant; tempus per  $AB$  erit ad tempus per  $D$  in ratione subduplicata  $AB$  ad  $DE$ .

Tab  
III.  
Fig.

## CAPUT VII.

*De Ascensu Gravium, cum Perpendiculari, tum in plano inclinato.*

## THEOREMA XLVIII.

317. **S**I grave in medio non resistente vi impressa sive perpendiculariter, sive per planum inclinarum ascendit, motus ejus uniformiter retardatur.

## DEMONSTRATIO.

Dum grave vi impressa perpendiculariter ascendit, à vi gravitatis absolutæ secundum eandem perpendicularem (§. 215); dum vero per planum inclinarum ascendit, à vi gravitatis respectivæ secundum directionem plani (§. 261) continuo deorsum impellitur. Motus adeo ejus continuo retardatur (§. 77). Quoniam vero vis gravitatis tam absolutæ, quam respectivæ in omnibus locis, per quæ grave descendit, eadem (§. 78 & §. 261); æqualibus temporibus æquales celeritatis gradus eliduntur (§. 25), consequenter motus uniformiter retardatur (§. 70). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

318. Grave igitur sive perpendiculariter, sive per declive in medio non resistente ascendens spatium percurrit subduplum ejus, quod eodem tempore in plano horizontali motu uniformi describeret cum ea celeritate, quam ab initio motus habebat (§. 97).

## COROLLARIUM II.

319. Eiusdem igitur spatia æqualibus temporibus confecta ordine retrogrado decrescunt ut numeri impares 7. 5. 3. 1. (§. 98), adeoque ascensus tandem sistitur, consequenter ubi vis impressa fuerit assumpta, corpus vi gravitatis rursus descendit.

## COROLLARIUM III.

320. Sunt adeo inverse ut spatia iisdem temporibus ab alio gravi per eandem altitudinem cadente confecta. Sit enim e.g. tempus in quatuor partes divisum; momento primo grave  $A$  descendet per spatium 1,  $B$  ascendet per 7; secundo  $A$  descendet per 3,  $B$  ascendet per 5; tertio  $A$  descendet per 5,  $B$  ascendet per 3; ultimo  $A$  descendet per 7,  $B$  ascendet per 1 (§. 86. 319).

COROL-

COROLLARIUM IV.

321. Unde grave vi impressa ascendens ad eam altitudinem ascendit, ex qua decidere deberet, ut eam cadendo celeritatem acquireret, qua sursum propellitur.

COROLLARIUM V.

322. Quamobrem cadendo acquirit vim ascendendi ad eam altitudinem, unde deciderat, in medio nimirum non resistente.

PROBLEMA XLV.

323. Dato tempore, quo grave impetu impresso ad altitudinem datam ascendit, determinare spatia singulis momentis confecta.

RESOLUTIO.

Ponatur idem grave eodem tempore per eandem altitudinem descendisse & quærantur spatia singulis momentis percurra (§. 94): hæc enim inverso ordine sumta eadem sunt cum spatiis ascensus quæsitis (§. 320).

E. gr. Corpus perpendiculariter projectum intra 4 secunda ascendit per interval- lum 240 pedum. Quærantur spatia singulis temporibus confecta? Quod si corpus descendisset, primo minuto descendisset per 15 pedes, secundo per 45, tertio per 75, quarto per 105. Primo itaque ascendit per 105, secundo per 75, tertio per 45, ultimo, per 15. pedes.

PROBLEMA XLVI.

324. Dato tempore, quo grave vi impressa ad datam altitudinem ascendit, determinare tempus, quo ad altitudinem aliam datam pervenit.

RESOLUTIO.

Quærratur tempus, quo grave per altitudinem desideratam decidere potest

test (§. 95): eodem enim ad eandem ascendet (§. 320 322).

Vide supra exemplum Probl. II. (§. 95).

THEOREMA XLIX.

325. Vires corporum viva sunt in ratione composita ex simplici massarum & duplicata celeritatem.

DEMONSTRATIO.

Corpus E cadendo per AB acquirit vim ascendendi per AB, & F cadendo per CD vim adispiscitur, qua per altitudinem CD elevari potest (§. 322). Sunt adeo vires, quibus corpora E & F per altitudines AB & CD elevantur, in ratione composita altitudinum AB & CD atque massarum E & F, quia vires in elevandis corporibus per eas altitudines totæ confunduntur. Sed AB & CD sunt in ratione duplicata velocitatum cadendo per istas altitudines acquisitarum (§. 86). Ergo vires E & F sunt in ratione composita ex simplici massarum & duplicata celeritatum. Sunt vero vires E & F vivæ, utpote non solo nisu, sed impetu concepto agentes, adeoque cum motu actuali conjunctæ (§. 9). Constat igitur vires vivas esse in ratione composita ex simplici massarum & duplicata celeritatum. Q. e. d.

Tab. III. Fig. 42.

COROLLARIUM.

326. Quare si massæ fuerint æquales; vires sunt in ratione duplicata celeritatum (§. 181. Arithm.).

SCHOLIUM I.

327. Errant qui promiscue vires omnes in ratione composita massarum & velocitatum esse statuunt, propterea quod mortuæ in eadem

dem deprehenduntur (§. 278). *Errorem communem detexit & emendavit (a) Vir illustris LEIBNITIVS. Aliam Theorematis LEIBNITIANI demonstrationem invenit & per literas mecum pro humanitate sua communicavit celeberrimus BERNOULLIVS, quam ipsis viri ingeniosissimi verbis huc transcribo.*

Tab.

IV.

Fig. 43.

„ moveri oblique in elastrum L velocitate CL ut 2, angulo inclinationis CLP existente 30 gr. cujus nempe sinus CP est semissis radii CL. Suppono autem eam esse resistentiam in elastro, ut ad illud tendendum requiratur præcise unus velocitatis gradus in illo corpore, si perpendiculariter impingeret. Quid ergo jam fiet post incurfionem obliquam corporis C in elastrum L? Quoniam motus per CL componitur, ut notum est, ex duobus collateralibus per CP & PL (vide § 241), & cum CP, secundum quam corpus directe impingit in elastrum L, exprimat dimidiam celeritatem corporis per CL, consumetur hic motus per CP, tenfo elastro (perinde enim esset ac si corpus C celeritate CP perpendiculariter incurreret in elastrum, quod per hypothefin eam celeritatem destrueret potest) remanente corporis celeritate & directione PL. Producta igitur PL in M, ita ut LM fit = PL =  $\sqrt{3}$ ; (ponitur enim CL = 2) & applicato in M alio simili elastro faciente cum LM angulum LMQ, cujus sinus LQ = CP = 1; per eandem rationem manifestum est, corpus C post tensionem elastri L tenfurum esse elastrum M amiffio motu per LQ & fervato motu per QM. Prolongata itaque QM ad N, ut fiat MN = QM =  $\sqrt{2}$ , ibique substituto elastro simili tertio constituyente cum MN angulum MNR femirectum, quo scilicet MR iterum sit = CP = 1; patet similiter motum per MR totum impendi in tensionem elastri N, corpore interim

„ moveri pergente directione & celeritate „ RN = 1. Denique si hac celeritate resf- „ dua impingat perpendiculariter in elaf- „ trum O, huic flectendo totam suam vim „ reliquam dabit; ipsum itaque corpus „ ad quietem redigetur. Hisce ita præ- „ missis, patet nunc potentiam corporis „ C tantam fuisse, ut per se solum ten- „ dere possit præcise quatuor elaftra talia, „ ad quæ singula seorsim tendenda requi- „ ritur dimidia velocitas corporis æqualis „ ipsi C, adeoque cum effectus illius qua- „ druplo major fit, quam effectus hujus, „ evidens est quoque vim corporis velo- „ citate 2 gr. quadruplam esse vis corpo- „ ris ejusdem vel æqualis velocitate 1 gr. „ Haud absimili modo demonstrarem cor- „ pus C velocitate 3 gr. tendere posse 9 „ elaftra, ad quorum unum tendendum „ unus velocitatis gradus in eo corpore „ requiritur, & tandem in genere nume- „ rum elaftrorum tenforum semper esse „ quadratum numeri graduum velocitatis. „ Unde igitur fequetur, vires corporum „ æqualium esse in duplicata ratione cele- „ ritatum. Q. e. d.

## SCHOLIION II.

328. *Prædiit nuper Parisiis Tractatus Mathematici hujus eminentis (b), in quo hanc virium mensuram à nonnullis Mathematicis exteris impugnata multo apparatu stabilivit. Præterea Viri celeberrimi GRAVESANDIVS (c) HERMANNVS & BÜLFINGERVS (d) eandem mensuram aliis modis demonstrarunt, & POLENVS (e) experimentis confirmavit. Ego in Principiis Dynamicis (f) Analysisi vere Dynamica eandem virium mensuram erui. Qui vires vivas à mortuis non distinguunt, vires promiscue*

(b) *Discours sur les Loix de la Communication du Mouvement, à Paris, 1727*

(c) *In Element. Phys. Tom. I. p. 112. Edit. poster.*

(d) *In Comment. Acad. Scient. Petropolitane pp. 1. 45.*

(e) *In Tractatu de Castellis, p. 56. & seqq.*

(f) *In Comment. Acad. Scient. Petropolitane, p. 231.*

(a) *Acta Eruditorum, An. 1636. p. 161. & seqq.*

*miscue æstimant per celeritatem in massam ductam.*

THEOREMA L.

Tab. III. 329. *Si grave vel perpendiculariter per AD, vel per q amcunque superficiem FED descendat & impetu concepto per aliam DC rursus ascendat, in punctis æque-altis veluti in G, H & Q, eandem vim eandemque celeritatem habebit.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam grave vi cadendo per AD vel FD acquisita ad C usque ex D per DGC ascendit (§. 322); ubi ad G pervenit, ea ipsi superest vis, qua ad C usque ascendere valet. Sed eandem vim adipiscitur cadendo ex C per CG, itemque ex A ad H, nec non ex F in Q

(§. cit.). In punctis adeo æque-altis G, H & Q eandem vim habet. *Quod erat unum.*

Sunt autem vires cadendo acquisitæ in punctis G, H & Q ut quadrata celeritatum (§. 326). Quare cum vires æquales sint, per demonstr. celeritatum quoque quadrata, consequenter ipsæ celeritates æquales sunt. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

330. Quodsi adeo grave per superficiem quamcunque FED descendat & per aliam similem ac æqualem similiterque positam DGC rursus ascendat; idem omnino est, ac si eadem linea eadem velocitate singulis sui partibus bis percurreretur (§. 329). Unde tempora descensus & ascensus per æqualia spatia æqualia sunt (§. 25).

CAPUT VIII.

*De Descensu & Ascensu Corporum in Lineis Curvis.*

DEFINITIO XXXVII.

331. **C**urva *Isochrone* dicitur, in qua grave sine acceleratione descendit, hoc est æqualibus temporibus æqualiter ad horizontem accedit.

COROLLARIUM.

332. In Curva *Isochrone* tempora descensus ut altitudines ejusdem.

SCHOLIUM.

333. *Problema de Curva Isochrone inveniendâ proposuit LEIBNITIUS (a) & sup-pressa Analyfi demonstrationem syntheticam.*

(a) *Nouvelles de la Republique des Lettres, Septembre 1687.*

*dedit (b). Dedit autem solutionem ope calculi differentialis tunc temporis nascentis JACOBUS BERNOULLI (c): dedere post eum alii alias.*

PROBLEMA XLVII.

334. *Invenire Curvam Isochronam.* Tab. XIII.

RESOLUTIO.

Sit linea horizontalis BC, altitudo, per quam grave ad eandem descendit AC, Curva *Isochrone* GMB. Sit AP = x, PM = y; erit ducta pm ipsi PM infinite propinqua Pp = dx, mR = dy

(b) In Actis Erudit. An. 1689 p. 196. & seqq.  
(c) In Actis. Erudit. An. 1690. p. 217 & seqq.

$= dy$  &  $Mm = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$  (§. 417 *Geom.*). Quoniam in Curva Isochrona tempora descensus sunt ut altitudines, per quas descenditur (§. 332); erit tempus per  $Mm$  ut  $Pp$ , adeoque  $= dx$ . Et quia celeritas in  $M$  acquisita eadem est cum celeritate in  $P$  acquisita (§. 308), adeoque in ratione subduplicata altitudinis  $AP$  (§. 87); erit celeritas, qua arculus infinite parvus  $Mm$  percurritur,  $= \sqrt{x}$ . Jam cum per arculum  $Mm$  grave motu æquabili feratur, erit ipse tanquam spatium à mobili percursum (§. 12)  $= dx\sqrt{x}$  (§. 34). Est itaque in Curva Isochrona

$$\frac{dx\sqrt{x} = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{x dx^2 = dx^2 + dy^2}$$

$$\frac{x dx^2 - dx = dy^2}{\text{hoc est } \frac{dx^2(x-1) = dy^2}{dx\sqrt{(x-1)} = dy}}$$

$$\text{hoc est } \frac{dx^2(x-1) = dy^2}{dx\sqrt{(x-1)} = dy}$$

$$\text{Fiat } x-1 = v$$

$$\text{erit } dx = dv$$

$$\frac{dx\sqrt{(x-1)} = dv\sqrt{v} = v^{1/2} dv}{\text{adeoque } v^{1/2} dv = dy}$$

$$\frac{2/3 v^{3/2} = y}{5/3 v^3 = y^2 \text{ sive } v^3 = \frac{2}{5} y^2}$$

$$\frac{2/3 v^{3/2} = y}{5/3 v^3 = y^2 \text{ sive } v^3 = \frac{2}{5} y^2}$$

Apparet adeo, Curvam Isochronam esse è numero Paraboloidum quadratico-cubicalium (§. 519 *Analyf. infinit.*), cujus abscissa  $= u$ , semiordinata  $PM = y$ , parameter  $\frac{2}{4}$ . Quoniam altitudo, per quam cadit grave, est  $x$ , sed  $v = x - 1$ ; curva  $BMG$  lineam verticalem  $AC$  non secatur in  $A$ , sed in  $G$ , consequenter mobile cadere debet per altitudinem  $AG$ , antequam in curva  $GMB$  descendere possit. Et quia  $AG = 1$ , parameter vero  $= \frac{2}{4}$ ;

si sit parameter  $= p$ , erit  $p = \frac{2}{4} AG$ , adeoque  $\frac{4}{3} p = AG$ , hoc est, altitudo  $AG$ , per quam descendere debet grave, antequam per curvam ita descendere potest, ut altitudines descensus sint tempori proportionales, est quatuor nonis parametri curvæ æqualis. Mobile adeo non ex quiete descensum inchoat, sed ea celeritate, quam acquirit cadendo per altitudinem quatuor nonis parametri æqualem.

## SCHOLIUM.

335. *Supponimus directiones gravis cadentis, quas vi gravitatis habet, inter se parallelas: quemadmodum & in præcedentibus factum. Idem vero Problema in hypothese directionum convergentium solvit VARIIGNONIUS (a). Labet igitur solutionem in eadem hypothese subjungere.*

## PROBLEMA XLVIII.

336. *Invenire Lineam Isochronam in hypothese directionum in centro Telluris convergentium.* Tab. XIV Fig. 131

## RESOLUTIO.

Sit distantia  $AC$  puncti horizontalis  $A$ , unde grave cadit, à centro Telluris  $C = b$ ,  $AP = x$  ut ante,  $AN$  arcus radio  $AC$  descriptus  $= y$ , quia ad  $AC$  perinde ac in Problemate præcedente semiordinatæ ad eandem altitudinem perpendicularis (§. 38 *Analyf. infinit.*). Sit porro radius  $Cn$  ipsi  $CN$  infinite propinquus & radiis  $CP$  atque  $Cp$  particula infinite parva  $Pp$  differentibus describantur arcus concentrici  $PM$  &  $pm$ ; erit  $MR = Pp = dx$ ,  $Nn = dy$  &

(a) In Comment. Acad. Reg. Scient. An. 1699. p. 1. & seq.

& ob similitudinem sectorum  $CnN$  &  $CmR$  (§. 138. 412 *Geom.*).

$$CN : Nn = Cm : mR$$

$$b : dy = b - x :$$

adeoque  $mR = (b - x) dy : b$ .

Porro ob angulum ad  $R$  rectum (§. 38 *Analyf. infinit.*).

$$MR^2 + mR^2 = Mm^2 \quad (\text{§. 417 } \textit{Geom.})$$

adeoque  $Mm^2 = dx^2 + (b - x)^2 dy^2 : b^2$

$$= (b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2) : b^2$$

Enimvero vi *Analyseos* præcedentis (§. 334)

$$Mm^2 = x dx^2$$

Ergo  $x dx^2 = (b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2) : b^2$

$$\frac{b^2 x dx^2 - b^2 dx^2 = (b - x)^2 dy^2}{b dx \sqrt{(x - 1)} = (b - x) dy}$$

$$\frac{b dx \sqrt{(x - 1)}}{b - x} = dy$$

$$\int \frac{b dx \sqrt{(x - 1)}}{b - x} = y$$

Cum  $y$  sit arcus  $AN$  & eo dato determinetur punctum  $M$  ducto, ex centro  $C$  radio  $CN$  & intervallo  $CP$  ob  $AP = x$  noto seu  $= b - x$ , arcu  $PM$ ; non alia re opus est, quam ut arcus  $AN$  ex assumpta  $AP$  five  $x$  determinetur: id quod fit ope curvæ  $BQD$ . Si enim Elementum ejus  $PpQq$  ponatur  $= b dx \sqrt{(x - 1)} : (b - x)$ ; cum sit  $Pp = dx$ , erit semiordinata  $PQ = b \sqrt{(x - 1)} : (b - x)$ . Quare si area  $BPQ$  dividatur per  $AB = 1$ ; prodibit recta arcui  $AN$  æqualis. Construatur itaque parallelogrammum rectangulum  $ABLK$  æquale areæ  $BPQ$ , cujus altitudo constans  $AB = 1$ ; erit  $BL = AK = AN$  arcui, qui adeo circuli quadratura præsupposita determinari potest. Apparet ita-

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

que Curvæ *Isochronæ* in præfenti casu constructionem pendere à quadratura curvæ  $BQD$  & quadratura circuli.

Ut curvæ  $BQD$  natura investigetur fiat

$$\frac{PQ = b \sqrt{(x - 1)} : (b - x) = 0}{\text{erit } x - 1 = 0}$$

$$x = 1$$

Patet adeo semiordinata  $PQ$  evanescente,  $x$  degenerare in  $AB = 1$ , five in  $B$ , ubi  $PQ = 0$ , esse  $AB$  adhuc  $= 1$ . Fiat porro  $PQ = b \sqrt{(x - 1)} : (b - x) = \infty$

$$\text{erit } \frac{b - x = 0}{b = x}$$

Ergo ubi  $AP = x$  degenerat in  $AC = b$ , semiordinata  $CR$  fit infinita, & hinc  $CR$  ad  $BC$  in centro  $C$  normalis est asymptotus curvæ  $BQD$ .

Ut curvæ  $BQD$  constructio detegatur, fiat  $BP = v$ , erit ob  $AP = x$  &  $AB = 1$

$$\frac{x = v + 1}{x - 1 = v}$$

$$PQ = \frac{b \sqrt{(x - 1)}}{b - x} = \frac{b \sqrt{v}}{b - v - 1}$$

Quoniam  $\sqrt{v}$  est semiordinata parabolæ, cujus vertex  $B$ , abscissa  $BP$ , parameter  $AB = 1$  (§. 392 *Anal. finit.*); construatur circa axem  $BC$  parabola  $BHS$ , erit  $PH = \sqrt{v}$ . Ducatur porro recta  $CV$  per punctum  $H$  ex centro  $C$  rectæ  $AT$  ad  $AC$  normali in  $V$  occurrens. Quoniam  $PH$  &  $AV$  inter se parallelæ (§. 256 *Geom.*), erit (§. 268 *Geom.*)

$$CP : PH = CA : AV$$

$$b - v - 1 : \sqrt{v} = b : \frac{b \sqrt{v}}{b - v - 1}$$

I

Est

Est igitur  $AV = PQ$ , adeoque punctum curvæ  $Q$ , à qua constructio Isochronæ pendet, habetur si parallelogrammum  $PAVQ$  compleatur.

Hinc vero porro eruitur æquatio curvæ  $BQD$  ad axem  $AT$  relatæ. Nimirum si fit  $VQ = AP = y$  &  $AV = PQ = x$ ,  $AB = a$ ; erit

$$x = \frac{b\sqrt{(ay - a^2)}}{b - y}$$

$$x^2 = \frac{ab^2y - a^2b^2}{(b - y)^2}$$

$$x^2(b - y)^2 = ab^2y - a^2b^2$$

feu ob  $(b - y)^2 = b^2 - 2by + y^2$

$$b^2x^2 - 2bx^2y + x^2y^2 = ab^2y - a^2b^2$$

$$x^2y^2 - 2bx^2y + b^2x^2 - ab^2y + a^2b^2 = 0$$

Si fiat

$$\text{erit } \frac{x = 0}{a^2b^2 - ab^2y = 0}$$

$$\frac{a - y = 0}{a = y}$$

Est igitur semiordinata  $AB$  in origine abscissarum  $A = a$ , quod convenit cum superioribus, & curva  $BQD$  Algebraica (§. 377 *Analys. finit.*), tertii quidem generis (§. 382 *Anal. finit.*).

Ut vero nunc etiam æquatio ad curvam Isochronam in hypothefi directionum convergentium eruatur, fiat præter  $AB = I$ ,  $BP = v$ , arculus  $mR$  radio  $Cp = CR$  descriptus  $= dz$ , cum sit  $Pp = dv$ , erit  $Mm^2 = dz^2 + dv^2$

(§. 417 *Geom.*). Est vero  $Mm^2 = xdx^2$  vi superioris *Analysos*. Quare cum fit

$$\begin{aligned} x &= v + I \\ \text{erit } dx &= dv \\ dx^2 &= dv^2 \\ xdx^2 &= (v + I)dv^2 \\ &= vdv^2 + dv^2 \end{aligned}$$

Habemus itaque

$$\begin{aligned} dz^2 + dv^2 &= vdv^2 + dv^2 \\ \frac{dz^2 + dv^2}{dv^2} &= \frac{vdv^2 + dv^2}{dv^2} \\ \frac{dz^2}{dv^2} + 1 &= v + 1 \\ \frac{dz}{dv} &= \sqrt{v^2 + 2v + 1} \\ z &= \frac{2}{3}v^{3/2} \\ \frac{3}{4}z^2 &= v^3 \end{aligned}$$

hoc est,  $\frac{3}{4}AB \cdot PM^2 = BP^3$

Quoniam  $PM$  est arcus circuli radio  $CP$  descriptus, curva Isochrona  $BMC$  in hypothefi directionum convergentium transcendens est (§. 380 *Analys.*).

Ut curvæ hujus indoles porro detegatur, ponatur in æquatione differentiali ad eandem  $dz = dv\sqrt{v}$  feu

$$\frac{dz}{dv} = \sqrt{v}$$

$$\begin{aligned} v &= 0 \\ \text{erit } \frac{dz}{dv} &= 0 \\ dv &= \infty \end{aligned}$$

Est vero in  $B$ ,  $v = 0$  &  $dv = \infty$ . Axis igitur  $CB$  curvam  $BMC$  in  $C$  tangit, adeoque ea axi convexitatem ibidem obvertit.

Quodsi fiat  $CP = 0$ , arculus quoque radio  $CP$  descriptus  $mR = dz = 0$ : punctum ergo  $M$  coincidit cum  $C$ , adeoque curva  $BMC$  cum axe in  $C$  concurrat,

quæ



quæ in B eam tangit. Necessè igitur est ut ibidem sit ad axem concava, consequenter punctum flexus contrarii habet.

Jam in puncto flexus contrarii M est  $Mm^2 = CP. dPp$  (§. 309. *Anal. infin.*). Fiat igitur  $CB = c$ , Cum sit  $BP = v$ , erit  $CP = c - v$ , adeoque  $Pp = -dv$ . Jam

$$dz = v^{1/2} dv$$

$$\text{adeoque } v^{-1/2} dz = dv$$

$$-v^{-1/2} dz = -dv$$

$\frac{1}{2} v^{-3/2} dz dv = -ddv = dPp$ , ob constantem  $dz$ ,

$$\frac{1}{2} (c - v) v^{-3/2} dz dv = CP. dPp$$

Porro  $Mm^2 = dz^2 + dv^2 = v dv^2 + dv^2$

Habemus itaque

$$v dv^2 + dv^2 = \frac{1}{2} (c - v) v^{-3/2} dz dv = \frac{1}{2} (c - v) v^{-1} dv^2$$

$$v + 1 = (c - v) : 2v$$

$$v^2 + v = \frac{1}{2} c - \frac{1}{2} v$$

$$v^2 + \frac{3}{2} v = \frac{1}{2} c$$

$$v^2 + \frac{3}{2} v + \frac{9}{16} = \frac{1}{2} c + \frac{9}{16}$$

$$v + \frac{3}{4} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} c + \frac{9}{16}\right)}$$

$$v = \sqrt{\left(\frac{1}{2} c + \frac{9}{16}\right)} - \frac{3}{4}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{2} c + \frac{1}{2} + \frac{1}{16}\right)} - \frac{3}{4}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{2} AC. AB + \frac{1}{16} AB^2\right)} - \frac{3}{4} AB$$

ob  $c + 1 = AC$ .

Sit  $Cl$  ultimum elementum curvæ, erit  $bl = dz$  &  $bC = dv$ , & ob rectum ad  $b$  (§. 38. *Anal. infin.*)  $bl$  ad  $bC$  ut sinus anguli  $bCl$  ad sinum anguli  $bC$

(§. 33. *Trigon.*), adeoque  $dv : dz = \sin. bCl : \sin. bC$ . Si  $Cl$  sit ultimum curvæ elementum, punctum  $l$  infinite parvo intervallo ab axe  $AC$  distat, seu cum eo coincidit, atque adeo punctum  $l$  est in axe  $AC$  & angulus  $bCl$  idem cum  $ACG$ , intra quem curva  $BMC$  comprehenditur. Quare  $dv : dz = \sin. ACG : \text{Cofin.} ACG$ . Est vero  $dz = dv \sqrt{v}$ , adeoque  $dz : dv = \sqrt{v} : 1 = \sqrt{BC} : \sqrt{AB}$ . Est igitur sinus anguli  $ACG$ , intra quem curva continetur, ad ejus cofinum in ratione subduplicata rectorum  $CB$  &  $BA$  (§. 167. *Arith.*). Et per hoc Theorema angulus  $ACG$ , consequenter arcus  $AG$  determinatur, qui curvæ Isochronæ toti construendæ sufficit.

Denique in æquatione  $dz = dv \sqrt{v}$  substituatur valor ipsius  $v = x - 1$ , erit  $dz = dx \sqrt{x - 1}$ .

Fiat  $dz = 0$

erit  $dx \sqrt{x - 1} = 0$

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1$$

$$= AB$$

Quare cum  $x$  denotet altitudinem, per quam grave cadit, seu motus acceleraticem, &  $dz$  in puncto  $B$  sit  $= 0$ , ubi axis  $BC$  curvam tangit, per demonstrata; grave non ex quiete motum in curva  $BMC$  incipere debet, sed ea celeritate, quam acquirit cadendo per altitudinem  $AB$ .

Angulus, intra quem continetur curva Isochrona in hypothefi directionum convergentium, determinatur, si super  $AC$ , hoc est recta inter locum  $A$ , un-

Tab. XIV. a Fig. 132.

de descensus incipit, & centrum Telluris C interjecta, describatur semicirculus, & in B, ubi curva axem tangit, erigatur perpendicularis BD, factaque BE = BA ducatur ex C recta ED parallela CF perpendiculari BD ultra semicirculum continuata in F occurrens: est enim ACF angulus quaesitus, consequenter arcus AG ex centro C radio CA descriptus curvæ construendæ sufficit. Etenim AB : BD = BD : BC (§. 327. *Geom.*) Quare AB ad BD in ratione subduplicata AB : BC (§. 216. 159. *Arithm.*), seu AB : BD =  $\sqrt{AB} : \sqrt{BC}$ , consequenter  $\sqrt{BC} : \sqrt{AB} = BD : AB$  aut BE (§. 169. *Arithm.*). Quoniam, FC parallela ipsi DE per construct. erit BD : BE = BF : BC (§. 268. *Geom.*), adeoque  $\sqrt{BC} : \sqrt{AB} = BF : BC$  (§. 167. *Arithm.*). Est vero etiam BF : BC = sin. BCF. sin. CFB (§. 33. *Trig.*) = sin. ACG : Cosin ACG. Ergo sin. ACG : Cos. ACG =  $\sqrt{BC} : \sqrt{AB}$  (§. 167. *Arithm.*) Est igitur ACG angulus quaesitus.

Quodsi super AH =  $\frac{1}{2}$  AC semicirculus AIH describatur & in B perpendicularis excitetur, ductisque AI & IH fiat IK = AL =  $\frac{1}{4}$  AB & LO = KA, erit O punctum axis, cui punctum flexus contrarii respondet. Est enim AB : AI = AI : AH live  $\frac{1}{2}$  AC (§. 330. *Geom.*), adeoque AI =  $\sqrt{\frac{1}{2} AC \cdot AB}$  (§. 377. *Geom.*) Quare cum angulus AIK sit rectus (§. 317. *Geom.*), erit AK =  $\sqrt{(\frac{1}{2} AC \cdot AB + \frac{1}{16} AB^2)}$ . Et quia LB =  $\frac{3}{4} AB$  & LO = AK per construct. erit BO =  $\sqrt{(\frac{1}{2} AC \cdot AB + \frac{1}{16} AB^2)} - \frac{3}{4} AB$ .

Quare in O est punctum axis, quod puncto flexus contrarii respondet.

## SCHOLIUM I.

337. Atque ita calculo analytico eruimus præcipuas curvæ Isochrone proprietates in hypothesis directionum convergentium, qua præfenti instituto inserviunt. Constat enim, quomodo sit construenda, supposita quadratura curvæ cujusdam per parabolam construendæ & quadratura circuli. Constat præterea, quenam sint puncta, quibus ductus curvæ determinatur, nempe quod in B axem tangat, eique convexitatem obvertat, punctum O respondeat flexui contrario, ita ut curvæ portioni axis OC concavitatem obvertat, in C denique eadem cum axe concurrat: tota autem intra angulum ACG contineatur. Quoniam tamen curvæ ista & rectificabilis, & quadrabilis est, quadraturam & longitudinem in Corollariis determinare libet.

## COROLLARIUM I.

338. Quoniam  $Mm = dx \sqrt{x}$  (§. 336.)  $\int dx \sqrt{x} = \frac{2}{3} x^{3/2}$ , erit arcus curvæ BM =  $\frac{2}{3} x^{3/2}$  =  $\frac{2}{3} x \sqrt{x}$ . Sed  $x = v + 1$  (§. cit.) Ergo BM =  $(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}v) \sqrt{v + 1} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} x \sqrt{x} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \frac{AP \cdot \sqrt{AP}}{AB} - \frac{2}{3} AB$ . Quare si super

AP describatur semicirculus & erecta in B perpendiculari BC & in D (est autem AD =  $\frac{2}{3} AP$ ) perpendiculari DE ducatur recta AE occurrens ipsi DE in E, tandemque ex EA refecetur EG =  $\frac{2}{3} AB$ : erit AG longitudo arcus. Est enim AP : AC = AC : AB. (§. 130. *Geom.*), adeoque AC =  $\sqrt{AP \cdot AB}$ , ob AB = 1. Porro cum ED ipsi BC parallela (§. 256. *Geom.*); AB : AC = AD : AE (§. 268. *Geom.*). Ergo AE =  $\frac{AD \cdot AC}{AB} = \frac{2}{3} \frac{AP \cdot \sqrt{AP}}{AB}$ .

Quare cum GE =  $\frac{2}{3} AB$  per constr. erit utique recta AG arcui curvæ æqualis.

COROLL.

COROLLARIUM I I.

339. Quoniam Elementum areae est sector infinite parvus  $CmR = mR \cdot \frac{1}{2} CR = v^{1:2} dv (\frac{1}{2}c - \frac{1}{2}v) (\S. 336.) = \frac{1}{2} cv^{1:2} dv - \frac{1}{2} v^{3:2} dv$ ; erit area  $BMC = \frac{1}{2} cv^{3:2} - \frac{1}{5} v^{5:2} = (\frac{1}{2}cv - \frac{1}{5}v^2) \sqrt{v} = (5cv - 3v^2) \sqrt{v} : 15 = \frac{(5CB \cdot BP - 3BP^2) \sqrt{BP}}{15AB}$  ob  $AB = 1$ .

Quodsi fiat  $v = c$ , erit area integra  $= (5c^2 - 3c^2) \sqrt{c} : 15 = \frac{2}{15} c^2 \sqrt{c} = \frac{2}{15} BC^2 \sqrt{BC} : AB$ , denuo ob  $AB = 1$ .

SCHOLION I I.

340. Quoniam  $v = BP$  & area curvae incipit in puncto B, non opus est, ut de quantitate adjicienda solliciti simus. Sed cum in Corollario primo origo ipsius  $x$  in A, curva autem in B: ideo pro  $x$  substitui debebat  $v$  ut constaret de quantitate adjicienda.

COROLLARIUM III.

341. Si CM ad PM perpendicularis ( $\S. 38. Anal. infinit.$ ) fiat infinite magna, erit ea axi AC parallela & PM arcus, itidemque alter AN degenerat in rectam arcui æqualem, propterea quod cum AC nullibi concurrat ( $\S. 82. 256. Geom.$ ). Quare cum  $x$  five AP, intuitu infinitæ  $b$  five AC,  $= 0$ ; crit  $b - x = b$ , adeoque æquatio  $y = \int \frac{bdx \sqrt{(x-1)}}{b-x}$  ( $\S. 336.$ ) degenerat in sequentem  $y = \int bdx \sqrt{(x-1)} : b = \int dx \sqrt{(x-1)}$ ; qui est casus LEIBNITIANUS ( $\S. 334.$ )

SCHOLION III.

342. Cum centrum terræ ingenti admodum intervallo distet, & altitudines, in quibus gravium descensus nobis usui esse potest, respectu illius distantiae sint admodum exiguae; casus directionum parallelarum praxi satisfacit, qui etiam ob faciliorem curvae descriptionem sese commendat ( $\S. 334. Mech. & \S. 581. Analys.$ ). In illo igitur acquiescere

poteramus, nisi nobis quoque propositum esset speciminibus illustribus docere, quomodo principii Mathematicis in his Elementis à nobis explicatis in solvendis Problematis arduis sit utendum & quo ordine ratiocinia sint concatenanda, ut non perturbato animi statu ad portum optatum perveniatur. Quamobrem nec piget de solutione generali Problematis in duplici hypothesei hactenus considerati nonnulla addere. Nimirum solvimus Problema de curva Isochrone in hypothesei accelerationis GALILÆANA, propterea quod experimentis in iis altitudinibus, in quibus ea capere licet, satisfacit, ita ut in locum hypotheseos naturæ quoad nos surrogari possit ( $\S. 85. & seqq.$ ). Enim vero cum alie quoque hypotheses non sint impossibiles atque Geometrae sit Problema in omni hypothesei solvere, quamdiu ignoratur, quenam illarum sit hypothesei naturæ: ut ostendamus restat, quid fieri conveniat data quacunque accelerationis lege. Generalem adeo solutionem hic imprimis admittimus in usum artis inveniendi, ut appareat progressus à solutionibus particularibus ad generales.

PROBLEMA XLIX.

343. Invenire curvam Isochronam in quacunque accelerationis hypothesei.

RESOLUTIO.

Quodsi acceleratio alia statuatur, Tab. XIV.a. quam quæ in hypothesei GALILÆANA Fig. 134. obtinet directionibus parallelis manentibus, curvae Isochrone BMC accedat curva celeritatum ANE juxta altitudinem acceleratricem AG tanquam communem axem descripta, cujus semiorinatae PN, GE exprimunt celeritates per abscissas iisdem respondententes AP, AG acquisitas

Sit itaque  $AP = x, PM = y, PN = v,$   
I 3 recip.

reperitur, eodem profus quo supra (§ 334.) modo,  $Mm = v dx$ , ut adeo habeamus

$$\frac{dx^2 + dy^2 = v^2 dx^2}{dy^2 = v^2 dx^2 - dx^2}$$

$$dy = dx \sqrt{(v^2 - 1)}$$

Quodsi jam sit  $v = \sqrt{x}$ , quemadmodum in hypothefi GALILÆANA: prodibit  $dy = dx \sqrt{(x - 1)}$ , profus ut supra (§. cit.) Solutio itaque particularis convertitur in universalem, aut potius specialis in generalem, si pro  $\sqrt{x}$  pones  $v$ , id quod regulis Logicis, quas stabilivimus, ad amussim congruit (§. 710. Log.).

Quodsi magis arriferit ope loci sollicitationum centralium, seu scalæ gravitatis IQO Problema solvere; pari facilitate idem præstatur. Accedat enim porro ad curvam Isochronam BMC & curvam celeritatum ANC scala sollicitationum centralium IQO & sit communis abscissa AP in altitudine acceleratrice  $AP = x$ ,  $PM = y$ ,  $PN = v$ ,  $PQ = g$ ; erit  $v^2 = 2 \int g dx$  (§. 113.). Quare si pro  $v^2$  hunc valorem substituas, prodibit  $dy = dx \sqrt{(2 \int g dx - 1)}$ . Quodsi jam supponas, quemadmodum id obtinet in hypothefi GALILÆANA (§. 112), gravitatem constantem, quæ adeo fit ut 1; erit  $dy = dx \sqrt{(2 \int dx - 1)} = dx \sqrt{(2x - 1)}$ , vel, cum hic sola ratio attendatur, minime autem magnitudo absoluta,  $dy = dx \sqrt{(x - 1)}$ , ut supra (§. 334.).

## SCHOLIUM.

344. In curva Isochrona temporis descensus sunt ut altitudines, per quas descenditur (§. 332.). Inveniri autem possunt etiam curvæ aliæ, in quibus tempus ad altitudinem relationem quamcunque constantem vel quomodocunque assignabilem habet. Quamobrem in gratiam artis inveniendi solutionem Problematis generalem apponimus, sub quo curva Isochrona tanquam casus particularis continetur.

## PROBLEMA L.

345. Invenire curvam, in qua grave descendit ea lege, ut tempus habeat ad altitudinem, per quam descendit, relationem datam, seu ut tempora descensus habeant inter se relationem ex datis altitudinibus dato modo assignabilem, suppositis quacunque accelerationis lege & directionibus sive parallelis, sive convergentibus.

## RESOLUTIO.

Non differt resolutio Problematis præsentis à resolutione præcedentis, nisi quod circa axem communem describatur, præter curvam descensus BMC, curva celeritatis ANE, etiam curva temporis ASH. Nimirum grave in curva BMC ea lege descendit. ut in M sit celeritas ut semiordinata PN, tempus vero ut PS.

Sit  $AP = x$ ,  $PN = v$ ,  $PS = t$ ,  $PM = y$ ; erit  $Mm = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$  itemque ob suppositum per Mm motum æquabilem  $v dt$ , ut supra (§. 335.).

Habe-

$$\begin{aligned} \text{Habemus itaque } v dt &= \sqrt{(dx^2 + dy^2)} \\ v^2 dt^2 &= dx^2 + dy^2 \\ v^2 dt^2 - dx^2 &= dy^2 \\ dy &= \sqrt{(v^2 dt^2 - dx^2)} \\ y &= \int \sqrt{(v^2 dt^2 - dx^2)} \end{aligned}$$

Quod si ergo in dato casu speciali  $v$  exprimatur per  $x$  &  $dt$  per  $dx$ , prodit æquatio curvæ descensus respondens.

Sit. E. gr.  $v = \sqrt{x}$  &  $t = x$ , quemadmodum in curva Isochrona, supposita accelerationis lege GALILÆANA; erit  $dt = dx$ , adeoque  $y = \int \sqrt{(x dx^2 - dx^2)} = \int dx \sqrt{(x - 1)}$ , ut suprâ (§. 334).

Quod si quis in casu directionum convergentium Problema resolvere velit, non novo calculo opus est, sed in æquatione prima paulo ante (§. 336). inventa pro  $x dx^2$  substitui debet  $v^2 dt^2$ : quo facto habemus.

$$\begin{aligned} v^2 dt^2 &= \frac{b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2}{b^2} \\ \frac{v^2 b^2 dt^2 - b^2 dx^2}{(b - x)^2} &= dy^2 \\ dy &= \frac{b \sqrt{(v^2 dt^2 - dx^2)}}{b - x} \end{aligned}$$

Quod si etiam hic in dato casu speciali  $v$  &  $t$  per  $x$  determinantur, æquatio curvæ descensus prodit.

E. gr. Sit ut ante  $v = \sqrt{x}$ ,  $t = x$ , quemadmodum pro curva Isochrona supposuimus; erit

$$dy = \frac{b \sqrt{(x dx^2 - dx^2)}}{b - x} = \frac{b dx \sqrt{(x - 1)}}{b - x}$$

ut suprâ (§. 336).

SCHOLIION.

246. Ubi adeo Problema in casu particulari

solutum, veluti in casu LEIBNITII, non difficilis est solutio universalis, quamcumque universalitatem eidem donare volueris: id quod etiam in aliis Problematis similiter obtinet. Enimvero ubi solutio generalis ad casum specialem applicanda, plus difficultatis oritur, quatenus nempe formulæ, quæ per substitutionem prodeunt, vel summandæ, vel ad quadraturas aut rectificationes simpliciorum curvarum reducendæ. Atque ea ratio est, cur Geometræ eminentes artem inveniendi sive analysin promoturi parum solliciti fuerint de solutionibus generalibus, modo particulares dare possent, in quibus ars eminebat, novis artificijs analyticis introductis.

DEFINITIO XXXVIII. Tab.

347. Curva Isochrona paracentrica dicitur, per quàm descendens grave æqualiter æqualibus temporibus à dato puncto recedit, vel ad illud accedit. Dicitur etiam Curva accessus & recessus æqualis. XIV. b. Fig. 137.

Sit BCM curva quæ sita, D punctum fixum in axe datum, DM esse debet ut tempus descensus ab A in M.

SCHOLIION.

348. Problema de curva Isochrona paracentrica invenienda primum propositum est à LEIBNITIO (a); sed cum solutu difficilis sit priore, dudum intactum relinquerunt Geometræ, donec tandem solutionem daret JACOBUS BERNOULLI (b) & simul solutiones LEIBNITII Fratrisque JOANNIS (c) eliret. Generalius deinde idem Problema solvit VARIGNONIUS (d). Lubet hic dare solutionem præcedenti, quantum licet, asfinem.

PROBLEMA LIV.

349. Invenire curvam Isochronam paracentricam.

RESO-

(a) In Actis Frudit. A. 1689. p. 198.  
 (b) In Actis Erudit. A. 1694. p. 277.  
 (c) Ibid. p. 371. 394.  
 (d) In Comment. Academ. Reg. Scient. A. 1699. p. 9. & seqq.

## RESOLUTIO.

Sit A punctum, unde descensum inchoat grave; D punctum, à quo vel recedit, vel ad quod accedit, prout casus tulerit. Radio AD describatur semicirculus ANF, ductisque ad punctum curvæ M rectis DM & Dm infinite propinquis agantur ad axem normales NQ & PM, itemque  $nq$ , quæ erit ipsi NQ infinite propinqua. Ducatur NT tangens circulum in N (§. 38. *Anal. infin.*) & nO normalis ad NQ, tandemque radio DM arcus MR ex centro D.

Sit jam DN=DA=DF= $a$ , DQ= $z$ , DM= $t$ , erit  $mR=dt$ ,  $Qq=nO=dz$  &  $QN=\sqrt{(a^2-z^2)}$  (§. 417 *Geom.*). Quærat jam ut in Problemate anteriore de curva Isochrone (§. 334 & 336) arcus Mm duplici modo, nempe 1. ex principiis pure Geometricis, 2. & ex principis Mechanicis, seu conditione Problematis.

I. Quoniam TN circulum tangit in N per *construct.* angulus TND rectus est est (§. 38 *Anal. infin.*), adeoque  $\triangle DNQ \sim \triangle QNT$  seu angulus DNQ= $QTN$  (§. 329 *Geom.*). Sed ob parallelismum rectarum nO & QT (§. 256 *Geom.*) angulus OnN= $QTN$  (§. 233 *Geom.*). Ergo OnN= $DNQ$  (§. 87 *Arithm.*). Quare cum DQN & nON sint recti per *construct.* erit (§. 267 *Geom.*)

$$NQ: DN=nO: Nn$$

$$\sqrt{(a^2-z^2)}: a=dz:$$

$$\text{Ergo } Nn=adz: \sqrt{(a^2-z^2)}$$

Porro ob sectores DnN & DRM similes (§. 138. 412 *Geom.*)

$$DN: Nn=DM: MR$$

$$a: \frac{adz}{\sqrt{(a^2-z^2)}}=t:$$

$$\text{Ergo } MR=tdz: \sqrt{(a^2-z^2)}$$

$$\text{Hinc } MR^2=t^2dz^2: (a^2-z^2)$$

$$\text{Sed } mR^2=dt^2$$

$$\text{Ergo } Mm^2=\frac{t^2 dz^2}{a^2-z^2}+dt^2$$

$$=\frac{t^2 dz^2+a^2 dt^2-z^2 dt^2}{a^2-z^2}$$

II. Quoniam motus per arculum infinite parvum Mm æquabilis supponitur, erit spatium Mm in ratione composita temporis & celeritatis in M acquisitæ (§. 34). Sed tempus est ut mR five dt (§. 347) & celeritas in M acquisita in hypothese GALILÆANA seu gravitatis constantis ut  $\sqrt{AP}$  (§. 87). Ergo  $Mm=dt. \sqrt{AP}$ . Est verò ob parallelas QN & PM (§. 268 *Geom.*)

$$DN: DQ=DM: DP$$

$$a: z=t:$$

$$DP=tz: a$$

$$\text{Ergo } AP=AD+DP$$

$$=a+tz: a$$

$$=\frac{a^2+tz}{a}$$

Unde  $Mm=dt. \sqrt{AP}$  per *demonstr.*

$$=dt. \sqrt{(a^2+tz)}: \sqrt{a}$$

$$Mm^2=\frac{a^2 dt^2+tz dt^2}{I. a}$$

hoc est, sumta a pro unitate,

$$Mm^2=\frac{a^2 dt^2+tz dt^2}{a^2}$$

Habemus

Habemus itaque

$$\frac{a^2 dt^2 + tz dt^2}{a^2} = \frac{a^2 dt^2 - z^2 dt^2 + t^2 dz^2}{a^2 - z^2}$$

$$\frac{a^4 dt^2 + a^2 tz dt^2 - a^2 z^2 dt^2 - tz^3 dt^2}{a^2 t z dt^2 - tz^3 dt^2} = \frac{a^4 dt^2 - a^2 z^2 dt^2 + a^2 t^2 dz^2}{a^2 - z^2}$$

$$\frac{a^2 t z dt^2 - tz^3 dt^2}{dt \sqrt{(a^2 z - z^3)}} = \frac{a^2 t^2 dz^2}{adt \sqrt{a}}$$

$$\frac{dt \sqrt{(a^3 z - az^3)}}{dt} = \frac{adz \sqrt{at}}{\sqrt{at} \sqrt{(a^3 z - az^3)}}$$

h. e.  $a^{-1:2} t^{-1:2} dt = adz : \sqrt{(a^3 z - az^3)}$

$$2a^{-1:2} t^{1:2} = a f(dz : \sqrt{(a^3 z - az^3)})$$

$$2a^{1:2} t^{1:2} = a^2 f(dz : \sqrt{(a^3 z - az^3)})$$

Atque hæc est æquatio, quam dedit LEIBNITIUS pro curva Isochrone paracentrica (a). Omnis itaque rei cardo huc redit, ut  $a^2 f(dz : \sqrt{(a^3 z - az^3)})$  determinetur, quod membrum æquationis absolute summari nequit. Dari autem potest constructio sive per quadraturam, sive per rectificationem alicujus curvæ. Dabimus primo constructionem per quadraturam.

Quoniam igitur  $a^3 dz : \sqrt{(a^3 z - az^3)}$  est elementum areæ, erit semiordinata  $v = a^3 : \sqrt{(a^3 z - az^3)}$  (§. 98 *Anal. infinit.*)

Ut curvæ hujus indoles detegatur, ponatur

$$\begin{aligned} \text{erit } v &= \infty \\ \sqrt{(a^3 z - az^3)} &= 0 \\ a^3 z - az^3 &= 0 \\ a^2 - z &= 0 \\ z &= a \end{aligned}$$

Quando itaque z fit a, hoc est, DQ degenerat in DC, semiordinata CR fit infinita. Est adeo CR Asymptotus curvæ.

(a) In Actis loc. cit. p. 371 & 372.

Fiat  $z = 0$   
erit  $v = \frac{a^3}{0}$

Quare ubi z fit 0, seu evanescit, semiordinata DS est Asymptotus curvæ.

Quoniam  $v = a^3 (a^3 z - az^3)^{-1:2}$   
erit

$$dv = -\frac{1}{2} a^3 (a^3 z - az^3)^{-3:2} (a^3 dz - 3az^2 dz)$$

Si jam fiat  $dv = 0$ ,

erit  $-\frac{1}{2} a^3 (a^3 z - az^3)^{-3:2} (a^3 dz - 3az^2 dz) = 0$

$$\begin{aligned} \frac{a^3 dz}{a^2} &= \frac{3az^2 dz}{\sqrt{\frac{1}{3} a^2}} = z \end{aligned}$$

Quando itaque  $DQ = \sqrt{\frac{1}{3} a^2}$ , applicata QN fit minima (§. 63 *Analys. infin.*).

Quoniam  $v = \frac{a^3}{\sqrt{(a^3 z - az^3)}} = \frac{a^3}{\sqrt{(a^2 - z^2)} \sqrt{az}}$

erit  $\sqrt{az} : a = a : \frac{a^2}{\sqrt{az}}$

$$\sqrt{(a^2 - z^2)} : \frac{a^2}{\sqrt{az}} = a : v$$

Est vero  $\sqrt{az}$  semiordinata parabolaë QG, cujus parameter = a & abscissa DQ (§. 392 *Analys.*) &  $\sqrt{(a^2 - z^2)}$  semiordinata QF circuli AFC radio DA = a descripti (§. 377 *Geom.*). Curva igitur quadranda ita constructur. Circa communem axem AC describatur semicirculus AFC radio AD = a & parabola DGB, cujus vertex in D centro semicirculi, parametro a radio semicirculi æquali. Fiat deinde

K DI =

DI = GQ & DO = DA, itemque DL = QF, ductisque OK ipsi AI & KT ipsi LO parallelis; erit DT = QN. Est enim  
 DI : DA = DO : DK

$$\sqrt{az} : a = a : \frac{a^2}{\sqrt{az}}$$

$$DL : DO = DK : DT$$

$$\sqrt{(a^2 - z^2)} : a = \frac{a^2}{\sqrt{az}} : \frac{a^3}{\sqrt{(a^2 - z^2)}\sqrt{az}}$$

Demisso itaque ex T perpendiculari TN ad QN; punctum N est in curva quæsitâ. Quodsi tandem spatio SDQNH fiat æquale rectangulum ADZV, erit ob AD = a, DZ = a<sup>2</sup> f(dz : √(a<sup>2</sup>z - az<sup>3</sup>)).

$$\text{Habemus ergo } \frac{DZ = 2 \sqrt{at}}{\frac{1}{4} DZ^2 = at} \\ \frac{DZ^2}{4a} = t$$

Unde rectæ t, quibus puncta in Isochrona paracentrica determinantur, facile inveniuntur. Nimirum fiat Db =  $\frac{1}{4} DZ$  & ducatur bc ipsi ZA parallela; erit (§. 268. *Geom.*) DA : DZ = Db : Dc, consequenter Dc = t. Quare si ex centro D radio Dc describatur arcus secans DN in M; erit punctum M in isochrona paracentrica.

Videamus jam porro, quomodo summatio formulæ  $\frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{fadz}{\sqrt{(a^2z - z^3)}}$

reducatur ad rectificationem arcus cujusdam. Quoniam adz : √(a<sup>2</sup>z - z<sup>3</sup>) est elementum arcus, per *hypoth.* erit

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \frac{adz}{\sqrt{(a^2z - z^3)}} \\ dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 dz^2}{az^2 - z^3}$$

Quoniam coordinatæ curvæ rectificandæ dx & dy per z dari debent, quadratum a<sup>2</sup> dz<sup>2</sup> : (a<sup>2</sup>z - z<sup>3</sup>) seu ejus multipulum dividendum est in duo alia, quorum latera, si fieri potest, sunt summabilia. Quamobrem cum numerator a<sup>2</sup> dz<sup>2</sup> debeat esse aggregatum duorum quadratorum, evidens est requiri, ut quadrata non modo diversa habeant signa, verum etiam tales denominatores, qui in se invicem ducti producunt a<sup>2</sup>z - z<sup>3</sup>. Enimvero cum a<sup>2</sup>z - z<sup>3</sup> in istiusmodi factores resolvi nequeat, fieri autem id possit, si mutetur, in a<sup>2</sup>z<sup>2</sup> - z<sup>4</sup>, cum tunc factores sint az + z<sup>2</sup> & az - z<sup>2</sup> (§. 86. *Anal.*); fractio a<sup>2</sup> dz<sup>2</sup> : (a<sup>2</sup>z - z<sup>3</sup>) ducatur in z ut habeatur a<sup>2</sup>z dz<sup>2</sup> : (a<sup>2</sup>z<sup>2</sup> - z<sup>4</sup>). Quare si laterum numeratores dicantur interea q & w; erunt latera qdz : √(az + z<sup>2</sup>) & wdz : √(az - z<sup>2</sup>). Ex differentiandi regulis constat, fore latera summabilia, si fiat  $q = \frac{a+2z}{2}$  &  $w = \frac{a-2z}{2}$ ,

adeoque ipsa latera fiant  $\frac{(a+2z) dz}{2\sqrt{(az+z^2)}}$

$$\& \frac{(a-2z) dz}{2\sqrt{(az-z^2)}}$$

Videamus itaque, an quadratorum

$$\text{summa} = \frac{a^2 dz^2}{a^2z - z^3} \quad \text{Quoniam itaque}$$

$$dx = \frac{(1+2z) dz}{2\sqrt{(az+z^2)}} \& dy = \frac{(a-2z) dz}{2\sqrt{(az-z^2)}}$$

$$\text{erit } dx^2 = \frac{(a^2 + 4az + 4z^2) dz^2}{4az + 4z^2} \& dy^2$$

$$= \frac{(a^2 - 4az + 4z^2) dz^2}{4az - 4z^2} \text{ seu reductione}$$



ad eandem denominationem facta:  
 $dx^2 = (4a^3z + 16a^2z^2 + 16az^3 - 4a^2z^2 - 16az^3 - 16z^4)dz : (16a^2z^2 - 16z^4)$   
 &  $dy^2 = (4a^3z - 16a^2z^2 + 16az^3 + 4a^2z^2 - 16az^3 + 16z^4)dz : (16a^2z^2 - 16z^4)$ , adeoque  $dx^2 + dy^2 = 8a^3zdz^2 : (16a^2z^2 - 16z^4) = a^3dz^2 : (2a^2z - 2z^3)$ ,  
 feu multiplum quadrati dividendi, consequenter  $\sqrt{dx^2 + dy^2} = dz \sqrt{a^3 : (2a^2z - 2z^3)}$ .

$$\text{Est vero } \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{adz}{\sqrt{(a^2z - z^3)}}$$

$$\frac{dt\sqrt{a}}{\sqrt{2t}} = \frac{adz\sqrt{a}}{\sqrt{(2a^2z - 2z^3)}}$$

$$\frac{adt}{\sqrt{2at}} = \frac{dz\sqrt{a^3}}{\sqrt{(2a^2z - z^3)}}$$

$$\frac{at^{-1/2}dt}{\sqrt{2a}} = \frac{dz\sqrt{a^3}}{\sqrt{(2a^2z - z^3)}} = dv$$

$$\frac{2at^{-1/2}}{\sqrt{2a}} = \sqrt{2at} = v$$

$$2at = v^2$$

$$t = v^2 : a$$

Quoniam itaque per hanc æquationem valor ipsius  $t$  inveniri potest; pro construenda curva Isochrone paracentrica prius construi debet curva, in qua altera coordinata est  $\sqrt{(az + z^2)}$  seu semiordinata hyperbolæ æquilatere, cujus axis transversus  $= a$ , abscissa  $= z$  (S. 507 *Analys.*), altera  $\sqrt{(az - z^2)}$ , seu semiordinata circuli, cujus diameter  $= a$ , abscissa  $= z$ .

Ut curvæ hujus natura intelligatur, fiat

$$\text{erit } \frac{x = \sqrt{(az + z^2)} \quad y = \sqrt{(az - z^2)}}{x^2 = az + z^2 \quad y^2 = az - z^2}$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2 + x^2 = \frac{1}{4}a^2 + az + z^2}{\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + x^2)} = \frac{1}{2}a + z}$$

$$\frac{z = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + x^2)} - \frac{1}{2}a}{az = a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)} - \frac{1}{2}a^2}$$

$$\frac{z^2 = x^2 + \frac{1}{4}a^2 - a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)} + \frac{1}{4}a^2}{= x^2 + \frac{1}{2}a^2 - a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)}}$$

$$\frac{az - z^2 = 2a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)} - x^2 - a^2}{y^2 =}$$

$$\frac{y^2 + x^2 + a^2 = 2a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)}}{y^4 + 2y^2x^2 + x^4 + 2a^2y^2 + 2a^2x^2 + a^4 = 4a^2x^2 + a^4}$$

$$\frac{y^4 + 2y^2x^2 + 2a^2y^2 = 2a^2x^2 - x^4}$$

Est itaque curva tertii generis (S. 382 *Analys.*).

Fiat  $x = 0$

erit  $y^4 + 2a^2y^2 = 0$

$$y = 0$$

Fiat  $y = 0$

erit  $2a^2x^2 - x^4 = 0$

$$2a^2 = x^2$$

$$\sqrt{2a^2} = x$$

In vertice ergo D est origo utriusque Tab. indeterminatæ  $x$  &  $y$ . Quando ergo XIV. b. DG  $= x = \sqrt{2a^2}$ , semiordinata  $y$  evanescit, adeoque curva secat axem in G. 139.

Porro si æquatio differentietur, erit  $4y^3dy + 4yx^2dy + 4y^2xdx + 4a^2ydy = 4a^2xdx - 4x^3dx$

Quare si fiat  $dy = 0$ , erit

$$\frac{4y^2xdx = 4a^2xdx - 4x^3dx}{y^2 = a^2 - x^2}$$

$$y = \sqrt{(a^2 - x^2)}$$

quæ est maxima applicata (S. 63 *Analys. infinit.*). Quoniam vero

$\sqrt{(a^2 - x^2)}$  est semiordinata circuli HI (§. 377 *Anal.*), maxima applicata cadit in I, ubi circulus ex centro D radio  $DN = a$  descriptus curvam secat.

Ponatur in æquatione  $a^2 - x^2 = y^2$  valor ipsius  $y = 2a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)} - x^2 - a^2$ , habemus

$$\begin{aligned} a^2 - x^2 &= 2a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)} - x^2 - a^2 \\ \frac{2a^2}{a} &= \frac{2a\sqrt{(x^2 + \frac{1}{4}a^2)}}{(\sqrt{x^2 + \frac{1}{4}a^2})} \\ a^2 &= x^2 + \frac{1}{4}a^2 \\ \frac{\frac{3}{4}a^2}{x} &= \frac{x^2}{\sqrt{\frac{3}{4}a^2}} = DH \end{aligned}$$

Quodsi ponamus abscissarum originem in G &  $GQ = v$ , erit  $DQ = x = b - v$ , adeoque æquatio ob  $b = \sqrt{2a^2}$  in hanc degenerat :

$$b^2(b-v)^2 - (b-v)^4 = y^4 + 2y^2(b-v)^2 + b^2y^2$$

$$\text{Fiat jam } v > b, \text{ e. gr. } = \frac{3}{2}b$$

$$\text{erit } b - v = b - \frac{3}{2}b = -\frac{1}{2}b$$

$$(b - v)^2 = \frac{1}{4}b^2$$

$$(b - v)^4 = \frac{1}{16}b^4$$

consequenter

$$\frac{3}{4}b^4 - \frac{1}{16}b^4 = y^4 + \frac{1}{2}b^2y^2 + b^2y^2$$

$$\text{h. e. } \frac{3}{16}b^4 = y^4 + \frac{3}{2}b^2y^2$$

Cum itaque valor ipsius  $y$  non fiat imaginarius etiamsi  $v$  seu  $GQ$  sumatur major quam  $GD$ , seu axe curvæ  $GIFDIG$ ; curva ultra  $D$  continuatur, adeoque se mutuo secant partes in  $D$ , hoc est, curva nodum in  $D$  habet. Ex constructione autem patet, partem inferiorem fore priori similem.

Ut determinetur angulus, sub quo curva axem in  $D$  secat, investiganda est ut supra (§. 336) ratio laterum infinite parvorum  $Dq$  &  $qf$ . Quodsi

enim  $Df$  sumatur pro sinu toto,  $fq$  sinus,  $Dq$  cosinus anguli quæsitum. Quodsi ergo in communi axe hyperbolæ atque circuli genetricium abscissa sumatur  $dz$ , semiordinata hyperbolæ erit  $\sqrt{(adz + dz^2)}$  (§. 507 *Analys.*), circuli vero  $\sqrt{(adz - dz^2)}$  (§. 377 *Analys.*), hoc est, cum  $dz^2$  differentiale secundi gradus respectu primi  $adz$  evanescat, utrobique  $= \sqrt{adz}$ . Quoniam itaque per constructionem  $Dq$  est semiordinata hyperbolæ &  $qf$  semiordinata circuli; erit ad verticem  $qf = qD$ , adeoque  $qDf$  angulus curvæ cum axe semirectus (§. 24 *Geom.*), consequenter angulus curvæ rectus est.

Potest idem etiam aliis modis ostendi. Nimirum

$$qD = dx = \frac{(a + 2z)dz}{2\sqrt{(az + z^2)}}$$

$$qf = dy = \frac{(a - 2z)dz}{2\sqrt{(az - z^2)}}$$

Sed in casu instantis evanescentiæ  $z$  fit  $dz$ . Quare si pro  $z$  substituatur  $dz$ , erit

$$qD = \frac{adz + 2dz^2}{2\sqrt{(adz + dz^2)}}$$

$$qf = \frac{adz - 2dz^2}{2\sqrt{(adz - dz^2)}}$$

Est vero  $dz^2$  respectu  $adz = 0$ . Ergo per ea, quæ modo diximus,

$$qD = \frac{adz}{2\sqrt{adz}} = \frac{1}{2}\sqrt{adz}$$

$$qf = \frac{adz}{2\sqrt{adz}} = \frac{1}{2}\sqrt{adz}$$

Ergo  $qD = qf$ , ut ante.

Idem inveniri debet, si in æquatione differentiali ad curvam pro  $x$  substituatur

tur  $dx$  & pro  $y$  ponatur  $dy$ . Æquatio enim  $a^2 x dx - x^2 dx = y^2 dy + x^2 y dy + a^2 y dy$  facta substitutione in sequentem degenerat :

$$a^2 dx^2 - dx^4 = dy^4 + dx^2 dy^2 + a^2 dy^2$$

Quare fit  $dx^4 = 0, dy^4 = 0, dx^2 dy^2 = 0$  erit  $a^2 dx^2 = a^2 dy^2$

$$\frac{dx^2 = dy^2}{dx = dy}$$

hoc est,  $qD = qf$ , ut ante.

Immo potest etiam in æquatione ad curvam  $2a^2 x^2 - x^4 = y^4 + 2y^2 x^2 + 2a^2 y^2$  pro  $x$  substitui  $dx$  & in locum ipsius  $y$  surrogari  $dy$  : quo facto habemus ,

$$2a^2 dx^2 - dx^4 = dy^4 + 2 dy^2 dx^2 + 2a^2 dy^2$$

Sed  $dx^4 = 0, dy^4 = 0, 2 dy^2 dx^2 = 0$

$$\text{Ergo } \frac{2a^2 dx^2 = 2a^2 dy^2}{dx = dy}, \text{ ut ante.}$$

Ut tandem etiam intelligatur natura Isochronæ paracentricæ, cum pro ea fit ,

$$\frac{adt}{\sqrt{2at}} = \frac{dz \sqrt{a^3}}{\sqrt{(2a^2 z - z^3)}} = dv$$

seu  $t = v^2 : 2a$ ,

si fiat  $\frac{dz = 0}{erit \frac{dv = 0}$

adeoque  $t = 0$

Curva itaque axem in D fecat.

Ex ipsa autem constructione apparet, si  $DQ = z$  fiat  $= a$ , seu  $DN$ , rectam  $DM$  in O cadere, atque adeo curvam axem ibidem secare, ultra eum ex altera parte continuandam. Est vero tum  $v = DFIG$ , adeoque  $DO = (DFIG)^2 : 2a$ .

Patet idem ex valoribus  $x$  &  $y$ . Etenim si fit,

$$z = a$$

$$\text{erit } x = \sqrt{(az + z^2)}$$

$$= \sqrt{2a^2} = DG$$

$$\& y = \sqrt{(az - z^2)}$$

$$= \sqrt{(a^2 - a^2)} = 0$$

$$\text{adeoque } DO = t = v^2 : 2a$$

$$= (DFIG)^2 : 2a$$

Habemus hinc

$$DO : DFIG = DFIG : 2a$$

Quoniam vero curva Isochrona paracentrica utrinque ultra axem continuatur, se mutuo in O partes secant.

SCHOLIUM.

350. Poterat quoque problema præsens ad modum præcedentis variis modis universalius resolvi, nimirum in quacunque gravitatis hypotesi, cum in solutione GALILÆANAM supposuerimus, sumentes celeritatem acquisitam in ratione subduplicata altitudinis. Sed non opus est, ut istiusmodi solutionibus immoremur.

DEFINITIO XXXIX.

351. Curva Tautochrona dicitur, in qua mobile per quoscunque arcus eodem tempore descendit.

COROLLARIUM.

352. Quoniam descensus per Cycloiden & quemcumque ejus arcum sunt æquidistanti (§. 311.) ; Cyclois curva tautochrona est (§. 351.)

PROBLEMA L.

353. Determinare tempus descensus per curvam in quacunque gravitatis hypotesi, sive directiones supponantur parallela, sive convergentes. Tab. XIV. b. Fig. 140.

## RESOLUTIO.

Sit altitudo AP, per quam descendit grave, AMB curva descensus, ANR curva celeritatis, PN. celeritas in P. acquisita, in C centrum gravium. Radii CM & *cm* infinite propinquis describantur arcus PM & *pm*, sitque AP = *x*, PM = *y*: erit Pp = MR = *dx*, Rm = *dy*, adeoque Mm =  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ . Quoniam motus per M æquabilis, erit Mm = *dt*. PN (§. 34. consequenter

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dt. \text{ PN}$$

$$dt = \frac{\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{\text{PN}}$$

Si punctum C infinite distet, arcus PM & *pm* evadent rectæ ad AC perpendiculares, manentque omnia ut ante.

Quodsi ex hypothesi gravitatis speciali substituatur valor ipsius PN, sive celeritatis; prodibit valor temporis pro illa gravitatis hypothesi. Si vero ulterius ex æquatione ad curvam substituatur valor ipsius *y* per *x*; prodibit tempus in casu speciali dato.

In hypothesi GALILÆANA, PN =  $\sqrt{x}$ , sive, si parameter parabolæ quæ curva celeritatum ANR, fuerit *a*, PN =  $\sqrt{ax}$  (§. 87). Ergo tempus per Mm =  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} : \sqrt{ax}$ , adeoque  $dt^2 = (dy^2 + dx^2) : ax$ .

Sit jam curva descensus AMB etiam parabola, cujus vertex in A, axis AQ; erit in hypothesi directionum parallelarum AQ = PM = *y*, QM = AP = *x*, adeoque (§. 388 *Analys.*).

$$x^2 = ay$$

$$2xdx = ay$$

$$\begin{aligned} & 4x^2 dx^2 : a^2 = dy^2 \\ \text{Ergo } dt^2 &= \frac{(4x^2 dx^2 + a^2 dx^2) : ax}{a^2} \\ &= \frac{(4x^2 + a^2) dx^2}{a^3 x} \\ dt &= \frac{dx \sqrt{(4x^2 + a^2)}}{\sqrt{a^3 x}} \end{aligned}$$

Quoniam  $dt = \sqrt{(dx^2 + dy^2)} : \sqrt{ax}$ ; poterat idem valor facilius inveniri, Elementum arcus parabolici Mm =  $dx \sqrt{(4x^2 + a^2)} : a$  (§. 146 *Anal. infin.*) dividendo per celeritatem in M acquisitana =  $\sqrt{ax}$ .

Est igitur  $t = \int (dx \sqrt{(4x^2 + a^2)} : a \sqrt{ax}) = \text{PO}$ .

Quodsi per quadraturam alicujus curvæ ANR curva temporum construi debet, dividendo spatium APN per quantitatem constantem *a*; erit Elementum illius curvæ PNnp =  $dx \sqrt{(4x^2 + a^2)} : \sqrt{ax}$ .

Quare cum sit Pp = *dx*; erit semiordinata ejus PN =  $\sqrt{(4x^2 + a^2)} : \sqrt{ax}$ , seu, si *a* = 1, PN =  $a \sqrt{(4x^2 + a^2)} : \sqrt{ax}$ . Est vero  $\sqrt{ax}$  semiordinata parabolæ, cujus abscissa AP = *x*, parameter = *a* (§. 392 *Analys.*),  $\sqrt{(4x^2 + a^2)}$  abscissa hyperbolæ æquilateræ à centro computata, cujus axis transversus = *2a*, semiordinata = *2y* (§. 147 *Anal. infin.*). Curva Tab igitur, à cujus quadratura pendet conf- XIV  
tructio curvæ temporum, ita construi- Fig.  
tur. Circa communem axem AX conf- 141.  
truatur parabola AMT & hyperbola æquilatera AOV (§. 472 *Analys.*), cujus centrum in C, axis dimidius AC = *a*, qui simul parabolæ AMT parameter. Ducta semiordinata parabolæ PM,

PM, fiat  $CQ = 2AP = 2x$ , erit ex Q erecta ad CQ perpendiculari  $QO = \sqrt{(4x^2 + a^2)}$ . Ducatur TF parallela ipsi CX per punctum M & AH parallela ipsi QG, erit  $TL = CA = a$  &  $TC = PM = \sqrt{ax}$ . Fiat  $TG = QO = \sqrt{(4x^2 + a^2)}$  & ducatur FG parallela ipsi LC, erit (§. 268. *Geom.*).

$$TC : TL = TG : TF$$

$$\sqrt{ax} : a = \sqrt{(4x^2 + a^2)} :$$

$$TF = \frac{a\sqrt{(4x^2 + a^2)}}{\sqrt{ax}}$$

Quod si ergo MP continetur in N, donec  $PN = TF$ , erit punctum N in curva per cujus quadraturam curva temporum construi debet.

Si curvæ temporum constructionem ad rectificationem alicujus curvæ reducere volueris; fiat

$$dx \frac{\sqrt{(a^2 + 4x^2)}}{a\sqrt{ax}} = \sqrt{(dz^2 + dy^2)}$$


---


$$\text{erit } \frac{a^2 dx^2 + 4x^2 dx^2}{a^3 x} = dz^2 + dy^2$$

$$\text{Fiat jam } dz^2 = \frac{dx^2}{ax}$$

$$dy^2 = \frac{4x^2 dx^2}{a^3 x}$$

$$= \frac{4x dx^2}{a^3}$$

$$\text{erit } \frac{a^{-1:2} x^{-1:2} dx = dz}{2a^{-1:2} x^{1:2} = z}$$

$$\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{a}} = z$$

$$dy = 2x^{1:2} a^{-3:2} dx$$

$$y = \frac{4}{3} x^{3:2} a^{-3:2}$$

$$= \frac{4x\sqrt{x}}{3a\sqrt{a}}$$

Si fit  $a = 1$ ; erit

$$\frac{z = 2\sqrt{ax}}{z^2 = 4ax} \quad y = \frac{4x\sqrt{x}}{3\sqrt{a}}$$

$$\frac{2}{16} ay^2 = x^3$$

Æquatio prima est ad parabolam Apollonianam (§. 388 *Anal.*) cujus parameter  $4a$ , abscissa  $x$ , semiordinata  $z$ : altera vero ad parabolam secundi generis, cujus parameter  $= \frac{2}{16} a$ , abscissa ad parabolam externam relata  $= x$ , semiordinata  $= y$ , seu abscissa  $= y$ , semiordinata  $= x$  (§. 519 *Analys.*) Construenda igitur est parabola, parametro  $4a$ , AMR (§. 393 *Anal.*) & alia secundi generis, cujus parameter  $\frac{2}{16} a$ , ANT (§. 581 *Anal.*): erit  $PM = z$  abscissa,  $PN = AQ = y$  semiordinata curvæ, à cujus rectificatione pendet constructio curvæ temporis. Ut curvæ hujus natura intelligatur, substituatur in æquatione  $x^3 = \frac{2}{16} ay^2$  valor ipsius  $x = z^2 : 4a$  ex æquatione prima inventus, erit ob  $x^3 = z^6 : 64a^3$  æquatio ad illam curvam

$$\frac{z^6}{64a^3} = \frac{2}{16} ay^2$$

adeoque  $z^6 = 36a^4 y^2$  quæ est curva quinti generis (§. 382 *Analys.*) ex familia parabolæ, seu paraboliformium (§. 519 *Analys.*).

Sit DMA quadrans circuli, cujus Tab. radius  $CA = a$ ,  $CP = x$  erit  $Mm =$  XIV.a  
 $adx : \sqrt{(a^2 - x^2)}$  (§. 153 *Anal. infin.*),  
 adeoque  $dt = adx : \sqrt{(a^2 - x^2)} \sqrt{ax}$ , quod Fig. 143.  
 elementum cum coincidat cum eo, quod paulo ante (§. 349) pro inveniendâ curva Isochrona paracentrica reperimus; quæ

Tab. XIV.b. Fig. 142.

quæ ad ejus summationem spectant, ibidem relegenda sunt.

Sit CMD cyclois, AOD semicirculus genitor, DN =  $x$ , AD =  $a$ , erit AN =  $a - x$ . Quare cum Mm =  $dx\sqrt{a}$ :  $\sqrt{x}$  (§. 168. *Analys. infin.*); erit

$$\begin{aligned} dt &= \frac{dx\sqrt{a}}{\sqrt{(a-x)}\sqrt{x}} \\ &= \frac{dx\sqrt{a}}{\sqrt{(ax-x^2)}} \\ &= \frac{adx\sqrt{a}}{a\sqrt{(ax-x^2)}} \\ t &= \frac{\sqrt{a}}{a} \int \frac{adx}{\sqrt{(ax-x^2)}} \end{aligned}$$

Enimvero  $\int (adx : \sqrt{(ax-x^2)})$  = arcui DO (§. 157. *Analys. infin.*).  $\sqrt{a}$  =  $\sqrt{AD}$  &  $a$  = AD. Ergo tempus descensus per arcum MC =  $\sqrt{AD}$ . DO : AD.

Quodsi ergo  $x$  five DN degeneret in  $a$  five AD, erit tempus descensus per semicycloidem CMD =  $\sqrt{AD}$ . DOA : DA.

#### PROBLEMA LI.

Tab. XIV. b Fig. 140. 354. Determinare tempus descensus in convexitate curvæ in quacunqve gravitatis hypothesi, five directiones sint parallela five convexa.

#### RESOLUTIO.

Sit ANR curva, per quam grave descendit, AP =  $x$ , PN =  $y$ , erit Nn =  $\sqrt{(dx^2+dy^2)}$ . Sit celeritas in P acquisita =  $v$ , erit ut in Probl. preced. (§. 353.), si elementum temporis fuerit  $dt$ ,  $dt = \sqrt{(dx^2+dy^2)} : v$ .

In hypothesi GAILLÆANA  $v = \sqrt{x}$ . Ergo  $dt = \sqrt{(dx^2+dy^2)} : \sqrt{x}$ . Quare si ex æquatione ad curvam descensus substituatur ut ibidem valor ipsius  $dy^2$ ; prodibit æquatio ad curvam temporis.

Sit ANR parabola; erit (§. 21. *Anal. infin.*)

$$\begin{aligned} \frac{adx}{2y} &= dy \\ \frac{adx}{2y} &= dy \\ \frac{dy^2}{dx} &= \frac{a^2 dx^2}{4y^2} = \frac{a^2 dx^2}{4ax} \\ \text{Quare} \\ dt &= \sqrt{\left(dx + \frac{a^2 dx^2}{4ax}\right)} : \sqrt{x} \\ &= \frac{dx \sqrt{(4ax+a^2)}}{\sqrt{4ax} \sqrt{x}} \\ &= \frac{dx \sqrt{(4ax+a^2)}}{2\sqrt{ax^2}} = \frac{dx \sqrt{(ax+\frac{1}{4}a^2)}}{x\sqrt{a}} \\ t &= \int dx \sqrt{(ax+\frac{1}{4}a^2)} : x\sqrt{a} \end{aligned}$$

Quare si hic valor sumitur pro spatio curvilineo per  $\sqrt{a}$  diviso; erit semiordinata curvæ, à cujus quadratura constructio curvæ temporis pendet,  $\sqrt{(ax+\frac{1}{4}a^2)} : x$ . Est vero  $\sqrt{(ax+\frac{1}{4}a^2)}$  semiordinata parabolæ, cujus parameter =  $a$ , si abscissæ à foco, cujus distantia à vertice =  $\frac{1}{4}a$  (§. 396. *Analys.*) computentur. Quare curvæ quadrandæ vertex est in foco parabolæ & assumpta parametro  $a$  pro unitate, semiordinata curvæ, à cujus quadratura constructio curvæ temporis pendet, est quarta proportionalis ad parabolæ abscissam à centro computatam, semiordinatam & parametrum. Sit semiordinata hujus curvæ =  $v$ , erit

$$v =$$

$$\frac{v = a\sqrt{(4ax + a^2)} : 2x}{\frac{vx = \frac{1}{2}a\sqrt{(4ax + a^2)}}{v^2x^2 = a^3x + \frac{1}{4}a^4}}$$

Est igitur curva tertii generis (§. 382 *Analys.*), sed facillimæ, quemadmodum apparet, constructionis.

Quodsi constructionem curvæ temporis reducere volueris ad rectificationem alicujus curvæ, cujus Elementum =  $\sqrt{(dz^2 + dy^2)}$ , abscissa scilicet existente  $z$ , femiordinata  $y$ ; erit

$$\frac{4axdx^2 + a^2dx^2}{4ax^2} = dz^2 + dy^2$$

Fiat

$$\begin{aligned} dz^2 &= \frac{4axdx}{4ax^2} & dy^2 &= \frac{a^2dx^2}{4ax^2} \\ &= dx^2 : x & &= adx^2 : 4x^2 \\ \frac{dz}{dx} &= x^{-1/2} & \frac{dy}{dx} &= \frac{dx\sqrt{a}}{2x} \\ \frac{z}{2} &= 2x^{1/2} & y &= \int \frac{dx\sqrt{a}}{2x} \\ z &= 2\sqrt{x} & & \end{aligned}$$

Est vero  $\sqrt{x}$  femiordinata parabolæ, cujus parameter = 1, (§. 392 *Anal.*) &  $\int \frac{dx}{x}$  spatium hyperbolicum asymptoticum, cujus latus potentia = 1 (§. 120 *Anal. infin.*). Quare curva, à cujus rectificatione pendet curvæ temporis constructio, construatur, si abscissæ fiant femiordinatis parabolæ duplis, femiordinatæ autem spatiis hyperbolicis dimidiis per  $\sqrt{a}$  divisis æquales, axe parabolæ existente simul Asymptoto hyperbolæ. Arcus hujus curvæ erunt ut tempora descensus per convexitatem parabolæ.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.

Si curva ANR fuerit Cyclois & diameter circuli genitoris = 1, erit  $Nz = dx : \sqrt{x}$  (§. 168 *Analys. infin.*), adeoque  $dt = dx : x$ . Pendet adeo temporis determinatio à quadratura hyperbolæ intra asymptotos (§. 120 *Analys. infin.*): Et quoniam  $t = \int dx : x$ , sed  $\int dx : x$  logarithmus ipsius  $x$  sumtus in logarithmica, cujus subtangens = 1 (§. 243 *Analys. infin.*), tempus descensus per convexitatem Cycloidis etiam per Logarithmos determinari potest.

DEFINITIO XL.

355. Curvæ Brachystochrona est, per quam grave tempore minore à puncto dato ad aliud datum, quam per quamvis aliam, descendit. Dicitur etiam *Oligochrona*, item *Curva celerrimi descensus*.

SCHOLIUM.

356. Problema hoc proposuit JOANNES BERNOULLI. *Analysi suppressa Cycloidem esse monuerunt LEIBNITIUS (a) & HOSPITALIUS (b). Solutionem integram exhibuit JACOBUS BERNOULLI (c), Methodo Synthetica ex natura descensus celerrimi quandam ejus proprietatem deducens, quam Cycloidi convenire postea ostendit. JOANNES vero (d) ex fundamentis Dioptricis id solvit, propterea quod advertit eam eandem esse cum curvatura radii per medium uniformiter densum propagati. Equidem solutio facilis videri poterat prima fronte. Cum enim tempus descensus per arculum Mm infinite parvum sit minimum, hoc vero sit  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} : \sqrt{x}$  in hypothese GALILÆANA (§. 354), non alia re opus esse videbatur,*

(a) In Actis Eruditorum. A. 1697 p. 203.  
 (b) Ibid. p. 217.  
 (c) Ibid. p. 212.  
 (d) Ibid. p. 207. & seqq.

tur, quam ut ejus differentiale ponatur nihilo æquale (§. 63. *Analys. infin.*). Enim vero tentanti apparebit, sic nos delabi ad æquationem differentialem tertii gradus. Alia igitur via incedere libet, quæ nos tandem deducit ad analogiam JOANNIS BERNOULLI sine supposita identitate Brachystochronæ cum curvatura radii per medium non uniformiter densum.

PROBLEMA LII.

357. *Invenire Curvam Brachystochronam sive celerrimi descensus.*

RESOLUTIO.

Sint semiordinatæ PM, *pm* & Qn infinite propinquæ, & Pp = pQ; erunt arcus Mm & mn infinite parvi, & demissis perpendicularibus MR & mO, erectaque perpendiculari nS ipsi pm continuatæ in S occurrente, erit MR = mO = nS & RS respectu arcus Mn constans.

Sit jam AP = x, PM = y; erit Pp = pQ = MR = nS = dx, mR = dy & Mm = √(dx² + dy²). Sit RS = b; erit mS = On = b - dy, adeoque mn = √(dx² + b² - 2bdy + dy²).

Quoniam motus per Mm est æquabilis, erit toto tempusculo descensus celeritas constans, nempe ea, quæ descensu per altitudinem AP acquisita. Ex eadem ratione celeritas in descensu per arculum mn constans est, nempe ea, quæ descensu per altitudinem Ap acquisita. Sit prior = c, posterior = C, erit tempus descensus per Mm = √(dx² + dy²) : c & tempus per mn = √(dx² + b² - 2bdy + dy²) : C (§. 31.), consequenter tempus descensus per Mm + mn = dt =  $\frac{\sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{c} + \frac{\sqrt{(dx^2 + b^2 - 2bdy + dy^2)}}{C}$ .

Quoniam tempusculum minimum est, & dx constans, dy vero variabilis, erit (§. 63. *Anal. infinit.*).

$$ddt = \frac{dyddy}{c\sqrt{(dx^2 + dy^2)}} + \frac{dyddy - bddy}{C\sqrt{(dx^2 + b^2 - 2bdy + dy^2)}}$$

hoc est

$$\frac{dy}{c\sqrt{(dx^2 + dy^2)}} = \frac{b - dy}{C\sqrt{(dx^2 + b^2 - 2bdy + dy^2)}}$$

five

$$\frac{mR}{c \cdot Mm} = \frac{mS}{C \cdot mn}$$

---


$$C \cdot mn \cdot mR = c \cdot Mm \cdot mS$$

adeoque

$$Mm : mn = C \cdot mR : c \cdot mS$$

Jam in hypothesi GALILÆANA, C = √Ap & c = √AP (§. 87.). Quare Mm : mn = mR. √Ap : mS. √AP

Quæ est proprietas curvæ Brachystochronæ à JACOBO BERNOULLI alia via eruta.

Quod si fiat Mm = mn, erit C. mR = c. mS, adeoque.

$$c : C = mR : mS$$

$$\& c : mR = C : mS$$

hoc est, elementa semiordinatarum mR & mS sive nO sunt ut celeritates acquisitæ, seu ad has celeritates in ratione constante : id quod est fundamentum solutionis JOANNIS BERNOULLI ex dioptriciis principiis ab ipso derivatum.

Quod si jam arcus Mm = √(dx² + dy²) sumatur constans, dx fiet variabilis. Sit celeritas in M acquisita = v & ratio constans ipsius dy ad eandem = Mm : a, erit;

dy :

Tab. XIV. b Fig. 144.



$$\begin{aligned} dy : v &= \sqrt{(dx^2 + dy^2)} : a \\ \frac{ady}{a^2 dy^2} &= \frac{v \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{v^2 dx^2 + v^2 dy^2} \\ \frac{ady^2}{a^2 dy^2} - \frac{v^2 dy^2}{v^2 dx^2} &= \frac{v^2 dx^2}{a^2 - v^2} \\ dy^2 &= \frac{v^2 dx^2}{a^2 - v^2} \\ dy &= \frac{v dx}{\sqrt{(a^2 - v^2)}} \end{aligned}$$

Formula hæc generalis est & in omni hypothesi gravitatis, etiam utcumque variabilis, obtinet. Quodsi jam substituaturs valor ipsius  $v$  ex data gravitatis hypothesi, prodibit formula specialis.

Sit itaque in hypothesi gravitatis constantis

$$\begin{aligned} v^2 &= ax, \text{ adeoque } v = \sqrt{ax} \\ \text{crit } dy &= \frac{dx \sqrt{ax}}{\sqrt{(a^2 - ax)}} \\ &= \frac{dx \sqrt{x}}{\sqrt{(a - x)}} \\ &= \frac{xdx}{\sqrt{(ax - x^2)}} \end{aligned}$$

Est vero  $xdx : \sqrt{(ax - x^2)}$  differentia inter  $adx : 2\sqrt{(ax - x^2)}$  &  $(adx - 2xdx) : 2\sqrt{(ax - x^2)}$ . Ergo

$$\begin{aligned} dy &= \frac{adx}{2\sqrt{(ax - x^2)}} - \frac{(adx - 2xdx)}{2\sqrt{(ax - x^2)}} \\ y &= \int \frac{adx}{2\sqrt{(ax - x^2)}} - \int \frac{adx - 2xdx}{2\sqrt{(ax - x^2)}} \\ &= \int \frac{adx}{2\sqrt{(ax - x^2)}} - \sqrt{(ax - x^2)} \end{aligned}$$

Est vero  $\sqrt{(ax - x^2)}$  semiordinata circuli DH diametro CB =  $a$  descripti (§. 377 *Analys.*) &  $\int (adx : 2\sqrt{(ax - x^2)})$  arcus CH (§. 157 *Anal. infin.*). Quam-

obrem  $y = \text{arculi CH} - \text{DH} = \text{PM}$ . Est vero in Cycloide MH = arcui BH (§. 575 *Analys.*) & AC = PM + MH + HD = arc. CH + arc. HB (§. 574 *Analys.*). Ergo in eadem arc. CH = PM + HD, consequenter PM est æqualis differentię inter arcum CH & ejus sinum HD.

Curva igitur celerrimi descensus five Brachystochrona est Cyclois, adeoque eadem cum Tautochrona (§. 352).

COROLLARIUM.

358. Quoniam in Cycloide PM = arc. CH - HD (§. 357); si utrumque æquationis membrum multiplices per dimidium circuli genitoris radium =  $\frac{1}{2} OC$ , prodibit

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} OC. PM &= \frac{1}{2} OC. \text{arc. CH} - \frac{1}{2} OC. HD \\ \frac{1}{2} OC. \text{arc. CH} &= \text{Sect. COH} \text{ (§. 435. Geom.)} \\ \frac{1}{2} OC. HD &= \Delta COH \text{ (§. 392 Geom.)} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} OC. PM = \text{Sect. COH} - \Delta COH = \text{segmento HIC} \text{ (§. 336 Geom.)}$$

Est adeo Cyclois externa segmentorum circularium repræsentatrix.

SCHOLIUM I.

359. *Elegantem hanc Cycloidis proprietatem, etsi ad Mechanicam non spectet, hic tamen annotari consultum fuit, ubi ex demonstratis tanta facilitate fluit. Poterat vero etiam ex formula analytica deduci. Etenim elementum arcus HC =  $adx : 2\sqrt{(ax - x^2)}$  (§. 157 *Anal. infin.*), qui in  $\frac{1}{2} CO = \frac{1}{4} a$  ductus producit elementum sectoris =  $a^2 dx : 8\sqrt{(ax - x^2)}$  (§. 435 *Geom.*). Quodsi porro DH altitudinem  $\Delta COH = \sqrt{(ax - x^2)}$  in basin ejus dimidiam,  $\frac{1}{2} CO = \frac{1}{4} a$  ducas, prodibit area  $\Delta COH = \frac{1}{4} a \sqrt{(ax - x^2)}$  (§. 392 *Geom.*), cujus adeo elementum =  $(a^2 dx - 2ax dx) : 8\sqrt{(ax - x^2)}$ .*

Tab. CV. fig. 45.

Quare si hoc elementum trianguli ab elemento sectoris auferas, relinquetur elementum segmenti  $HIC = axdx : 4\sqrt{(ax - x^2)}$  (§. 436 *Geom.*). Est vero elementum ipsius  $PM = xdx : \sqrt{(ax - x^2)}$  (§. 357). Quodsi ergo idem in  $\frac{3}{4}a$  seu  $\frac{1}{2}CO$  ducas, prodibit  $axdx : 4\sqrt{(ax - x^2)}$  elementum sectoris modo repertum, consequenter sector  $= \frac{1}{4}a \int (xdx : \sqrt{(ax - x^2)}) = \frac{1}{2}CO. PM.$

## SCHOLIUM II.

360. Quodsi detur altitudo, per quam grave ad locum datum in linea curva celerrime descendere debet, cyclois describenda est per duo puncta data. Quamobrem ut problema ad praxin transferri possit, ostendendum adhuc erit, quomodo cyclois per data duo puncta describatur.

## PROBLEMA LIII.

Tab. 361. Describere cycloidem per data  
XV. duo puncta A & C transeuntem.  
Fig. 146.

## RESOLUTIO.

1. Jungantur puncta data A & C recta AC &
2. Describatur cyclois quacunque ABD, circulo genitore END, quæ rectam AC in B fecet.
3. Fiat deinde  $AB : AC = ED : FG$ ; erit FG diameter circuli genitoris cycloidis per puncta A & C transeuntis; quo dato
4. Cyclois ACG describi potest (§. 573 *Anal.*).

## DEMONSTRATIO.

Id unice demonstrandum, esse  $AB : AC = ED : FG$ , quod ut fiat, ducantur rectæ SP & TQ ad AH perpendiculares, quæ erunt inter se parallelæ (§. 256 *Geom.*). Et quoniam HA,

DE & GF perpendiculares ad AF per constr. erunt quoque eadem inter se parallelæ (§. cit. *Geom.*). Et SP ad ED, TQ ad FG perpendiculares (§. 230 *Geom.*), consequenter (§. 268 *Geom.*)  $AB : AC = SB : TC = AS : AT = EP : FQ$  ob  $EP = AS$  &  $AT = FQ$  (§. 168 *Arithm.*). Sed  $SB = arc. EN - PN$  &  $TC = arc. FR - QR$  (§. 357). Ergo  $EP : FQ = arc. EN - PN : arc. FR - QR$  (§. 167 *Arithm.*), consequenter  $DE. EP : FG. FQ = segm. EN : segm. FR$  (§. 185 *Arithm.*), quia scilicet  $\frac{1}{2}DE$  (arc. EN - PN) = segm. EN &  $\frac{1}{2}FG$  (arc. FR - QR) = segm. FR (§. 436 *Geom.*). Est vero  $DE : EN = EN : EP$  &  $FG : FR = FR : FQ$  (§. 330 *Geom.*), adeoque  $DE. EP = EN^2$  &  $FG. FQ = FR^2$  (§. 377 *Geom.*), consequenter  $EN^2 : FR^2 = segm. EN : segm. FR$  (§. 167 *Arithm.*). Sunt itaque segmenta EN & FR similia (§. 406 *Geom.*) & hinc etiam arcus cognomines similes sunt, consequenter  $EP : FQ = ED : FG$  (§. 12 *Trigon.*). Quare cum sit  $AB : AC = EP : FQ$  per demonstrata; erit etiam  $AB : AC = ED : FG$  (§. 167 *Arithm.*). Q. e. d.

## Aliter.

Potest idem multo brevius ex principiis nostris similitudinis ostendi, alibi propositis (a); scilicet cum omnes cycloides sint inter se similes, erunt omnes lineæ eodem modo ad eas determinatæ proportionales. Sed AB & AC sunt chordæ arcuum cycloidorum eandem basin

(a) In Actis Erudit. A. 1715 p. 213 & seqq.

basin AF sub eodem angulo secantes, adeoque eodem modo determinatæ, & diametri circulorum genitorum sunt rectæ ex medio basium normaliter erectæ, consequenter itidem eodem modo determinatæ. Patet ergo esse diametros circulorum genitorum ED & FG ipsas AB & AC proportionales *Q. c. d.*

SCHOLIION I.

362. Patet hinc præstantia principiorum nostrorum similitudinis, ob quam merentur, quæ in Geometriam recipiantur, & ob quam etiam in eandem ipsis aditum aperuimus. Sanè si quis analysin similitudinis invenire vellet, ex istis principiis deducenda forent, quæ ad eam pertinent. Per eam vero analysin, quæ ad similitudinem spectant, multo facilius reperirentur, quam per analysin magnitudinum qua nunc sola utimur in Geometria.

SCHOLIION II.

363. Supposuimus in demonstratione, segmenta circulorum similia esse in ratione duplicata chordarum, nempe  $EN^2 : FR^2 = \text{segm. EN} : \text{segm. FR}$  vi principiorum Geometria, ex quibus id facile colligitur. Quod si quis non videat, quomodo idem inde inferatur, demonstrationem hic subijcere licet per modum Lemmatis & quidem multo universalius.

LEMMA I.

364. Sectors similes & segmenta similia circuli habent rationem duplicatam radiorum, subtensarum & ipsorum arcuum: immo segmenta similia curvarum similium habent rationem duplicatam subtensarum & ipsorum arcuum, aliarumque linearum quarumcumque eodem modo determinatarum.

DEMONSTRATIO.

Sector FOR æqualis est triangulo rectangulo, cujus basis est arcus FR, altitudo radius FO: & sector ENQ æqualis est triangulo rectangulo, cujus basis est arcus EN, altitudo radius EQ (§. 415. *Geom.*). Est vero sector FOR similis sectori ENQ *per hypoth.* quare cum sectores per rationem arcuum ad radios discerni possint, erunt arcus FR & EN radiis suis FO & EQ proportionales (§. 24 *Arithm.*), consequenter triangula, quibus sectores æquales sunt, inter se similia sunt (§. 183 *Geom.*). Sunt igitur sectores in ratione duplicata radiorum & arcuum (§. 398 *Geom.*). *Quod erat unum.*

Quoniam arcus FR & EN similes sunt, cum alias segmenta per eorum ad peripheriam rationem discerni possent, contra hypothefin (§. 24 *Arithm.*), in triangulis FOR & EQN anguli cognomines sunt æquales (§. 141 *Geom.*), consequenter cum utrobique crura sibi invicem sint æqualia (§. 40. *Geom.*), ipsa triangula similia sunt (§. 183 *Geom.*), adeoque in ratione duplicata radiorum (§. 398 *Geom.*). Est igitur sector FRO : sect. ENQ =  $\triangle FRO : \triangle ENQ$  (§. 167 *Arithm.*), consequenter sect. FRO —  $\triangle FRO$  : sect. ENQ —  $\triangle ENQ$  = sect. FRO : sect. ENQ (§. 189 *Arithm.*). Ergo cum sect. FRO —  $\triangle FRO$  = segmento FR & sect. ENQ —  $\triangle ENQ$  = segmento EN, quod per se patet, segment. FR : segm. EN = sector FRO : sect. ENQ (§. 168 *Arithm.*). Sunt vero

sectores FRO & EQN in ratione duplicata radiorum FO & EQ, atque arcuum FR & EN *per demonstr.* Ergo & segmenta FR & EN in ratione duplicata radiorum & arcuum sunt (§. 167 *Arithm.*). *Quod erat secundum.*

Arcus FR & EN sunt similes *per hypo.* Ergo eorum sinus (§. 12 *Trigon.*), consequenter & sinum duplæ (§. 2. *Trigon.*) chordæ sunt arcubus proportionales (§. 178 *Arithm.*). Sunt vero sectores atque segmenta in ratione duplicata arcuum, *per demonstrata.* Ergo & in ratione duplicata chordarum (§. 167. 260 *Arithm.*).

Idem vero multo universalius de quibuscunque curvarum similium segmentis similibus demonstratur.

Tab. Si curvæ fuerint similes, rectæ conf-  
XV. tantes, quæ æquationem ingrediuntur,  
Fig. eandem inter se rationem habent, cum  
47. alias per eam distingui possent, (§. 24  
*Arithm.*). Quare si porro segmenta  
similia esse debent, necesse est ut abscissæ AP & Ap ad rectas illas constantes  $a$  &  $b$  utrobique in eadem sint ratione (§. *cit.*), consequenter  $AP:Ap = a:b$ . Quare si  $AP = x$ ; erit  $Ap = bx : a$ . Et quoniam semiordinatæ PM & pm, chordæ AM & am, arcusque cognomines eodem modo determinantur; erit  $AM:am = \text{arc. } AM:\text{arc. } am = PM:pm = AP:ap = a:b$  (§. 120 *Geom.*).

Quare si  $PM = y$ ; erit  $pm = by : a$ . Est vero Elementum curvæ  $AMP = ydx$ , alterius  $amp = b^2 ydx : a^2$  (§. 98 *Anal. infn.*), adeoque curvilineum  $AMP:amp = \int ydx : \frac{b^2}{a^2} \int ydx = a^2 : b^2 = AM^2 : am^2$

$= PM^2 : pm^2 = AP^2 : ap^2$ . Porro quia  $AP:PM = ap:pm$  per demonstr. & anguli ad P & p recti *per construct.*  $\triangle APM \sim \triangle apm$  (§. 183 *Geom.*), consequenter  $\triangle APM:\triangle apm = AM^2:am^2$  (§. 398 *Geom.*). Cum itaque sit  $APM:apm = \triangle APM:\triangle apm$  (§. 167 *Arithm.*), erit segment.  $AM:\text{segm. } am = APM:apm$  (§. 189 *Arithm.*)  $= AM^2:am^2 = PM^2:pm^2 = AP:ap = \text{arc. } AM^2:\text{arc. } am^2$  (§. 167 *Arithm.*), consequenter in ratione duplicata linearum quarumcunque aliarum eodem modo determinatarum, veluti si ex P & p demittantur in AM & am perpendiculara PL & pl, rectarum PL & pl, per demonstrata. *Quod erat tertium.*

#### SCHOLIION.

365. *Qui ad demonstrationem partis ultimæ Lemmatis præsentis attendit, is fecunditatem & utilitatem principiorum nostrorum similitudinis abunde perspiciet: quæ in Philosophia prima tanquam sede genuina ex notionibus puris independenter ab omni imagine derivavimus (a).*

#### DEFINITIO XLI.

366. *Curva Synchrona est, ad cuius singula puncta D, m, M eodem Tab. XV. tempore minimo grave pervenit.* Fig. 148.

#### SCHOLIION.

367. *Curvam hanc primus invenit JOANNES BERNOULLI (b). Ex hætenus autem traditis mira facilitate eam deducere li. et.*

#### PROBLEMA LIV.

368. *Construere curvam Synchronam DmM, data altitudine perpendiculari CD, per quam grave dato tempore descen-*

(a) Ontolog. §. 215. & seqq.

(b) Vid. Acta Eruditorum An. 1697.

descendit, quo ad singula puncta Syn-  
chrona pervenit.

RESOLUTIO.

1. Describantur Cycloides quocunque CM, Cm &c. commune initium in C habentes (§. 573 *Analys.*)
2. Erigatur in communi initio C ad basin CA perpendicularis CD, quæ sit altitudini datæ æqualis, per quam grave dato tempore descendit, seu, quod perinde est, per quam datur tempus, quo grave ad singula puncta D, m, M Synchronæ minimo tempore pervenit (§. 357).
3. Fiat arcus AN æqualis mediæ proportionali inter diametrum circuli genitoris AB & altitudinem CD.
4. Ex puncto N ducatur basi AC parallela NM secans Cycloidem in M: erit punctum in M Synchrona.  
Eodem modo in Cycloidibus ceteris Cm determinantur puncta in Synchrona ope circulorum genitorum ipsis respondentium.

DEMONSTRATIO.

AB: arc. AN = arc. AN: CD *per constr.*

$$\frac{AN = \sqrt{AB} \cdot \sqrt{CD}}{AN \cdot \sqrt{AB} = AB \cdot \sqrt{CD}}$$

$$\frac{AN \cdot \sqrt{AB}}{AB} = \sqrt{CD}$$

Est vero AN.  $\sqrt{AB}$ : AB tempus descensus per arcum Cycloidis CM (§. 353) &  $\sqrt{CD}$  tempus descensus per altitudinem CD (§. 87). Quare grave eodem tempore pervenit ad punctum M, quo ad punctum D descendit. Quoniam itaque eodem modo ostenditur,

quod ad quodvis punctum m eodem tempore perveniat, quo per CD descendit; curva DmM est Synchrona (§. 366).

DEFINITIO XLII.

369. *Curva Æquilibrationis dicitur, in qua existens pondus vel facoma semper æquilibrium faciat cum ponte sublicio circa axem convertibili.*

SCHOLIUM.

370. *Problema hoc solverunt (a) MARCHIO HOSPITALIUS & JACOBUS BERNOULLI diversa ratione. JOANNES BERNOULLI (b) identitatem curvæ æquilibrationis cum Cycloide descripta ex circumvolutione rotæ Super rota æquali demonstravit & Problema generalius per communem Geometriam solvit.*

PROBLEMA LV.

371. *Invenire Curvam Æquilibrationis.* Tab. XV. Fig. 149.

RESOLUTIO.

Sit pons sublicius AB, centrum gravitatis in B habens & circa axem A versatilis. Sit funis BCM trochleæ C circumductus, cujus una extremitas B pontem, altera M facoma sustinet. Cum potentia laterales agentes juxta directiones BC & BA æquipollent ponderi pontis agentis juxta directionem CA (§. 241. 280); si CA exponit pondus pontis absolutum, BC exponet potentiam juxta BC agentem, cum qua æquilibratur pondus M. Similiter cum pondus M ad descensum sollicitetur juxta directionem CK & in curvam agat juxta directionem MK ad curvam normalem; si CM consideretur ut pars ponderis M, quæ æquivalet poten-

(a) In Actis Eruditorum, An. 1695. p. 56. & 65.  
(b) In Actis Eruditorum, An. 1695. p. 60.

potentiæ ut BC, integrum pondus M erit ut CK (§§. cit.). Quare si fit quædam recta  $b$  ut pondus absolutum M, erit CK:CM =  $b$ :BC.

Sit jam CP =  $x$ , PM =  $y$ , BC + CM =  $a$ ; erit CM =  $\sqrt{(x^2 + y^2)}$  & hinc BC =  $a - \sqrt{(x^2 + y^2)}$ . Est vero subnormalis PK =  $ydy$ :  $dx$  (§. 35 Anal. infinit.) & hinc CK = CP + PK =  $x + ydy$ :  $dx$  =  $(x dx + y dy)$ :  $dx$ . Quare cum fit CK:CM =  $b$ :BC per demonstr. erit

$$\frac{x dx + y dy}{dx} : \sqrt{(x^2 + y^2)} = b : a - \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

$$x dx + y dy : dx \sqrt{(x^2 + y^2)} = b : a - \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

$$\frac{b dx \sqrt{(x^2 + y^2)} = a x dx + a y dy}{-x dx \sqrt{(x^2 + y^2)} - y dy \sqrt{(x^2 + y^2)}}$$

$$b dx = \frac{a x dx + a y dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)}} - x dx - y dy$$

$$bx = a \sqrt{(x^2 + y^2)} - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} y^2$$

$$bx + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 = a \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

quæ est æquatio ad curvam æquilibriumis, cui, si libuerit, etiam quantitas quædam constans addi, vel ab eadem demi potest (§. 95 Anal. infinit.).

Ut curva hæc construatur, radio CD =  $a$  describatur semicirculus FDE & ducatur DG ad FE normalis. Fiat CG =  $z$ , erit GD =  $\sqrt{(a^2 - z^2)}$  (§. 417 Geom.) & (§. 268 Geom.).

$$CG : CD = CP : CM$$

$$z : a = x :$$

$$\text{Est itaque } \frac{z \cdot CM}{a} = x$$

$$\text{Porro } CD : DG = CM : PM$$

$$a : \sqrt{(a^2 - z^2)} = CM : y$$

$$\frac{CM \cdot \sqrt{(a^2 - z^2)}}{a} = y$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{2} x^2 = z^2 \cdot CM^2 : 2a^2$$

$$\frac{1}{2} y^2 = (a^2 - z^2) \cdot CM^2 : 2a^2$$

Quodsi hi valores in æquatione ad curvam substituantur, prodibit

$$a \cdot CM = \frac{bz \cdot CM}{a} + \frac{z^2 \cdot CM^2}{2a^2}$$

$$+ \frac{a^2 \cdot CM^2 - z^2 \cdot CM^2}{2a^2}$$

$$= \frac{bz \cdot CM}{a} + \frac{1}{2} CM^2$$

$$2a = \frac{2bz}{a} + CM$$

$$CM = 2a - \frac{2bz}{a}$$

Punctum itaque quodlibet M facile determinatur, cum non alia re opus sit, quam ut ad radium circuli CD seu longitudinem funis BC + CM, duplum rectæ illius, quæ pondus absolutum facomatis exponit, & rectam CG pro lubitu assumendam quærat tertiam proportionalis, ac ex diametro circuli FE auferatur.

Si fit  $a = b$ , erit CM =  $2a - 2z$  = 2GE: qui est casus omnium simplicissimus.

Quando CM degenerat in CN, hoc est, quando fit  $a$ , curva semicirculum in N fecat, tumque est

$$a = 2a - \frac{2bz}{a}$$

$$0 = a - 2bz : a$$

$$\frac{a^2}{2b} = z$$

Patet adeo, CG esse tertiam proportionalem ad  $2b$  &  $a$ , si curva peripheriam circuli secat.

Quo-

Quoniam subtangens =  $ydx : dy$   
 (§. 20 *Anal. infin.*) & vi superiorum

$$dx = \frac{aydy - ydy\sqrt{(x^2 + y^2)}}{(b+x)\sqrt{(x^2 + y^2)} - ax}$$

$$\frac{ydx}{dy} = \frac{ay^2 - y^2\sqrt{(x^2 + y^2)}}{(b+x)\sqrt{(x^2 + y^2)} - ax}$$

Quare si  $CM = \sqrt{(x^2 + y^2)} = a$

$$\text{erit } \frac{ydx}{dy} = \frac{ay^2 - ay^2}{(b+x)a - ax} = 0$$

Ergo ubi curva peripheriam circuli fecat, subtangens evanescit, adeoque semiordinata eam tangit, consequenter N est punctum infimum, sicque in nostro casu Mechanico arcus CN sufficit.

Quodsi in situ pontis horizontali AI longitudo funis  $IC = CE = CN = a$  & præterea  $b = a$ , vel  $b > a$ ; tota curvæ portio CMN sufficit; si vero  $CI < CN$ , & in situ horizontali pondus jam fuerit in M, satisfacit portio, MN, quoniam tum CM est differentia inter CN & CI.

Si sit  $CI = c$ , reliqua sint ut ante, erit

$$CM = 2a - \frac{2bz}{a} = a - c$$

$$a + c = \frac{2bz}{a}$$

$$\frac{a^2 + ac}{2b} = z$$

Punctum adeo M determinatur, si fiat  $CG = (a^2 + ac) : 2b$ , quæ est quarta proportionalis ad  $2b$ ,  $a$  &  $a + c$ , hoc est, ad duplam lineam, quæ pondus M exprimit, radium circuli CE seu funis integri longitudinem ob  $IC + CM = CE$  & compositam ex radio & portione funis IC.

Wolffi Oper. Mathem. Tom. II.

Sit  $CM = 0$   
 erit  $2a - 2bz : a = 0$   
 $a^2 - abz = 0$   
 $a^2 : b = z$

Tab. XV. Fig. 151. n. 1.

Habemus itaque  $b : a = a : z$ . Quare si  $b = a$ ; erit  $a = z$ , adeoque punctum D cadit in E, consequenter diameter FE curvam in centro C tangit.

Si  $b > a$ , etiam  $a > z$  (§. 149 *Arithm.*), recta igitur CD definiens punctum curvæ C adhuc in peripheriam EN cadit, consequenter curva ultra centrum continuari potest, adeoque in centro C axem FE secat.

n. 2.

Quando itaque CD coincidit in E; erit  $z = a$ , adeoque cum sit

$$x = z \cdot \frac{CM}{a} = z\sqrt{(x^2 + y^2)} : a = \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

$$\frac{x^2 = x^2 + y^2}{y = 0}$$

Curva ergo ultra centrum continuata axem secat in K. Quare cum ex constructione appareat, ab altera parte describi posse partem similem, curva in centro C nodum habet.

Si in æquatione ad curvam

$$a^2x^2 + a^2y^2 = b^2x^2 + bx^3 + \frac{1}{4}x^4 + bxy^2 + \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4$$

fiat  $y = 0$

$$\text{erit } a^2x^2 = b^2x^2 + \frac{1}{4}x^4 + bx^3$$

$$a^2 = b^2 + \frac{1}{4}x^2 + bx$$

$$a = b + \frac{1}{2}x$$

$$2a = 2b + x$$

Quando itaque  $b > a$ ; erit

$$-x = 2b - 2a$$

M

Unde

Unde intelligitur, punctum K à centro distare intervallo  $2b - 2a$ .

Si vero fuerit  $a > b$ ; erit

$$x = 2a - 2b$$

Ex quo apparet, curvam secare axem infra centrum C in L, ita ut CL fit  $2a - 2b$ .

Quodsi in æquatione ad curvam valor ipsius  $x$  sumatur negativus & ponatur  $y = 0$ , prodibit distantia puncti F à centro C, ubi axem secat. Nimirum cum ob  $y = 0$ ; fit

$$a^2 = b^2 + bx + \frac{1}{4}x^2$$

erit ob valorem ipsius  $x$  negativum.

$$a^2 = b^2 - bx + \frac{1}{4}x^2$$

$$a = \frac{1}{2}x - b$$

$$\begin{aligned} 2a + 2b &= x \\ &= CF \end{aligned}$$

Curva igitur in omni casu in se redit.

Quodsi maxima curvæ latitudo determinanda, cum sit

$$\frac{aydy}{\sqrt{(x^2+y^2)}} - ydy = bdx + xdx - \frac{axdx}{\sqrt{(x^2+y^2)}}$$

erit ob  $dy = 0$  (§. 63 Anal. infin.)

$$\frac{bdx + xdx - \frac{axdx}{\sqrt{(x^2+y^2)}}}{(b+x)\sqrt{(x^2+y^2)}} = 0$$

$$\sqrt{(x^2+y^2)} = \frac{ax}{b+x} = CM.$$

Ut igitur CM in casu maximi inveniri possit, valor ejus, quem supra reperimus  $= 2a - 2bz : a$ , exprimitur etiam hic per  $z$ , ita ut pro  $x$  substituatur valor ipsius per  $z$  expressus. Est vero juxta superiora  $CM = ax : z$ . Quare cum hic fit  $CM = ax : (b+x)$ ; erit:

$$z = b + x$$

$$z - b = x$$

$$CM = \frac{ax}{z} = \frac{az - ab}{z}$$

Habemus itaque

$$\frac{az - ab}{z} = 2a - \frac{2bz}{a}$$

$$\frac{a^2z - a^2b}{2bz^2 - a^2z} = \frac{2a^2z - 2bz^2}{2bz^2 - a^2z} = \frac{a^2b}{2b}$$

$$z^2 - \frac{a^2z}{2b} = \frac{1}{2}a^2$$

$$z^2 - \frac{a^2z}{2b} + \frac{a^4}{16b^2} = \frac{a^4}{16b^2} + \frac{1}{2}a^2$$

$$= \frac{a^4 + 8a^2b^2}{16b^2}$$

$$z - \frac{a^2}{4b} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} = \frac{a}{4b} \sqrt{(a^2 + 8b^2)}$$

$$z = \frac{a^2 + a\sqrt{(a^2 + 8b^2)}}{4b}$$

Quodsi  $a = b$ , erit  $z = \frac{a^2 + a\sqrt{(a^2 + 8a^2)}}{4a}$   
 $= \frac{1}{4}a + \frac{3}{4}a$

Quando in hoc casu  $z = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}a = a$ , Tab. XIV cum sit  $a = CE$ , curva axem in centro tangit juxta superiora. Ergo in casu maximi satisfacit radix falsa, nempe  $z = \frac{1}{4}a - \frac{3}{4}a = -\frac{1}{2}a$ : quod indicio est, valorem ipsius  $z$  sumi debere ex altera parte, nempe versus F in recta CF.

Quando  $b > a$ , curva KCF duplicem habet maximam semiordinatam, alteram nempe infra centrum, alteram supra idem, adeoque radix utraque servit, affirmativa infra centrum, negativa supra idem. In:



1. 3. In casu denique tertio, ubi  $a < b$ , radix positiva est major radio. Sed cum  $z = CG$  radio CE major fieri nequeat, *vi construct.*; radix negativa hic itidem locum habet: id quod denuo innuit, maximam applicatam cadere ultra centrum versus F.

SCHOLIION.

372. Illud hic notatu dignum est, quod pro diversa relatione quantitatum constantium  $a$  &  $b$ , quæ equationem ingrediuntur, curvæ ductus admodum variet, ita ut oculorum iudicio pro curvis non haberentur, quæ per eandem equationem definiuntur.

THEOREMA LI.

ab. 373. Si circulus X super alio equali V. Y rotetur, ita ut punctum rotationis ig. vel sit in ipsa peripheria, vel extra eam, 52. vel intra peripheriam circuli rotantis; curva hoc puncto descripta erit curva æquilibrationis.

DEMONSTRATIO.

Sit punctum rotationis extra peripheriam, veluti in M, & initium rotationis in V, ita ut initio punctum O cadat in V. Dico curvam CMN, quæ hac rotatione describitur, esse curvam æquilibrationis. Ducatur recta RS, quæ centra circulorum Y & X connectit & recta SM, in qua est punctum describens M producat, donec radio RV per initium rotationis V continuato in H occurrat. Quoniam arcus TV & TO, mensuræ angulorum R & S (§. 57 Geom.), æquales sunt per genesin curvæ CMN; erit  $RH = HS$  (§. 186 Geom.). Fiat  $RC = SM$  & ex centro C

radio  $CD = RV = SO$  describatur circulus & ex C per M ducatur radius CD, ex puncto vero D demittatur perpendicularis GD, quemadmodum in constructione curvæ æquilibrationis fecimus (§. 371). Fiat porro ut ibidem  $RV = OS = CD = a$ ,  $SM = RC = b$ ,  $CG = z$ . Quoniam  $RH = HS$  per demonstr. &  $RC = SM$  per constr. erit etiam  $CH = RM$  (§. 91 Arithm.), adeoque  $HC : HM = HR : HS$ , consequenter angulus  $GCD = HRT$  (§. 183 Geom.). Quare cum porro ob  $RT = TS$  &  $HR = HS$  angulus ad T rectus sit (§. 179. 147 Geom.), & ad G itidem rectus per construct. erit (§. 267 Geom.).

$$CG : CD = RT : RH$$

$$z : a = a :$$

Est itaque  $RH = a^2 : z$ , adeoque

$$CH = RH - RC = \frac{a^2}{z} - b.$$

Porro ob ang.  $CHD = \text{ang.} RHS$  per demonstrata; erit CM ipsi RS parallela (§. 255 Geom.), adeoque (§. 268 Geom.)

$$HR : RS = HC : CM$$

$$\frac{a^2}{z} : 2a = \frac{a^2}{z} - b : CM$$

five  $a^2 : 2a = a^2 - bz : CM$

$$\text{Ergo } CM = \frac{2a^3 - 2abz}{a^2}$$

$$= 2a - \frac{2bz}{a}$$

Est itaque punctum M in curva æquilibrationis, consequenter curva rotatione circuli X super circulo Y puncto M descripta curva æquilibrationis (§. 371).

Idem eodem modo ostenditur in iis casibus, ubi punctum describens O fuerit in peripheria, vel punctum describens K fuerit intra peripheriam circuli.

PROBLEMA LVI.

Tab. 374. *Data curva AB invenire curvam aliam LM, super qua in quocunque puncto pondus M datum sit in æquilibrio cum pondere alio B dato.*

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

Ducatur recta KO rectam CH ad angulos rectos secans. Quoniam CH est linea verticalis *per hypoth.* erit KO linea horizontalis (§.210). Demittantur perpendiculares BK & ME in lineam horizontalem KO ex punctis curvarum B & M, in quibus pondera æquilibrata constituuntur, quæ dicantur B & M; erit I centrum gravitatis ponderum

constans commune (§. 124). Quare B: M=EI: IK (§. 144). Est vero ob K & E rectos (§.78 *Geom.*) & verticales ad I æquales (§. 156 *Geom.*), ME: KB=EI: IK (§. 267 *Geom.*). Quare B: M=ME: KB (§.167 *Arithm.*) Demittantur ex M & B perpendiculares ad CH, nempe PM & BH; erit EM=IP & KB=IH (§.226 *Geom.*), adeoque B: M=IP: IH (§. 167 *Arithm.*). Quare si per hanc analogiam reperiat recta IP, datis ponderibus & recta IH (§.271 *Geom.*), & ducta PS ad CI perpendicularis portione funis CM tanquam radio ex puncto C intersecetur; erit in M punctum curvæ æquilibrationis quæsitum.

Quodsi æquatio ad curvam AB datur, facile reperiri potest æquatio ad curvam æquilibrationis per communes Algebrae regulas.

CAPUT IX

*De motu Pendulorum.*

DEFINITIO XLIII.

376. **P**endulum est grave quodlibet, ita suspensum, ut circa punctum aliquod vi gravitatis ascensus & descensus reciprocos continuare possit. Ascensus ille & descensus reciprocos *Oscillatio* penduli vocatur.

DEFINITIO XLIV.

Tab. 377. *Pendulum simplex* est quod constat unico pondere instar puncti

considerato & linea inflexili gravitatis experte circa centrum C convertibili AC appenso.

DEFINITIO XLV.

378. *Pendulum compositum* est quod pluribus ponderibus constat, eandem distantiam tum inter se, tum à centro, circa quod oscillationes fiunt, constanter servantibus.

## DEFINITIO XLVI.

379. *Axis oscillationis est recta lineæ horizontali apparenti parallela transiens per centrum, circa quod pendulum oscillatur.*

## THEOREMA LI.

ab.  
V.  
.44. 380. *Pendulum in B adductum per arcum circuli BA descendit & ad punctum aque alium D per arcum equalem ascendit: inde denuo in A descendit ac ad B ascendit, sicque reciprocos ascensus & descensus continuat.*

## DEMONSTRATIO.

Sit HI linea horizontalis & BD ipsi parallela. Si globus A, quem instar puncti consideramus, cum solius gravitatis ratio hic habeatur (§. 377), in B adducitur, linea directionis BH, utpote ex centro gravitatis B ad lineam horizontalem HI perpendicularis, cadit extra basin, quæ est in puncto C. Globus igitur in hoc situ quiescere nequit, sed descendit (§. 222). Cum autem filo BC retineatur, ne perpendiculariter per BH descendere possit, per arcum circuli BA descendit (§. 131 *Geom.*). Ubi centrum gravitatis ad imum pervenit, ea vi globus instruitur, quæ cadendo per KA acquiritur (§. 303) adeoque ipsum ad altitudinem æqualem elevare potest (§. 322). Quare cum filum impediatur, ne juxta tangentem AI progrediatur, per arcum AD ipsi AB æqualem (§. 291 *Geom.*) ascendit. Vi igitur, quam cadendo acquisiverat, omni absorpta per eundem arcum DA relabitur vi gravitatis ascensurus ex A in B & ita porro *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

381. *Experientia theoremati non contradicit, etsi sine fine continuata oscillationes ei parum respondeant. Aeris enim resistentia & frictio circa centrum C partem aliquam ejus vis absument, quæ cadendo acquisita fuerat: unde fieri nequit, ut ad eandem præcise altitudinem eleveatur globus, ex qua delapsus. Quoniam itaque ascensus continua capit decremента oscillatio tandem sistitur, & pendulum in situ CA, in quo centrum gravitatis infimum occupat locum, quiescit.*

## THEOREMA LII.

382. *Si pendulum simplex inter duas semicycloides CB & CD suspendatur, quarum circuli generatores habent diametrum CE dimidiæ longitudini fili CA æqualem, ita ut filum oscillans iis circumplicetur; oscillationes omnes utcumque inæquales erunt Isochronæ seu æquidiurnæ in medio non resistente.* Tab. XIV. Fig. 45.

## DEMONSTRATIO.

Cum enim penduli filum CE semicycloidi BC circumplicetur, à centro gravitatis globi E, qui instar puncti consideratur (§. 377), ex evolutione cyclois BEAD describitur (§. 330 *Analyf. infinit.*). Sed omnes descensus & ascensus in cycloide sunt æquidiurni (§. 311). Ergo oscillationes penduli sunt æquidiurnæ (§. 376). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

383. *Quodsi longitudine penduli CA describatur circulus ex centro C, cum portio cycloidis prope verticem A eodem fere motu describatur, arcus exiguus circuli cum cycloide propemodum coincidit. Unde in arcubus circuli exiguis oscillationes pendulorum sunt ad sensum Isochronæ, utcumque in se inæquales.*

## COROLLARIUM II.

384. Quo longiora itaque sunt pendula in arcibus circuli oscillantia; eo majores oscillationes Isochronæ sunt.

## SCHOLION I.

385. *Experientia non abludit. Quodsi enim duo fuerint pendula ejusdem longitudinis, quorum unum in majorem, alterum in minorem arcum, utrumque tamen in arcum non nimis magnum, oscillando excurrat; in oscillationibus centum vix aliquam differentiam notabis.*

## SCHOLION II.

386. *Penduli inter duas semicycloides oscillantis tam theoria, quam praxis debetur illustri HUGENIO (a)*

## PROBLEMA LV.

387. *Determinare durationem oscillationis in Cycloide.*

## RESOLUTIO.

Sit diameter circuli genitoris seu altitudo totius Cycloidis  $AB = 2a$ ;  $HB$  altitudo, ex qua descendit pendulum per arcum illius  $QB = 2r$ ,  $HP = x$ , erit  $PB = 2r - x$ . Sit porro tempus per  $QB = t$  & super  $HB$  describatur semicirculus  $HNB$  ducanturque  $PM$  atque  $pm$  infinite propinquæ ad  $HB$  perpendiculares: erit  $PN = \sqrt{(2rx - xx)}$ ,  $Pp = NO = Rm = dx$ , & celeritas in  $P$ , adeoque & in  $M$  (§. 303), acquisita  $= \sqrt{x}$  (§. 83), consequenter, cum infinitesima  $Mm$  motu uniformi percuratur, tempus per  $Mm = dt = Mm : \sqrt{x}$  (§. 39). Constat vero (§. 131 *Analys. infinit.*) esse  $Mm : mR = BS : BP$  &  $AB : BS = BS : BP$  (§. 330 *Geom.*). Est itaque  $BS$  ad  $BP$  in ratione subduplicata  $AB$  ad  $BP$ , (§. 216 *Arithm.*); hoc

(a) Vide Horologium Oscillatorium sive Demonstrationes de motu Pendulorum ad horologia aptato Geometricas.

est, ut  $\sqrt{AB}$  ad  $\sqrt{PB}$ , consequenter  $Mm : mR = \sqrt{AB} : \sqrt{PB}$  (§. 167 *Arithm.*). Unde  $Mm = mR \cdot \sqrt{AB} : \sqrt{PB}$  &  $dt = dx \sqrt{a} : \sqrt{(2rx - x^2)} = 2r dx \sqrt{a} : 2r \sqrt{(2rx - x^2)}$ . Est vero  $rdx : \sqrt{(2rx - xx)} = Nn$  (§. 157 *Analys. infinit.*) Ergo  $dt = 2\sqrt{a} \cdot Nn : 2r$  &  $\int dt = \int Nn \cdot 2\sqrt{a} : 2r$ . Jam quando  $\int dt$  sive  $t$  tempus denotat, quo grave per arcum cycloidis  $QB$  descendit,  $\int Nn$  in semiperipheriam circuli degenerat. Quare ut  $2r$  seu diameter circuli, ad semiperipheriam ejus; ita  $2\sqrt{a}$ , ad tempus per arcum  $QB$ , consequenter cum  $2\sqrt{a} = 2a : \sqrt{a}$  denotet tempus descensus perpendicularis per  $AB$  (§. 39. 83); patet tandem (§. 168 *Arithm.*) sequens

*Theorema*: Tempus integræ oscillationis per arcum quemcunque Cycloidis  $GDQ$  est ad tempus descensus perpendicularis per diametrum circuli genitoris  $AD$  ut peripheria circuli ad diametrum. Tab. III. Fig. 39.

## COROLLARIUM.

388. Hinc denuo consequitur, quod jam superius aliunde demonstratum (§. 311), tempus descensus per quoslibet arcus cycloidis esse æquiditurnum, oscillationes item in omnibus arcibus cycloidis esse æquiditurnas.

## THEOREMA LIII.

389. *Gravitatis actio minor est in iis Terræ regionibus, ubi oscillationes ejusdem penduli sunt tardiores; major vero, ubi eadem celeriores.*

## DEMONSTRATIO.

Tempus oscillationum in cycloide est ad tempus descensus perpendicularis per diametrum circuli genitoris

ut

ut peripheria circuli ad diametrum (§. 387) adeoque in ratione constante (§. 413 *Arithm.*). Quare si oscillatio ejusdem penduli fit tardior, descensus quoque gravium perpendicularis tardior evadit: si ille redditur celerior; hic quoque celerior fit necesse est. In primo igitur casu minus spatium cadendo conficit grave, quam in altero, adeoque in illo motus minori vi acceleratur, quam in altero, consequenter gravitas minor est. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

390. Cum adeo experientia docuerit, oscillationes ejusdem penduli esse tardiores prope æquatorem, quam in remotioribus versus polum regionibus; gravitas corporum minor est versus æquatorem, quam versus polos.

SCHOLIUM.

391. Observavit hoc primus RICHERIUS *An.* 1672. itinere in Insulam Cayennæ, quæ ab æquatore 5 fere gradibus distat, facto, ubi pendulum Parisiense singulis minutis secundis oscillans, cujus longitudo erat pedum 3, linearum  $8\frac{2}{7}$ , minuendum erat linea una cum quadrante, ut adhuc oscillationes singulis minutis secundis absolveret (a). *An.* 1677. HALLEJUS ad Insulam S. Helenæ navigans reperit Horologium suum ibi tardius moveri, quam Londini, sed differentiam non notavit. Similes observationes habuere *An.* 1682. VARIN & DES HAYES, *An.* 1697. COUPLET filius, & *An.* 1704. FEUILLEB (b).

THEOREMA LVII.

392. Si duo pendula CA & EF in arcus similes DAB & GFH excurrant; tempora oscillationum sunt in ratione subduplicata longitudinum CA & EF.

(a) Acta Eruditorum, An. 1695. p. 30.

(b) Vid. NEWTONUM in Principiis, Lib. III. Prop. 19. p. m. 419.

DEMONSTRATIO.

Tempus descensus per DA est ad tempus descensus per GF in ratione subduplicata DA ad GF (§. 314). Sed tempora ista sunt oscillationum per arcus DB & GH dimidia. Ergo & tempora oscillationum sunt in ratione subduplicata arcuum DA & GF (§. 178 *Arithm.*), consequenter & radiorum CA & EF, quibus arcus similes DA & GF per *hypoth.* describuntur (§. 412 *Geom.* & 170 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM

393. Longitudines igitur pendulorum in arcus similes DA & GF excurrentium sunt in ratione duplicata temporum, quibus singulæ oscillationes conficiuntur.

THEOREMA LVII.

394. Numeri oscillationum Isochronarum à duobus pendulis eodem tempore confectarum sunt reciproce ut tempora, quibus singulæ oscillationes fiunt.

DEMONSTRATIO.

Sit intra tempus  $a$  numerus oscillationum penduli unius  $= b$ , alterius  $= mb$ . Cum oscillationes singulæ ejusdem penduli supponantur æquidistantiæ, erit tempus, quo pendulum primum oscillationem unam conficit,  $= a : b$ , & tempus, quo alterum oscillationem unam absolvit,  $= a : mb$  (§. 302 *Arithm.*). Sunt ergo tempora, quibus singulæ oscillationes fiunt, ut  $a : b$  ad  $a : mb$ , hoc est, ut  $amb$  ad  $ab$  (§. 178 *Arithm.*) seu ut  $mb$  ad  $b$  (§. 181 *Arithm.*). Sed ut  $mb$  ad  $b$  ita est numerus oscillationum penduli secundi ad primum. Sunt itaque numeri oscillatio-

lationum eodem tempore confectarum reciproce ut tempora singularum. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

395. Longitudines igitur pendulorum in arcus similes, eosque parvos excurrentium sunt in ratione duplicata numerorum oscillationum eodem tempore confectarum, sed reciproce sumptorum (§. 303).

THEOREMA LVIII.

396. Longitudines pendulorum intra Cycloides suspensorum sunt in ratione duplicata temporum, quibus singule oscillationes fiunt.

DEMONSTRATIO.

Ut diameter circuli ad peripheriam, ita tempus descensus per altitudinem Cycloidis seu dimidiam penduli longitudinem ad tempus unius oscillationis (§. 387). Sunt igitur tempora descensus per duorum pendulorum dimidias longitudes ut tempora duarum oscillationum ab iisdem confectarum (§. 167. 173 *Arihm.*). Sed altitudines descensus perpendicularis sunt in ratione duplicata temporum (§. 86). Ergo etiam altitudines, hoc est pendulorum longitudes dimidiæ, consequenter & integræ (§. 178 *Arih.*), sunt in ratione duplicata temporum, quibus oscillationes per Cycloides absolvuntur (§. 167 *Arih.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

397. Sunt igitur & in ratione duplicata numerorum oscillationum eodem tempore confectarum, sed reciproce sumptorum (§. 304.).

COROLLARIUM II.

398. Tempora oscillationum in Cycloidibus diversis sunt in ratione subduplicata longitudinis pendulorum.

PROBLEMA LVI.

399. *Data longitudine alicujus penduli, una cum numero oscillationum in tempore dato confectarum, invenire longitudinem alterius penduli, quod eodem tempore datum oscillationum numerum conficiat.*

RESOLUTIO.

Quærat ad quadratum numeri oscillationum, quas in tempore dato absolvere debet pendulum quæsitum, ad quadratum numeri oscillationum penduli dati & longitudinem penduli dati numerus quartus proportionalis; erit is longitudo penduli quæsitæ (§. 397).

E. gr. Juxta HUGENIUM (a) longitudo penduli, cujus oscillationes singulæ singulis minutis secundis absolvuntur, est pedum Parisinorum 3 & linearum  $8\frac{1}{2}$ . Quæritur pendulum, quod intra minutum primum 200 oscillationes conficiat. Cum numerus oscillationum penduli dati sit intra minutum primum 60 & ejus longitudo 881 linearum dimidiarum (§. 26 *Geom.*); erit longitudo penduli quæsitæ =  $3600. 881 : 40000 = 79\frac{20}{100}$  lin. dim. seu  $39\frac{645}{1000}$  lin.

PROBLEMA LVII.

400. *Dato numero oscillationum, que à pendulo data longitudinis in dato tempore absolvuntur, invenire numerum oscillationum ab alio pendulo data iidem longitudinis in dato tempore conficiendarum.*

RESO-

(a) In Horolog. Oscillat. part. 4. Prop. 25. f. 152.

RESOLUTIO.

1. Quæritur numerus quartus proportionalis ad longitudes pendulorum inverſe ſumtas & quadratum numeri oſcillationum quæſiti (§.397).
2. Quare ſi inde extrahatur radix, habebitur numerus oſcillationum quæſitus.

E.gr. Quæritur, quot oſcillationes intra minutum primum abſolvat pendulum, cujus longitudo eſt 7929 iſtiusmodi partium, qualium pendulum ſingulis minutis ſecundis oſcillans eſt 88100. Reperietur numerus oſcillationum =  $\sqrt{(88100. 3600 : 7929)}$   
 =  $\sqrt{40000} = 200.$

THEOREMA XL.

ab. II. 36. 401. Celeritas penduli in puncto inſimo B eſt ad celeritatem cadendo per duplam longitudinem AB acquiſitam ut chorda arcus, quem deſcribit, EB ad diametrum circuli AB.

DEMONSTRATIO.

Celeritas per arcum EB acquiſita æquatur celeritati per PB acquiſitæ (§.255). Eſt ergo ad celeritatem per AB acquiſitam in ratione ſubduplicata BP ad BA (§.87). Sed BA:BE = BE:BP (§.330 Geom.), adeoque BA ad BE eſt ratio ſubduplicata BA ad BP (§.216. 159 Arithm.). Ergo celeritas per arcum BE eſt ad celeritatem per BA acquiſitam ut chorda BE ad BA (§.156 Arithm.) Q.e.d.

COROLLARIUM.

402. Cum adeo ſit ut celeritas per arcum EB acquiſita ad celeritatem per AB acquiſitam ut chorda EB ad AB & ut celeritas per arcum DB acquiſita ad celeritatem per AB acquiſitam, ut chorda DB ad AB (§.401); celeritates per arcus EB & DB acquiſitæ ſunt ut chordæ cognomines (§.195 Arithm.).

SCHOLION.

403. Alia adhuc Theoremata non inelegantia de Pendulis habet NEWTONUS (a): quæ Analytice facillime demonſtrantur ex ſuperioribus. Eum igitur in finem ſequens addimus Problema.

PROBLEMA LX.

404. Determinare tempus oſcillationis dimidiæ per arcum exiguum in hypotheſi gravitatis uniformis, ſed maſſæ minime proportionalis.

RESOLUTIO.

Sit in C centrum, circa quod pendulum oſcillatur. Sint NA & MA arcus exigui, per quos oſcillatur, ſeu oſcillationes dimidiæ. Sit BA dupla penduli longitudo & BNA ſemicirculus ex centro C deſcriptus; dicatur

Tab. XIV. Fig. 154.

CA = a, AP = x:

AQ = b

erit AB = 2a

QP = b - x

& (§.330 Geom.)

AB:AN = AN:AQ

2a:AN = AN:b

AB:AM = AM:AP

2a:AM = AM:x

adeoque

AM =  $\sqrt{2ax}$  AN =  $\sqrt{2ab}.$

Quoniam arcus AM & AN admodum exigui; ab arcubus non different notabiliter ſubtenſæ cognomines. Quare etiam arcus AM =  $\sqrt{2ax}$ , & arcus AN =  $\sqrt{2ab}$ , conſequenter NM = AN

N

-AM

$-AM = \sqrt{2ab} - \sqrt{2ax}$ , cujus differentiale  $mM$  reperitur  $= \frac{1}{2}x^{-1/2}dx\sqrt{2a} = -dx\sqrt{a}:\sqrt{2x}$ .

Sit porro gravitas  $= g$ , massa  $= m$ . Quoniam gravitas uniformis seu constans *per hypoth.* erit celeritas in  $M$  utpote cadendo per altitudinem  $QP = b - x$  acquisita  $= \sqrt{2g(b-x)}:\sqrt{m}$  (§. 113).

Quoniam motus per arculum infinite parvum  $mM$  æquabilis, erit tempusculum  $dt$  directe ut spatium seu arculum  $mM$  & reciproce ut celeritas in  $m$  acquisita (§. 39), consequenter

$$dt = \frac{mM}{\text{Cel. per NM}} = \frac{-dx\sqrt{am}}{2\sqrt{(gbx - gx^2)}} = \int \frac{-dx\sqrt{am}}{2\sqrt{(gbx - gx^2)}}$$

Est vero  $-b dx : 2\sqrt{(bx - x^2)}$  Elementum arcus  $QR$ , radio  $\frac{1}{2}b = \frac{1}{2}AQ$  descripti, cujus sagitta  $QP = b - x$ , ob valorem negativum (§. 157 *Analys. infin.*). Ergo  $-dx : \sqrt{(bx - x^2)} =$  Elemento arcus  $AR$  per  $\frac{1}{2}AQ$  divisio. Fiat itaque

$$\frac{-b dx}{2\sqrt{(bx - x^2)}} = dz$$

$$\text{erit } \frac{-dx}{\sqrt{(bx - x^2)}} = \frac{2dz}{b}$$

$$\text{adeoque } dt = \frac{-dx\sqrt{am}}{2\sqrt{(gbx - gx^2)}} = \frac{dz\sqrt{am}}{b\sqrt{g}} = \frac{z\sqrt{am}}{b\sqrt{g}} = \frac{\text{arc. QR. } \sqrt{AB.} \sqrt{ms}}{AQ. \sqrt{g}}$$

Quodsi jam fiat  $QP = QA$ , arcus  $QR$  degenerabit in semiperipheriam  $QRA$ , eritque  $t$  tempus dimidiæ oscillationis, hoc est, descensus per arcum  $NA$  absolvitur tempore

$$t = \frac{QRA. \sqrt{AB.} \sqrt{m}}{AQ. \sqrt{g}}$$

Patet,  $QRA : AQ$  designare rationem semiperipheriæ ad diametrum, &  $\sqrt{AB}$  esse ut tempus descensus perpendicularis per  $AB$  seu altitudinem duplæ longitudini penduli æqualem (§. 87). Quare si fuerit  $g$  ut  $m$ , seu gravitas massæ proportionalis, quemadmodum in hypothese GALILÆANA (§. 114), erunt

*Theorema*: Oscillationes pendulorum in arcibus exiguis circularibus ad tempus descensus perpendicularis ponderis appensi per altitudinem duplæ longitudini penduli æqualem seu circuli diametrum, ut semiperipheria circuli ad diametrum, seu oscillationes integræ sunt ad tempus descensus perpendicularis per diametrum ut peripheria circuli ad diametrum.

#### THEOREMA LIX.

405. *Tempora sunt in ratione composita ex directis subduplicatis longitudinum pendulorum & massarum atque reciproca subduplicata gravitatum uniformium.*

#### DEMONSTRATIO.

Sint longitudines pendulorum  $L$  &  $l$ , tempora oscillationum  $T$  &  $t$ , massæ  $M$  &  $m$ , gravitates  $G$  &  $g$ ; erit

$$T = \frac{QRA. \sqrt{2M.L}}{AQ. \sqrt{G}}$$

$$\& t = \frac{QRA. \sqrt{2m.l}}{AQ. \sqrt{g}} \text{ (§. 404), adeoque}$$

$T:t$



$$T:t = \frac{QRA.\sqrt{2ML}}{AQ.\sqrt{G}} : \frac{QRA.\sqrt{2ml}}{AQ.\sqrt{g}}$$

$$= \frac{\sqrt{M.L}}{\sqrt{G}} : \frac{\sqrt{m.l}}{\sqrt{g}} \text{ (§.181 Arithm.)}$$

$$= \sqrt{M}.\sqrt{L}.\sqrt{g}:\sqrt{m}.\sqrt{l}.\sqrt{G} \text{ (§.178 Arithm.)} \text{ Q. e. d.}$$

THEOREMA LX.

406. *Quantitates materiae in corporibus funependulis, quorum longitudines aequales sunt, sunt in ratione composita ex ratione gravitatum & ratione duplicata temporum.*

DEMONSTRATIO.

Sint omnia ut in Theoremate praecedente, erit

$$T:t = \frac{\sqrt{ML}}{\sqrt{G}} : \frac{\sqrt{ml}}{\sqrt{g}}$$

adeoque  $T^2:t^2 = \frac{ML}{G} : \frac{ml}{g}$  (§. 260 Arithm.)

Et hinc  $T^2G:t^2g = ML:ml$  (§. 184 Arithm.).

Quare cum sit  $L=l$  per hypoth. erit

$T^2G:t^2g = M:m$  (§.183 Arithm.).  
Q. e. d.

COROLLARIUM I.

407. Quodsi fuerit  $T=t$ ; erit  $G:g = M:m$ , hoc est, si tempora sunt aequalia, quantitates materiae sive massae sunt ut gravitates.

COROLLARIUM II.

408. Quodsi fuerit  $G=g$ , erit  $T^2:t^2 = M:m$  (§.182 Arithm.), hoc est, si gravitates sunt aequales, massae sunt in ratione duplicata temporum.

COROLLARIUM III.

409. Quodsi fuerit  $M=m$ ; erit  $T^2G = t^2g$  (§.151 Arithm.), adeoque  $G:g = t^2:T^2$

(§. 299 Arithm.), hoc est, si massae sunt aequales, gravitates sunt in ratione duplicata reciproca temporum.

COROLLARIUM IV.

410. Quoniam  $T^2G:t^2g = ML:ml$ , vi demonstr. praef. si sit  $T=t$  &  $M=m$ , erit  $G:g = L:l$  (§.151 Arithm.), hoc est, si & tempora, & massae aequalia sunt, pondera sunt ut longitudines pendulorum.

COROLLARIUM V.

411. Et quia  $T^2G:t^2g = ML:ml$ ; erit etiam  $T^2Gl:t^2gL = M:m$  (§. 185. 178 Arithm.), hoc est, massae pendulae sunt ut quadrata temporum & gravitates directe, & ut longitudines pendulorum inverse.

SCHOLIUM I.

412. *His Principiis usus est NEWTONUS (a) in comparandis corporibus inter se quoad quantitatem materiae in singulis. Factis autem experimentis quam accuratissimis se semper invenisse fatetur, quantitatem materiae in corporibus singulis eorum ponderi proportionalem esse. Hinc etiam pendet ratio comparandi pondera ejusdem corporis in diversis locis ad cognoscendam variationem gravitatis.*

COROLLARIUM VI.

413. Quodsi fuerit  $M=m$ , erit  $T^2Gl = t^2gL$  (§.149 Arithm.) consequenter  $T^2:t^2 = gL:Gl$  (§.299 Arithm.), adeoque  $T:t = \sqrt{g}.\sqrt{L}:\sqrt{G}.\sqrt{l}$  (§.260 Arithm.), hoc est, si massae funependulorum fuerint aequales, tempora sunt in ratione composita ex directa longitudinum pendulorum & reciproca gravitatum subduplicata.

COROLLARIUM VII.

414. Quodsi fuerit  $M=m$  &  $T=t$ , erit  $gL = Gl$  (§. praef.), consequenter  $G:g = L:l$ , hoc est, pendula Isochrona habent gravitates seu vires acceleratrices longitudinibus pendulorum proportionales.

COROLLARIUM VIII.

415. Quodsi fuerit  $M=m$  &  $L=l$ , erit  $T^2G = t^2g$  (§.415), consequenter  $T^2:t^2 = \frac{N}{2} : \frac{N}{2} = g$

(a) Vid. Princip. Lib.2. Prop.24. Cor.7 p.m.295.

$=g:G$  (§. 299 *Arithm.*), adeoque  $T:t = \sqrt{g}:\sqrt{G}$  (§. 260 *Arithm.*), hoc est, si massæ & longitudines fune pendulorum fuerint æquales, tempora sunt in ratione subduplicata reciproca gravitatum.

## COROLLARIUM IX.

416. Quodsi fuerit  $M=m$  &  $G=g$ , erit  $T:l = t^2:L$  (§. 413) consequenter  $T^2:t^2 = L:l$ , adeoque  $T:t = \sqrt{L}:\sqrt{l}$ , hoc est, si gravitates acceleratrices & massæ fune pendulorum fuerint æquales, tempora sunt in ratione subduplicata longitudinum.

## SCHOLION II.

417. *Cum in pendulis vis ponderis, quæ sollicitatur, in uno puncto concentrata concipitur, (§. 225), neque massa per se, nisi quatenus à causa gravitatis animatur, ad motum aliquid conferat, si pondera massis proportionalia sunt, adeoque æquales quantitates materiæ seu massæ æquales à gravibus eodem modo animentur, nulla habetur massarum ratio. Perinde igitur est in hoc casu, ac si in omnibus pendulis massæ essent æquales. Unde in hac naturæ consentanea hypothese valent, quæ in casu massarum æqualium demonstravimus.*

## THEOREMA LXI.

418. *Numeri oscillationum duorum pendulorum quorumcunque in arcubus exiguis æqualibus temporibus absolutarum sunt in ratione composita ex reciprocis subduplicatis massarum & longitudinum, atque directâ subduplicata gravitatum massas animantium.*

## DEMONSTRATIO.

Sunt enim numeri oscillationum  $N$  &  $n$  à duobus pendulis æqualibus temporibus absolutarum reciproce ut tempora, quibus singulæ oscillationes fiunt (§. 394). Enimvero tempora oscillationum sunt in ratione composita ex

rationibus subduplicatis directis massarum & longitudinum pendulorum & subduplicata reciproca massas animantium gravitatum, seu ut  $\sqrt{L}.\sqrt{M}.\sqrt{g}$  ad  $\sqrt{l}.\sqrt{m}.\sqrt{G}$  (§. 405). Quare numeri oscillationum à duobus pendulis æqualibus temporibus absolutarum sunt in ratione composita ex reciprocis subduplicatis massarum & longitudinum & directâ subduplicata gravitatum massas animantium, seu  $N:n = \sqrt{l}.\sqrt{m}.\sqrt{G}:\sqrt{L}.\sqrt{M}.\sqrt{g}$ . *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

419. Quodsi fuerit  $m=M$ , erit  $N:n = \sqrt{l}:\sqrt{G}$ , hoc est, si massæ duorum pendulorum fuerint æquales, numeri oscillationum eodem tempore in arcubus exiguis absolutarum sunt in ratione composita ex subduplicata reciproca longitudinum pendulorum & directâ subduplicata gravitatum massas animantium.

## COROLLARIUM II.

420. Quodsi fuerit  $M=m$  &  $L=l$ , erit  $N:n = \sqrt{G}:\sqrt{g}$ , hoc est, multitudines vibrationum, eodem tempore à duobus pendulis æqualibus peractarum, se habent in subduplicata ratione directâ virium pendula agitantium.

## SCHOLION I.

421. *Si cui libuerit, is ex analogia  $N:n = \sqrt{G}:\sqrt{g}$ ,  $\sqrt{l}:\sqrt{m}$ ,  $\sqrt{g}:\sqrt{L}$ ,  $\sqrt{M}$  plura Theoremata deducet, quemadmodum supra in simili casu factum.*

## SCHOLION II.

422. *Quæ hætenus de pendulorum motu demonstrata sunt, plerumque tantum succedunt, si filum, ex quo pondus suspenditur, gravitate careat & totius ponderis gravitas in punctum individuum sit coacta: quæ nempe superius supposuimus. Quamobrem in præxi filo utendum est tenui & globo exiguo sed ex materiæ*

*materia quantumvis gravi conflato. Quodsi vero filum aut virga sit gravis & pondus magnum: leges modo demonstratæ valde turbantur: neque enim pendulum amplius simplex est, sed compositum: perinde nimirum est, ac si plura pondera eidem virgæ inflexili & gravitatis experti in diversis locis applicarentur, quæ singula diversa celeritate moventur. Enim-*

*vero non sufficit, quemadmodum supra in æquipo-ponderantibus, invenire centrum gravitatis commune & in eo applicare ponderum summam, ut verus penduli motus exploretur; sed alia ratione determinandum est illud punctum, in quo colligenda est omnis penduli gravitas, ut eadem præstet cum omposito. Eum igitur in finem addimus capit sequens.*

C A P U T X.

*De Centro Oscillationis.*

DEFINITIO XLVII.

423. **C**entrum oscillationis est punctum, in quo si colligatur penduli compositi totius gravitas, oscillationes singulæ eodem adhuc tempore conficiuntur, quo ante.

COROLLARIUM.

424. Eius itaque à puncto suspensionis distantia æquatur longitudini penduli simplicis, cujus oscillationes sunt cum oscillationibus compositi Isochronæ.

DEFINITIO XLVIII.

425. *Pes horarius* est longitudo penduli simplicis, quod singulas oscillationes conficit singulis minutis secundis.

THEOREMA LXII.

426. Si plura pondera *D, F, H, B,* quorum gravitas in punctis *D, F, H, B,* concipitur collecta, in virgæ inflexili *AB* eandem inter se & à puncto suspensionis *A* distantiam constantè conservent & circa *A* oscillationes suas perficiat pendulum hoc modo compositum; probabit

*distantia centri oscillationis O à puncto suspensionis OA, si singula pondera in quadrata distantiarum ducantur & aggregatum per summam momentorum eorundem ponderum dividatur.*

DEMONSTRATIO.

Quodsi pendulum celeritate semel acquisita ageretur, æqualibus temporibus pondera *D, F, H, B* constantè describerent arcus *dD, fF, gH* & *bB* distantis à puncto suspensionis *Ad, Af, Ag, Ab* proportionales. Patet adeo, celeritatem semel acquisitam descensum ponderum non alterare. Sola igitur spectanda est vis gravitatis, quæ incrementa celeritatis efficit. Concipiamus itaque punctum *O* esse centrum oscillationis. Quando itaque pendulum percurrit angulum infinite parvum *BAC*; summa ponderum in centro oscillationis *O* applicata arcum *OP* describet (§. 423). Quare cum vis gravitatis eodem modo agat in pondera singula *D, F, H, B,* quo in summam

Tab. IV. Fig. 48.

eorundem O, nisi retinaculum AB obtaret; singula per spatiola ipsi OP æqualia transferrentur, quia motus in instanti est uniformis, adeoque celeritates spatiolis proportionales (§. 33). Quare si KN per P ipsi DB parallela ducatur, DK, FL, HM, BN (cum arcus infinite parvi à chordis eorum non differant) exponent celeritates à ponderibus D, F, H & B in instanti acquirendas, si libere descenderent. Gravitatis vero cum solo nisu agat (§. 4), vis mortua est (§. 9); consequenter vires motuum acceleratrices sunt in ratione composita ponderum & celeritatum (§. 278). Deperditur itaque in E vis ut D. EK & in F vis ut F. GL: contra vero in H accrescit vis ut H. MI & in B vis ut B. NC; seu quod perinde est, ob decrementum virium in D & F vi in P aliquid accrescit, sed incrementum in H accremento in P rursus aliquid detrahit. Cum autem sit vis in D ad vim in B uti AB ad AD; vis in F ad vim in B uti AB ad AF; vis in denique in H ad vim in B uti AB ad AH (§. 153); reperiuntur accrementa virium in B ut (D. EK. AD): AB & (F. GL. AF): AB, quod vero inde rursus detrahitur ut (H. MI. AH): AB. Habemus adeo

$$B. NC = [D. EK. AD + F. GL. AF - H. MI. AH]: AB.$$

& hinc

$$B. AB. NC + H. MI. AH = D. EK. AD + F. GL. AF$$

Jam cum GL ipsi EK & MI ipsi NC sit parallela, ob rectos, E, G, I, C

(§. 38 *Analys. infinit.*) & EG = DF, GP = FO, PI = HO, IC = BH; erunt EK & GL ipsi OD & OF, MI & NC ipsi OH & OB proportionales (§. 268 *Geom.*), consequenter substitutis pro EK, GL, MI, NC proportionalibus OD, OF, OH, OB.

$$B. AB. OB + H. OH. AH = D. OD. AD + F. OF. AF.$$

Denique cum sit

$$H. AH^2 = H. HA. HO + H. HA. AO$$

$$B. AB^2 = B. BA. BO + B. BA. AO$$

$$D. OA. DA = D. AD. AD + D. AD. OD$$

$$F. OA. FA = F. FA. FA + F. OF. FA.$$

Si utrinque addantur in æquatione inventa D. DA<sup>2</sup> + F. FA<sup>2</sup> + H. AO. HA + B. AO. BA, prodibit

$$D. DA^2 + F. FA^2 + H. AH^2 + B. AB^2 = (D. DA + F. FA + H. HA + B. BA) AO$$

Consequenter

$$AO = \frac{D. DA^2 + F. FA^2 + H. HA^2 + B. BA^2}{D. DA + F. FA + H. HA + B. BA}$$

*Q. e. d.*

### SCHOLIUM I.

427. Quod si non evidens videatur, esse  $AB^2 = AB. BO + AB. AO$  &  $HA^2 = HA. HO + HA. AO$ , itemque  $OA. DA = AD. AD + DA. OD$  &  $OA. FA = AF. AF + AF. FO$ ; idem facile ostenditur hoc modo. Cum sit  $HA = HO + OA$  (§. 86 *Arithm.*), erit  $HA^2 = HO^2 + 2 HO. OA + OA^2$  (§. 261 *Arithm.*). Et quoniam  $HA = AO + OH$  (§. 86. *Arithm.*); erit  $HA. HO = (AO + OH) HO = HO. OA + HO^2$  &  $HA. AO = (AO + OH) AO = AO^2 + OH. AO$  (§. 93

(§. 93 Arithm.), consequenter  $HA^2 = HA.HO$   
 $\star HA.AO$  (§. 87 Arithm.). Similiter cum  
 sit  $AB^2 = AO^2 + 2 AO.OB + OB^2$  &  $AB.BO$   
 $= (AO + OB) OB = AO.OB + OB^2$  &  
 $AB.AO = (AO + OB) AO = AO^2 + AO.OB$ ;  
 erit  $AB^2 = AB.BO + AB.AO$ . Et quia  $OA$   
 $= AD + OD$  (§. 86 Arithm.), erit  
 $OA.DA = (AD + OD) DA = AD.AD$   
 $\star AD.OD$  (§. 93 Arithm.). Similiter  
 quia  $AO = AF + FO$ ; erit  $OA.FA = AF.AF$   
 $\star AF.FO$ .

SCHOLIION II.

428. JOANNES BERNOULLI (a) ex  
 simplicissimis principiis mechanicis Theoriam  
 de centro oscillationis ab HUGENIO (b) in-  
 ventam & à JACOBO BERNOULLI fratre (c)  
 ex natura vectis demonstratam, quemadmo-  
 dum modo uberius exposuimus, deduxit & ad  
 agitationem pendulorum in liquoribus dedu-  
 xit. Opera igitur pretium nos facturos existi-  
 mamus, si viri ingeniosissimi methodum hic  
 dilucidemus.

PROBLEMA LXI.

429. Determinare centrum oscillatio-  
 nis in pendulo composito.

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

Sit virga inflexilis AL gravitatis ex-  
 pers, onusta ponderibus quotcunque  
 C, D &c. in distantiis quotcunque AC,  
 AD &c. ab axe oscillationis A; deter-  
 minandum est centrum oscillationis Z seu  
 longitudo penduli simplicis AZ compo-  
 sito AL Isochroni.

Sit itaque C massa ponderis in C; D  
 vero massa ponderis in D: quæ ponde-  
 ra animantur à gravitate naturali G;  
 erit pondus in C = G. C & momentum

ejus G. C. AC, quod vim agitativam  
 penduli appellat Bernoullius. Eodem  
 prorsus modo reperitur vis agitativa  
 penduli in D = G. D. AD & ita porro,  
 si plura fuerint pondera (§. 153).

Assumatur jam pro arbitrio punc-  
 tum P & quaratur tum massa ponde-  
 ris, tum gravitas, à qua animanda, ut  
 pondus ibidem habeat momentum ponde-  
 ri C æquale, adeoque ipsi C substi-  
 tuti possit.

Nimirum cum gravitates seu vires ac-  
 celeratrices massarum sint ut celeritates,  
 quas producunt in instanti, celeritates  
 autem in tempusculo infinite parvo,  
 quo per angulum infinite parvum ex AL  
 in A (L) movetur pendulum, sint ut C(C)  
 ad P(P) (§. 33), consequenter ut AC  
 ad AP (§. 138. 412 Geom.); erit ut AC  
 ad AP ita gravitas in C ad fictitiam in P,  
 à qua animandum pondus in P in locum  
 ipsius C subrogandum, consequenter

gravitas in P =  $\frac{AP. G}{AC}$ . Quodsi massa  
 hujus ponderis ponatur P; erit pondus  
 $\frac{G.P.AP}{AC}$  & momentum =  $\frac{G.P.AP^2}{AC}$ ,  
 quod cum sit æquale momento ponde-  
 ris in C, erit  $\frac{G. P. AP^2}{AC} = G. C. AC$

$$\text{Unde } P = \frac{C. AC^2}{AP^2}$$

Eodem prorsus modo reperitur pon-  
 dus in P substituendum ponderi in D:

nimirum massa ejus =  $\frac{AD^2. D}{AP^2}$ ; gravi-  
 tas, qua animanda, =  $\frac{AP. G}{AD}$ .

Est

(a) In Actis Erudit. A. 1714. p. 257 & seqq.  
 (b) In Horolog. celi lat. part. 4. f. 91 & seqq.  
 (c) In Actis Erudit. A. 1691 p. 317.

Est itaque pondus, quod in P substitui debet pro pondere, quod est in C,  $\frac{AP \cdot G \cdot C \cdot AC^2}{AC \cdot AP^2} = \frac{AC \cdot C \cdot G}{AP}$  & pondus, quod pro D in P substituendum  $= \frac{AP \cdot G \cdot AD^2 \cdot D}{AD \cdot AP^2} = \frac{AD \cdot D \cdot G}{AP}$

Quoniam hæc pondera à gravitatibus particularibus animantur, invenienda est porro gravitas communis, quæ animat uniformiter massarum seu corporum aggregatum.

Sit ea gravitas = x: erit

$$\frac{AC^2 \cdot Cx}{AP^2} + \frac{AD^2 \cdot Dx}{AP^2} \&c.$$

$$= \frac{AC \cdot C \cdot G}{AP} + \frac{AD \cdot D \cdot G}{AP} \&c.$$


---


$$= \frac{AC^2 \cdot Cx + AD^2 \cdot Dx + \&c.}{(AC \cdot C + AD \cdot D + \&c.) AP \cdot G}$$

$$x = \frac{(AC \cdot C + AD \cdot D + \&c.) AP \cdot G}{AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D + \&c.}$$

hoc est, gravitas communis reperitur dividendo ponderum summam per summam massarum.

Cum adeo pendulum AP, quod animatur à gravitate ficticia  $\frac{AC \cdot C + AD \cdot D}{AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D}$  &c. AP. G sit composito AL Isochronum, pendula vero simplicia Isochrona habeant gravitates longitudinibus proportionales (§. 414); longitudo penduli simplicis AZ fictitio AL Isochroni & à gravitate naturali G animandi reperitur, si fiat:

$$\frac{AC \cdot C + AD \cdot D + \&c.}{AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D + \&c.} \cdot AP \cdot G : G = AP : AZ$$

Erit enim (§. 181. 183 *Arithm.*)  $(AC \cdot C + AD \cdot D \&c.) : (AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D \&c.) = 1 : AZ$

consequenter

$$AZ = \frac{AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D + \&c.}{AC \cdot C + AD \cdot D + \&c.}$$

quæ est regula HUGENIANA (a) in propositione præcedente demonstrata; sed in eocasu, ubi pondera, quæ pendulum componunt, sunt in eadem recta, aut saltem, in eodem plano, in quo est axis oscillationis.

Ponamus jam pondera C, D &c. non esse in eadem recta seu in plano, in quo est axis oscillationis, sed quomodocunque in plano quodam verticali circa axem A oscillante disposita, ita tamen ut situm non mutant. Sit AH linea verticalis plani & per centrum suspensionis A ducatur AH ad verticalem AM normalis, adeoque horizontalis (§. 210), radio AC describatur arcus cC, & ex C demittatur perpendicularis CK ad AH; erit gravitas absoluta in C ad gravitatem respectivam, qua impellitur radius AC in ratione AC ad AK (§. 272) sive RC, adeoque

Tab. XVI. Fig. 156.

$$AC : RC = G : \frac{G \cdot RC}{AC}$$

Est ergo vis agitativa in C =  $\frac{G \cdot RC}{AC}$

Eodem modo reperitur gravitas respectiva in D =  $\frac{G \cdot DS}{AD}$ . Et, si gravitas

[a] Prop. 5. part. 4. de Horolog. oscillat. f. 98.

vitas absoluta in  $P=M$ , respectiva ibidem  $\frac{M \cdot PQ}{AP}$ .

Sit jam punctum  $P$  pro arbitrio assumtum, in quo substituendum est pondus aliquod pro  $C$  idem cum ipso momentum habens. Constat primum ex antecedentibus, si radio  $AP$  describatur arcus  $Pp$ , fore

$$AC : AP = \frac{G \cdot RC}{AC} : \frac{M \cdot QP}{AP}$$

adeoque  $AC^2 : AP^2 = G \cdot RC : M \cdot QP$  (§. 185 *Aritbm.*).

$$AP^2 \cdot G \cdot RC = AC^2 \cdot M \cdot QP$$

$$\frac{AP^2 \cdot G \cdot RC}{AC^2 \cdot QP} = M$$

Quodsi  $N$  denotet gravitatem absolutam, qua animatur pondus pro  $D$  substituendum, reperietur eodem modo

$$N = \frac{AP^2 \cdot G \cdot DS}{AD^2 \cdot QP}$$

Sit jam massa ponderis gravitate  $M$  animandi  $= T$ . Quoniam ejus momentum æquale est momento ponderis  $C$ , in cujus locum surrogatur; erit

$$RC \cdot C \cdot G = \frac{T \cdot AP^2 \cdot G \cdot RC \cdot QP}{AC^2 \cdot QP}$$

$$C = \frac{T \cdot AP^2}{AC^2}$$

$$\frac{C \cdot AC^2}{AP^2} = T$$

Eodem modo invenitur massa  $V$  corporis in  $P$  pro altero  $D$  substituendi &

*Wolffii Oper. Mathem. Tom. II.*

$$\text{gravitate } N \text{ animandi} = \frac{AD^2 \cdot D}{AP^2}$$

Quoniam gravitas communis, qua ponderum aggregatum in  $P$  animatur, est  $\frac{T \cdot M + V \cdot N + \&c.}{T + V}$ .

Vi antecedentium cum sit

$$T \cdot M = \frac{C \cdot AC^2 \cdot AP^2 \cdot G \cdot RC}{AP^2 \cdot AC^2 \cdot QP} = \frac{C \cdot G \cdot RC}{QP}$$

$$\& V \cdot N = \frac{D \cdot AD^2 \cdot AP^2 \cdot G \cdot DS}{AP^2 \cdot AD^2 \cdot QP} = \frac{D \cdot G \cdot DS}{QP}$$

$$T + V = \frac{AC^2 \cdot C + AD^2 \cdot D}{AP^2}$$

$$\text{erit } \frac{T \cdot M + V \cdot N}{T + V}$$

$$= \frac{AP^2 \cdot C \cdot G \cdot RC + AP^2 \cdot D \cdot G \cdot DS}{QP \cdot AC^2 \cdot C + QP \cdot AD^2 \cdot D}$$

$$= \frac{C \cdot RC + D \cdot DS}{C \cdot AC^2 + D \cdot AD^2} \cdot \frac{AP^2 \cdot G}{QP}$$

Habemus adeo gravitatem fictitiam, qua animandum est pendulum  $AP$ , ut sit composito Isochronum in instanti, quia  $RC, SD$  &c. variables in motu penduli.

Tandem itaque ut ante inferitur:

$$\frac{C \cdot RC + D \cdot SD}{C \cdot AC^2 + D \cdot AD^2} \cdot \frac{AP^2 \cdot G}{QP} : G = AP : AZ$$

$$(C \cdot RC + D \cdot DS) AP : (C \cdot AC^2 + D \cdot AD^2) QP = 1 : AZ \text{ (§. 185 } Aritbm.)$$

Quamobrem

$$AZ = \frac{C \cdot AC^2 + D \cdot AD^2}{C \cdot RC + D \cdot SD} \cdot \frac{QP}{AP}$$

Quæ est longitudo penduli fictitii in instanti composito Isochroni ob  $RC, SD, QP$  variables.

O

Sic

Sit jam in F centrum gravitatis, erit ob parallelas FE & PQ (§. 268 *Geom.*).

$$PQ: AP = FE: AF$$

$$\text{adeoque } AF = \frac{AP \cdot FE}{PQ}$$

= quantitati constanti.

Erit etiam ob centrum gravitatis in F (§. 153)

$$(C+D)EF = RC \cdot C + SD \cdot D$$

adeoque si AP transit per centrum gravitatis F, hoc est, si sit *linea centri* phrasi HUGENIANA; erit

$$AZ = \frac{C \cdot AC^2 + D \cdot DA^2 \&c.}{(C+D \&c.) AF}$$

Atque hæc est regula HUGENIANA pro inveniendò centro oscillationis in pendulo quocunque composito, quam ipsius verbis enunciat sequens.

*Theorema.* Si pondera singula penduli compositi ducantur in quadrata distantiarum suarum ab axe oscillationis & summa productorum dividatur per id, quod fit ducendo ponderum summam in distantiam centri gravitatis communis omnium ab eodem axe oscillationis; orietur longitudo penduli simplicis composito Isochroni, sive distantia inter axem & centrum oscillationis ipsius penduli compositi.

### COROLLARIUM I.

430. Si pondera omnia fuerint æqualia, nempe  $D = F = H = B \&c. = P$  & numerus ponderum  $n$ ; erit

$$\text{Tab. IV. } AO = \frac{P \cdot DA^2 + P \cdot FA^2 + P \cdot HA^2 + P \cdot BA^2 \&c.}{n \cdot P \cdot AR}$$

Fig. 48.

$$\text{hoc est } AO = \frac{DA^2 + FA^2 + HA^2 + BA^2 \&c.}{n \cdot AR}$$

### COROLLARIUM II.

431. Quoniam D. AD est momentum ponderis D (§. 153); si momenta considerentur ut pondera ad rectam AB applicatas; centrum oscillationis coincidet cum centro gravitatis communi horum ponderum (§. 429) adeoque momentis in ponderum locum surrogatis eodem modo determinatur centrum oscillationis, quo supra centrum gravitatis commune investigavimus (§. 157).

### COROLLARIUM III.

432. Si figura plana circa axem RI ita oscilletur, ut is semper maneat in plano oscillante seu (quod perinde est) ordinatis figuræ MN constanter sit parallelus; singulæ pondusculi cujuscunque MN $nm$  partes ab axe oscillationis RI æqualiter distant (§. 216 *Geom.*), nec aliter oscillatur e. gr. particula G ac si in puncto L suspenderetur. Est adeo momentum integri pondusculi MN $nm$  (si fuerit  $AP = LG = x$ ,  $MN = 2y$ ,  $Pp = dx$ ) =  $2yxdx$ , consequenter distantia centri oscillationis ab axe =  $2\int yx^2 dx : 2\int yx dx$  (§. 157) =  $\int yx^2 dx : \int yx dx$ . Quodsi adeo ex æquatione speciali ad figuram aliquam datam valor ipsius  $y$  substituitur & Elementa debita ratione integrentur; prodibit distantia centri oscillationis ab axe in terminis ordinariis.

Tab. I.  
Fig. 9.

### PROBLEMA LXII.

433. *Determinare centrum oscillationis in linea recta AB.* Tab. I  
Fig. 2.

### RESOLUTIO.

Sit  $AB = a$ ,  $AD = x$ , erit particula infinite parva  $DP = dx$ , momentum hujus pondusculi  $x dx$ , consequenter distantia centri oscillationis in parte AD à puncto suspensivis  $A = \int x^2 dx : \int x dx = \frac{1}{3}x^3 : \frac{1}{2}x^2 = \frac{2}{3}x$ . Quodsi pro  $x$  substituitur  $a$ , prodibit distantia centri oscillationis in recta integra  $AB = \frac{2}{3}a$ .

SCHO-



SCHOLIION.

434. Hac ratione definitur centrum oscillationis filii ferrei circa alterum extremum oscillantis.

PROBLEMA LXIII.

435. Determinare centrum oscillationis rectanguli RIHS in puncto medio A lateris RI suspensi & circa axem RI oscillantis.

RESOLUTIO.

Si fuerit  $RI = SH = a$ ,  $AP = x$ , erit  $Pp = dx$  & Elementum areae, consequenter unum pondusculum  $= adx$  & momentum ejus  $axdx$  (§.153). Quare (§.433)  $\int ax^2 dx : \int ax dx = \frac{1}{3} ax^3 : \frac{1}{2} ax^2 = \frac{2}{3} x$  indefinite exprimit distantiam centri oscillationis ab axe oscillationis in segmento RCDI. Quodsi igitur pro  $x$  substituatur integri rectanguli altitudo  $RS = b$ ; prodibit distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{2}{3} b$ .

PROBLEMA LXIV.

436. Determinare centrum oscillationis trianguli aequicruri SAH circa axem RI basi SH parallelum oscillantis.

RESOLUTIO.

Sit altitudo  $AE = a$ ,  $AP = x$ ,  $EH = \frac{1}{2} b$ ,  $PV = y$ , erit (§.268 Geom.)

$$AP : PV = AE : EH$$

$$x : y = a : \frac{1}{2} b$$

$$ay = \frac{1}{2} bx$$

$$y = bx : 2a$$

Hinc  $\int yx^2 dx = \frac{\int x^3 dx}{2a} = \frac{bx^4}{8a}$

$$\int yx dx = \frac{\int bx^2 dx}{2a} = \frac{bx^3}{6a}$$

$$\& \frac{\int yx^2 dx}{\int yx dx} = \frac{6abx^4}{8abx^3} = \frac{6}{8} x = \frac{3}{4} x.$$

Quodsi pro  $x$  substituatur altitudo integra  $AE = a$ , prodibit distantia centri oscillationis in triangulo aequicruro  $ASH$  à vertice  $A = \frac{3}{4} a = \frac{3}{4} AE$ .

PROBLEMA LXV.

437. Determinare centrum oscillationis trianguli aequicruri SAH circa basin Fig. 9. SH oscillantis. Tab. I.

RESOLUTIO.

Sint omnia, ut in Problemate precedente, erit  $PE = a - x$ . Unde

$$\int yx^2 dx = \frac{\int bx dx}{2a} (a-x)^2 = \int (\frac{1}{2} abx dx$$

$$- bx^2 dx + \frac{bx^3 dx}{2a}) = \frac{1}{4} abx^2 - \frac{1}{3} bx^3 + \frac{bx^4}{8a}$$

$$\int yx dx = \frac{\int bx dx}{2a} (a-x) = \int (\frac{1}{2} bx dx - \frac{bx^2 dx}{2a}) = \frac{1}{4} bx^2 - \frac{bx^3}{6a}$$

$$\frac{\int yx^2 dx}{\int yx dx} = (\frac{1}{4} abx^2 - \frac{1}{3} bx^3 + \frac{bx^4}{8a}) : (\frac{1}{4} bx^2 - \frac{bx^3}{6a})$$

$$= (\frac{24a^2 bx^2 - 32abx^3 + 12bx^4}{96a}) : (\frac{6abx^2 - 4bx^3}{24a})$$

$$= \frac{12a^2 bx^2 - 16abx^3 + 6bx^4}{12abx^2 - 8abx^3} = \frac{6a^2 - 8ax + 3x^2}{6a - 4x}$$

Habemus adeo distantiam centri oscillationis ab axe in segmento SZVH.

Quodsi pro  $x$  substituatur  $a$ , prodibit distantia centri oscillationis in integro triangulo SAH  $= (6a^2 - 8a^2 + 3a^2) : (6a - 4a) = \frac{1}{2} a = \frac{1}{2} AE$ .

## PROBLEMA LXVI.

Tab. I. 438 Determinare centrum oscillationis in triangulo equicruro SAH, quod filis inflexile & gravitatis experie Ah suspensum circa axem ri basi SH parallelum oscillatur.

## RESOLUTIO.

Sit  $Ah = c$ , reliqua sint ut supra (§. 437): erit  $Pb = c + x$ . Unde

$$\int yx^2 dx = \int \frac{(c+x)bx dx}{2a} = \int \left( \frac{bc^2 x dx}{2a} + \frac{bcx^2 dx}{a} + \frac{bx^3 dx}{2a} \right) = \frac{bc^2 x^2}{4a} + \frac{bcx^3}{3a} + \frac{bx^4}{8a} = \frac{24bc^2 x^2 + 32bcx^3 + 12bx^4}{96a} = \frac{6bc^2 x^2 + 8bcx^3 + 3bx^4}{24a}$$

$$\int yx dx = \int \frac{(c+x)bx dx}{2a} = \int \left( \frac{bcx dx}{2a} + \frac{bx^2 dx}{2a} \right) = \frac{bcx^2}{4a} + \frac{bx^3}{6a} = \frac{6bcx^2 + 4bx^3}{24a} = \frac{3bcx^2 + 2bx^3}{12a}$$

$$\frac{\int yx^2 dx}{\int yx dx} = \frac{6bc^2 x^2 + 8bcx^3 + 3bx^4}{24a} : \frac{3bcx^2 + 2bx^3}{12a} = \frac{6c^2 + 8cx + 3x^2}{6c + 4x}, \text{ qui est valor distantiae centri oscillationis ab axe } ri \text{ in segmento trianguli AZV.}$$

Quodsi pro  $x$  substituatur trianguli altitudo  $AE = a$ , prodibit distantia centri oscillationis ab axe oscillationis  $ri$  in triangulo integro SAH  $(6c^2 + 8ac + 3a^2) : (6c + 4a)$ .

## SCHOLIUM.

439. Ex unico hoc exemplo intelligitur, quid in casu simili aliarum figurarum factu opus sit.

## PROBLEMA LXVII.

440. Determinare centrum oscillationis in infinitis parabolis & curvis agnatis circa axem RI basi SH parallelum oscillantibus.

Quoniam (§. 163)

$$\int xy dx = \int x^{(r+n):n} dx = \frac{n}{r+2n} x^{(r+2n):n}$$

$$\text{erit } \int yx^2 dx = \int x^{(r+2n):n} dx = \frac{n}{r+3n} x^{(r+3n):n}$$

$$\& \frac{\int x^2 y dx}{\int xy dx} = \frac{(r+2n)x^{(r+3n):n}}{(r+3n)x^{(r+2n):n}} = \frac{r+2n}{r+3n} x$$

E. gr. In parabola Apolloniana  $r = 1$ ,  $n = 2$ . Ergo distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{5}{7} AE$ .

In paraboloido cubicali  $r = 1$ ,  $n = 3$ . Ergo distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{7}{10} AE$ .

In paraboloido biquadratico  $r = 1$ ,  $n = 4$ . Ergo distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{9}{13} AE$ .

In curva, ad quam  $ax^2 = y^2$ ,  $r = 2$ ,  $n = 3$ . Ergo distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{8}{11} AE$ .

In curva, ad quam  $ax^3 = y^3$ ,  $r = 3$ ,  $n = 5$ . Ergo distantia centri oscillationis ab axe  $= \frac{13}{18} AE$ .

## PROBLEMA LXVIII.

441. Invenire centrum oscillationis in parabola SAH circa basin SH agitata.

## RESOLUTIO.

Sit  $AE = b$ ,  $AP = x$ ,  $MP = y$ ; erit  $y dx = x^{1/2} dx$ ,  $EP = b - x$  & distantia centri oscillationis

oscillationis =  $\int x^{1:2} dx (b-x)^2 : \int x^{1:2} dx (b-x)$ .

Quoniam itaque  $\int x^{1:2} dx (b-x)^2$   
 $= \int b^2 x^{1:2} dx - \int 2bx^{3:2} dx + \int x^{5:2} dx$   
 $= \frac{2}{5} b^2 x^{3:2} - \frac{4}{7} bx^{5:2} + \frac{2}{7} x^{7:2}$   
 $= \frac{70b^2 x^3 - 84bx^5 + 30x^7}{105}$  &

$\int x^{1:2} dx (b-x) = \int bx^{1:2} dx - \int x^{3:2} dx$   
 $= \frac{2}{3} bx^{3:2} - \frac{2}{5} x^{5:2} = \frac{10bx^{3:2} - 6x^{5:2}}{15}$ .

erit distantia centri oscillationis  
 $= \frac{15(70b^2 x^3 - 84bx^5 + 30x^7)}{105(10bx^{3:2} - 6x^{5:2})}$   
 $= \frac{35b^2 - 42bx + 15x^2}{35b - 21x}$

Quod si fiat  $x = b$ , erit distantia centri oscillationis totius parabolæ SAH à basi SH.

$$= \frac{35b^2 - 42b^2 + 15b^2}{35b - 21b}$$

$$= \frac{8b^2}{14b} = \frac{4}{7}b = \frac{4}{7}AE.$$

PROBLEMA LXIX.

424. Invenire centrum oscillationis in infinitis parabolis SAH circa basim SH agitatis.

RESOLUTIO.

Quoniam pro infinitis parabolis

$y^m = x$  (§. 519 *Analys.*)

$y = x^{1:m}$

$y dx = x^{1:m} dx$

$x^2 y dx = x^{1:m} dx (b-x)^2$

$= x^{1:m} dx (bb - 2bx + xx)$

$= b^2 x^{1:m} dx - 2bx^{1+m} dx + x^{2+1:m} dx$

$\int x^2 y dx = \frac{m}{m+1} b^2 x^{1+1:m} dx - \frac{2m}{2m+1} bx^{2+1:m} + \frac{m}{3m+1} x^{3+1:m}$

$= \frac{m(2m+1)(3m+1)b^2 x^{1+1:m} - 2m(m+1)(3m+1)bx^{2+1:m} + m(m+1)(2m+1)x^{3+1:m}}{(m+1)(2m+1)(3m+1)}$

$\int xy dx = \int bx^{1:m} dx - \int x^{1+1:m} dx = \frac{m}{m+1} bx^{1+1:m} - \frac{m}{2m+1} x^{2+1:m}$

$= \frac{m(2m+1)bx^{1+1:m} - m(m+1)x^{2+1:m}}{(m+1)(2m+1)}$

$\frac{dx}{x} = \frac{m(m+1)(2m+1)^2(3m+1)b^2 x^{1+1:m} - 2m(m+1)^2(2m+1)(3m+1)bx^{2+1:m} + m(m+1)^2(2m+1)^2 x^{3+1:m}}{m(m+1)(2m+1)^2(3m+1)bx^{1+1:m} - m(m+1)^2(2m+1)(3m+1)x^{2+1:m}}$

$= \frac{(2m+1)(3m+1)b^2 - (2m+2)(3m+1)bx + (m+1)(2m+1)xx}{(2m+1)(3m+1)b - (m+1)(3m+1)x}$

Quod si fiat  $x = b$ , cum sit

$(2m+1)(3m+1) = 6m^2 + 5m + 1$

$(2m+2)(3m+1) = 6m^2 + 8m + 2$

$(m+1)(2m+1) = 2m^2 + 3m + 1$

$(m+1)(3m+1) = 3m^2 + 4m + 1$

reperietur distantia centri oscillatio-

nis in infinitis parabolis à Basi

SH =  $\frac{2m^2 b^2}{(3m^2 + m)b} = \frac{2mb}{3m+1} = \frac{2m}{3m+1} AE$

Sit jam  $m = 2$ , prodibit eadem distantia =  $\frac{4}{7}AE$ , ut ante (§. 441).

## LEMMA II.

Tab. 443. Si in triangulo quocunque  
XVI. MAN ducitur utcumque recta AP;  
Fig. erit  $AM^2:PN + AN^2.PM=AP^2.MN$   
157.  $+ PM.PN.MN.$

## DEMONSTRATIO.

Quoniam enim  $o=P$  (§. 156 *Geom.*)  
& ang.  $MAD=MDN$  (§. 315 *Geom.*),  
erit  $AM:AP=ND:NP$ . (§. 267 *Geom.*).  
adeoque  $AM.NP=AP.ND$  (§. 297  
*Arithm.*).

Similiter  $u=y$  (§. 156 *Geom.*) &  
ang.  $ANM=ADM$  (§. 315 *Geom.*),  
consequenter (§. 267 *Geom.*)

$AN:AP=MD:MP$   
adeoque  $AN.MP=AP.MD$  (§.  
297 *Arithm.*):

Est vero  $MN.AD=AM.ND$   
 $+ AN.MD$  (§. 324 *Analys.*).

Quare cum fit  $AD=AP + PD$   
(§. 86 *Arithm.*); erit etiam  $MN.AP$   
 $+ MN.PD=AM.ND + AN.MD$ ,  
consequenter  $MN.AP^2 + MN.PD.AP$   
 $=AM.ND.AP + AN.MD.AP$  (§. 93  
*Arithm.*). Quare cum fit *per demonf-*  
*trata*

$$ND.AP=AM.NP$$

$$MD.AP=AN.MP$$

atque  $AP.PD=MP.PN$  (§. 381 *Geom.*);  
erit  $MN.AP^2 + MN.MP.PN=AM^2.$   
 $NP + AN^2.MP$ . *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

444. Utimur hoc lemmate in determinan-  
do centro oscillationis in figuris, quæ in latus  
agitantur, hoc est, circa axem ad planum figu-  
ræ normalem. Ejus enim determinatio diffici-  
lior est in hoc casu, quam in præcedente, ubi  
agitatio fit in planum: quemadmodum videre  
est apud HUGENIUM (a). Calculum differen-

(a) In Horolog. oscillat. part. 4. f. 91. & seqq.

tialem ad hoc negotium applicavit JACOBUS  
BERNOULLI (b). Nos primum regulam ge-  
neralem demonstrabimus eamque deinde ad  
problemata specialia applicabimus, quemad-  
modum in casu præcedente factum.

## PROBLEMA LXX.

445. Determinare centrum gravita-  
tis in figuris in latus agitatis.

## RESOLUTIO.

Ponamus Figuram AMN agitari in  
latus, hoc est, ita ut planum figuræ AP  
si ad axem oscillationis normale. Con-  
sideremus primum duo puncta M & N  
tanquam pondera æqualia, aut sumantur  
pro punctis potius rectarum MP &  
PN portiones infinite parvæ; erit eorum  
centrum gravitatis commune ob  $MP$   
 $=PN$  in P (§. 154), atque adeo pondus  
in P  $=M + N$  (§. 125), consequenter  
distantia centri oscillationis penduli hu-  
jus compositi  $= \frac{M.AM^2 + N.AN^2}{(M + N)AP}$

(§. 429). Est vero  $M=N$  &  $MP=PN$   
*per hypothes.* Ergo distantia centri oscil-  
lationis  $= \frac{PN.AM^2 + PM.AN^2}{(M + N)AP}$ .

Est vero  $PN.AM^2 + PM.AN^2$   
 $=MN.AP^2 + MN.MP.PN$  (§. 443),  
consequenter  $M.AM^2 + N.AN^2$   
 $=MN.AP^2 + MN.MP.PN$ , hoc est,  
ob  $M=N$ , &  $PM=PN$  adeoque  $MN$   
 $=PM + PN$ ,  $\frac{M.AM^2 + N.AN^2}{P.AP}$ .

$= \frac{P.AP^2 + P.MP.MP}{P.AP}$ . Jam cum  
recta MN in innumera istiusmodi pon-  
duscula

(b) In Comment. Acad. Reg. Scient. A. 1703.  
p. m. 96. 327.

dufcula refolvi poffit, qualia funt M & N = dp; fi PM fumatur variabilis & dicatur y, AP vero x, fumma pondufculorum duorum M & N = dp; erit pro duobus pondufculis distantia centri oscillationis  $\frac{x^2 dp + y^2 dp}{x dp}$ , confequen-

ter pro omnibus pondufculis fecundum rectam MN constitutis distantia centri oscillationis =  $\frac{2 \int x^2 dp + 2 \int y^2 dp}{2 \int x dp}$

=  $\frac{\int x^2 dp + \int y^2 dp}{\int x dp}$ . Enimvero cum pondufcula dp funt parallelogrammula, quorum latitudo est differentiale dy, altitudo differentiale absciffæ, adeoque dp = dx dy & dx respectu dy constans est; erit  $\int dp = dx \int dy$ . Similiter quia y variabilis est respectu x, quod ejus intuito pro constante habetur; erit  $\int x^2 dy = x^2 y$  &  $\int y^2 dy = \frac{1}{3} y^3$  &  $\int x dy = xy$ , confequenter fi jam y fumatur pro integra femiordinata PM; erit distantia centri oscillationis in integra figura plana oscillante MAN =  $\frac{\int x^2 y dx + \int \frac{1}{3} y^3 dx}{\int x y dx}$ .

Non alia igitur re opus est, quam ut pro y ex æquatione ad curvam speciali fubftituatur valor ipfius y & y<sup>2</sup>.

COROLLARIUM I.

446.  $\frac{\int x^2 y dx}{\int x y dx}$  exprimit distantiam centri oscillationis in figura in planum agitata (§. 432). Quare fi distantia centri oscillationis in figura in latus agitata defideratur; ad illam nonnifi adjicienda  $\int \frac{1}{3} y^3 dx$ , ubi data vel jam inventa præfupponitur.

COROLLARIUM II.

447. Liquet etiam hinc, distantiam centri oscillationis in figura in planum agitata & in eadem in latus agitata, fiquidem ita vifum fuerit, una reperiri poffe.

PROBLEMA LXXI.

448. Determinare centrum oscillationis rectanguli RIHS ex puncto medio A lateris RI fufpenfi & in latus agitati. Tab. I. Fig. 9.

RESOLUTIO.

Si fuerit RI = SH = a, AP = x, erit distantia centri oscillationis ab axe five à puncto A pro agitatione in planum =  $\frac{2}{3} x$  seu pro integro rectangulo =  $\frac{2}{3} b$  &, ob y = a,  $\int x y dx = \int a x dx = \frac{1}{2} a x^2$  (§. 435) &  $\int \frac{1}{3} y^3 dx = \frac{1}{3} \int a^3 dx = \frac{1}{3} a^3 x$ . Quare  $\frac{\int \frac{1}{3} y^3 dx}{\int x y dx}$  seu particula adjicienda, ut prodeat distantia centri oscillationis rectanguli in latus agitati (§. 446), =  $\frac{2 a^3 x}{3 a x^2} = \frac{2 a^2}{3 x}$ , seu fi porro fiat x = b, =  $\frac{2 a^2}{3 b}$ . Est igitur distantia quaefita =  $\frac{2}{3} b + \frac{2 a^2}{3 b}$ .

PROBLEMA LXXII.

449. Determinare centrum oscillationis trianguli æquicruri SAH ex vertice fufpenfi & in latus agitati. Tab. I. Fig. 9.

RESOLUTIO.

Sit altitudo AE = a, AP = x, EH =  $\frac{1}{2} b$ , PV = y; erit distantia centri oscillationis in planum agitati trianguli =  $\frac{2}{4} x$ , aut totius trianguli =  $\frac{2}{4} a$ ,  $\int y x dx = \frac{b x^2}{6 a}$  &  $\int y = \frac{b x}{2 a}$  (§. 436).

Quare

Quare  $\int \frac{1}{3}y^3 dx = \int \frac{b^3 x^3 dx}{24a} = \frac{b^3 x^4}{96a^3}$ ,

consequenter particula adjicienda  $\int \frac{1}{3}y^3 dx$   
 $\int xy dx$

$= \frac{b^3 x^4}{96a^3} : \frac{bx^3}{6a} = \frac{6ab^3 x^4}{96a^3 bx^3} = \frac{b^2 x}{16a^2}$ .

Est igitur distantia centri oscillationis trianguli æquicruri ex vertice suspensi & in latus agitati  $= \frac{3}{4}x + b^2x : 16a^2$ . Quodsi fiat  $x = a$ ; erit distantia centri oscillationis trianguli æquicruri

$= \frac{3}{4}a + \frac{b^2}{16a}$ .

PROBLEMA LXXIII.

Tab. I. 450. *Determinare centrum oscillationis trianguli æquicruri SAH in medio basis SH suspensi & in latus agitati.*

RESOLUTIO.

Sint omnia ut in problemate præcedente, erit  $PE = a - x$ ,  $\int yx dx$

$= \frac{1}{4}bx^2 - \frac{bx^3}{6a}$  & distantia centri oscillationis trianguli in planum agitati  $= \frac{6a^2 - 8ax + 3x^2}{6a - 4x}$ , aut integri trianguli  $= \frac{1}{2}a$ . Sed  $\int \frac{1}{3}y^3 dx$

$= \frac{b^3 x^4}{96a^3}$  (§. 449). Ergo pars addenda

$= \frac{24ab^3 x^4}{96a^3(6abx^2 - 4bx^3)} = \frac{3b^2 x^2}{72a^3 - 48a^2 x}$

consequenter, si fiat  $x = a$ , pro triangulo integro  $\frac{3a^2 b^2}{72a^3 - 48a^3} = \frac{2b^2}{24a} = \frac{b^2}{8a}$ .

Est igitur distantia centri oscillationis trianguli æquicruri in medio basis suspensi & in latus agitati  $= \frac{1}{2}a + \frac{b^2}{8a}$ .

PROBLEMA LXXIV.

451. *Determinare centrum oscillationis parabola ex vertice suspensa & in latus agitata.*

RESOLUTIO.

In Parabola in planum agitata distantia centri oscillationis à vertice est  $\frac{5}{7}x$  & si parameter  $= 1$ ,  $y^2 = x$  adeoque  $y^3 = x^{1+1/2}$  &  $\int yx dx = \frac{2}{5}x^{5/2}$  (§. 440). Quare cum porro sit  $\int \frac{1}{3}y^3 dx = \int \frac{1}{3}x^{3/2} dx = \frac{2}{15}x^{5/2}$ ; erit pars adjicienda  $= \frac{2}{15}x^{5/2} : \frac{2}{5}x^{5/2} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ . Est nempe parameter unitas, adeoque  $\frac{1}{3}$  pars tertia parametri: quæ si dicatur  $b$ , erit pars adjicienda  $= \frac{1}{3}b$ . Habemus adeo distantiam centri oscillationis à vertice parabola in latus agitatae  $= \frac{5}{7}x + \frac{1}{3}b$ .

PROBLEMA LXXV.

452. *Determinare centrum oscillationis in infinitis parabolis in latus agitatis, & ex vertice suspensis.*

RESOLUTIO.

In infinitis parabolis & curvis agnatis in planum agitatis distantia centri oscillationis à vertice est

$\frac{r+2n}{r+3n}x$ ,  $\int xy dx = \frac{n}{r+2n}x^{(r+2n):n}$

& quia  $y = x^{r:n}$ ,  $y^3 = x^{3r:n}$  (§. 439). Quoniam itaque  $\int \frac{1}{3}y^3 dx$

$= \frac{n}{3(3r+n)}x^{(3r+n):n} = \frac{n}{(9r+3n)}x^{(3r+n):n}$

erit pars adjicienda  $= \frac{n}{9r+3n}x^{(3r+n):n} : \frac{n}{r+2n}x^{(r+2n):n}$

$= \frac{r+2n}{9r+3n}x^{(2r-n):n}$ . Est itaque dif-

tantia centri oscillationis in infinitis parabolis aliisque curvis in latus agitatis

$$\frac{r+2n}{r+3n}x + \frac{r+2n}{9r+3n}x^{(2r-n):n}$$

Quoniam in parabola Apolloniana  $r=1$ ,  $n=2$ , erit  $\frac{r+2n}{r+3n} = \frac{1+4}{1+6} = \frac{5}{7}$ ,  $\frac{r+2n}{9r+3n} = \frac{1+4}{9+6} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ ,  $\frac{2r-n}{n} = \frac{2-2}{2} = 0$ , adeoque  $x^{(2r-n):n} = x^0 = 1$ . Est adeo in parabola Apolloniana distantia centri oscillationis à vertice  $\frac{5}{7}x + \frac{1}{3}b$ , si nempe parameter  $= b$ , prorsus ut in Problemate præcedente (451).

PROBLEMA LXXVI.

453. Determinare centrum oscillationis parabola ex dimidia basi suspensæ & in latus agitata.

RESOLUTIO.

In parabola SAH circa basin SH in planum agitata distantia centri oscillationis à basi est  $\frac{4}{3}b$ , seu  $\frac{4}{3}AE$  & si parameter  $= 1$ ,  $y^3 = x^{3:2}$  &  $\int xy dx = 10bx^{3:2} - 6x^{5:2}$  (§. 441). Quare cum porro fit  $\int \frac{1}{2}y^3 dx = \frac{2}{15}x^{5:2}$ ; erit  $\int \frac{1}{2}y^3 dx : \int xy dx$ , seu pars ad-

$$\text{denda } \frac{2x^{5:2}}{10bx^{3:2} - 6x^{5:2}} = \frac{x}{5b - 3x}$$

$$= (\text{si parameter } 1 \text{ fiat } = a) \frac{ax}{5b - 3x}$$

consequenter si fiat  $x=b$ , prodibit pars adjicienda  $= \frac{ba}{5b - 3b} = \frac{1}{2}a$ .

Est igitur distantia centri oscillationis parabolæ ex dimidia basi suspensæ & in latus agitatæ  $= \frac{4}{3}b + \frac{1}{2}a$ .

PROBLEMA LXXVII.

454. Invenire centrum oscillationis in figuris solidis rotatione genitis.

RESOLUTIO.

Non alia re opus est, quam ut in Tab. XVI. formula superiori  $\frac{\int x^2 dp + \int y^2 dp}{\int x dp}$  figuris Fig. 153.

solidis convenienter explicetur valor pondusculi  $dp$ . Designat autem  $dp$  elementum Solidi, quod habetur ducendo in se invicem differentialia abscissæ PQ & semiordinatæ QK atque semiordinatam QK. Sit  $PQ=y$ ,  $AP=x$ ,  $QK=v$ , erit elementum  $vdydx$ , consequenter cum  $\int vdy$  exprimat segmentum PQKL, quod concipitur instar pondusculi in QP collectum, si PM fit  $= y$ ,  $\int vdy$  exprimit integrum semicirculum in lineam rectam MN collectum instar ponderis. Sit adeo ratio radii ad semiperipheriam  $= r : p$ ; erit semiperipheria radio  $PM=y$  descripta  $= \frac{py}{r}$ , consequenter area semicirculi  $= \frac{py^2}{r}$ , adeoque pondusculum  $dp$  in valore  $\int x^2 dp$  substituendum  $= \frac{py^2 dx}{r}$ ; unde

$$\int x^2 dp = \frac{\int px^2 y^2 dx}{r} = \frac{p}{r} \int x^2 y^2 dx$$

Quodsi idem valor substituatur in  $\int x dp$ ; reperietur idem  $\frac{p}{r} \int xy^2 dx$ . Substituatur valor ipsius  $dp$  etiam in formula  $\int y^2 dp$ ; erit pondusculum puncto Q respondens  $y^2 vdydx$ , consequenter ponduscula respondentia lineæ QP  $= dx/vy^2 dy$ .

Dicatur radius circuli  $PN = t$ : erit  $v = \sqrt{(t^2 - y^2)}$ , adeoque  $\int v y^2 dy = \int y^2 dy \sqrt{(t^2 - y^2)}$ . Est vero  $\int y^2 dy \sqrt{(t^2 - y^2)} = \frac{1}{4} t^2 \int v dy - \frac{1}{4} y v^3$  (§. 455). Ergo omnia ponduscula respondentia lineæ  $QP$  sunt  $\frac{1}{4} t^2 dx \int v dy - \frac{1}{4} y v^3 dx$ . Jam  $\int v dy$  exprimit legmentum circuli  $PQKL$ , adeoque degenerat in semicirculum radio  $PM$  descriptum, quando  $PQ$  efficitur ipsi  $PM$  aequalis, adeoque  $t = y$ . In eo igitur casu cum area semicirculi

$$\text{fit } \frac{py^2}{r}, \text{ est } \frac{1}{4} t^2 dx \int v dy = \frac{py^2 dx}{4r}.$$

Et quoniam in  $M$  semiordinata  $QN$  evanescit, erit  $v = 0$ , adeoque etiam  $\frac{1}{4} y v^3 = 0$ . Prodit adeo tandem

$$\frac{\int x^2 dp + \int y^2 dp}{\int x dp} = \frac{pr \int x^2 y^2 dx + \frac{1}{4} pr \int y^4 dx}{pr \int x y^2 dx} = \frac{\int x^2 y^2 dx + \frac{1}{4} y^4 dx}{\int x y^2 dx},$$

ut adeo in casu speciali non alia re opus sit, quam ut pro  $y$  substituatur valor ex æquatione curvæ, vel figuræ, cujus rotatione solidum generatur, quemadmodum Problemata sequentia docent.

SCHOLION I.

455. Diximus, si  $t$  sit constans quantitas &  $v = \sqrt{(t^2 - y^2)}$ , esse  $\int v y^2 dy = \frac{1}{4} t^2 \int v dy - \frac{1}{4} y v^3$ . Id vero facile probatur, differentiando utrumque integralis membrum; quo facto restituitur differentiale ad integrandum propositum (§. 92. *Analys. infin.*). Quodsi ergo  $\frac{1}{4} t^2 \int v dy - \frac{1}{4} y v^3$  differentietur, cum  $t$  constans sit, prodit  $\frac{1}{4} t^2 v dy - \frac{1}{4} v^3 dy - \frac{3}{4} y v^2 dv$ . Jam quia  $v = \sqrt{(t^2 - y^2)}$  per hypoth.  $v dv = -y dy$  &  $v^2 = t^2 - y^2$ . Quare his valoribus in  $\frac{3}{4} y v^2 dv$  &  $\frac{1}{4} v^3 dy$  substitutis;

differentiale emetgit  $\frac{1}{4} t^2 v dy - \frac{1}{4} t^2 v dy + \frac{1}{4} v y^2 dy + \frac{3}{4} y v^2 dy = \frac{1}{4} v y^2 dy = v y^2 dy$ , quod erat elementum ad integrandum propositum.

SCHOLION II.

456. Quoniam solida rotatione figurarum circa axem fixum genita eodem modo agitantur, in quamcunque partem fiat agitatio; non hic attendenda venit differentia, qualem in figuris planis inter agitationem in planum & in latus consideravimus; adeoque in omni casu eadem formula satisfacit.

PROBLEMA LXXVIII.

457. Determinare centrum oscillationis in cylindro ex centro basis suspensio.

RESOLUTIO.

Sit altitudo cylindri  $AB = a$ ,  $CB = b$ ,  $AP = x$ . Quoniam omnes circuli basi paralleli æquales sunt, erit in cylindro  $PM = CB$ , hoc est,  $y = b$ . Unde habemus (§. 454):

$$\begin{aligned} x^2 y^2 dx &= b^2 x^2 dx \\ \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{4} b^4 dx \\ \int x y^2 dx &= b^2 x dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{adeoque } \int x^2 y^2 dx &= \frac{1}{3} b^2 x^3 \\ \int \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{4} b^4 x \\ \int x y^2 dx &= \frac{1}{2} b^2 x^2 \end{aligned}$$

Quare distantia centri oscillationis à puncto suspensionis =  $\frac{\frac{1}{3} b^2 x^3 + \frac{1}{4} b^4 x}{\frac{1}{2} b^2 x^2}$

=  $\frac{2}{3} x + \frac{b^2}{2x}$ . Quodsi fiat  $x = a$ ; prodit distantia centri oscillationis pro integro cylindro  $\frac{2}{3} a + \frac{b^2}{2a}$ .

SCHO-



SCHOLIUM.

458. Equidem DECHALES (a) centri oscillationis distantiam in Cylindro ex centro basis suspensi tantummodo facit  $\frac{2}{3}a$ ; sed ipse non diffitetur suo tempore theoriam centri oscillationis nondum fuisse excultam: immo vix fando quid audiverat de regula HUGENIANA, quæ in Horologio Oscillatorio demonstratur (b).

PROBLEMA LXXIX.

459. Determinare centrum oscillationis in Cono ex vertice suspensio.

RESOLUTIO.

.II. Si altitudo Coni AC = a, radius .15. basis BC = b, AP = x, PM = y; erit  $y = bx : a$  (§. 268. Geom.). Quare (§. 454).

$$\begin{aligned} x^2 y^2 dx &= b^2 x^4 dx : a^2 \\ \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{4} b^4 x^4 dx : a^4 \\ xy^2 dx &= b^2 x^3 dx : a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{adeoque } \int x^2 y^2 dx &= b^2 x^5 : 5a^2 \\ \int \frac{1}{4} y^4 dx &= b^4 x^5 : 20a^4 \\ \int xy^2 dx &= b^2 x^4 : 4a^2 \end{aligned}$$

Distantia igitur centri oscillationis à puncto suspensionis =  $\left(\frac{b^2 x^5}{5a^2} + \frac{b^4 x^5}{20a^4}\right) : \frac{b^2 x^4}{4a^2}$   
 $= \frac{4}{5}x + \frac{b^2 x}{5a^2}$ . Quodsi jam porro fiat  $x = a$ : prodit distantia centri oscillationis pro Cono integro =  $\frac{4}{5}a + \frac{b^2}{5a}$ .

PROBLEMA LXXX.

460. Determinare centrum oscillationis Sphæræ.

(a) In Mundo Mathem. Tom. 2. Stat. Lib. 3. Prop. 65 f. m. 322.  
 (b) Vide Prop. præc. 64.

RESOLUTIO.

Si diameter Sphæræ = 2r, erit  $y^2 = 2rx - x^2$  (§. 377. *Analys.*), adeoque  $y^4 = 4r^2 x^2 - 4rx^3 + x^4$ . Habemus adeo (§. 453).

$$\begin{aligned} x^2 y^2 dx &= 2rx^3 dx - x^4 dx \\ \frac{1}{4} y^4 dx &= r^2 x^2 dx - rx^3 dx + \frac{1}{4} x^4 dx \\ xy^2 dx &= 2rx^2 dx - x^3 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x^2 y^2 dx &= \frac{1}{2} rx^4 - \frac{1}{5} x^5 \\ \int \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{3} r^2 x^3 - \frac{1}{4} rx^4 + \frac{1}{20} x^5 \\ \int xy^2 dx &= \frac{2}{3} rx^3 - \frac{1}{4} x^4 \end{aligned}$$

Est itaque distantia centri oscillationis à puncto suspensionis =  $\frac{\frac{1}{2}rx^4 + \frac{1}{3}r^2 x^3 - \frac{3}{20}x^5}{\frac{2}{3}rx^3 - \frac{1}{4}x^4}$   
 = (multiplicando per 12 & dividendo per  $x^3$ )  $\frac{3rx + 4r^2 - \frac{9}{5}x^2}{8r - 3x}$   
 =  $\frac{15rx + 20r^2 - 9x^2}{40r - 15x}$ . Quodsi fiat

$x = 2r$ , prodit distantia centri oscillationis pro Sphæra integra  
 $\frac{30r^2 + 20r^2 - 36r^2}{40r - 30r} = \frac{14}{10}r = \frac{7}{5}r$ .

Si pro r ponatur diameter d, quia  $d = 2r$ , adeoque  $\frac{1}{2}d = r$ , erit eadem distantia =  $\frac{7}{10}d$ .

COROLLARIUM.

461. Si in formula  $\frac{15rx + 20r^2 - 9x^2}{40r - 15x}$  fiat  $x = r$ ; prodit distantia centri oscillationis in hemisphærio  $\frac{15r + 20r^2 - 9r^2}{40r - 15r} = \frac{26r}{35}$ , ubi nempe ex vertice facit suspensum.

## PROBLEMA LXXXI.

462. *Determinare centrum oscillationis in Conoide Parabolico circa verticem agitato.*

## RESOLUTIO.

Si parameter parabolæ generatricis  $a$ , erit  $y^2 = ax$  (§. 388 *Analys.*), adeoque  $y^4 = a^2 x^2$ . Habemus adeo (§. 454).

$$\begin{aligned} x^2 y^2 dx &= ax^3 dx \\ \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{4} a^2 x^2 dx \\ xy^2 dx &= ax^2 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{adeoque } \int x^2 y^2 dx &= \frac{1}{4} ax^4 \\ \int \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{12} a^2 x^3 \\ \int xy^2 dx &= \frac{1}{3} ax^3 \end{aligned}$$

Quamobrem distantia centri oscillationis à vertice

$$= \frac{\frac{1}{4} ax^4 + \frac{1}{12} a^2 x^3}{\frac{1}{3} ax^3} = \frac{3}{4} x + \frac{1}{4} a.$$

Si diameter basis fuerit  $b$ , & altitudo Conoidis  $= c$ ; erit parameter  $= b^2 : c$  (§. 391 *Analys.*). Quodsi ergo  $x$  degenerat in  $c$ ; prodit distantia centri oscillationis à vertice in Conoide integro  $= \frac{3}{4} c + bb : 4c$ .

## PROBLEMA LXXXII.

460. *Determinare centrum oscillationis in omnibus Conoidibus parabolicis in infinitum circa verticem agitatis.*

## RESOLUTIO.

Si parameter fuerit  $1$ , pro omnibus parabolis in infinitum erit  $y = x^{1:m}$  (§. 519

*Analys.*), adeoque  $y^2 = x^{2:m}$  &  $y^4 = x^{4:m}$ . Habemus itaque (§. 454).

$$\begin{aligned} x^2 y^2 dx &= x^{2+2:m} dx \\ \frac{1}{4} y^4 dx &= \frac{1}{4} x^{4+4:m} dx \\ xy^2 dx &= x^{1+2:m} dx \end{aligned}$$

$$\int x^2 y^2 dx = \frac{m}{3m+2} x^{3+2:m}$$

$$\int \frac{1}{4} y^4 dx = \frac{m}{4m+16} x^{1+4:m}$$

$$\int xy^2 dx = \frac{m}{2m+2} x^{2+2:m}$$

Est igitur distantia centri oscillationis in infinitis Conoidibus parabolicis circa verticem agitatis

$$\begin{aligned} &\frac{2m+2}{3m+2} x + \frac{2m+2}{4m+16} x^{-1+2:m} \\ &= \frac{2m+2}{3m+2} x + \frac{m+1}{2m+8} x^{-1+2:m} \end{aligned}$$

Ponatur  $m=2$ , prodit  $\frac{6}{5} x + \frac{3}{12} x^{-1}$ , hoc est, ob  $x^0 = 1$  (§. 55. *Analys.*),  $\frac{3}{4} x + \frac{1}{4}$ . Si parameter, quam posuimus  $= 1$ , fiat  $a$ ; erit distantia centri oscillationis in Conoide parabolico circa verticem agitato  $\frac{3}{4} x + \frac{1}{4} a$ , prorsus ut ante (§. 462).

## PROBLEMA LXXXIII.

464. *Determinare centrum oscillationis in Conoide Hyperbolico circa verticem agitato.*

## RESOLUTIO.

Quoniam planum describens est hyperbola, si axis transversus dicitur  $a$ ; para-

parameter  $b$ , erit  $y^2 = bx + \frac{bx^2}{a}$  (§. 459

*Analys.*), adeoque  $y^4 = b^2 x^2 + \frac{2b^2 x^3}{a}$

+  $\frac{b^2 x^4}{a^2}$ . Habemus igitur (§. 454).

$$x^2 y^2 dx = bx^3 dx + \frac{bx^4 dx}{a}$$

$$\frac{1}{4} y^4 dx = \frac{1}{4} b^2 x^2 dx + \frac{b^2 x^3 dx}{2a} + \frac{b^2 x^4 dx}{4a^2}$$

$$xy^2 dx = bx^2 dx + \frac{bx^3 dx}{a}$$

adeoque

$$\int x^2 y^2 dx = \frac{1}{4} bx^4 + \frac{bx^5}{5a} = \frac{5abx^4 + 4bx^5}{20a}$$

$$\int \frac{1}{4} y^4 dx = \frac{1}{12} b^2 x^3 + \frac{b^2 x^4}{8a} + \frac{b^2 x^5}{20a^2}$$

$$= \frac{160a^2 b^2 x^3 + 240ab^2 x^4 + 96b^2 x^5}{12a \cdot 160a}$$

$$= \frac{10a^2 b^2 x^3 + 15ab^2 x^4 + 6b^2 x^5}{12a \cdot 10a}$$

$$\int xy^2 dx = \frac{1}{3} bx^3 + \frac{bx^4}{4a} = \frac{4abx^3 + 3bx^4}{12a}$$

Prodit itaque

$$\frac{\int x^2 y^2 dx}{\int xy^2 dx} = \frac{3 \cdot 5abx^4 + 3 \cdot 4bx^5}{5 \cdot 4abx^3 + 5 \cdot 3bx^4}$$

$$= \frac{15ax + 12x^2}{20a + 15x}$$

$$\frac{\int \frac{1}{4} y^4 dx}{\int xy^2 dx} = \frac{10a^2 b^2 x^3 + 15ab^2 x^4 + 6b^2 x^5}{10a \cdot 4abx^3 + 10a \cdot 3bx^4}$$

$$= \frac{10a^2 b + 15abx + 6bx^2}{40a^2 + 30ax}$$

Est adeo distantia centri oscillationis à vertice in Conoide hyperbolico

$$\frac{15ax + 12x^2}{20a + 15x} + \frac{10a^2 b + 15abx + 6bx^2}{40a^2 + 30ax}$$

Quodsi fiat  $x = a$ , prodibit distantia Centri oscillationis à vertice in Conoide hyperbolico, cujus altitudo axi transverso æqualis,

$$\frac{15a^2 + 12a^2}{20a + 15a} + \frac{10a^2 b + 15a^2 b + 6a^2 b}{40a^2 + 30a^2} = \frac{27}{35} a + \frac{3}{10} b.$$

PROBLEMA LXXXIV.

465. Determinare centrum oscillationis in spheroidè Elliptico ex vertice, seu altero axis majoris extremo suspensò.

RESOLUTIO.

Si axis transversus fuerit  $a$ , parameter  $b$ ; erit  $y^2 = bx - \frac{bx^2}{a}$  (§. 420. *Analys.*),

adeoque  $y^4 = b^2 x^2 - \frac{2bx^3}{a} + \frac{b^2 x^4}{a^2}$ .

Reperitur adeo, uti in problemate præcedente (§. 464),

$$\int x^2 y^2 dx = \frac{5abx^4 - 4bx^5}{20a}$$

$$\int \frac{1}{4} y^4 dx = \frac{10a^2 b^2 x^3 - 15ab^2 x^4 + 6b^2 x^5}{12a \cdot 10a}$$

$$\int xy^2 dx = \frac{4abx^3 - 3bx^4}{12a}$$

adeoque  $\frac{\int x^2 y^2 dx}{\int xy^2 dx} = \frac{15ax - 12x^2}{20a - 15x}$ .

$$\frac{\int \frac{1}{4} y^4 dx}{\int xy^2 dx} = \frac{10a^2 b - 15abx + 6bx^2}{40a^2 - 30ax}$$

Est igitur distantia centri oscillationis à vertice

$$\frac{15ax - 12x^2}{20a - 15x} + \frac{10a^2b - 15abx + 6bx^2}{40a^2 - 30ax}$$

Quodsi fiat  $x = a$ , prodit distantia centri oscillationis à vertice pro integro Spharoidè circa axem majorem agitato

$$\frac{15a^2 - 12a^2}{20a - 15a} + \frac{16a^2b - 15a^2b}{40a^2 - 30a^2}$$

$= \frac{3}{5}a + \frac{1}{10}b$ . Si fiat axis minor  $= c$ , erit  $b = c^2 : a$  (§. 423. *Analys.*), adeoque distantia centri oscillationis in Sphæ-

$$\text{roide} = \frac{3a}{5} + \frac{c^2}{10a}$$

## PROBLEMA LXXXV.

466. *Determinare centrum oscillationis in Cono ex Centro basis suspensio.*

## RESOLUTIO.

Sit Semidiameter basis  $BC = b$ , Tat  $CP = x$ ,  $AC = a$ , erit  $AP = a - x$ , II consequenter ob  $AC : BC = AP : PM$  Fig (§. 327. *Geom.*),  $PM = y = (ab - bx) : a$  15.

$$= b - bx : a, y^2 = b^2 - \frac{2b^2x}{a} + \frac{b^2x^2}{a^2} \text{ \& } y^4$$

$$= b^4 - \frac{4b^4x}{a} + \frac{6b^4x^2}{a^2} - \frac{4b^4x^3}{a^3} + \frac{b^4x^4}{a^4}$$

Habemus adeo (§. 454) :

$$x^2 y^2 dx = b^2 x^2 dx - \frac{2b^2 x^3 dx}{a} + \frac{b^2 x^4 dx}{a^2}$$

$$\frac{1}{4} y^4 dx = \frac{1}{4} b^4 dx - \frac{b^4 x dx}{a} + \frac{6b^4 x^2 dx}{4a^2} - \frac{b^4 x^3 dx}{a^3} + \frac{b^4 x^4 dx}{4a^4}$$

$$xy^2 dx = b^2 x dx - \frac{2b^2 x^2 dx}{a} + \frac{b^2 x^3 dx}{a^2}$$

$$\int x^2 y^2 dx = \frac{1}{3} b^2 x^3 - \frac{b^2 x^4}{2a} + \frac{b^2 x^5}{5a^2} = \frac{10a^2 b^2 x^3 - 15ab^2 x^4 + 6b^2 x^5}{30a^2}$$

$$\int \frac{1}{4} y^4 dx = \frac{1}{4} b^4 x - \frac{b^4 x^2}{2a} + \frac{b^4 x^3}{2a^2} - \frac{b^4 x^4}{4a^3} + \frac{b^4 x^5}{20a^4}$$

$$= \frac{5a^4 b^4 x - 10a^3 b^4 x^2 + 10a^2 b^4 x^3 - 5ab^4 x^4 + b^4 x^5}{20a^4}$$

$$\int xy^2 dx = \frac{1}{2} b^2 x^2 - \frac{2b^2 x^3}{3a} + \frac{b^2 x^4}{4a^2} = \frac{6a^2 b^2 x^2 - 8ab^2 x^3 + 3b^2 x^4}{12a^2}$$

Est itaque distantia centri oscillationis à puncto suspensionis

$$\frac{20a^2 x - 30ax^2 + 12x^3}{30a^2 - 40ax + 15x^2} + \frac{15a^4 b^2 - 30a^3 b^2 x + 30a^2 b^2 x^2 - 15ab^2 x^3 + 3b^2 x^4}{30a^4 x - 40a^3 x^2 + 15a^2 x^3}$$

Quodsi fiat  $x = a$ , erit distantia centri oscillationis à puncto suspensionis in Cono integro

$$= \frac{20a^3 - 30a^3 + 12a^3}{30a^2 - 40a^2 + 15a^2} + \frac{15a^4 b^2 - 30a^4 b^2 + 30a^4 b^2 - 15a^4 b^2 + 3a^4 b^2}{30a^5 - 40a^5 + 15a^5} = \frac{2}{5}a + \frac{3b^2}{5a}$$

Si al-

Si altitudo Coni fuerit semidiametro basis aequalis, erit  $a = b$ , adeoque  $b^2 : a = a$ . Unde distantia centri oscillationis in Cono rectangulo à puncto suspensionis  $\frac{2}{5}a + \frac{3}{5}a = a$ .

PROBLEMA LXXXVI.

467. Determinare centrum oscillationis in hemisphærio ex centro basis suspensio.

RESOLUTIO.

Quoniam abscissæ hic computantur à centro, si radius circuli sit  $r$ , erit  $y^2 = r^2 - x^2$  (§. 377 Anal.) &  $y^4 = r^4 - 2r^2x^2 + x^4$ . Habemus itaque (§. 454).

$$\begin{aligned} x^2y^2dx &= r^2x^2dx - x^4dx \\ \frac{1}{4}y^4dx &= \frac{1}{4}r^4dx - \frac{1}{2}r^2x^2dx + \frac{1}{4}x^4dx \\ xy^2dx &= r^2xdx - x^3dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x^2y^2dx &= \frac{1}{5}r^2x^3 - \frac{1}{5}x^5 \\ &= \frac{5r^2x^3 - 3x^5}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{4}y^4dx &= \frac{1}{4}r^4x - \frac{1}{6}r^2x^3 + \frac{1}{20}x^5 \\ &= \frac{15r^4x - 10r^2x^3 + 3x^5}{60} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int xy^2dx &= \frac{1}{2}r^2x^2 - \frac{1}{4}x^4 \\ &= \frac{2r^2x^2 - x^4}{4} \end{aligned}$$

Est itaque distantia centri oscillationis à puncto suspensionis

$$\frac{20r^2x - 12x^3}{30r^2 - 15x^2} + \frac{15r^4 - 10r^2x^2 + 3x^4}{30r^2x - 15x^3}$$

aut, reductione ad eandem denominationem facta, multiplicando primum membrum per  $x$ ,

$$\frac{10r^2x^2 - 9x^3 + 15r^4}{30r^2x - 15x^3}$$

Quodsi fiat  $x = r$ , prodibit distantia centri oscillationis à puncto suspensionis in hemisphærio integro

$$= \frac{10r^4 - 9r^4 + 15r^4}{30r^3 - 15r^3} = \frac{16}{15}r.$$

SCHOLIUM.

468. Non absimili modo inveniri potest centrum oscillationis Conoidis & Sphæroidis dimidii ex centro basis suspensi. Potest etiam punctum suspensionis h extra figuram assumi, ut distantia pondusculi P ab axe oscillationis sit Ph atque ab abscissa figuræ AP differat quantitate Ah, veluti si figura oscillans ex Tab. I. filo suspendatur: quo in casu HUGENIUS re- Fig. 9. perit in sphæra ex filo tenui suspensa distantiam centri oscillationis esse longitudinem fili & radium atque duas quintas tertie proportionalis ad compositam ex semidiametro sphærae ac longitudine fili & semidiametrum ipsam  
(a), hoc est, si filum = l, radius = r,  $l + r + \frac{2r^2}{5(l+r)}$

PROBLEMA LXXXVII.

469. Determinare quantitatem pedis horarii.

RESOLUTIO.

1. Horologium pendulo inter duas femicycloides suspensio & singulas oscillationes singulis minutis secundis aut eorum semissibus absolvente (§. 382) instructum & secunda temporis scrupula indice peculiari monstrans ad motum stellarum ea ratione componatur, quæ inferius in Astronomia exponitur.
2. Globus plumbeus ex filo tenui suspensus (§. 377) leniter impellatur, ut nonnisi exiguos arcus describat, quo singulæ oscillationes sint Isochronæ (§. 383) & tamdiu augeatur, vel minuatur fili longitudo, donec oscillationes singulis minutis secundis absolvantur.

3. Quo-

(a) In Horolog. Oscillat. Part. IV. Prop. 22. fol. 142.

3. Quoniam longitudo fili cum radio & duæ quintæ tertiæ proportionalis ad compositam ex semi-diametro & longitudo fili atque femidiametrum ipsam definiunt distantiam centri oscillationis ab axe (§.468) earundem pars tertia quantitatem pedis horarii constituit. (§.425).

## SCHOLIUM I.

470. HUGENIUS (a) hoc modo invenit, pedem horarium esse ad Parisiensem ut 881 ad 864 hoc est, longitudo penduli simplicis oscillationes singulas singulis minutis secundis absolventis esse trium pedum Parisiensium cum octo lineis & dimidia. Monet autem pedem Parisiensem ad Rhenum esse ut 144 ad 139, hoc est, quinque suis lineis diminui debere, ut alterum relinquat.

## SCHOLIUM II.

471. Quodsi gravitas omnibus in locis eadem esset; pes horarius mensura foret universalis & perpetua, quemadmodum HUGENIUS contendit: sed cum eandem variari nunc constet pro diversa ab aequatore distantia (§.390); nonnisi iis in locis eadem penduli simplicis minuta secunda metientis longitudo, quorum latitudines non nimis discrepant. Quo itaque mensura vere universalis haberetur, opus præterea esset, ut ratio longitudinum penduli prædicti in diversis latitudinibus una determinaretur. Nec hoc forte attentione omni prorsus indignum censei debet; hætenus nec per experimenta constare, nec demonstratum esse, quod eodem in loco intra amplum temporis intervallum, veluti aliquot seculorum decursum gravitas non mutetur.

(a) Horolog. Oscillat. Part. IV. Prop. 25. fol. 152. & 153.

## THEOREMA LXIII.

472. Spatium descensus perpendicularis gravium intra minutum secundum temporis est ad semissem longitudinis penduli simplicis, cujus oscillationes minutis secundis respondent, in ratione duplicata peripheriæ ad diametrum circuli.

## DEMONSTRATIO.

Sit pes horarius ter sumtus seu longitudo penduli simplicis, cujus oscillationes minutis secundis horariis respondent (§.425) =  $a$ , tempus descensus per dimidiam illam longitudinem =  $t$ , altitudo quæsitæ =  $x$ , ratio diametri ad peripheriam =  $d:p$ ; erit  $t = d:p$  (§.387). Est vero  $t^2:I = \frac{1}{2}a:x$  (§.87) adeoque  $t^2x = \frac{1}{2}a$ , hoc est, si valor ipsius  $t$  modo inventus substituitur,  $d^2x:p^2 = \frac{1}{2}a$ , seu  $d^2x = \frac{1}{2}ap^2$ . Ergo  $x:\frac{1}{2}a = p^2:d^2$ . Q. e. d.

## COROLLARIUM.

473. Quoniam  $d:p = 113:355$  (§.431 Geom.) &  $a = 3'8\frac{1}{2}''$  seu 737 linearum dimidiarum pedis Parisiensis (§.470); erit  $x = ap^2:2d^2 = 737.126025:25538 = 1818'' = 15'1''8''$  seu  $15'1''$  quam proxime.

## SCHOLIUM.

474. Hæc cum experimentis accuratissimis prorsus convenire observavit HUGENIUS (b).

## CAPUT

(b) In Horolog. Oscillat. Part. IV. Prop. 22. fol. 142.

CAPUT XI.

De Motu Projectorum.

DEFINITIO XLIX.

475. **G**rave perpendiculariter projici dicitur, si impellitur secundum lineam directionis, quæ est ad horizontalem perpendicularis.

DEFINITIO L.

476. Grave horizontaliter projici dicitur, si impellitur secundum lineam directionis horizontali apparenti parallelam.

DEFINITIO LI.

477. Grave oblique projici dicitur, si impellitur secundum lineam directionis, quæ cum horizontali apparente angulum efficit obliquum.

DEFINITIO LII.

ab. 478. Angulus elevationis RAB est, quem efficit linea directionis corporis projecti AR cum linea horizontali AB.

THEOREMA LXIV.

479. Si corpus grave perpendiculariter projicitur, perpendiculariter ascendit.

DEMONSTRATIO.

Grave impellitur secundum lineam directionis, quæ est ad horizontalem perpendicularis (§. 475). Quare cum gravitas secundum eandem directionem vi impressæ resistat (§. 215); directionem mutare nequit, sed motum tantum re-

Wolfi Oper. Mathem. Tom. II.

tardat (§. 77). Grave igitur perpendiculariter projectum perpendiculariter ascendit (§. 71). Q. e. d.

THEOREMA LXV.

480. Si corpus grave horizontaliter projicitur, motu suo parabolam describit in medio non resistente. Tab: IV. Fig. 49.

DEMONSTRATIO.

Corpus enim projectum vi impressa uniformiter urgetur secundum rectam AR (§. 71); sed vi gravitatis secundum rectam AC, quæ ad rectam AR, lineæ horizontali (ex hypothesi) parallelam perpendicularis (§. 215). Jam si vi impressa corpus pervenisset in Q, vi gravitatis descendit interea per QM adeoque in M reperitur. Quoniam vero motus secundum directionem AR semper est uniformis, per demonstr. spatia AQ & Aq sunt ut tempora (§. 32.). Sed spatia QM & qm, sunt ut temporum quadrata (§. 80.). Est ergo  $AQ^2 : Aq^2 = QM : qm$ , hoc est,  $PM^2 : pm^2 = AP : Ap$  (257 Geom.) Via igitur, quam grave horizontaliter projectum decurrit, AMm est parabola (§. 402. Analyf. fin.). Q. e. d.

SCHOLIUM.

481. Equidem cum gravia versus centrum telluris tendant (§. 213), rectæ QM & qm in eodem concurrere debent, adeoque parallela non sunt (§. 82. Geom.). Enimvero

vero si tota altitudo AC, per quam decidit grave secundum directionem AR projectum sit exigua admodum pars distantie à centro telluris (§. 216.); pro parallelis citra errorem experimento ullo definiendum haberi possunt.

## THEOREMA LXVI.

Tab.  
IV.  
Fig.  
50.

482. Si corpus grave oblique sive sursum, sive deorsum projicitur in medio non resistente, motu suo Parabolam describit.

## DEMONSTRATIO.

I. Sit linea directionis corporis sursum projecti AR. Cum corpus projectum, si gravitatis actio cessaret, eandem uniformiter describeret (§. 71); positis AQ, Qq, qb & bR aequalibus erunt AQ & Aq ut tempora (§. 32). Quodsi AB sit linea horizontalis, & QM, qm &c. ita ducantur, ut continuatæ in T, t &c. sint ad AB perpendiculares; erunt QM, qm &c. altitudines, per quas vi gravitatis descendit interea corpus projectum, dum ex A in Q, q &c. pervenisset (§. 215.). Quare si AS ducatur ad AB perpendicularis; erit rectis QM, qm &c. parallela (§. 256. Geom.). Ductis porro PM, pm &c. ipsi AR parallelis; erit  $PM=AQ$ ,  $pm=Aq$  &c.  $AP=QM$ ,  $Ap=qm$  &c. (§. 257. Geom.), adeoque  $AP:Ap=PM^2:pm^2$ , (§. 86.). Est igitur AMB parabola, cujus diameter AS (§. 416. *Analys. finit.*). Quod erat unum.

Tab.  
IV.  
Fig.  
51.

II. Sit similiter linea directionis corporis deorsum projecti AR in partes æquales AQ, Qq &c. divisa & RS linea horizontalis. Ducta AS ad RS

perpendiculari & QM, qm &c. eidem AS; PM vero, pm &c. ipsi AR parallelis: eodem, quo ante, modo demonstratur, esse  $AP:Ap=PM^2:pm^2$ . Quare AMm denuo est parabola, cujus diameter AS (§. cit. *Analys. finit.*). Quod erat alterum.

## COROLLARIUM I.

483. Est ergo parameter diametri parabolæ AS tertia proportionalis ad AP & PM: sive QM & AQ (§. cit. *Analys. finit.*), hoc est, ad spatium, per quod grave dato tempore descendit, & ad celeritatem spatio, quod vi impressa eodem tempore describit, definiendam (§. 14.).

## COROLLARIUM II.

484. Cum spatium uno minuto secundo à gravi quocunque perpendiculariter cadendo confectum notum sit, nempe  $15\frac{1}{2}$  pedum Parisiensium (§. 472.), parameter diametri parabolæ describendæ invenitur, si spatii, quod uno minuto secundo projectile vi impressa percurrit, quadratum per  $15\frac{1}{2}$  pedum Parisiensium dividatur (§. 302. *Arithm.*)

## COROLLARIUM III.

485. Si ergo velocitas projectorum eadem spatia eodem tempore vi impressa descripta æqualia sunt (§. 33.), consequenter eadem parabolæ, quas motu composito percurrunt, parameter invenitur (§. 177. *Arithm.*)

## COROLLARIUM IV.

486. Si à parametro diametri subtrahatur ipsius altitudinis AP quadruplum, parameter axis relinquatur (§. 316. *Analys. finit.*), cujus quarta pars est distantia verticis axis à foco parabolæ (§. 36. *Analys. finit.*) Parabola igitur describi potest, data celeritate projectorum (§. 400. *Analys. finit.*) & (§. 484. *Mech.*)

COROL.



COROLLARIUM V.

487. Linea directionis projectilis AR parabolam in A tangit (§. 414. 415. *Analys. finit.*)

DEFINITIO LIII.

488. *Semita* est Parabola, quam corpus horizontaliter vel oblique projectum describit.

DEFINITIO LIV.

489. *Amplitudo* (scilicet *semitæ*) est recta horizontalis AB *semitam* AMB subtendens.

THEOREMA LXVII.

490. *Projectile temporibus equalibus per equalia spatia horizontalia defertur.*

DEMONSTRATIO.

Sit AMB *semita*, AB *amplitudo* ejus, AR *linea directionis* projectilis in partes æquales AQ, Qq &c. divisa. Dēmittantur perpendiculares QT, qt, &c. erunt AT, Tt &c. spatia horizontalia, per quæ *projectile* defertur, dum partes *semitæ* AM, Mm, &c. percurrit. Quoniam *projectile* vis sola impressa uniformiter describeret rectas AQ, Qq &c. (§. 71.); AQ, Qq &c. sunt ut tempora (§. 31). Est vero AQ:Qq = AT:Tt (§. 268. *Geom.*). Ergo AT & Tt sunt ut tempora, consequenter temporibus equalibus etiam AT & Tt æquantur. Q. e. d.

PROBLEMA LXXXVIII.

491. Dato angula elevationis RAB una cum *amplitudine* AB. invenire *parametrum* diametri AS *semitæ* AMS.

RESOLUTIO.

Sit *sinus* anguli elevationis = a, *cosinus* = b, *sinus* totus = t, *amplitudo* AB = c, *parameter* = x. Si AR sumatur pro *sinu* toto, erit BR *sinus*, AB *cosinus* anguli elevationis RAB (§. 3. II. *Trigon.*) adeoque

$$b : a = AB : BR$$

$$b : a = c : \frac{ac}{b}$$

Est itaque BR = AS (§. 257. *Geom.*) = ac : b.

Porro b : t = AB : AR

$$b : t = c : \frac{tc}{b}$$

Est itaque AR = SB (§. cit.) = tc : b.

Quare ob x. AS = SB<sup>2</sup> (§. 416. *Analys. finit.*)

$$acx : b = c^2 t^2 : b^2$$

$$ax = ct^2 : b$$

$$x = ct^2 : ab$$

Æquatio penultima in hanc resolvitur analogiam  $a : \frac{t^2}{b} = c : x$ . Est vero  $\frac{t^2}{b}$  secans anguli elevationis RAB (§. 26. *Trigon.*). Habemus itaque sequens

*Theorema*, *Amplitudo* *semitæ* AB est ad *parametrum* diametri AS ut *sinus* anguli elevationis RAB ad ejus *secantem*.

COROLLARIUM I.

492. Quoniam  $ax = ct^2 : b$  (§. 491), adeoque  $2ax = 2ct^2 : b$  (§. 93. *Aritbm.*) erit etiam  $2abx : 2t^2 = c$ , consequenter  $t : \frac{2ab}{t} = \frac{1}{2}x : c$ . Est vero  $2ab : t$  *sinus* dupli anguli elevationis BAR (§. 325. *Analys. finit.*).

Q 2

Ergo

Ergo semiparameter est ad amplitudinem AB ut sinus totus ad sinum dupli anguli elevationis.

## COROLLARIUM II.

493. Si eadem projectorum celeritas, parameter eadem est (§. 485.). Quare cum sit semiparameter semitæ in uno casu ad amplitudinem, ut sinus totus ad sinum dupli anguli elevationis, & semiparameter semitæ in altero casu ad amplitudinem, ut sinus totus ad sinum dupli anguli elevationis (§. 492.); amplitudines sunt ut sinus angulorum duplorum elevationis, celeritate projectorum existente eadem, (§. 196. Arithm.) & ratio sinus anguli dupli elevationis ad amplitudinem in hoc casu constans est (§. 173. Arithm.).

## THEOREMA LXXXVI.

494. Si eadem maneat projectilis celeritas, amplitudo AB maxima est sub angulo elevationis  $45^\circ$ : æquales vero sunt amplitudines sub angulis elevationis à semirecto æqualiter differentibus.

## DEMONSTRATIO.

Cum ratio sinus anguli dupli elevationis ad amplitudinem constans sit, celeritate projectilis existente eadem (§. 493.); crescente sinu anguli dupli elevationis crescit amplitudo. Quare cum sinus anguli elevationis  $45^\circ$  dupli sit radius, quo major sinus non datur; maxima fit necesse est amplitudo sub sinu anguli elevationis  $45^\circ$ . *Quod erat unum.*

Jam cum idem sit sinus angulorum à recto æqualiter differentium, e. gr.  $80^\circ$  &  $100^\circ$  (§. 5. Trig.), anguli autem dupli a recto æqualiter different, si sim-

pli a semirecto differant æqualiter; amplitudines eo in casu æquales sint necesse est (§. 493). *Quod erat alterum.*

## COROLLARIUM.

495. Quoniam ut sinus totus ad sinum anguli elevationis dupli, ita semiparameter ad amplitudinem (§. 492) & sinus totus sinui anguli elevationis dupli æqualis, si is  $45^\circ$ ; sub angulo elevationis  $45^\circ$  amplitudo semiparametro æquatur.

## PROBLEMA LXXXIX.

496. Data amplitudine maxima, determinare amplitudinem sub angulo elevationis alterius cujuscunque, celeritate manente eadem.

## RESOLUTION.

Quoniam sinus totus est sinus dupli anguli elevationis, quando amplitudo maxima (§. 494); fiat ut sinus totus ad sinum anguli dupli elevationis cujuscunque alterius; ita amplitudo maxima ad quæsitam (§. 493.).

E. g. Sit jactus maximus, seu semirectus alicujus tormenti 6000 passuum & quaratur longitudo jactus graduum 30. Reperietur 5196 passuum.

Log. sin. tot.	1000000000
Log. sin. 60	99375306
Log. 6000	37781512

Log. quæf. + 37156818, cui in tabulis respondent 5196.

## PROBLEMA XC.

497. Data celeritate projectilis invenire amplitudinem maximam.

RESO.

RESOLUTIO.

Cum celeritas projectilis detur per spatium, quod vi impressa dato tempore, e. gr. uno secundo minuto, percurrere valet: non alia re opus est, quam ut parameter semitæ inveniatur (§. 484). Hujus enim semiffis est amplitudo quæsitâ (§. 495).

E. gr. Sit ea projectilis celeritas, qua intra unum minutum secundum 1000 pedes Parisienses seu 12000' conficere valeat. Quodsi itaque 144000000 per 181 dividas, prodibit parameter semitæ maximæ 795580' seu 66298 pedum. Ergo amplitudo maxima 33149. Quæ adeo intra hunc terminum constituta sunt, projectile attingere potest.

PROBLEMA XCI.

498. Data amplitudine maxima invenire celeritatem projectilis seu spatium horizontale intra minutum secundum conficiendum.

RESOLUTIO.

Cum duplum amplitudinis maximæ sit parameter semitæ (§. 495.); inter duplum amplitudinis maximæ & spatium, quod intra minutum secundum conficit grave perpendiculariter cadendo, nempe, 181 digitorum, qualium 12 est pes Parisiensis, quæratu numerus medius continue proportionalis (§. 302 Arithm.) Is enim erit spatium à projectili intra unum minutum secundum conficiendum (§. 495).

Si amplitudo maxima 500 pedum Parisiensium; erit parameter maxima 1000 pedum seu 12000 digitorum & hinc spatium quæsitum =  $\sqrt{(12000 \cdot 181)}$  = 120 pedum Parisiensium cum 9 unciiis seu digitis.

PROBLEMA XCII.

499. Determinare altitudinem maximam tm, ad quam grave oblique projectum ascendit. Tab. IV. Fig. 50.

RESOLUTIO.

Sit  $AB = a$ ,  $BR = b$ ,  $AT = x$ ; erit  $AR^2 = SB^2 = a^2 + b^2$  (§. 417 Geom.). Porro (§. 268 Geom.)

$$AB : BR = AT : TQ;$$

$$a : b = x : \frac{bx}{a}$$

Et (§. 416 *Analys. finit.*)

$$SB^2 : AQ^2 = BR : QM.$$

$$a^2 + b^2 : \frac{a^2x^2 + b^2x^2}{a^2} = b : \frac{bx^2}{a^2}$$

Quare  $TM = bx : a - bx^2 : a^2$ . Cum vero  $tm$  sit maximum aliquod, per *hypoth.* erit (§. 63 *Analys. infinit.*)

$$bdx : a - 2bxdx : a^2 = 0$$

---


$$ab - 2bx = 0$$

---


$$ab = 2bx$$

---


$$\frac{1}{2}a = x$$

*Theorema.* Si amplitudo AB bifariam dividatur in  $t$  & ex puncto  $t$  erigatur perpendicularis  $tm$ ; erit  $tm$  altitudo maxima, ad quam grave juxta directionem AR projectum ascendit.

THEOREMA LXIX.

500. Si altitudo maxima  $tm$ , ad quam grave juxta directionem AR projectum ascendit, continuetur usque ad lineam directionis AR; erit recta  $qm$  inter semitam  $Amb$  & lineam directionis AR intercepta eidem equalis: & si in extremitate semitæ erigatur perpendicularis BR, erit  $tm = \frac{1}{4}BR$ .

## DEMONSTRATIO.

Quoniam  $AB : At = AR : Ag$  (§. 268. *Geom.*), &  $At = \frac{1}{2} AB$  (§. 498); erit etiam  $Ag = \frac{1}{2} AR$ . Est vero  $AR^2 : Ag^2 = BR : gm$  (§. 416. *Analys. fin.*). Quare cum  $Ag^2 = \frac{1}{4} AR^2$ , per demonstrat. erit quoque  $gm = \frac{1}{4} BR$ . Quod erat unum.

Sed, ob  $AB : At = BR : tq$  (§. 268. *Geom.*) &  $At = \frac{1}{2} AB$  (§. 498)  $tq = \frac{1}{2} BR$ , hinc  $\frac{1}{2} tq = \frac{1}{4} BR$ . Est vero  $gm = \frac{1}{4} BR$  per demonstrat. Ergo  $gm = \frac{1}{2} tq$  (§. 87. *Arithm.*) =  $tm$ . Quod erat alterum.

## PROBLEMA XCIII.

501. Data amplitudine  $AB$  & angulo elevationis  $BAR$ , determinare altitudinem jactus maximam  $tm$ .

## RESOLUTIO.

Si  $AR$  sumatur pro sinu toto, erit  $BR$  sinus,  $AB$  cosinus anguli elevationis  $BAR$  (§. 3. II. *Trigon.*) Quare si fiat ut cosinus anguli elevationis ad sinum ejusdem, ita amplitudo  $AB$  ad quartum; reperietur  $BR$ , cujus quarta pars est altitudo jactus maxima  $tm$  (§. 499).

## COROLLARIUM.

502. Quoniam data celeritate projectilis amplitudo maxima (§. 497.) & inde porro amplitudo sub angulo elevationis quocunque invenitur (§. 496.); data celeritate, maxima quoque jactus altitudo inveniri potest (§. 501)

## THEOREMA LXX.

503. Altitudo jactus  $tm$  est ad octavam parametri partem ut sinus versus anguli dupli elevationis ad sinum totum.

## DEMONSTRATIO.

Sit sinus anguli elevationis  $BAR = a$ , cosinus =  $b$ , sinus totus =  $t$ , parameter =  $x$ ; erit amplitudo  $AB = abx : t^2$  (§. 496.) & (§. 501.)

$$b : a = AB : BR$$

$$b : a = \frac{abx}{t^2} : \frac{a^2x}{t^2}$$

Ergo  $tm = \frac{1}{4} BR$  (§. 500.) =  $a^2x : 4t^2 = 2a^2x : 8t^2$ . Est vero  $(b^2 - a^2) : t$  cosinus anguli dupli elevationis (§. 325. *Analys. finit.*) & hinc sinus versus ejusdem anguli dupli  $t - (b^2 - a^2) : t$  (§. 2. *Trigon.*) =  $(t^2 - b^2 + a^2) : t$  consequenter ob  $t^2 - b^2 = a^2$  (§. 16. *Trig.*), idem sinus versus =  $2a^2 : t$ . Est adeo ut  $t$  sinus totus ad  $2a^2 : t$  sinum versus anguli dupli elevationis, ita  $\frac{1}{8}x$  octava parametri pars ad altitudinem  $tm$ . Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

504. Quoniam ut sinus totus ad sinum versus anguli dupli elevationis in uno casu, ita octava parametri pars ad altitudinem jactus, & ut sinus totus ad sinum versus anguli dupli elevationis in altero quocunque casu, ita octava parametri pars ad altitudinem (§. 503.), velocitate autem existente eadem parameter quoque in diversis angulis elevationis eadem est (§. 484); erunt altitudines jactus sub diversis angulis elevationum ut sinus versus eorumdem angulorum duplorum (§. 196. *Arithm.*)

## COROLLARIUM II.

505. Si sinus anguli elevationis in uno casu  $a$ , in altero  $c$ , velocitate existente eadem, altitudines jactus sunt ut  $a^2x : 4t^2$  ad  $c^2x : 4t^2$  (§. 503), hoc est ut  $a^2$  ad  $c^2$  (§. 181 *Arithm.*), adeoque in ratione duplicata sinuum angulorum elevationum.

PRO-

Tab.  
IV.  
Fig.  
50.

PROBLEMA XCIV.

506. *Data celeritate projectilis, altitudine ferendi In & ejus distantia horizontali AI, invenire jactus angulum elevationis.*

RESOLUTIO.

Cum data celeritate projectilis parameter diametri AS detur (§. 483); sit ea =  $a$ . Sit præterea  $IN = b$ ,  $AI = c$ , sinus totus =  $t$ , tangens anguli quaesiti =  $x$ . Quodsi AI sumatur pro sinu toto, erit  $hI$  tangens anguli  $hAI$  (§. 7. *Trigon.*) Est itaque

$$t : x = AI : hI$$

$$t : x = c : \frac{cx}{t}$$

Ergo  $hn = Ar = cx : t - b$  &  $rn^2 = acx : t - ab$  (§. 416. *Anal. fin.*). Est vero etiam  $rn^2 = Ab^2 = AI^2 + hI^2$  (§. 417 *Geom.*) =  $c^2 + c^2 x^2 : t^2$ . Quare

$$c^2 + c^2 x^2 : t^2 = acx : t - ab$$


---


$$\frac{c^2 x^2 : t^2 - acx : t}{\frac{1}{4}a^2} = \frac{-ab - c^2}{\frac{1}{4}a^2}$$


---


$$c^2 x^2 : t^2 - acx : t + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 - ab - c^2$$


---


$$cx : t - \frac{1}{2}a = \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - ab - c^2\right)}$$


---


$$cx : t = \frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - ab - c^2\right)}$$


---


$$x = \left[\frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - ab - c^2\right)}\right] t : c$$

Est igitur ut  $c$  ad  $\frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - ab - c^2\right)}$  ita sinus totus  $t$  ad tangentem anguli elevationis quaesitum  $RAB$ .

COROLLARIUM I.

507. Si  $ab + c^2 = \frac{1}{4}a^2$  seu  $\frac{1}{4}a = b + c^2 : a$  erit  $x = at : 2c$ , adeoque in hoc casu est  $2c : a = t : x$ , hoc est, ut dupla distantia

objecti ferendi AI ad parametrum, ita finus totus ad tangentem anguli elevationis.

COROLLARIUM II.

508. Si  $ab + c^2 > \frac{1}{4}a^2$ ;  $\sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - ab - c^2\right)}$  radix imaginaria evadit (§. 71. *Anal. finit.*), adeoque valor ipsius  $x$  est impossibilis (§. cit.). Quare in hoc casu data celeritate objectum attingi nequit.

THEOREMA LXXI.

509. *Tempora jactuum sub diversis elevationis angulis, velocitate existente eadem, sunt ut sinus angulorum elevationis.*

DEMONSTRATIO.

Sit sinus totus =  $t$ , sinus anguli elevationis  $BAR = a$ , cosinus =  $b$ , parameter semitæ =  $x$ ; erit secans anguli elevationis =  $t^2 : b$ , adeoque  $\frac{t^2}{b} : a = x :$

$AB$  (§. 491), consequenter  $AB = abx : t^2$ . Quare cum sit (§. 33. *Trigon.*)

$$b : t = AB : AR$$

$$b : t = \frac{abx}{t^2} : \frac{ax}{t}$$

adeoque  $AR = ax : t$ ; erit ut sinus totus  $t$  ad sinum anguli elevationis in casu uno ita parameter ad  $AR$  & ut sinus totus ad sinum anguli elevationis in casu alio ita parameter ad  $AR$  in casu alio. Quoniam vero celeritas in utroque casu eadem, per *hypoth.* parameter quoque eadem est (§. 485). Ergo ut sinus angulorum elevationis ita sunt rectæ  $AR$  in diversis elevationum angulis (§. 196. *Arithm.*). Enimvero rectæ  $AR$  sunt spatia, quæ projectilia eadem

Tab. IV. Fig. 50.

eadem celeritate uniformiter describunt, cessante gravitatis actione (§. 71) Tempora igitur jactuum sunt ut ista spatia (§. 32), consequenter ut sinus angulorum elevationis. *Q. e. d.*

### PROBLEMA XCV.

510. *Data celeritate projectilis una cum angulo elevationis RAB, invenire amplitudinem AB, altitudinem jactus  $tm$  & semitam AmB describere.*

#### RESOLUTIO.

1. Ad rectam horizontalem AB erigatur perpendicularis AD, quæ sit altitudo, unde projectile cadendo celeritatem datam acquirere valet (§. 92).
2. Super AD describatur semicirculus AQD, lineam directionis AR secaturus in Q.
3. Per Q ducatur ipsi AB parellela  $Cm$  fiatque  $CQ = Qm$ .
4. Ex puncto  $m$  demittatur ad AB perpendicularis  $mt$ .
5. Denique per verticem  $m$  describatur parabola  $AmB$  parametro  $4CD$ . (§. 393. *Analys. fin.*)

Dico hanc esse semitam quæsitam,  $4CQ$  ejus amplitudinem &  $tm$  jactus altitudinem.

#### DEMONSTRATIO.

Cum anguli ad C &  $m$  sint recti per constr. & verticales ad Q æquales (§. 156. *Geom.*), sit etiam  $CQ = Qm$  per constr. erit  $qm = AC$  (§. 251. *Geom.*). Est vero  $tm = AC$  (§. 257. *Geom.*). Ergo  $qm = mt$  (§. 87. *Arithm.*) consequenter  $tm$  est altitudo jactus (§. 500.) & pro-

jectile parabolam  $AmB$  describit, cujus adeo amplitudo  $AB = 2At$  (§. 499.)  $= 2Cm = 4CQ$ , ob  $CQ = Qm$  per constr. Quod erat primum, secundum & tertium.

Denique quia  $At = Cm$  (§. 257. *Geom.*)  $= 2CQ$ ;  $At^2 = 4CQ^2 = 4DC \cdot AC$  (§. 327. 377. *Geom.*)  $= 4DC \cdot tm$ , per demonstr. Ergo  $4DC$  est parameter parabolæ in vertice  $m$  (§. 388. *Analys. finit.*). Quod erat ultimum.

### COROLLARIUM I.

511. *Data igitur projectilis celeritate, dantur amplitudines & altitudines omnium jactuum, qui fieri possunt, eadem opera. Ducta enim EA, erit sub angulo elevationis EAB altitudo AI, amplitudo 4IE; sub angulo elevationis FAB altitudo AH, amplitudo 4HF (§. 510.).*

### COROLLARIUM II.

512. *Cum AB sit ad AD perpendicularis, per hypoth. circulum in A tangit (§. 304. *Geom.*). & hinc angulus ADQ angulo elevationis RAB æqualis (§. 323. *Geom.*). consequenter AIQ est duplus anguli elevationis (§. 313. *Geom.*). Est itaque CQ quarta pars amplitudinis (§. 510.) sinus rectus; AC altitudo jactus (§. cit.) sinus versus anguli dupli elevationis (§. 2. *Trigon.*).*

#### SCHOLIUM.

513. *Hinc facili opera deducuntur, quæ supra per analysin invenire docuimus, ut ejus in hisce usum ostenderemus.*

### PROBLEMA XCVI.

514. *Data altitudine jactus  $tm$  aut IV. amplitudine AB, una cum angulo eleva-* Tal  
Fig  
tionis 50.

vationis RAB invenire projectilis celeritatem, qua ab initio fertur, hoc est, altitudinem AD, unde cadendo istiusmodi celeritatem acquirere valet.

RESOLUTIO.

Cum AC = tm sit sinus versus, CQ = 1/4 AB (§. 512) sinus rectus anguli AIQ (§. 2. Trig.), quem esse anguli elevationis RAB duplum ex demonstratione problematis 95 (§. 510) constat: queratur ad sinum versus anguli dupli elevationis, sinum totum & altitudinem jactus: vel ad sinum rectum anguli dupli elevationis, sinum totum & quartam amplitudinis partem numerus quartus proportionalis: erit is radius IQ sive IA, cujus duplum AD est altitudo quaesita (§. cit.)

SCHOLIUM.

515. Potuisset quoque Curva projectionis analytice investigari & quidem in omni gravitatis hypothese possibili: quod ut appareat, sequens subjungere lubet problema.

PROBLEMA XCVII.

516. Invenire Curvam projectionis, directionibus gravium suppositis parallelis, in medio non resistente.

RESOLUTIO.

I. Ponamus corpus grave horizontaliter projici secundum directionem AR, AMm esse Curvam projectionis, AQ abscissam, QM semiordinatam, aut, si mavis AP abscissam, PM semiordinatam. Sit AP = QM = x, AQ = PM = y. Intelligatur semiordinata pm alteri PM infini-  
*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

finite propinqua: erit arculus curvae infinite parvus  $Mm = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ , adeoque  $Mm^2 = dx^2 + dy^2$  (§. 144. *Analys. infin.*) Quoniam projectile in medio non resistente movetur per hypoth. motus, quo vi impressa movetur, æquabilis (§. 71). Porro cum grave, dum motu composito per Mm fertur (§. 241). per spatium infinite parvum MO (recta MO parallela & = Pp) descendens isto tempusculo etiam æqualiter moveatur; erit tam MO, quam Om in ratione composita celeritatis & temporis (§. 34). Quodsi ergo ponamus AQ sive PM exponere tempus (§. 31); erit tempusculum, quo projectile per arculum Mm defertur, = dy. Fiat celeritas projectili impressa, quae constans est, 1: erit Om ut dy. Sit porro celeritas à gravi cadendo in M acquisita = v; erit MO ut vdy. Habemus itaque  $Mm^2$  ut  $dy^2 + v^2 dy^2$ , consequenter

$$dy^2 + v^2 dy^2 = dy^2 + dx^2$$

adeoque  $v^2 dy^2 = dx^2$

$$v dy = dx$$

$$dy = dx : v$$

$$y = \int v^{-1} dx$$

Data igitur celeritate v à gravi in M acquisita per x; reperietur æquatio ad Curvam projectionis.

Jam in hypothese GALILÆI  $v = \sqrt{x} = x^{1/2}$  (§. 87).

Ergo  $dy = x^{-1/2} dx$

hoc est  $y = 2x^{1/2} = 2\sqrt{x}$

$$y^2 = 4x$$

R

Est

Est ergo in hypothefi GALILÆANA Curva projectionis parabola, cujus parameter 4. (§. 388. *Anal. fin.*): quemadmodum superius demonstratum (§. 480.). Quoniam  $x : y = y : 4$ , hoc est,  $AP : PM = PM : 4$ , five  $QM : AQ = AQ : 4$ ; parameter curvæ projectionis est tertia proportionalis ad spatium, quod in tempore quocunque grave cadendo conficit, & spatium, quod vi impressa describit: quemadmodum supra reperimus (§. 480.).

Sit in hypothefi BALIANA  $v$  ut  $x$ : erit

$$dy = x^{-1} dx = \frac{dx}{x}$$

---


$$y = \int \frac{dx}{x}$$

$$= lx \text{ (§. 243. } *Analys. infin.*.)$$

Sunt igitur abscissæ  $AQ, Aq$  &c. ut logarithmi semiordinatarum  $QM, qm$  &c. consequenter curva projectionis est Logarithmica, cujus subtangens = 1 (§. 553. *Analys. finit.*.)

Tab. II. Quodsi directio AR fuerit ad horizon-  
 IV. tem AB obliqua, seu si grave  
 Fig. oblique projiciatur (§. 477.), eodem modo solutio procedit. Ducatur  $pm$  ipsi AR parallela & intelligatur alia eidem infinite propinqua. Fiat  $Aq = pm = y, qm = Ap = x$ ; erit arculus infinite parvus curvæ projectionis semiordinatis istis interceptus =  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ , adeoque quadratum ejusdem =  $dx^2 + dy^2$  ut ante. Sit celeritas constans qua mobile fertur = 1, celeritas vero per

$qm = Ap$  acquisita =  $v$ ; tempusculo per arculum infinite parvum consumpto in spatiolis  $dy$  &  $dx$  erit  $dy : dx = 1 : v$  (§. 38), adeoque in hypothefi GALILÆI  $dy : dx = 1 : x^{1:2}$ . prodit; igitur ut ante

$$\frac{dx}{x^{1:2}} = x^{-1:2} dx = dy$$

---


$$2x^{1:2} = 2\sqrt{x} = y$$

---


$$4x = y^2$$

Unde patet in hoc quoque casu curvam projectionis esse parabolam; quemadmodum supra ostendimus (§. 482.)

SCHOLIUM.

517. Supposuimus directiones parallelas, propterea quod lineæ in centro Telluris concurrentes pro parallelis haberi possunt citra errorem assignabilem in iis distantiiis, in quibus experimenta capere licet. Quod si tamen desideraveris problema solvi in hypothefi linearum directionis convergentium; solutionem dudum dedit vir summus NEWTONUS (a): dederunt deinde Geometra celeberrimus HERMANNUS (b) aliique ab eodem laudati (c). Nos sequentem subjungimus, ne quid in hoc argumento desiderari possit.

PROBLEMA XCVIII.

518. Invenire curvam projectionis in hypothefi gravitatis cujuscunque, directionibus in centro Telluris convergentibus.

RESOLUTIO.

Sit curva projectionis AMR & linea directionis ex centro Telluris C ducta

(a) In Princip. Philos. Natur. Mathem. Prop. 41. Lib. 1.  
 (b) In Phoronomia Lib. 1. Prop. 23. §. 162.  
 (c) Loc. cit. §. 164.



CN. Intelligatur  $Cn$  radius ipsi  $CN$  infinite propinquus, radio  $CA = CN = Cn$  descripto arcu  $AB$ . Ducantur porro radii  $CM$  &  $Cm$  arcus concentrici  $PM$  &  $pm$ . Sit denique  $AH$  altitudo, per quam grave cadendo acquirit eam celeritatem, qua vi impressa movetur, ac deinde per curvam  $AMR$  descendat vi impressa & velocitate vi gravitatis quomodocunque accelerata. Dicatur jam  $AH = a$ ,  $AP = x$ ,  $AC = b$ , arcus  $AN = y$ ; erit  $Pp = RM = dx$ ,  $Nn = dy$ ,  $PC = MC = mC$  (§. 4. *Analys. infn.*) =  $b - x$ . Porro propter sectores similes  $CNn$  &  $CRm$ , erit (§. 131. 412. *Geom.*).

$$CN : Cm = Nn : Rm$$

$$b : b - x = dy :$$

$$\text{adeoque } Rm = (b - x) dy : b$$

$$mR^2 = (b - x)^2 dy^2 : b^2$$

$$MR^2 = dx^2$$

$$Mm^2 = \frac{b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2}{b^2}$$

Sit jam celeritas, qua projectile urgetur per  $MR$  vi gravitatis, seu quæ cadendo per altitudinem  $AP$  acquiritur, =  $z$ ; altera vero, qua per arcum  $mM$  motu composito fertur, seu quæ cadendo per  $HP$  acquiritur =  $v$ . Quoniam in spatiolis infinite parvis  $Mm$  &  $RM$  motus æquabilis;  $MR : Mm = z : v$  (§. 33), consequenter

$$MR^2 : Mm^2 = z^2 : v^2 \text{ (§. 260. Arithm.)}$$

$$\text{hoc est, } dx^2 : \frac{b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2}{b^2} = z^2 : v^2$$

$$b^2 dx^2 : b^2 dx^2 + (b - x)^2 dy^2 = z^2 : v^2$$

$$v^2 b^2 dx^2 = b^2 z^2 dx^2 + (b - x)^2 z^2 dy^2$$

$$v^2 b^2 dx^2 - b^2 z^2 dx^2 = (b - x)^2 z^2 dy^2$$

$$\frac{bdx \sqrt{(v^2 - z^2)} = zdy (b - x)}$$

$$dy = \frac{bdx \sqrt{(v^2 - z^2)}}{z(b - x)}$$

$$y = \int \frac{bdx \sqrt{(v^2 - z^2)}}{z(b - x)}$$

Quodsi jam valor ipsius  $v$  atque  $z$  exprimitur per  $x$  ex hypothesi gravitatis; prodibit æquatio ad curvam projectionis specialem.

In hypothesi GALILÆANA,  $v = \sqrt{HP} = \sqrt{(a + x)}$  &  $z = \sqrt{AP} = \sqrt{x}$  (§. 87). Substitutis itaque hisce valoribus in æquatione differentiali generali; prodit specialis

$$dy = \frac{bdx \sqrt{(a + x - x)}}{(b - x) \sqrt{x}} = \frac{bdx \sqrt{a}}{(b - x) \sqrt{x}}$$

Pendet adeo constructio hujus Curvæ à Quadratura alterius Curvæ, cujus abscissa  $x$ , semiordinata vero  $ab \sqrt{a} : (b - x) \sqrt{x} = a^2 b : (b - x) \sqrt{ax}$ . Nimirum si Areae hujus Curvæ dividuntur per  $a$ , seu rectam  $AH$ , unde projectile acquirit celeritatem, qua à vi impressa movetur; prodeunt arcus respondententes  $AN$  eo modo, quem jam exposuimus, cum de Curva Isochrone in Hypothesi directionum in centro Telluris convergentium ageremus (§. 336). Construitur autem Curva, à cujus Quadratura pendet Constructio Curvæ projectionis, ope Parabolæ circa axem  $AC$  parametro  $AH$  descripta, ut semiordinata abscissæ  $AP$  respondens sit  $\sqrt{ax} = PS$ . Est enim ut  $PS$  ad  $AH$  ita  $AH$  ad tertiam proportionalem & ut  $CP$  ad  $CA$  ita

tertia hæc proportionalis ad semiordinatam Curvæ quadrandæ;

Fiat  $b = \infty$  : quo in casu directiones gravium evadunt parallelæ; erit  $x$ , respectu  $b$ ,  $= 0$ , adeoque  $b - x = b$ , consequenter

$$\begin{aligned} dy &= \frac{bdx \sqrt{a}}{(b-x)\sqrt{x}} = \frac{bdx \sqrt{a}}{b\sqrt{x}} \\ &= \frac{dx \sqrt{a}}{\sqrt{x}} = a^{1/2} x^{-1/2} dx \\ y &= 2 a^{1/2} x^{1/2} = 2 \sqrt{ax} \\ \hline y^2 &= 4ax \end{aligned}$$

Est igitur Curva projectionis in hoc casu Parabola (§. 388. *Analys. fin.*), quemadmodum ante reperimus (§. 516) & parameter  $4a$  est quadrupla altitudinis AH, unde cadendo projectilem acquirit celeritatem, qua projicitur, prouti supra demonstratum fuit (§. 510).

## SCHOLION.

519. Curva projectionis Trajectoria appellari solet, qua denominatione quoque utitur NEWTONUS.

## CAPUT XII.

*De Motu Corporum ex Percussione.*

## DEFINITIO LV.

520. **C**orpus perfecte durum est, quod ab ictu figuram non mutat.

## DEFINITIO LVI.

521. *Corpus molle* est, quod ab ictu figuram pristinam amittit, ut argilla, febum, cera.

## DEFINITIO LVII.

522. *Corpus elasticum* est, quod ab ictu figuram quidem mutat, sed vi propria in eandem rursus restituitur. Talis est ensis, qui ad ictum incurvatur, sed statim resilit in figuram pristinam.

## DEFINITIO LVIII.

523. *Corpus unum in alterum directe impingere* dicitur, si impingit secundum rectam ad contactum perpendicularem.

## COROLLARIUM.

524. Sphæra igitur A directe in alteram Tab B impingit, si linea directionis centra IV. utriusque jungit (§. 38. *Analys. infinit.*) Fig. 53.

## DEFINITIO LIX.

526. *Corpus unum in alterum indirecte vel oblique impingere* dicitur, si impingit secundum rectam ad contactum obliquam.

DEFINITIO LX.

527. *Centrum percussionis est punctum in quo ictus est maximus.*

AXIOMA VIII.

528. *Actioni aequalis, sed contraria est reactio.*

SCHOLIUM

529. *Hoc legum motus principium ab experientia petitur & à celeberrimo NEWTONO (a) his exemplis illustratur. „ Si quis, „ inquit, lapidem digito premit, premitur „ & hujus digitus à lapide. Si equus la- „ pidem funi alligatum trahit, retrahetur „ etiam & equus aequaliter in lapidem: „ nam funis utrinque distentus eodem re- „ laxandi se conatu urgebit equum ver- „ sus lapidem ac lapidem versus equum, „ tantumque impedit progressum unius, „ quantum promovet progressum alterius. „ Si corpus aliquod in corpus aliud im- „ pingens, motum ejus vi sua quomo- „ docunque mutaverit, idem quoque vi- „ cissim in motu proprio eandem muta- „ tionem in partem contrariam vi alte- „ rius (ob æqualitatem pressionis mutua) „ subibit.*

THEOREMA LXXII.

530. *Effectus pleni sunt Viribus causarum suarum proportionales.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam nihil est sine ratione sufficiente, cur potius sit, quam non sit (§. 25.) Vis determinata indifferens non est, adeoque ipsi determinata effectus quantitas ex necessitate respondet. Quare si Vis  $V$  ut  $V$ , seclusa omni  $Vi$  alia sive adjuvante, sive impediante, effectum  $E$  ut  $E$  producit; etiam alia  $V$  ut  $V$  effectum  $E$

(a) Princip. Mathem. Philos. Natural. pag. 13. Conf. Cosinologia nostra generalis. §. 316. 346.

ut  $E$  producet, consequenter Vis  $mV$  ut  $mV$  (ubi  $m$  notat multipulum aut submultipulum ipsius  $V$ ) producet effectum  $mE$  ut  $mE$ . Est igitur  $V : mV = E : mE$  (§. 149. *Aritm.*) hoc est, effectus pleni sunt Viribus suarum causarum proportionales. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

531. *Vires igitur motum producentes si fuerint aequales, eandem motus quantitatem producent (§. 530) addendum mobili secundum eandem directionem progredienti (§. 76.), subtrahendum vero, si secundum contrariam progredinitatur (§. 77).*

THEOREMA LXXIII.

532. *Si corpus unum A in alterum Tab. B vel quiescens vel tardius motum se- IV. cundum eandem directionem, vel etiam Fig. secundum contrariam ipsi obvium fac- 53. tum impingat; summa motuum in corporibus secundum eandem directionem motis, differentia eorundem in motis juxta contrarias, eadem erit ante & post ictum.*

DEMONSTRATIO.

Ponamus  $A$  &  $B$  moveri juxta eandem directionem, sitque quantitas motus ipsius  $A = a$ , ipsius  $B = b$ , erit summa motuum ante ictum  $= a + b$ . Si  $A$  acceleret motum ipsius  $B$  juxta ejusdem directionem in conflictu, incrementum quoddam motus efficit (§. 22). Quare cum  $B$  eadem vi reagat in  $A$ , qua  $A$  agit in  $B$  (§. 528.), ob contrarias virium æqualium directiones tantum motus subtrahitur ex  $A$ , quantum additur ipsi  $B$  (§. 531). Unde si

quantitas motus ipsius B fuerit post ictum  $= b+c$ ; erit quantitas motus ipsius A post ictum  $= a-c$ . Summa igitur motuum  $b+c+a-c=b+a$  eadem post ictum, quæ ante ictum. Si B quiescit, erit motus quantitas ante ictum  $= 0$ , adeoque motuum summa  $= a$ . Sed si post ictum quantitas motus ipsius B  $= c$ , per demonstrata quantitas motus ipsius A  $= a-c$ . Unde denuo summa motuum eadem ante & post ictum, hoc est  $= a$ .

Si fuerit  $c > a$ : reactione ipsius B, qua efficitur motus  $a+c$  destruitur quantitas motus  $a$  & efficitur motus, secundum directionem contrariam impulsu corporis A,  $= c$ , per demonstrata. Differentia igitur motuum post ictum in corporibus B & A secundum contrarias directiones motus  $= b+a+c-c$  eadem est quæ summa ante ictum  $a+b$ .

Si  $c = a$ , reactione ipsius B destruitur motus in A, adeoque corpus A quiescit & B versus eandem plagam solum progreditur. Unde denuo summa motuum post ictum  $a+b+0$  æquatur summa ante ictum  $a+b$ .

Si corpora A & B sibi mutuo occurrant, erit differentia motuum  $a-b$ . Sit post conflictum quantitas motus ipsius B  $= c$ : destruitur ergo per actionem A motus  $b$  & efficitur  $c$ . Reactione igitur ipsius B in A destruitur motus  $b+c$ , adeoque post conflictum remanet motus  $a-b-c$ . Quodsi  $a > b+c$ , progrediuntur A & B post conflictum juxta eandem directionem estque summa motuum  $a-b-c+c$  eadem quæ differentia  $a-b$  ante ictum.

Quodsi  $c+b > a$ , destruitur reactione ipsius B  $= c+b$  motus  $a$  & efficitur secundum contrariam directionem motus  $c+b-a$ , adeoque B & A resiliunt secundum directiones contrarias. Differentia igitur motuum post ictum  $c-c-b+a$  eadem est, quæ fuerat ante ictum  $a-b$ .

Denique si  $b+c = a$ , reactione ipsius B destruitur motus totus in A, qui adeo post ictum  $= 0$ . Unde summa motuum  $c = a-b$  eadem quæ differentia eorundem ante ictum.

### THEOREMA LXXIII.

533. Si duo corpora A & B pondere equalia & non elastica, equalibus celeritatibus lata, sibi mutuo occurrunt, post ictum ambo quiescunt.

### DEMONSTRATIO.

Cum enim corporum A & B massæ atque celeritates æquales sint per hypoth. motuum quantitates æquales sunt (§. 22). Eorum itaque differentia ante ictum nulla est. Quodsi post ictum secundum eandem directionem progredierentur, summa motuum deberet esse nulla (§. 512): secundum eandem igitur progredi nequeunt. Sed cum secundum contrarias se mutuo urgeant eadem vi, nec ulla sit ratio, cur a se invicem resiliant, per hypoth. secundum directiones contrarias moveri nequeunt. Post ictum ergo ambo quiescunt. Q. e. d.

THEOREMA LXXIV.

534. Si corpus elateris expers A in aliud itidem non elasticum B directe incurrat, nec per conflictum motus extinguatur; post ictum ambo eadem celeritate moventur, secundum eandem directionem.

DEMONSTRATIO.

Si enim A incurrat in B sive quiescens, sive segnius motum, urgebit ipsum secundum directionem suam, adeoque, cum nulla adsit ratio, cur à se invicem resilient, per hypoib. si A vincat, B necessario movebitur secundum directionem ipsius. Quod erat unum.

Quodsi jam A & B secundum eandem directionem progrediuntur, B tardius moveri nequit quam insequens A. Cum vero eandem celeritatem adipiscitur, quam habet ipsum A, motui ejus non amplius resistit adeoque fugit, consequenter ambo eadem celeritate progrediuntur. Quod erat alterum.

THEOREMA LXXV.

b. 535. Si corpus elateris expers A in aliud non elasticum B quiescens directe incurrat, celeritas post ictum est ad celeritatem ante ictum ut pondus ipsius A ad ponderum A & B summam.

DEMONSTRATIO.

Sit massa ipsius A = M, alterius B = m, celeritas prioris = C: erit quantitas motus ipsius A = MC (§. 22), ipsius B vero nulla, adeoque motuum summa post ictum = MC (§. 532), consequenter celeritas = MC: (M+m)

(§. 515. 22). Est adeo ut M + m ponderum summa ad M pondus moti, ita C celeritas ante ictum ad celeritatem post ictum. Q. e. d.

COROLLARIUM.

536. Quodsi corpora A & B fuerint ejusdem ponderis, erit  $M = m$ , adeoque celeritas post ictum = MC: 2 M =  $\frac{1}{2}$  C. Moventur itaque celeritate dimidia ejus, qua A ferebatur ante conflictum.

THEOREMA LXXVI.

537. Si corpus elateris expers A in aliud non elasticum B tardius motum secundum eandem directionem directe impingat; erit celeritas post ictum equalis motuum summe per ponderum summam divisa.

DEMONSTRATIO.

Sint corporum A & B massæ M & m, celeritates C & c; erit motus quantitas ante conflictum MC & mc (§. 22), adeoque summa eorundem MC + mc: quæ cum eadem sit post conflictum (§. 532), erit celeritas communis corporum A & B post eundem (MC + mc): (M + m) (§. 22). Q. e. d.

COROLLARIUM.

536. Si pondera corporum A & B fuerint equalia, erit  $M = m$ , adeoque celeritas post ictum  $M(C + c): 2 M = (C + c): 2$ , seu semisumma celeritatum ante ictum.

THEOREMA LXXVII.

537. Si duo corpora non elastica, pondere equalia, diversis celeritatibus lata, sibi mutuo directe occurrant; post conflictum feruntur celeritatum semidifferentia, qua movebantur ante ictum.

DEMON-

## DEMONSTRATIO.

Sit massa communis  $= M$ , celeritates sint ut  $C$  &  $c$ ; erit differentia motuum  $M(C-c)$ : cui cum æqualis sit post conflictum summa eorundem (§. 532), erit celeritas communis  $= M(C-c):2M=(C-c):2$ , hoc est, æqualis velocitatum ante impactum semidifferentiæ. *Q. e. d.*

## THEOREMA LXXVIII.

Tab. 538. Si duo corpora non elastica A IV. & B iis celeritatibus sibi mutuo directe Fig. occurrant, que sunt reciproce ut pondera eorundem; ambo post ictum quiescunt, 53.

## DEMONSTRATIO.

Sint enim massæ  $M$  &  $m$ , celeritates  $C$  &  $c$ ; quoniam  $M:m=C:c$ , per hypoth. erit  $mc=MC$ ; adeoque motuum differentia ante conflictum nulla (§. 22). Ergo summa motuum post ictum cum nihilo æqualis sit (§. 632); nullus quoque post ictum erit motus, hoc est, ambo quiescunt. *Q. e. d.*

## THEOREMA LXXIX.

539. Si duo corpora non elastica A & B eadem celeritate sibi mutuo directe occurrunt; erit celeritas post impactum ad celeritatem ante eundem ut ponderum differentia ad summam eorundem.

## DEMONSTRATIO.

Sit communis celeritas  $= C$ , massæ corporum A & B ut  $M$  &  $m$ ; erit differentia motuum ante impactum  $(M-m)C$  (§. 22). Huic cum æqualis sit summa

motuum post impactum (§. 532); erit velocitas communis post eundem  $= (M-m)C:(M+m)$  (§. 22), hoc est, ut ponderum summa ad differentiam eorundem, ita celeritas ante ictum ad celeritatem post ictum. *Q. e. d.*

## THEOREMA LXXX.

540. Si duo corpora non elastica A & B quacunque celeritate sibi mutuo directe occurrunt; erit celeritas post ictum æqualis semidifferentiæ motuum per summam ponderum divise.

## DEMONSTRATIO.

Sint corporum A & B massæ  $M$  &  $m$ , celeritates  $C$  &  $c$ ; erit differentia motuum ante ictum  $MC-mc$  (§. 22). Huic cum æqualis sit summa motuum post impactum (§. 532); erit velocitas communis post eundem  $(MC-mc):(M+m)$  (§. 22). *Q. e. d.*

## PROBLEMA XCIX.

541. Determinare partem motus in conflictu amissam à fortiori.

## RESOLUTIO.

1. Celeritas, qua movetur corpus ante conflictum, ducatur in massam ejus, ita habebitur quantitas motus ante conflictum (§. 22.).
2. Similiter celeritas, qua idem fertur post conflictum, ducatur in massam ejus, ita habebitur quantitas motus post conflictum (§. cit.)
3. Quodsi motuum quantitatem posteriorem à priori auferas, relinquetur pars amissa.

E. gr.

E. gr. Si duo corpora æqualis ponderis sibi mutuo occurrant celeritatibus  $C$  &  $c$ , erit celeritas post confictum  $= \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}c$ . Ergo motus quantitas post confictum est  $\frac{1}{2}MC + \frac{1}{2}Mc$ . Sed ante confictum erat in fortiori  $= MC$ . Motus ergo amissus est  $\frac{1}{2}MC - \frac{1}{2}Mc$ . Quare motus integer ad partem amissam ut  $MC$  ad  $\frac{1}{2}MC - \frac{1}{2}Mc$ , hoc est, ut  $2C$  ad  $C - c$ , seu ut dupla celeritas fortioris ad differentiam celeritatum ante confictum.

SCHOLIION.

542. *Hac ergo methodo inveniri possunt theorematata de quantitate motus in confictu amisso & inde magnitudinem ictus æstimare licet.*

DEFINITIO LXI.

543. *Impetum cum LEIBNITIO (a) appello quantitatem motus, seu id quod efficitur ducendo massam in celeritatem (§. 22), quodque adeo vi mortuæ æquipollet (§. 278).*

AXIOMA IX.

544. *Si corpus aliquod non elasticum in obicem, qui cedere nequit, impingit, motus omnis cessat.*

COROLLARIUM.

545. *Si ergo corpus quoddam non elasticum in obicem cedere nescium impingit; impetum omniæ amittit (§. 543.)*

SCHOLIION.

546. *Propositio per experientiam satis manifesta, ut adeo eam instar axiomatis sumere licuerit, nec opus sit ex notione clarioris deficientis eam demum deduci.*

THEOREMA LXXXI.

547. *Centrum percussionis idem est cum centro oscillationis, si corpus percutiens circa punctum fixum rotatur.*

(a) In Actis Erudit. A. 1695. p. 174.

DEMONSTRATIO.

Centrum enim percussionis est punctum, in quo colligitur impetus omnis, seu circa quod impetus partium utrinque æquilibrantur (§. 527). Invenitur adeo si impetus partium considerentur instar ponderum ad lineam inflexilem ac gravitatis expertem applicatorum, hoc est, dividendo summam factorum ex impetibus partium in distantias à puncto suspensionis per summam impetuum (§. 156). Sed eodem modo invenitur centrum oscillationis (§. 431). Ergo centrum oscillationis idem est cum centro percussionis, si corpus percutiens circa punctum fixum rotatur. *Q. e. d.*

SCHOLIION

548. *Quæ igitur supra de centro oscillationis dicta sunt, eadem quoque de centro percussionis valent, si grave percutiens circa punctum fixum rotetur.*

THEOREMA LXXXII.

549. *Centrum percussionis idem est cum centro gravitatis, si corporis percutientis partes omnes motu parallelo feruntur, seu eadem celeritate moventur.*

DEMONSTRATIO.

Impetus enim sunt facti ex ponderibus in celeritates (§. 543). Quare si æquiponderantia per eandem celeritatem multiplices, perinde est ac si eorum æque-multiplicia sumas. Sed æquiponderantium æque-multiplicia quoque æquiponderant (nam si  $A$  æquiponderet ipsi  $B$  etiam  $2A$  ipsis  $2B$  & in genere  $mA$  ipsis  $mB$  æquiponderare intelliguntur). Ergo circa centrum gravitatis

vitatis impetus æquivalentes disponuntur, consequenter centrum gravitatis cum centro percussionis in hoc casu coincidit.

Tab. IV. 550. *Angulus incidentiæ DCA est quem linea directionis corporis impingentis DC efficit ad punctum contactus C.*

#### DEFINITIO LXIII.

551. Quodsi post ictum corpus reflectitur, *Angulus reflexionis ECF* vocatur, quem linea directionis corporis reflexi CE efficit ad punctum contactus, unde resilit.

#### THEOREMA LXXXIII.

552. *Ictus perpendicularis est ad obliquum ut sinus totus ad sinum anguli incidentiæ DCA.*

#### DEMONSTRATIO.

Demittatur ad AB perpendicularis DG, nempe in ipsam obicem, si superficies plana, aut in rectam, quæ eundem in contactu C tangit, si superficies curva, & compleatur rectangulum DGCH. Vis, qua urgetur corpus per DC, æquivalet viribus juxta directiones DH & DG agentibus (§. 241. 245.) Quare cum obex AB non opponatur directioni DH, sed tantum alteri DG; perinde est ac si corpus D tantum percuteret obicem vi secundum DG agente. Æstimatur vero magnitudo ictus ex impetu in conflictu amisso (§. 541) impetus vero ex quantitate motus (§. 543) adeoque cum cor-

pus idem sit, ex celeritate (§. 49), consequenter ex longitudine linearum DG, DH, DC (§. 247). Est adeo impetus corporis D per DC ad impetum per DG ut DC ad DG. Jam dum corpus oblique impingit, destruitur tantum ab obice impetus per DG, *per demonstrat.* si vero perpendiculariter seu directe impingeret, destrueretur impetus totus per DG & DH (§. 545), hoc est, per DC (§. 241). Est ergo ictus perpendicularis ad obliquum ut DC ad DG. Sed si DC sumatur pro sinu toto, erit DG sinus anguli incidentiæ DCG (§. 2. Trig.) Ictus itaque perpendicularis, ad obliquum ut sinus totus ad sinum anguli incidentiæ. *Q. e. d.*

#### THEOREMA LXXXIV.

553. *Elater est æqualis vi comprimantis aut tendentis, quamdiu corpus adhuc comprimi potest.*

#### DEMONSTRATIO.

Corpus elasticum adhuc ulterius comprimi aut tendi potest, nec tamen comprimitur aut tenditur *per hypoth.* Ergo tanta vi resistit, quanta comprimitur vel tenditur (§. 75.). Resistit autem vi elateris (§. 522) adeoque elater æqualis est vi comprimantis aut tendentis. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM.

554. Æquatur itaque etiam vi percutientis, quæ ad corpus elasticum tendendum aut comprimendum requiritur.

#### THEOREMA LXXXV.

555. *Si corpus H in obicem AB, qui cedere nescit, directe impingas, sitque vel*

*urum-*



utrumque, vel alterutrum elasticum, eadem celeritate reflectitur per eandem rectam CH, qua advenerat.

DEMONSTRATIO.

Si elater abesset, tota vis corporis B in resistantiam obicis frangendam infunderetur, motusque cessaret (§. 544). Ergo vis omnis impenditur in compressionem corporis elastici, atque adeo hoc acquirit vim elasticam isti æqualem (§. 553). Cum igitur elater, absumpta vi comprimente, corpus reducat in statum pristinum, eadem vi illud repellit, qua impegerat, consequenter hoc eadem celeritate resilit. Et quoniam corpus elasticum se restituit secundum directionem, secundum quam compressum fuerat (nulla enim adest ratio, quæ directionem immutet); corpus resilit per eandem rectam CH, per per quam advenerat (§. 71). *Q. e. d.*

THEOREMA LXXXVI.

556. Si corpus elasticum D oblique impingit in obicem AB, qui cedere nescit, ita post ictum resilit, ut angulus reflexionis sit æqualis angulo incidentiæ.

DEMONSTRATIO.

Patet ex demonstratione Theorematis 83. (§. 552) vim per DC æquipollere viribus per DG & DH & in ictu tantum impendi vim per DG, Cum adeo post ictum remaneat vis per DH sive CF & per vim elasticam recuperetur vis per DG sive CH (§. 556.); corpus post ictum iisdem viri-

bus urgetur per CF & CH, quibus urgebatur ante consuetum, adeoque motu composito describet rectam CE dato tempore ipsi DC æqualem, eruntque eodem tempore HE & DH æquales utpote ab eadem vi descriptæ (§. 241). Sunt igitur  $\triangle DCH$  &  $\triangle CHF$  æqualia, angulique cognomines æquales (§. 204. *Geom.*), consequenter cum  $HCA = HCF$  (§. 154.)  $DCA = EFC$  (§. 91. *Arithm.*). *Q. e. d.*

PROBLEMA C.

557. Determinare angulum ECF, Tab. sub quo resiliere debet corpus in C oblique impingens, ut ex D in E via brevissima perveniat, supposita nempe reflexione in C. IV. Fig. 52.

RESOLUTIO.

Demissis ex D & E perpendicularibus DG & EF, fiat  $DG = a$ ,  $EF = b$ ,  $FG = c$ ,  $CG = x$ , erit  $CF = c - x$ ,  $DC^2 = aa + xx$ ,  $CE^2 = bb + cc - 2cx + xx$ . Quoniam DC + CE est minimum aliquod per hypoth. fiat (§. 63. *Analys. infinit.*)

$$\frac{\sqrt{(aa+xx)} + \sqrt{(bb+cc-2cx+xx)}}{x dx} = y$$

$$\text{erit } \frac{x dx}{\sqrt{(aa+xx)}} + \frac{x dx - c dx}{\sqrt{(b^2+c^2-2cx+x^2)}} = dy = 0$$

$$\frac{x\sqrt{(b^2+c^2-2cx+x^2)} + (x-c)\sqrt{(a^2+x^2)}}{x\sqrt{(b^2+c^2-2cx+x^2)}} = (c-x)\sqrt{(a^2+x^2)}$$

hoc est,  $CG \cdot CE = CF \cdot CD$   
Est itaque  $CG : CD = CF : CE$  (§. 299. *Arithm.*) Jam si punctum E supponatur

in recta ipsi AB parallela: erit  $EF = DG$  (§. 226 *Geom.*) adeoque si DC sumatur pro sinu toto, erit GC sinus anguli GDC, & si CE sumatur pro sinu toto, erit CF sinus anguli CEF (§. 2. *Trigon.*). Sunt ergo GC & CF arcuum similium sinus (§. 12. *Trigon.*), adeoque anguli GDC & CEF (§. 141. *Geom.*), consequenter & eorum complementa ad rectos DCG & ECF (§. 246. *Geom.*) æquantur.

## COROLLARIUM.

558. Quoniam corpus D post impactum in C ita resilit, ut angulus reflexionis ECF sit æqualis angulo incidentiæ DCG (§. 557); ex D in E, supposita reflexione in C, via brevissima pervenit.

## PROBLEMA CI.

Tab. 559. Determinare punctum C, in  
IV. quod impingere debet corpus D, ut resi-  
Fig. liens incurrat in corpus L.  
52.

## RESOLUTIO.

Dato puncto D, datur DG perpendiculum  $= a$ . Dato puncto L, datur LI  $= b$ , consequenter GI  $= c$ . Fiat GC  $= x$ , erit CI  $= c - x$ . Et quia angulus LCI  $=$  DCG (§. 557), G vero & F recti, per constr. erit (§. 267. *Geom.*)

$$DG : LI = GC : CI$$

$$a : b = x : c - x$$

Ergo  $a + b : a = c : x$  (§. 190. *Arithm.*) hoc est,  $DG + LI : DG = GI : GC$ .

## THEOREMA LXXXVII.

560. Si corpus elasticum A in aliud quiescens Beidem æquale directe incurrat, post ictum quiescet A, & B movebitur ea celeritate, qua ante ictum ferebatur A.

## DEMONSTRATIO.

Si corpora non essent elastica, utrumque post ictum moveretur secundum eandem directionem celeritate dimidia (§. 536). Sed cum vis elastica secundum eam directionem agat, secundum quam facta est compressio, sitque vi comprimenti æqualis (§. 553); dimidia celeritate repellit A adeoque motum ejus sistit; B vero dimidia celeritate ulterius impellit adeoque motum ejus accelerat (§. 76). Fertur itaque post ictum celeritate integra, qua ante ictum ferebatur A, & A quiescit. Q. e. d.

## COROLLARIUM.

561. Cum adeo A omnem suam vim transferat in B, B eodem modo eandem in C, C rursus in D & D tandem in E transferre debet. Quare si fuerint plura corpora elastica pondere æqualia & se mutuo tangentia; atque A impingat in B, quiescentibus omnibus intermediis, movetur ultimum E ea celeritate, qua impegerat A.

## THEOREMA LXXXVIII.

562. Si duo corpora elastica A & B Ta pondere æqualia celeritate æquali sibi mutuo directe occurrant, utrumque resiliet Fi ea celeritate & secundum eam directio- 5. nem, qua advenerat.

## DEMONSTRATIO.

Si elater abesset, ambo quiescerent (§. 536). Omnis ergo vis in compressione consumitur. Huic adeo cum æqualis sit vis elastica, qua resiliunt secundum directio-

directionem, qua advenerant (§. 553); eadem vis æqualiter agens in corpus A & B eandem in utroque celeritatem & quidem pristinæ æqualem producit. Resiliunt itaque eadem celeritate, qua advenerant. *Q. e. d.*

THEOREMA LXXXIX.

ab. 563. Si duo corpora elastica A & B  
V. pondere equalia celeritate inæquali sibi  
Fig. mutuo directe occurrant: post ictum ce-  
3. leritatibus permutatis feruntur.

DEMONSTRATIO.

Concurrant corpora A & B celeritatibus  $C+c$  &  $C$ . Quod si eadem celeritate  $C$  concurrerent, A & B post ictum moveretur celeritate  $C$  (§. 562). Si B quiesceret & A celeritate  $c$  in ipsum incurreret, post ictum quiesceret A, & B moveretur celeritate  $c$  (§. 460). Ergo excessus celeritatis  $c$ , quo fertur A, totus transfunditur per conflictum in B, adeoque ipso peracto A movetur celeritate  $C$ , B vero celeritate  $C+c$ . *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

ab. 564. Post ictum itaque eadem celeritate à se invicem discedunt, qua ante ictum ad se invicem accedebant.

THEOREMA XCI.

565. Si corpus elasticum A in aliud æquale B segnius motum incurrat, post ictum ambo, permutatis celeritatibus, feruntur secundum eandem, nempe pristinam, directionem.

DEMONSTRATIO.

Incurrat A celeritate  $C+c$  in B celeritate  $C$  motum. Quoniam ob cele-

ritates  $C$  &  $C$  æquales nullus fit impulsus, perinde est ac si A sola celeritate  $c$  in B quiescens impingeret. Tum vero quiesceret A, & B moveretur celeritate  $c$  (§. 560). Ergo post ictum A movebitur solâ celeritate  $C$ , B vero celeritate  $C+c$ , & utrumque quidem secundum pristinam directionem, quia nihil directionem immutat. *Q. e. d.*

COROLLARIUM

566. Post ictum eadem celeritate à se invicem discedunt, qua ante ictum ad se in mutuo accedebant,

THEOREMA XCI.

567. Si corpus A in alterum B incurrit, ictus idem est, qui fieret à corpore A in B quiescens cum differentia velocitatum incurrente. Tab. IV. Fig. 53.

DEMONSTRATIO.

Sint enim massæ  $M$  &  $m$ , celeritates  $C$  &  $c$ , erit celeritas communis post impactum  $= (MC + mc) : (M + m)$  (§. 537), adeoque impetus ipsius  $A = (M^2 C + Mmc) : (M + m)$  (§. 543) consequenter impetus per ictum amissus  $= MC - (M^2 C + Mmc) : (M + m) = (M^2 C + MmC - M^2 C - Mmc) : (M + m) = Mm(C - c) : (M + m)$ . Sed si A incurrat in B quiescens celeritate  $C - c$ ; erit celeritas post ictum  $= (MC - Mc) : (M + m)$  (§. 535) adeoque impetus  $(M^2 C - M^2 c) : (M + m)$  (§. 543), consequenter per ictum amissus  $MC - Mc - (M^2 C - M^2 c) : (M + m) = (M^2 C - M^2 c + MmC - Mmc - M^2 C + M^2 c) : (M + m) = MmC - Mmc$

$= Mm (C - c) : (M + m)$ . In utroque igitur casu idem impetus amittitur, consequenter ictus idem est (§. 541).

COROLLARIUM.

568. Cum vis elastica ictui æqualis sit (§. 553); cum differentia velocitatum, quam habebant ante conflictum, in corpora A & B agit.

THEOREMA XCII.

Tab. IV. Fig. 53. 569. Si duo corpora A & B sibi mutuo occurrunt, ictus idem contingit, qui fieret à corpore A in B quiescens cum summa velocitatum impingente.

DEMONSTRATIO.

Sint omnia ut ante, erit celeritas communis post impactum  $(MC - mc) : (M + m)$  (§. 540), adeoque impetus ipsius A seu fortioris  $(M^2C - Mmc) : (M + m)$ , consequenter impetus per ictum amissus  $= MC - (M^2C - Mmc) : (M + m) = (M^2C + MmC - M^2C + Mmc) : (M + m) = (MmC + Mmc) : (M + m) = Mm (C + c) : (M + m)$ . Sed si A incurrat in B quiescens celeritate  $C + c$ , erit celeritas post ictum  $= (MC + Mc) : (M + m)$  (§. 535) adeoque impetus  $(M^2C + M^2c) : (M + m)$  (§. 543), consequenter impetus per ictum amissus  $MC + Mc - (M^2C + M^2c) : (M + m) = (M^2C + M^2c + MmC + Mmc - M^2C - M^2c) : (M + m) = (MmC + Mmc) : (M + m) = Mm (C + c) : (M + m)$ . Q. e. d.

COROLLARIUM.

570. Cum vis elastica ictui æqualis sit (§. 553), in corpora A & B cum summa velocitatum agit, quas ante conflictum habebant,

PROBLEMA CII.

571. Determinare celeritatem corporum elasticorum quorumcunque A & B celeritatibus quibuscunque directe concurrentibus.

RESOLUTIO.

I. Si corpora A & B in eadem plaga tendant, post ictum, vi sola impulsus, secundum eandem moventur celeritate communi  $(MC + mc) : (M + m)$  (§. 533). Accedat jam vis elastica, quæ agit in eadem corpora cum celeritate  $C - c$  (§. 568) adeoque cum in momento ictus A & B corpus unum constituent, eandem ita distribuit, ut celeritates, post ictum à vi elastica acquisitæ sint in ratione massarum reciproca. Sit ergo celeritas ipsi B acquisita  $= x$ , erit

$$\begin{aligned} M : m &= x : C - c - x \\ \hline MC - Mc &= Mx - mx \\ \hline MC - Mc &= Mx + mx \\ \hline (MC - Mc) : (M + m) &= x \end{aligned}$$

Hinc celeritas ipsi A acquisita  $= C - c - (MC - Mc) : (M + m) = (MC - Mc + mC - mc) : (M + m) = (mC - mc) : (M + m)$ . Jam cum elater corpus A repellat, directioni ejus contrarius, celeritas hæc subtrahenda est ab ea, quæ per solum impulsum acquiritur: cum vero idem corpus B ad eandem plagam propellat, celeritas hæc addenda est priori per impulsum solum acquisitæ (§. 76). Unde tandem prodit celeritas ipsius A  $= (MC + mc - mC + mc) : (M + m) = (MC - mC + 2mc)$

$$2mc) : (M + m) \text{ \& ipsius B } = (MC + mc + MC - Mc) : (M + m) = 2MC + mc - Mc : (M + m).$$

E. gr. Sit  $M = 6$  librarum,  $m = 4$ ,  $C = 3$ ,  $c = 2$ , erit post conflictum celeritas ipsius  $A = (18 - 12 + 16) : (6 + 4) = \frac{22}{10} = 2\frac{1}{5}$  & ipsius  $B = (36 + 8 - 12) : 10 = \frac{32}{10} = 3\frac{1}{5}$ . Progrediuntur itaque  $A$  &  $B$  versus eandem plagam celeritatibus  $2\frac{1}{5}$  &  $3\frac{1}{5}$ .

Sit  $M = 2$ ,  $m = 6$ ,  $C = 4$ ;  $c = 1$ , erit post conflictum celeritas ipsius  $A = (8 - 24 + 12) : (2 + 6) = -\frac{4}{3} = -\frac{1}{2}$ ; celeritas ipsius  $B = (16 + 6 - 2) : (2 + 6) = \frac{20}{8} = 2\frac{1}{2}$ . Cum celeritas ipsius  $A$  negativa prodeat, id indicio est, celeritatem per actionem elateris acquisitam esse majorem celeritate per impulsum acquisita, adeoque corpus  $A$  resilire post ictum. Post conflictum itaque  $A$  cum dimidio celeritatis gradu recedit,  $B$  vero cum  $2\frac{1}{2}$  progreditur.

II. Si corpora  $A$  &  $B$  ad contrarias plagas tendentia sibi mutuo occurrant, n conflictu per impulsu solum utrique acquiritur celeritas  $(MC - mc) : (M + m)$  (§. 540). Cum vis elastica in corpora, quæ inter se colliduntur, agat cum celeritate  $C + c$  (§. 570), si celeritas ipsi  $B$  inde acquisita sit  $x$ , erit vi superiorum.

$$M : m = x : C + c - x$$

$$\frac{MC + Mc - Mx = mx}{MC + Mc = Mx + mx}$$

$$(MC + Mc) : (M + m) = x$$

Hinc celeritas, quæ ipsi  $A$  acquiritur,  $C + c - (MC + Mc) : (M + m) = (MC + mC + Mc + mc - MC - Mc) : (M + m) = (mC + mc) : (M + m)$ . Unde tandem ut ante prodit celeritas

ipsius  $A = (MC - mc - mC - mc) : (M + m) = (MC - mC - 2mc) : (M + m)$ ; celeritas vero ipsius  $B = (MC - mc + MC + Mc) : (M + m) = (2MC + Mc - mc) : (M + m)$ . Quodsi  $mC + 2mc > MC$ ; celeritas ipsius  $A$  est negativa, quod ostendit, vim elasticam esse impulsu superiorem, adeoque corpus  $A$  resilire, nec progredi cum resiliente  $B$ .

E. gr. Sit ut ante  $M = 6$ ,  $m = 4$ ,  $C = 3$ ,  $c = 2$ , erit post conflictum celeritas ipsius  $A = (18 - 12 - 16) : 10 = -1$  & ipsius  $B = (36 + 12 - 8) : 10 = \frac{40}{10} = 4$ . Regreditur adeo corpus  $B$  cum quatuor gradibus celeritatum &  $A$  cum uno.

COROLLARIUM I.

572. Quoniam  $\frac{MC - mC + 2mc}{M + m} =$

$$\frac{MC + mC - 2mC + 2mc}{M + m} = C - \frac{2mC - 2mc}{M + m}$$

&  $\frac{2MC + mc - Mc}{M + m} = \frac{Mc + mc + 2MC - 2Mc}{M + m}$

$$= c + \frac{2MC - 2Mc}{M + m} \text{ atque } (2MC - 2Mc) :$$

$(M + m)$  &  $(2mC - 2mc) : (M + m)$  sunt celeritates, quæ se habent ad celeritatum differentiam ante impactum, quæ celeritas respectiva dicitur, ut alterutrius ponderis duplum ad ponderum summam; si corpus elasticum  $A$  in aliud  $B$  sive quiescens, sive tardius motum incurrat, invenitur celeritas post impactum corporis  $A$ , ubi fiat: ut summa ponderum ad duplum pondus ipsius  $B$ , ita celeritatum differentia ante impactum ad celeritatem, quæ ex celeritate ipsius  $A$  ante impactum subducta relinquit celeritatem ejusdem post impactum. Celeritas vero ipsius  $B$  reperitur, si fiat; Ut summa ponderum ad duplum pondus ipsius  $A$ , ita celeritatum differentia ante impactum ad celeritatem, qua addita celeritati ipsius  $B$  prodit celeritas hujus post impactum.

COROLLARIUM

573. Similiter quia  $\frac{MC - mC - 2mc}{M + m}$   
 $= \frac{MC + mC - 2mC}{M + m} - \frac{2mc}{M + m} = C - \frac{2mC + 2mc}{M + m}$   
 &  $\frac{2MC + Mc - mc}{M + m} = \frac{2MC + 2Mc - Mc - mc}{M + m}$   
 $= \frac{2MC + 2Mc}{M + m} - c$ , atque  $(2mC + 2mc) : (M + m)$

&  $(2MC + 2Mc) : (M + m)$  sunt celeritates, quæ se habent ad celeritatum ante impactum summam (quæ *celeritas respectiva* dicitur) ut duplum ponderis alterutrius ad eorundem summam; si duo corpora elastica A & B sibi mutuo occurrant invenitur post impactum corporis A celeritas, ubi fiat: ut *summa ponderum ad duplum pondus ipsius B, ita celeritatum ante impactum summa ad celeritatem quæ ex celeritate ipsius A ante impactum subducta relinquit celeritatem ejusdem post impactum.* Celeritas vero ipsius B invenitur, si fiat: ut *summa ponderum ad duplum pondus ipsius A ita summa celeritatum ante impactum ad celeritatem, ex qua subducta celeritas ante impactum relinquit eam, quæ inest post eundem.*

THEOREMA XCIII.

Tab. IV. Fig. 53. 574. Si corpus elasticum A directe impingit in aliud quiescens B; erit celeritas ejus post conflictum ad celeritatem ante eundem, ut differentia ponderum ad summam eorundem: quam vero communicat cum B, ea ad eandem est ut duplum pondus ipsius A ad ponderum summam.

DEMONSTRATIO.

Si B non quiescit, celeritas ipsius

A post ictum est  $(MC - mC + 2mc) : (M + m)$ , (S. 571). Si vero quiescit, celeritas ejus ante conflictum nulla est, adeoque  $c = 0$ . Quare cum in hoc casu fiat  $2mc = 0$  erit celeritas ipsius A post impactum  $= (MC - mC) : (M + m)$ . Est itaque ad C celeritatem ante conflictum ut  $M - m$  differentia ponderum ad  $M + m$  eorundem summam. *Quod erat unum.*

Similiter si B non quiescit, celeritatem ex conflictu acquirit  $(2MC + mc - Mc) : (M + m)$ , (S. 571). Jam si quiescit, celeritas ejus nulla est adeoque  $c = 0$ , consequenter  $mc = 0$  &  $Mc = 0$ . Quare celeritas ipsius B post conflictum  $= 2MC : (M + m)$ . Est igitur ad celeritatem ipsius A ante conflictum ut duplum ponderis A ad summam ponderum. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM

575. Erit ergo ex æquo post conflictum velocitas ipsius A ad velocitatem ipsius B ut differentia ponderum ad duplum ipsius A (S. 196. Arithm.)

THEOREMA XCIV.

576. Si duo corpora elastica A & B sibi mutuo directe occurrunt cum celeritatibus quæ ipsorum ponderibus reciproce proportionales sunt, post conflictum eadem celeritate à se invicem resiliunt, qua advenerant.

DEMONSTRATIO.

Post conflictum celeritas ipsius A est  $(MC - mC - 2mc) : (M + m)$  & celeritas ipsius B est  $(2MC + Mc - mc) : (M + m)$  (§. 571). Est vero  $M : m = c : C$  per hypoth. adeoque  $mc = MC$  (§. 297. Arithm.) Quod si ergo in expressione celeritatis ipsius A pro  $2mc$  substituas  $2MC$ , prodibit  $(-mC - MC) : (M + m) = -C$ . Refilit ergo A celeritate  $C$ , qua advenerat. Quod erat unum.

Quod si similiter in expressione celeritatis ipsius B pro  $2MC$  substituas  $2mc$ ; prodibit  $(mc + Mc) : (M + m) = c$ . Abit ergo B eadem celeritate, qua advenerat. Quod erat alterum.

THEOREMA. XCV.

577. Si duo corpora elastica ante & post conflictum in eandem plagam moventur; differentia celeritatum tam ante, quam post impulsum eadem.

DEMONSTRATIO.

Sint celeritates corporum  $M$  &  $m$  ante conflictum  $C$  &  $c$ ; crit eorum differentia  $= C - c$ , & corpus  $M$ , quod sequitur, in alterum  $m$  incurrit. Celeritas igitur ipsius  $M$  post conflictum  $= \frac{MC + 2mc - mC}{M + m}$ ; ipsius autem  $m$   $= \frac{mc + 2MC - Mc}{M + m}$ , & quoniam post conflictum adhuc in eandem plagam moventur, celeritas corporis  $M$  celeritate alterius  $m$  minor est, consequenter celeritatum differentia post conflictum

$$\frac{mc + 2MC - Mc - MC - 2mc + mC}{M + m} = \frac{MC - Mc - mc + mC}{M + m} = C - c.$$

Est adeo celeritatum differentia post conflictum eadem, quæ fuerat ante eundem. Q. e. d.

THEOREMA. XCVI.

578. Si duo corpora elastica ante conflictum in eandem plagam moventur, post conflictum in contrarias; differentia celeritatum ante conflictum aequalis est summe celeritatum post eundem.

DEMONSTRATIO.

Sint celeritates corporum  $M$  &  $m$  ante conflictum  $C$  &  $c$ : erit differentia earundem  $C - c$ . Quoniam corpus  $M$ , quod ante conflictum celerius movetur per hypoth. in alterum  $m$  incurrit, & post conflictum  $M$  &  $m$  moventur in plagas contrarias per hypoth. celeritas vi elastica producta in  $M$  major est celeritate ex ictu, utpote qua  $M$  cum  $m$  in eandem plagam progrediebatur (§. 534). Celeritas igitur in corpore  $M$  negativa est adeoque  $= \frac{mC - 2mc - MC}{M + m}$

& in corpore  $m = \frac{2MC + mc - Mc}{M + m}$  (§. 571), consequenter summa celeritatum post conflictum  $= \frac{MC + mC - Mc - mc}{M + m} = C - c$ . Est ergo summa celeritatum post conflictum eadem cum differentia earundem ante eundem. Q. e. d.

## THEOREMA XCVII.

579. Si duo corpora elastica ante conflictum in partes contrarias, post eundem in eandem moventur; summa celeritatum ante conflictum aequalis est differentia earum post eundem.

## DEMONSTRATIO.

Sint celeritates corporum  $M$  &  $m$  ante conflictum  $C$  &  $c$ : erit summa earundem  $C + c$ . Quoniam corpora sibi mutuo occurrunt & post conflictum in eandem partem moventur *per hypoth.* erit post conflictum celeritas corporis  $M$

$$= \frac{MC - mC - 2mc}{M + m} \text{ \& corporis } m \\ = \frac{2MC + Mc - mc}{M + m} \text{ (§. 571). Est}$$

vero differentia harum celeritatum  $\frac{MC + Mc + mC + mc}{M + m} = C + c$ , quæ eadem cum summa celeritatum ante conflictum. *Q. e. d.*

## THEOREMA XCVIII.

580. Si duo corpora elastica ante & post conflictum in partes contrarias moventur; summa celeritatum ante & post conflictum eadem.

## DEMONSTRATIO.

Sint corporum  $M$  &  $m$  celeritates ante conflictum  $C$  &  $c$ ; erit earum summa  $C + c$ . Quoniam corpora hæc ante conflictum in partes contrarias moventur, adeoque sibi mutuo occurrunt *per hypoth.* erit celeritas corporis  $m$

$$= \frac{2MC + Mc - mc}{M + m} \text{ (§. 571). Enim-}$$

vero corpus  $M$  post conflictum in par-

tem ei contrariam movetur, in quam ante eundem tendebat *per hypoth.* adeoque  $mC + 2mc > MC$ , seu celeritas post conflictum negativa, consequenter

$$= \frac{mC + 2mc - MC}{M + m} \text{ (§. cit.) Est igitur}$$

$$\text{summa celeritatum post conflictum.} \\ = \frac{MC + Mc + mC + mc}{M + m} = C + c, \text{ ad-}$$

eoque eadem quæ ante eundem. *Q. e. d.*

## THEOREMA XCIX.

581. Si duo corpora elastica ante & post conflictum in eandem plagam moventur; quantitas motus ante & post conflictum eadem.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam corpora ante conflictum in eandem plagam moventur, unum in alterum incurrit. Incurrat igitur corpus  $M$  celeritate  $C$  in corpus  $m$  celeritate  $c$  motum: erit celeritas illius post con-

$$\text{flictum } \frac{MC + 2mc - mC}{M + m} \text{ \& hujus ce-}$$

$$\text{leritas } \frac{2MC + mc - Mc}{M + m} \text{ (§. 571),}$$

consequenter quantitas motus corporis  $M$

$$\text{post conflictum } = \frac{M^2C + 2Mmc - MmC}{M + m}$$

$$\text{\& corporis } m = \frac{2MmC + m^2c - Mmc}{M + m}$$

Est itaque summa motuum post con-

$$\text{flictum } = \frac{M^2C + MmC + Mmc + m^2c}{M + m}$$

$$= MC + mc \text{ (§. 22). Enimvero quan-}$$

in



in unam summam collecta erat itidem  $MC + mc$  (§. cit.). Quamobrem patet quantitatem motus ante & post conflictum esse eandem. *Q. e. d.*

THEOREMA C.

582. Si duo corpora elastica ante & post conflictum in partes contrarias moventur; differentia quantitatum motus ante & post conflictum eadem.

DEMONSTRATIO.

Quia corpora ante conflictum in partes contrarias moventur per hypoth. sibi mutuo occurrunt. Occurrat itaque corpus M celeritate C corpori m celeritate c moto; erit celeritas corporis m post conflictum  $= \frac{2MC - mc + Mc}{M + m}$  & cum

corpus M post conflictum in partem ei contrariam movetur, qua advenerat, erit celeritas corporis M post conflictum  $= \frac{mC + 2mc - MC}{M + m}$ . Quare quan-

titates motuum in corporibus M & m sunt  $\frac{MmC + 2Mmc - M^2C}{M + m}$  &

$\frac{2MmC - m^2c + Mmc}{M + m}$ , consequenter eorum differentia

$$\frac{MmC - Mmc + M^2C - m^2c}{M + m}$$

$= MC - mc$ . Est vero  $MC - mc$  differentia quantitatum motus ante conflictum. Ergo differentia quantitatum motus ante & post conflictum eadem. *Q. e. d.*

THEOREMA CI.

583. Si duo corpora elastica ante conflictum in eandem partem, post con-

fliktum vero in contrarias moventur; differentia quantitatum motus post conflictum est equalis summæ earundem ante eundem.

DEMONSTRATIO.

Quoniam corpora ante conflictum in eandem partem moventur, corpus unum in alterum incurrit. Incurrat igitur corpus M celeritate C in alterum m celeritate c motum; erit celeritas cor-

$$\text{poris } m = \frac{2MC + mc - Mc}{M + m}. \text{ Quo-}$$

nia vero corpus M movetur post conflictum in partem contrariam ei, in quam ante tendebat; celeritas erit negativa; adeoque celeritas positiva evadet  $mC - 2mc - MC$  (§. 571). Sunt

$$\text{igitur quantitantes motus post conflictum}$$

$$\frac{MmC - 2Mmc - M^2C}{M + m} \text{ \&}$$

$$\frac{2MmC + m^2c - Mmc}{M + m}, \text{ adeoque differentia}$$

$$\frac{MmC + Mmc + M^2C + m^2c}{M + m} = MC + mc.$$

Quare cum sit  $MC + mc$  summa quantitatum motus ante conflictum (§. 22); differentia motuum post conflictum æqualis est summæ ante eundem. •

THEOREMA CII.

594. Si duo corpora elastica ante conflictum in partes contrarias, post eundem in easdem moventur; summa motuum post eundem equalis est differentiæ eorundem ante eundem.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam corpora ante conflictum in partes contrarias contendunt, sibi mutuo occurrunt. Occurrat igitur corpus M celeritate C alteri  $m$  celeritate  $c$  motu; erit celeritas corporis  $m$  post conflictum

$$= \frac{2MC + Mc - mc}{M + m} \text{ \& cor-}$$

$$\text{poris } M = \frac{MC - mC - 2mc}{M + m} \text{ (§. 571).}$$

Sunt adeo quantitates motus post conflictum

$$= \frac{2MmC + Mmc - m^2c}{M + m} \text{ \&}$$

$$\frac{M^2C - MmC - 2Mmc}{M + m}, \text{ consequen-}$$

ter summa motuum post conflictum

$$= \frac{M^2C + MmC - Mmc - m^2c}{M + m}$$

$= MC - mc$ . Quoniam differentia motuum ante conflictum est  $MC - mc$ , summa motuum post eundem est æqualis differentiæ motuum ante eundem.

## THEOREMA CIII.

585 *In conflictu corporum elasticorum hoc solo in casu eadem conservatur motus quantitas, quando corpora ante & post conflictum in eandem plagam moventur.*

## DEMONSTRATIO.

Corpora enim aut ante & post conflictum in eandem plagam moventur aut in contrarias; aut ante conflictum in eandem, post eundem in contrarias; aut denique ante conflictum in contrarias partes post eundem in eandem tendunt. Jam in hoc solo casu, quando corpora ante & post conflictum

in eandem plagam tendunt, summa motuum ante & post conflictum eadem (§. 581. & seqq.). In hoc igitur casu solo eadem conservatur motus quantitas.

## COROLLARIUM.

586. A vero igitur aberravit *Cartesius*, dum hanc statuit Naturæ Legem, quod in omni corporum conflictu eadem semper conservetur motus quantitas.

## SCHOLIUM.

587. Ut idem evidentius appareat, ostendum porro erit, quoniam in casu quantitas motus augetur, in quoniam minuitur. Eo igitur sine addimus Theoremata proxime sequentia.

## THEOREMA CIV.

588. *In conflictu corporum elasticorum quantitas motus augetur, quando ante conflictum in partem eandem, post conflictum in contrarias moventur.*

## DEMONSTRATIO.

Quando enim corpora ante conflictum in partem eandem, post conflictum in contrarias partes feruntur; differentia motuum post conflictum est æqualis summae eorundem ante conflictum (§. 583). Enimvero summa motuum post conflictum est major differentia motuum post eundem: id quod ex terminis manifestum est (§. 61. 64. *Arithm.*). Quamobrem etiã summa motuum post conflictum major est summa eorundem ante conflictum (§. 89. *Arithm.*). Quantitas igitur motus in conflictu augetur. *Q. e. d.*

THEOREMA CV.

589. *In conflictu corporum elastico-  
rum quantitas motus minuitur, quando  
ante conflictum in partes contrarias, post  
eundem in eandem moventur.*

DEMONSTRATIO.

Quando enim corpora ante conflic-  
tum in partes contrarias, post eundem  
in eandem feruntur; summa motuum  
post conflictum æqualis est differentiæ  
eorundem ante conflictum (§. 584).  
Enimvero summa motuum ante con-  
flictum major est differentiæ eorundem  
ante conflictum: id quod ex terminis  
manifestum (§. 61. 64. *Arithm.*). Er-  
go summa motuum ante conflictum ma-  
jor est summa motuum post eundem  
(§. 89. *Arithm.*). Quantitas igitur mo-  
tus in conflictu imminuitur. *Q. e. d.*

THEOREMA CVI.

590. *Corpora elastica post conflictum  
eadem celeritate à se invicem recedunt,  
qua ante eundem ad se invicem accede-  
bant.*

DEMONSTRATIO.

I. Si corpora ante conflictum in ean-  
dem plagam moventur & tardius mo-  
tum præcedit, celerius motum sequi-  
tur, quemadmodum in conflictu sup-  
poni debet; differentiæ celeritatum  
ad se invicem accedunt. Quodsi vero  
post conflictum itidem in eandem pla-  
gam feruntur, differentiæ celeritatum  
post conflictum est æqualis differen-  
tiæ celeritatum ante eundem (§. 577).

Quoniam itaque tardius motum se-  
quitur, celerius motum præcedit,  
quemadmodum ex actione elateris  
intelligitur, qua corpora vi ictus ea-  
dem celeritate secundum eandem di-  
rectionem progressura (§. 534) à se in-  
vicem separantur (§. 571), adeoque  
differentia celeritatum à se invicem  
discedunt; post conflictum ea celeri-  
tate à se invicem recedunt, qua an-  
te eundem ad se invicem accedebant.  
*Quod erat unum.*

II. Si corpora ante conflictum in ean-  
dem plagam moventur & tardius  
motum præcedit, celerius motum  
sequitur, differentiæ celeritatum ad se  
invicem accedunt. Quodsi post con-  
flictum in diversas plagas tendunt,  
summa celeritatum à se invicem re-  
cedunt. Quare cum in hoc casu sum-  
ma celeritatum post conflictum sit  
æqualis differentiæ ante eundem  
(§. 578); eadem celeritate etiam in  
hoc casu post conflictum à se invicem  
discedunt, qua ante eundem ad se in-  
vicem accedebant. *Quod erat secun-  
dum.*

III. Quodsi duo corpora ante conflictum  
in partes contrarias moventur sibi  
mutuo occursura, summa celerita-  
tum ad se invicem accedunt. Quodsi  
post conflictum tendant in eandem,  
cum celerius motum præcedat, tar-  
dius motum sequatur vi eorum, quæ  
*n. I.* dicta sunt; differentiæ celerita-  
tum à se invicem recedunt. Est ve-  
ro differentiæ celeritatum post con-  
flictum æqualis summæ ante eundem

(§. 579). Ergo corpora post conflictum eadem celeritate ad se invicem accedunt, qua post eundem à se invicem recedunt. *Quod erat tertium.*

IV. Denique si duo corpora ante conflictum in partes contrarias moventur sibi mutuo occursura & post conflictum in contrarias à se invicem discedunt; summa celeritatum ante conflictum ad se invicem accedunt, post conflictum à se invicem recedunt. Est vero in hoc casu summa celeritatum ante & post conflictum eadem (§. 580). Ergo eadem celeritate post conflictum à se invicem recedunt, quo ante eundem ad se invicem accedunt. *Quod erat quartum.*

#### SCHOLIUM.

591. Hoc theorema breviter ita enunciatum: In conflictu corporum elasticorum eadem semper conservatur celeritas respectiva. Hanc propositionem alii inter leges motus referunt ac inde regulas motus demonstrans.

#### COROLLARIUM.

592. Æqualibus igitur temporibus ante & post conflictum æquales sunt corporum à se invicem distantie, veluti quo intervallo, uno minuto ante conflictum, corpora à se invicem distant, eadem, uno minuto post eundem, à se invicem distant.

#### THEOREMA CVII.

Tab. IV. Fig. 53. 593. Si duo corpora elastica A & B directe concurrant vel sibi mutuo occurrant, summa factorum ex massis in quadrata celeritatum ante & post conflictum eadem.

#### DEMONSTRATIO.

In concursu directo celeritates post conflictum sunt  $(MC - mC \mp 2mc)$ :  $(M \mp m)$  vel  $(mC - 2mc - MC)$ :  $(M \mp m)$  &  $(2MC - Mc \mp mc)$ :  $(M \mp m)$  (§. 571). Hinc quadrata earundem  $(M^2C^2 \mp 4MmCc - 4m^2Cc \mp 4m^2c^2 \mp m^2C^2 - 2mMC^2)$ :  $(M^2 \mp 2Mm \mp m^2)$  &  $(4M^2C^2 \mp 4MmCc - 2Mm^2c^2 \mp m^2c^2 - 4M^2Cc \mp M^2c^2)$ :  $(M^2 \mp 2Mm \mp m^2)$ , consequenter prior per M, posteriore per m multiplicato, prodit summa factorum ex massis in quadrata celeritatum  $(M^3C^2 \mp 2Mm^2c^2 \mp 2M^2C^2m \mp M^2c^2m \mp Mm^2c^2 \mp m^3c^2)$ :  $(M^2 \mp 2Mm \mp m^2)$  =  $MC^2 \mp mc^2$ , quæ eadem est summa ex factis massarum in quadrata celeritatum ante conflictum. Idem cum eodem modo in occurfu corporum directo ostendatur, quo celeritas corporis m est  $(2MC \mp Mc - mc)$ :  $(M \mp m)$ , corporis vero M est  $\frac{MC - mC - 2mc}{M \mp m}$  vel  $\frac{mC \mp 2mc - MC}{M \mp m}$  (§. 571); patet propositum. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM

594. Eadem itaque in conflictu conservatur Virium vivarum quantitas (§. 325).

#### THEOREMA CVIII.

595. Si duo corpora elastica celeritatibus per conflictum acquisitis denuo in se invicem incurrere, vel sibi mutuo occurrere supponantur; per novum hunc conflictum recuperabunt celeritates, quas ante eundem habebant.

DEMONSTRATIO.

Sint massæ corporum  $M$  &  $m$ , celeritates ante primum conflictum  $C$  &  $c$ , ac corpus  $M$  incurrat in alterum  $m$ : erunt post conflictum celeritates eorundem corporum

$$\frac{MC - mc + 2mc}{M + m} \text{ \& } \frac{2MC + mc - Mc}{-M + m} \text{ -- (S. 571). Quo-}$$

niam celeritas corporis  $m$  major est celeritate alterius  $M$  post conflictum (S. cit.); mutatis directionibus corpus  $m$  in alterum  $M$  incurret. Ne calculus fiat intricatus; fiat  $A = m, B = M$ ,

$$\text{celeritas ipsius } A = V = \frac{2MC + mc - Mc}{M + m}$$

& celeritas corporis  $B = v = \frac{MC - mC + 2mc}{M + m}$ . Erit igitur post alterum

$$\text{conflictum celeritas corporis incurrentis } A = \frac{AV - BV + 2Bv}{A + B} \text{ \& celeritas}$$

$$\text{alterius } B = \frac{2AV + Bv - Av}{A + B} \text{ , Jam}$$

$$\begin{aligned} AV &= 2MmC + m^2c - Mmc \\ -BV &= -2M^2C - Mmc + M^2c \\ +2Bv &= 2M^2C - 2MmC + 4Mmc \end{aligned}$$

$$\frac{AV - BV + 2Bv}{A + B} = \frac{M^2c + 2Mmc + m^2c}{M^2 + 2Mm + m^2} = c$$

Recuperat igitur corpus  $m$  post conflictum alterum celeritatem  $c$ , quam ante primum habebat. *Quod erat unum.* Porro

$$\begin{aligned} 2AV &= 4MmC + 2m^2c - 2Mmc \\ +Bv &= +M^2C - MmC + 2Mmc \\ -Av &= -MmC + m^2C - 2m^2c \end{aligned}$$


---


$$\frac{2AV + Bv - Av}{A + B} = \frac{M^2C + 2MmC + m^2C}{M^2 + 2Mm + m^2} = C$$

Recuperat itaque etiam corpus  $M$  per conflictum alterum celeritatem  $C$ , quam ante primum habebat. *Quod erat secundum.*

Utrumque eodem modo ostenditur, si corpora duo sibi mutuo directa occurrant & mutatis directionibus post conflictum primum denuo sibi occurrere supponantur. *Quod erat tertium & quartum.*

DEFINITIO LXIV.

596. Si linea recta  $AB$  jungit centra gravitatis  $A$  &  $B$  duorum corporum & punctum  $C$  ita eandem dividat, ut sit pondus corporis  $A$  ad pondus corporis  $B$  uti reciproce  $BC$  ad  $CA$ ; dicitur punctum  $C$  *Centrum gravitatis corporum*  $A$  &  $B$ . Tab. I. Fig. 4.

SCHOLIUM.

597. Ratio denominandi patet ex iis, quæ superius (S. 144.) demonstrata sunt.

THEOREMA CIX.

598. *Centrum gravitatis corporum elasticorum ante & post conflictum vel quiescit, vel uniformiter seu eadem velocitate in eandem plagam movetur & temporibus equalibus eodem intervallo ab eodem distant mobilia ante & post conflictum.*

DEMONSTRATIO.

Etenim sumtis temporibus ante & post conflictum aequalibus eadem est corporum  $A$  &  $B$  distantia, adeoque recta jungens eorum centra gravitatis  $AB$  eadem Tab. I. Fig. 4.

eadem ( §. 192. *Geom.* ). Quare cum centrum gravitatis C in eadem recta fixum sit: mobilia ab eodem æquali intervallo distare debent sumtis ante & post conflictum temporibus æqualibus. *Quod erat primum.*

Fieri autem non potest ut eadem ante & post conflictum temporibus æqualibus sit corporum A & B à centro gravitatis distantia, nisi aut centrum istud quiescat, aut ante & post conflictum eodem modo moveatur: quod per se patet. Ergo centrum gravitatis ante & post conflictum vel moveri eodem modo, vel quiescere debet. *Quod erat secundum.*

Quoniam vero centrum gravitatis corpori majori continuo propius est ( §. 144 ); cum corpore majore seu graviore in eandem plagam, adeoque continuo juxta eandem directionem movetur. *Quod erat tertium.*

Denique cum corporum motus sit æquabilis ( §. 71 ), duplo tempore dupla, triplo tripla, quadruplo quadrupla efficitur in corporibus à se invicem recedentibus distantia, in accedentibus vero ad se invicem subdupla, subtripla, subquadrupla ( §. 31 ), consequenter cum distantia à centro sint in constante ratione, nimirum ratione massarum reciproca ( §. 596 ), eadem quoque duplo tempore duplæ, triplo triplæ, quadruplo quadruplæ in casu priori, aut subduplæ, subtriplæ, subquadruplæ in posteriori evadere debent ( §. 178. 181. *Arithm.* ). Quamobrem si centrum gravitatis movetur, spatia ab eo-

dem descripta temporum rationem habere, adeoque ipsum motu æquabili ferri ( §. 31 ), consequenter continuo eadem velocitate progredi debet ( §. 24 ) *Quod erat quartum.*

## SCHOLIUM.

599. *Quod centrum gravitatis subinde quiescat, subinde moveri debeat, & quandonam quiescat, quandonam moveatur, patet ex propositione sequente.*

## THEOREMA CX.

600. *Si duo corpora elastica moveantur celeritatibus, quæ sint massis seu ponderibus ipsorum reciproce proportionales, sibi que mutuo occurrunt, centrum gravitatis ante & post conflictum quiescit: in alio autem casu quocumque non quiescit, sed movetur.*

## DEMONSTRATIO.

Quoniam enim corpora motu æquabili feruntur *per hypoth.* spatia descripta eodem tempore continuo sunt ut celeritates quibus feruntur ( §. 33 ), adeoque in ratione massarum reciproca ( §. 167. *Arithm.* ). Enimvero centrum gravitatis continuo à mobilibus distat in ratione massarum reciproca ( §. 596 ), & ante conflictum auferuntur à distantia anterioribus continuo partes in ratione massarum reciproca *per demonstrat.*; adeoque partes inter mobilia & centri gravitatis locum in anteriore quocumque tempore interceptæ sunt itidem in ratione massarum reciproca ( §. 188. *Arithm.* ), consequenter centrum gravitatis in eodem loco constanter hæret ( §. 596 ) & hinc ante con-

& hinc ante conflictum quiescit. Enimvero post conflictum celeritates eadem prorsus sunt quæ ante eundem fuerant (§. 590), adeoque itidem massis reciproce proportionales *per hypoth.* Patet igitur, ut ante, quod distantia continuo crescant à loco centri gravitatis in tempore quocunque anteriore in ratione massarum reciproca (§. 187. *Arithm.*), consequenter & post conflictum quiescit. *Quod erat unum.*

Jam in omni reliquo casu eodem, quo ante, modo patet quod distantia à loco centri gravitatis dato tempore ante conflictum non decrescant, nec post conflictum crescant in ratione massarum reciproca, consequenter à loco isto continuo non distent corpora in ratione massarum reciproca (§. 188. 187. *Arith.*). Centrum igitur gravitatis non omni tempore in eodem loco est (§. 596), consequenter movetur. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

601. Si corpora elastica æqualia eadem celeritate sibi mutuo occurrunt, celeritates quoque massis reciproce proportionales sunt, quod per se patet. Centrum gravitatis igitur ante & post conflictum quiescit, si corpora elastica æqualia æquali celeritate sibi mutuo occurrunt.

SCHOLIUM.

602. Nimirum casus hic specialis sub generali Theorematis actu continetur, ut dici non possit præter casum Theorematis dari adhuc alium, in quo centrum gravitatis quiescit. Ceterum theorema præfens ita enunciari solet: Status centri gravitatis non mutatur ab

actione corporum in se invicem. Sunt quidam philosophi, qui ut autoritatem CARTESII tueantur, eandem motus quantitatem conservari in omni conflictu contendunt, quatenus centrum gravitatis, in quo pondera corporum uniuntur (§. 125), eadem celeritate ante & post conflictum movetur. Verum enim est quantitatem motus centri gravitatis ante & post conflictum esse eandem.

THEOREMA CXI.

603. Si corpora elastica sibi mutuo occurrunt, celeritas ab uno eorum amissa est ad celeritatem quam idem amitteret, si in alterum quiescens impingeret ut summa celeritatum utriusque ad celeritatem ipsius impingentis.

DEMONSTRATIO.

Si corpora M & m celeritatibus C & c sibi mutuo occurrant, erit illius celeritas post conflictum =

$$\frac{MC - mC - 2mc}{M + m}$$

(§. 571), consequenter celeritas in conflictu amissa = C -

$$\frac{MC - mC - 2mc}{M + m}$$

$$= \frac{MC + mC - MC + mC + 2mc}{M + m}$$

Jam vero sit corpus M in alterum m quiescens celeritate C

$$\text{incurreret; celeritas post conflictum foret} = \frac{MC - mC}{M + m}$$

$$\text{(§. cit.) consequenter celeritas amissa foret } C - \frac{MC - mC}{M + m} = \frac{MC + mC - MC + mC}{M + m}$$

$$= \frac{2mC}{M + m}$$

Est igitur celeritas in casu

priori amissa ad celeritatem in posteriori amittendam  $= \frac{2mC + 2mc}{M+m} \cdot \frac{2mC}{M+m}$   
 $= C+c : C$ , hoc est, ut summa celeritatum utriusque corporis ante conflictum ad celeritatem impingentis ante eundem. *Q. e. d.*

THEOREMA CXII.

604. Si corpus elasticum unum in alterum incurrit, celeritas ab incurrente in conflictu amissa est ad celeritatem, qua idem in quiescens impingeret ut celeritatum differentia ante conflictum ad celeritatem incurrentis.

DEMONSTRATIO.

Si corpus M celeritate C in corpus m incurrit, quod celeritate c movetur, erit illius celeritas post conflictum  $\frac{MC - mC + 2mc}{M+m}$  (§. 571), adeoque celeritas in conflictu amissa  $C - \frac{MC - mC + 2mc}{M+m}$   
 $= \frac{MC + mC - MC + mC - 2mc}{M+m}$   
 $= \frac{2mC - 2mc}{M+m}$ . Enimvero si corpus M in alterum m quiescens celeritate C incurreret; celeritas post conflictum foret  $\frac{MC - mC}{M+m}$ , adeoque celeritas amissa foret  $C - \frac{MC - mC}{M+m} = \frac{MC + mC - MC + mC}{M+m}$   
 $= \frac{2mC}{M+m}$ . Est igitur celeritas in casu

priori amissa ad celeritatem in casu posteriori amittendam  $= \frac{2mC - 2mc}{M+m}$ :

$\frac{2mC}{M+m} = C - c : C$ , hoc est, ut differentia celeritatum utriusque corporis ante conflictum ad celeritatem incurrentis post eundem. *Q. e. d.*

THEOREMA CXIII.

605. Si corpus elasticum majus incurrat in minus quiescens celeritatem majorem ea, qua fertur, sed dupla minorem eidem communicat.

DEMONSTRATIO.

Incurrat corpus M celeritate C in corpus minus m quiescens: erit celeritas corporis m post conflictum  $2MC : (M+m)$  (§. 571), hoc est, si  $M = m + n$ ,  $\frac{2mC + 2nC}{2m+n}$ . Est igitur celeritas corpori minori m communicata per conflictum à corpore M ad celeritatem hujus ante conflictum  $= \frac{2mC + 2nC}{2m+n}$ :  $C = 2mC + 2nC : 2mC + 2nC$  (§. 181. *Arithm.*)  $= 2m + 2n : 2m + n = 2 : 1 + \frac{n}{m+n}$ . Est igitur celeritas corporis minoris major quam fuerat impingentis ante conflictum, sed minor quam dupla ejusdem: nimirum si dupla foret, antecedens rationis esse deberet  $2 + 2m : (m+n)$ . Idem etiam patet si celeritatem corpori minori acquistam  $\frac{2mC + 2nC}{2m+n}$  dividas actu per  $2m+n$ ;

prodit



prodit enim  $C + \frac{nC}{2m+n}$ . Est vero

$$C + \frac{nC}{2m+n} > C \text{ (§. 84. Arithm.)}$$

Jam vero  $\frac{nC}{2m+n} : C = nC : (2m+n)C$

$$= n : 2m+n. \text{ Sed } n < 2m+n \text{ (§.}$$

20. Arithm.). Ergo  $\frac{nC}{m+n} < C \text{ (§.}$

151. Arithm.). Q. e. d.

THEOREMA CXIV.

606. Si corpus elasticum majus in minus quiescens incurrat, minus post conflictum movetur celeritate composita ex ea, qua majus ferebatur ante conflictum, & ex altera, qua post conflictum idem incedit.

DEMONSTRATIO.

Incurrat corpus M celeritate C in alterum quiescens m, sitque  $M = m+n$ ; patet ex demonstratione Theorematis precedentis corporis m celeritatem post

conflictum esse  $C + \frac{nC}{2m+n}$ . Enimvero

$$= \frac{MC - mC}{M+m} \text{ (§. 571)} = \frac{mC + nC - mC}{2m+n}$$

$= \frac{nC}{2m+n}$ . Componitur adeo celeritas

corporis m ex celeritate C, quam habebat majus M ante conflictum, &

ex celeritate  $\frac{nC}{2m+n}$ , quæ est eidem

post conflictum. Q. e. d.

THEOREMA CXV.

607. Si celeritas corporis elastici majoris in aliud minus quiescens incurrentis fuerit ut summa massarum utriusque corporis; minori dat celeritatem, quæ est ut duplum sui, amittit vero celeritatem, quæ est ut duplum minoris corporis.

DEMONSTRATIO.

Si corpus minus m, in quod majus M celeritate C incurrit, quiescit; celeritas ejus post conflictum est  $\frac{MC - mC}{M+m}$

& minori dat celeritatem  $\frac{2MC}{M+m}$  (§.

571). Est vero  $C = M+m$  per hypoth.

Ergo celeritas majoris sive incurrentis

$= M - m$ , quæ differt à celeritate

initiali  $M + m$  quantitate 2m. Amit-

tit igitur corpus M in conflictu celeri-

tatem, quæ est ut duplum corporis mi-

noris. Quod erat unum.

Sed celeritas corpori minori ex confi-

lictu acquisita erit 2M, adeoque ea

est ut duplum corporis majoris incur-

rentis. Q. e. d.

THEOREMA CXVI.

608. Si corpus elasticum minus in

aliud majus quiescens incurrit celerita-

te, quæ est ut massarum utriusque cor-

poris summa; dat ei celeritatem, quæ est

ut duplum sui; sed celeritatem amittit,

quæ est ut duplum majoris.

DEMONSTRATIO.

Etenim si corpus m celeritate C in cor-

pus majus M incurrit, corporis majoris

M celeritas post conflictum  $\frac{2mC}{M+m}$  &

celeritas ipsius post eundem  $\frac{mC - MC}{M + m}$   
 (§. 571). Est vero C ut  $M + m$  per *hypoth.* Ergo celeritas majoris ut  $2m$  seu duplum minoris; minoris vero sive incurrentis ut  $m - M$ . Differentia vero inter  $M + m$  &  $m - M$  est  $2M$ . Celeritas igitur in ictu amissa est ut duplum corporis M. Q. e. d.

## THEOREMA CXVII.

609. Si corpus elasticum minus in aliud majus quiescens incurrit, post conflictum semper resilit eique celeritatem sua minorem dat.

## DEMONSTRATIO.

Etenim si corpus  $m$  celeritate C incurrat in majus M; erit celeritas majoris M post conflictum  $\frac{2mC}{M + m}$ , minoris vero seu incurrentis  $\frac{mC - MC}{M + m}$  (§.

571). Nimirum in formula generali litteræ M &  $m$  permutantur, quia ibi M percutiens, hic vero  $m$  percutiens est. Jam vero celeritas incurrentis ante

conflictum  $C = \frac{MC + mC}{M + m}$ . Quare si

ponamus  $M = m + n$  (§. 20. *Arithm.*): erit celeritas minoris ante conflictum

$\frac{2mC + nC}{2m + n}$ , majoris vero post eundem

$\frac{2mC}{2m + n}$ . Est igitur velocitas majori

acquisita minor celeritate incurrentis (§. cit.) Quod erat unum.

Jam cum sit  $M = m + n$ , erit celeritas minoris post conflictum  $\frac{mC - mC - nC}{2m + n}$

$= \frac{-nC}{2m + n}$ , adeoque negativa. Post

conflictum itaque tendit in plagam contrariam ei, in quam ante eundem movebatur (§. 571). Corpus igitur minus  $m$  semper resilit post conflictum, Q. e. d.

## THEOREMA CXVIII.

610. Si corpus elasticum minus in aliud quiescens incurrit, celeritas utriusque post conflictum simul æquatur celeritati incurrentis ante eundem.

## DEMONSTRATIO.

Etenim si corpus  $m$  celeritate C incurrit in majus M atque  $M = m + n$ ; erit celeritas majoris post conflictum  $= \frac{2mC}{2m + n}$ ; minoris vero non habita ra-

tione directionis  $= \frac{nC}{2m + n}$  quemad-

modum ex demonstratione propositionis præcedentis intelligitur. Summa igitur celeritatum post conflictum est

$\frac{2mC + nC}{2m + n} = C$ . Q. e. d.

## THEOREMA CXIX.

611. Si corpus elasticum unum A incurrat in duo elastica B & C, quorum B sit majus quam A & C vicissim majus quam B; atque corpus C mediante altero B percutit; majorem corpori C celeritatem, dat, quam si idem immediate, seu corpore B non interveniente, percuteret.

DEMONSTRATIO.

Sint massæ corporum A, B & C = M, nM & niM, celeritas incurrentis = C. Cum sit ut summa massarum ad duplam massam incurrentis ita celeritas percussentis ad celeritatem percussæ (§. 574);

$$\text{erit } M + nM; 2M = C : \frac{2MC}{M + nM} \text{ quæ}$$

est celeritas corpori B acquisita. Quodsi jam hac celeritate corpus B in C impingat, seu idem urgeat; erit

$$nM + niM : 2nM = \frac{2MC}{M + nM}$$

$$\frac{4nM^2C}{(M + nM)(nM + niM)} \text{ quæ est ce-}$$

leritas corpori C interventu corporis B acquisita. Si corpus A immediate percuteret corpus C; foret M + niM : 2M

$$= C : \frac{2MC}{M + niM} \text{ quæ est celeritas cor-}$$

pori C acquirenda, si corpus A immediate seu absque interventu corporis B idem percuteret. Est adeo celeritas mediata corporis C ad immediatam

$$\frac{4nM^2C}{(M + nM)(nM + niM)} : \frac{2MC}{M + niM} = \frac{2nM}{(M + nM)(nM + niM)} : \frac{1}{M + niM}$$

$$= \frac{2nM^2 + 2n^2iM^2}{nM^2 + niM^2 + n^2M^2 + n^2iM^2} = \frac{2n + 2n^2i}{n + ni + n^2 + n^2i}$$

Est vero  $n + n^2i = n(1 + ni) > ni + n^2 = n(i + n)$ , quia  $ni > i + n$ , adeoque  $2n + 2n^2i > n + n^2 + n^2i + ni$  (§. 90. *Arithm.*). Patet igitur celeritatem corporis C, interventu alterius B à corpore A percussæ, esse majorem ea, quam acciperet si à corpore A immediate percuteretur.

E. gr. Sit massa corporis A = 1, alterius B = 2, tertii C = 3, erit celeritas corporis C mediante corpore B acquisita, ad eam quam immediate ex ictu à corpore A acquireret, (ob  $n = 2$  &  $i = 3$ ), ut  $4 + 24 : 2 + 6 + 4 + 12 = 28 : 24 = 7 : 6$ . Est igitur celeritas mediata major immediata. Sit similiter  $M = 2, n = 3, i = 5$ ; erit  $n^2 = 15, n^2i = 45$ , adeoque celeritas mediata corporis C ad immediatam =  $6 + 90 : 3 + 15 + 9 + 45 = 96 : 72 = 4 : 3$ . Est igitur denuo celeritas mediata major immediata.

THEOREMA CXX.

612. Si corpus elasticum unum A in aliud segnius motum, sed majus B incurrat, & hoc celeritate per conflictum modificata percutiat corpus C quiescens, sed se iidem majus; corpus C majore celeritate feretur, quam si immediate à corpore A percuteretur.

DEMONSTRATIO.

Sit massa corporis A = M, massa secundi B = nM & tertii C = niM, celeritas corporis A = C, corporis B vero = lC. Incurrat jam corpus A in corpus B; erit celeritas corporis B

$$= \frac{2MC + nlMC - lMC}{M + nM} \text{ (§. 571).}$$

Quodsi idem corpus A in tertium C quiescens incurreret, foret hujus celeritas

$$= \frac{2MC}{M + niM} \text{ Incurrat jam cor-}$$

pus B celeritate per conflictum cum corpore A modificata in quiescens C; erit celeritas corporis C

$$= \frac{4nM^2C + 4nlM^2C - 2nlM^2C}{(M + nM)(nM + niM)}$$

(§. cit.). Est igitur celeritas mediata corporis C ad celeritatem immediatam  

$$= \frac{4nM^2C + 4n^2lM^2C - 2nlM^2C}{(M+nM)(nM+niM)} : \frac{2MC}{M+niM}$$

$$= \frac{2nM + 2n^2lM - nlM}{(M+nM)(nM+niM)} : \frac{l}{M+niM}$$

$$= (2n + 2n^2l - nl)(l + ni) : (l + n)(n + ni)$$

$$= 2n + 2n^2l - nl + 2n^2i + 2n^2il - n^2il : n + ni + n^2 + n^2i.$$
 Est vero  $n + n^2i > n^2 + ni$ , adeoque  $2n + 2n^2l - nl + 2n^2i + 2n^2il - n^2il > n + ni + n^2 + ni$ . Quamobrem celeritas mediata major est immediata.

E. gr. Sit massa corporis  $A = 1$ , alterius  $B = 2$ , tertii  $C = 3$ , adeoque  $n = 2, i = 3$ . Sit porro  $l = 2$ . Erit celeritas mediata corporis C ad immediatam  $4 + 16 - 4 + 24 + 96 - 24 : 2 + 6 + 4 + 12 = 112 : 24 = 14 : 3$ . Est itaque celeritas mediata major immediata.

Sint omnia ut ante, sed  $l = \frac{1}{2}$ . Erit celeritas mediata corporis C ad immediatam  $= 4 + 4 - 1 + 24 + 48 - 12 : 2 + 6 + 4 + 22 = 67 : 34$ . Est adeo celeritas mediata denovo major immediata.

PROBLEMA CIII.

613. *Invenire corpus B interponendum inter duo alia corpora A & C, ut corpus C quiescens à corpore A data celeritate moto percussum maximam acquirat celeritatem, quam ex percussione istiusmodi habere potest.*

RESOLUTIO.

Sit celeritas, qua corpus A movetur  $= V$ . Incurrat A in B quiescens; erit hujus celeritas post conflictum  $= \frac{2AV}{A+B}$  (§. 571). Incurrat jam corpus B ce-

leritate hac acquisita in tertium C quiescens; erit corporis C celeritas post conflictum  $= \frac{4ABV}{AB+B^2+AC+BC}$  (§. cit.).

Quoniam celeritas hæc maxima est, quam corpus C ex istiusmodi percussione acquirere valet *per hypoib.* erit differentiale ejus nihilo æquale (§. 63. *Anal. infin.*). Jam cum A, C & V sint quantitates constantes, B vero sola sit variabilis, facta differentiatione (§. 19. *Analys. infin.*) reperitur  $(4A^2VBdB + 4AB^2VdB + 4A^2CVdB + 4ABCVDdB - 4A^2BVdB - 8AB^2VdB - 4ACBVdB) : (AB + B^2 + AC + BC^2)^2 = 0$ , hoc est,  $4A^2CVdB - 4AB^2VdB = 0$

$$AC - B^2 = 0$$

$$AC = B^2$$

Unde prodit  $A : B = B : C$  (§. 301. *Arithm.*).

*Theorema.* Si corpus B, cujus interventu aliud C quiescens à corpore quacunque celeritate percussum, fuerit medium proportionale inter percussens & percussum; celeritatem ei dabit maximam, quam interventu cujusdam corporis ei communicare valet.

COROLLARIUM.

614. Quodsi ergo series fuerit corporum in continua proportione crescentium, ultimum acquirat celeritatem maximam, quam à priori ex percussione tot corporum interventu acquirere valet, quæ continuo crescunt.

SCHOLIION.

615. Hoc pacto corporibus per conflictum celeritatem communicari posse, quæ fidem omnem superare videtur, calculus probat & HUGENIUS (a) exemplo illustri docuit. Idem valet si corpora continuo decrescant.

PROBLEMA CIV.

616. Determinare motum corporum A & B oblique impingentium, sive elasticorum, sive elateris expertium post conflictum.

RESOLUTIO.

Motus corporis A per AC resolvitur in duos alios secundum AE & AD & motus corporis B per BC similiter in duos alios secundum BF & BG (§. 245) suntque celeritates per AD & BF ad celeritates per AC & BC ut ipsæ rectæ AD, BF, AC, BC (§. 247). Jam cum rectæ AE & BG sint parallelæ, vires secundum has directiones agentes sibi mutuo non

opponuntur, adeoque in conflictu insuper habendæ. Sed cum lineæ AD & BF, seu quod perinde est, EC & GC eandem rectam ad DC perpendicularem constituent, perinde est ac si corpora A & B solis velocitatibus, quæ sunt ut EC & GC, directe sibi mutuo occurrerent (§. 523). Determinetur itaque celeritas corporum A & B juxta superiora. Sit e. gr. corporis A resilientis celeritas ut CH. Quoniam motus per AE in conflictu non mutatur, fiat CK = AE & compleatur parallelogrammum HCKI; diagonalis CI designabit motum corporis A post conflictum, movebitur nempe post ictum corpus A juxta directionem CI & celeritate ut CI (§. 241). Eodem modo reperitur, corpus B resilientis moveri per diagonalem parallelogrammi CM, in quo LM = BG. Sunt adeo celeritates post ictum ut CI ad CM. Quodsi post conflictum corpora A & B versus eandem plagam tendant, utrumque parallelogrammum infra DC construitur.

CAPUT XIII.

De Vi Centrifuga & Centripeta.

DEFINITIO LXV.

617. Vis centrifuga est vis, qua mobile circa centrum aliquod revolutum ab eo recedere conatur.

E. g. Si corpus in peripheria circuli

(a) de Motu Corporum ex Percussione, Prop. 13.

movetur, in quovis puncto A conatur progredi per tangentem AD (§. 71) & si nihil obstaret, actu progredieretur, adeoque eodem tempore, quo arcum AE describit, à centro recederet quantitate rectæ DE ad AD perpendicularis per vim centrifugam (§. 245). Tab. V. Fig. 56.

COROL-

## COROLLARIUM.

618. Est adeo vis centrifuga ut recta DE ad AD perpendicularis, si arcus AE infinite parvus (§. 245).

## DEFINITIO LXVI.

619. *Vis centripeta* est vis, qua mobile per rectam AG progressurum retrahitur à motu rectilineo, ut in curva incedat.

## COROLLARIUM I.

620. Est itaque vis centripeta ut recta DE, si arcus AE infinite parvus.

## COROLLARIUM II.

621. Et hinc vis centripeta centrifugæ æqualis est (§. 618.):

## DEFINITIO LXVII.

622. *Vires centrales* communi nomine ducuntur vis centrifuga atque centripeta.

## THEOREMA CXXI.

Tab.V.  
Fig.  
56.

623. *Si duo corpora pondere equalia eodem vel equali tempore motu æquali peripherias circularum inequalium describant, erunt vires centrales ut diametri AB & HL.*

## DEMONSTRATIO.

Sit arcus AE infinite parvus, adeoque à subtensa non differat. Quia peripheriæ eodem tempore describuntur; si ex centro C ducatur radius CE, erit HK arcus eodem momento descriptus & ad peripheriam minorem ut alter AE ad majorem (§. 137. *Geom.*). Quodsi jam ducantur tangentes AD & HI atque ex puncta E & K ad illas perpendiculares ED & KI,  $\triangle\triangle ADE$

& HIK eodem modo determinantur, (§. 119. *Geom.*) adeoque similia sunt (§. 120. *Geom.*), consequenter  $AE:HK=DE:IK$  (§. 175. *Geom.*). Sunt vero ut DE ad IK ita vis centralis in circulo majore ad vim centralem in minore (§. 620). Ergo vires centrales sunt ut arcus AE & HK (§. 167. *Arithm.*) consequenter ut peripheriæ circularum, quas percurreunt, *per demonstrata*, adeoque & ut diametri eorundem (§. 412. *Geom.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

624. Quodsi ergo vires centrales duorum corporum peripherias circularum inequalium describentium fuerint ut diametri, temporibus æqualibus easdem percurreunt.

## THEOREMA CXXII.

625. *Corporis in peripheria circuli incedentis vis centralis est ut arcus infinite parvi AE quadratum per diametrum AB divisum.*

## DEMONSTRATIO.

Demittatur perpendicularis EM: erit in rectangulo ADEM,  $AM=DE$ . Quoniam arcus infinite parvus AE à subtensa non differt; erit  $BA:AE=AE:AM$  (§. 330. *Geom.*). Est ergo  $AM=DE=AE^2:BA$  (§. 301. *Arithm.*) Quare cum vis centralis sit ut DE (§. 620); erit eadem ut  $AE^2:BA$ . *Q. e. d.*

## COROLLARIUM

626. Cum ergo corpus motu æquali tempusculis æqualibus arcus æquales AE describat (§. 31); vis centralis, qua corpus in peripheria circuli urgetur, constanter eadem est.

THEO-

THEOREMA CXXIII.

Tab. V. Fig. 56. 627. Si duo corpora diversas peripherias motu aquabili describant, vires centrales sunt in ratione composita ex duplicata celeritatum & reciproca diametrorum.

DEMONSTRATIO.

Sunt enim ut  $AE^2 : AB$  ad  $HK : HL$  (§. 625), adeoque ut  $AE^2. HL$  ad  $HK. AB$  (178. *Analys. finit.*). Sed cum arcus  $AE$  &  $HK$  eodem tempore describantur, per *hypoth.* erunt iidem ut celeritates (§. 33). Sunt itaque vires centrales in ratione composita ex duplicata celeritatum & reciproca diametrorum. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

628. Si celeritates fuerint æquales; erunt vires centrales reciproce ut diametri  $AB$  &  $HL$ . (§. 281. *Arithm.*)

COROLLARIUM II.

629. Si diametri  $AB$  &  $HL$  fuerint æquales, hoc est, si utrumque mobile in eadem peripheria, sed dispari celeritate, incedat; erunt vires centrales in ratione duplicata celeritatum (§. cit. *Arithm.*).

THEOREMA CXXIV.

630. Si duorum mobilium in diversis peripheriis incedentium vires centrales fuerint æquales; erunt diametri circulatorum  $AB$  &  $HL$  in ratione duplicata celeritatum.

DEMONSTRATIO.

Vires enim centrales in eodem instanti sunt  $AE^2 : AB$  &  $HK^2 : HL$  (§. 625). Quare  $AE^2 : AB = HK^2 : HL$  per *hypoth.* consequenter  $AE^2 : HK^2 = AB : HL$  (§. 173. *Arithm.*). *Q. e. d.*

Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.

LEMMA II.

631. Quantitatum proportionalium radices sunt etiam proportionales.

DEMONSTRATIO.

Sit enim  $a : ma = b : mb$  per *hypoth.* Quoniam  $\sqrt{ma} = \sqrt{a}$ .  $\sqrt{m}$  &  $\sqrt{mb} = \sqrt{b}$ .  $\sqrt{m}$ ; erit utique  $\sqrt{a} : \sqrt{ma} = \sqrt{b} : \sqrt{mb}$  (§. 149. *Arithm.*) *Q. e. d.*

LEMMA III.

632. Sint quatuor quacumque quantitates proportionales, sintque totidem alia inter se quoque proportionales; si posteriores singulas per singulas priores dividas vel contra, quoti quoque proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

Sit  $a : ma = b : mb$  &  $c : nc = d : nd$  per *hypoth.* Quodsi  $a$  per  $c$ ,  $ma$  per  $nc$ ,  $b$  per  $d$ ,  $mb$  per  $nd$  dividas; prodibunt  $\frac{a}{c}$ ,  $\frac{ma}{nc}$ ,  $\frac{b}{d}$  &  $\frac{mb}{nd}$ . Jam

cum sit  $\frac{a}{c} : \frac{ma}{nc} = \frac{b}{d} : \frac{mb}{nd} = \frac{mbd}{mbd}$  &  $\frac{a}{c} : \frac{ma}{nc} = \frac{a}{c} : \frac{ma}{nc} = \frac{b}{d} : \frac{mb}{nd} = \frac{mbd}{mbd}$ ;

erit utique  $\frac{a}{c} : \frac{ma}{nc} = \frac{b}{d} : \frac{mb}{nd}$ . Eodem modo patet, esse  $\frac{c}{a} : \frac{nc}{ma} = \frac{d}{b} : \frac{nd}{mb}$  *Q. e. d.*

THEOREMA CXXV.

633. Si duo corpora in peripheriis inæqualibus eadem vi centrali urgentur, tempus in majori est ad tempus in minori in ratione subduplicata diametri majoris  $AB$  ad minorem  $HL$ . Tab. V. Fig. 56.

## DEMONSTRATIO.

Sit  $AB = D$ ,  $HL = d$ , celeritas in majori peripheria  $= C$ , in minori  $= c$ , peripheria major  $= P$ , minor  $= p$ , tempus per illam  $= T$ , per hanc  $= t$ ; erit  $C^2 : c^2 = D : d$  (§. 630), adeoque  $C : c = \sqrt{D} : \sqrt{d}$  (§. 631). Est vero  $P : p = D : d$  (§. 411. *Geom.*).

Ergo &  $\frac{P}{C} : \frac{p}{c} = \frac{D}{\sqrt{D}} : \frac{d}{\sqrt{d}} = \sqrt{D} : \sqrt{d}$  (§. 632). Sed  $\frac{P}{C}$  &  $\frac{p}{c}$  sunt tempora,

quibus peripheriæ vel etiam arcus similes, qui peripheriarum rationem habent (§. 170. *Arithm.*), describuntur (§. 39). Ergo  $T : t = \sqrt{D} : \sqrt{d}$  (§. 167. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

634. Est igitur  $T^2 : t^2 = D : d$ , (§. 160. *Arithm.*) hoc est diametri circularum, in quorum peripheriis mobilia eadem vi centrali urgentur, sunt in ratione duplicata temporum.

## COROLLARIUM II.

635. Quoniam  $C^2 : c^2 = D : d$  (§. 630.) &  $T^2 : t^2 = D : d$  (§. 634.) erit quoque  $T^2 : t^2 = C^2 : c^2$  (§. 167. *Arithm.*) consequenter  $T : t = C : c$  (§. 631), hoc est, tempora, quibus peripheriæ aut arcus similes percurreuntur à mobilibus, eadem vi centrali impulsis, celeritatum rationem habent.

## THEOREMA CXXVI.

636. *Vires centrales sunt in ratione composita ex directa diametrorum & reciproca quadratorum temporum per integras peripherias.*

## DEMONSTRATIO.

Sint vires  $V$  &  $v$ , reliqua ut in demonstratione præcedente: erit  $V : v = \frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d}$  (§. 627). Sed  $C = D : T$  &  $c = d : t$  (§. 38). consequenter

$$C^2 : c^2 = \frac{D^2}{T^2} : \frac{d^2}{t^2} \text{ (§. 260. } Arithm.),$$

$$\text{adcoque } \frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d} = \frac{D^2}{DT^2} : \frac{d^2}{dt^2} \text{ (§. 185.}$$

$$Arithm.) = \frac{D}{T^2} : \frac{d}{t^2} \text{ (§. 231. } Arithm.),$$

$$\text{Est igitur } V : v = \frac{D}{T^2} : \frac{d}{t^2} \text{ (§. 167.}$$

$$Arithm.) = Dt^2 : dT^2 \text{ (§. 178. } Arithm.). \text{ } Q. e. D.$$

## THEOREMA CXXVII.

637. *Si tempora, quibus in peripheriis integris aut arcubus similibus mobilia feruntur, sunt ut diametri circularum, vires centrales sunt reciproce ut eadem diametri.*

## DEMONSTRATIO.

Quoniam  $T : t = D : d$ , per. *hypoth.*

$$\& V : v = \frac{D}{T^2} : \frac{d}{t^2} \text{ (§. 636); erit}$$

$$\text{etiam } V : v = \frac{D}{D^2} : \frac{d}{d^2} = \frac{1}{D} : \frac{1}{d}$$

$$= d : D \text{ (§. 178. } Arithm.) \text{ } Q. e. d.$$

## COROLLARIUM

$$638. \text{ Quoniam } V : v = \frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d} \text{ (§. 672):}$$

$$\text{erit } \frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d} = d : D \text{ (§. 167. } Arithm.),$$

consequenter  $C^2 : c^2 = Dd : Dd$  (§. 185. *Arithm.*). Sunt itaque celeritates hoc in casu æquales.

THEO-



THEOREMA CXXVIII.

639. Si corpus quoddam in periphēria circuli motu uniformi incedat, ea quidem celeritate, qua acquiritur per altitudinem AL cadendo; erit vis centralis ad gravitatem ejus ut dupla altitudo AL ad radium CA.

DEMONSTRATIO.

Eo tempore, quo grave cadit per AL, motu uniformi describeret 2AL, nempe celeritate, quam cadendo per AL acquisivit & qua per AE movetur (§. 92). Est igitur tempus per AE ad tempus per AL ut AE ad 2AL (§. 32), & hinc reperitur spatium eodem tempore à gravi cadente percursum, quo percurritur AE, = AL.  $AE^2 : 4AL^2 = AE^2 : 4AL$  (§. 86). Est vero vis centralis ad gravitatem in eodem corpore in ratione celeritarum, quas vires istæ producant (§. 280) adeoque spatiorum eodem tempore motu æquabili descriptorum (§. 33). Quare cum spatium eo instanti, quo vi gravitatis conficitur  $AE^2 : 4AL$ , vi centrali percursum sit  $AE^2 : BA$  (§. 625); erit vis centralis ad gravitatem ut  $AE^2 : BA$  ad  $AE^2 : 4AL$ , hoc est, ut 4AL ad BA, seu 2AL ad CA (§. 181. Arithm.). Q. e. d.

COROLLARIUM.

640. Quod si adeo gravitas corporis dicatur G; erit vis centrifuga 2AL. G : CA.

THEOREMA CXXIX.

641. Si grave in periphēria circuli æquabili motu feratur ea quidem celeritate, quam acquirit cadendo per alti-

tudinem AL dimidio radio æqualem; vis centralis erit gravitati æqualis.

DEMONSTRATIO.

Vis centralis est 2AL. G : CA (§. 640). Quare si  $AL = \frac{1}{2} CA$ ; eadem erit CA. G : CA = G. Q. e. d.

COROLLARIUM.

642. Ergo si gravitati vis centralis æqualis est, grave ea celeritate in periphēria circuli fertur, quam cadendo per altitudinem radio dimidio æqualem acquirit.

THEOREMA CXXX.

643. Si vis centralis gravitati æqualis est, tempus per periphēriam integram est ad tempus descensus per dimidium radium ut periphēria ad radium.

DEMONSTRATIO.

Spatium motu uniformi cum ea celeritate percursum, quæ cadendo per  $\frac{1}{2}CA$  acquiritur, est in tempore æquali = CA (§. 92). Quare cum periphēria circuli eadem celeritate uniformiter percurratur (§. 642); erit tempus per periphēriam ad tempus descensus per dimidium radium ut periphēria ad radium CA (§. 32). Q. e. d.

THEOREMA CXXXI.

644. Si duo corpora in periphēriis inæqualibus celeritate inæquali incedant, quæ sit reciproce in ratione subduplicata diametrorum: vires centrales sunt in ratione duplicata distantiarum à centro virium reciproce sumtarum.

DEMONSTRATIO.

Si celeritates fuerint C & c, diametri D & d, vires V & v; erit  $V : v = \frac{D^2}{d^2} = C^2$

Tab. V. Fig. 56.

$\frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d}$  (§. 627). Sed  $C : c = \sqrt{d} : \sqrt{D}$ , per *hypoth.* adeoque  $C^2 : c^2 = d : D$  (§. 260. *Arithm.*). Ergo  $V : v = \frac{d}{D} : \frac{D}{d} = d^2 : D^2$  (§. 178. *Arithm.*)  $= \frac{1}{4} d^2 : \frac{1}{4} D^2$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, Vires sunt reciproce ut quadrata radorum seu distantiarum. *Q. e. d.*

## THEOREMA CXXXII.

645. Si duo corpora in peripheriis inæqualibus celeritatibus incedunt, quæ sunt reciproce ut diametri; erunt vires centrales reciproce ut cubi distantiarum à centro virium.

## DEMONSTRATIO.

$V : v = \frac{C^2}{D} : \frac{c^2}{d}$  (§. 627). Sed  $C : c = d : D$  per *hypoth.* adeoque  $C^2 : c^2 = d^2 : D^2$  (§. 260. *Arithm.*) Ergo  $V : v = \frac{d^2}{D^2} : \frac{D^2}{d^2} = d^4 : D^4$  (§. 178. *Arithm.*)  $= \frac{1}{8} d^3 : \frac{1}{8} D^3$  (§. 181. *Arith.*); hoc est, Vires centrales reciproce sunt ut cubi radorum seu distantiarum à centro virium. *Q. e. d.*

## THEOREMA CXXXIII.

646. Si duorum corporum in peripheriis inæqualibus latorum celeritates fuerint reciproce in ratione subduplicata diametrorum; temporum quadrata, quibus integras peripherias aut arcus similes percurrunt, sunt in ratione triplicata distantiarum à centro virium.

## DEMONSTRATIO.

Sint tempora  $T$  &  $t$ , celeritates  $C$  &  $c$ , diametri  $D$  &  $d$ . Cum tam periphe-

riæ (§. 412. *Geom.*) quam arcus similes (§. 170. *Arithm.*) diametrorum rationem habeant; erit  $T : t = \frac{D}{C} : \frac{d}{c}$  (§. 38). Est vero  $C : c = \sqrt{d} : \sqrt{D}$ , per *hypoth.* Ergo  $T : t = \frac{D}{\sqrt{d}} : \frac{d}{\sqrt{D}}$  (§. 124. *Analys. finit.*), consequenter  $T^2 : t^2 = D^3 : d^3$  (§. 260. *Arithm.*)  $= \frac{1}{8} D^3 : \frac{1}{8} d^3$  (§. 181. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM

647. Ergo si Vires centrales sunt in reciproca ratione distantiarum à centro subduplicata; temporum quadrata, quibus peripheriæ integræ aut arcus similes percurruntur, sunt in triplicata earundem distantiarum (§. 280.) ratione.

## THEOREMA CXXXIV.

648. Si duorum corporum in peripheriis inæqualibus incedentium celeritates fuerint ut diametri reciproce, tempora sunt in ratione duplicata distantiarum à centro.

## DEMONSTRATIO.

Quia  $C : c = d : D$ , per *hypoth.* & peripheriæ (§. 412. *Geom.*) atque arcus similes (§. 171. *Arithm.*) sunt ut radii; adeoque  $T : t = \frac{D}{C} : \frac{d}{c}$  (§. 39); erit  $T : t = \frac{D}{d} : \frac{d}{D} = D^2 : d^2$  (§. 124. *Anal. finit.*)  $= \frac{1}{4} D^2 : \frac{1}{4} d^2$  (§. 181. *Arithm.*); hoc est, tempora sunt in ratione duplicata radorum seu distantiarum à centro. *Q. e. d.*

## COROL.

COROLLARIUM.

649. Si ergo vires centrales sunt reciproce ut cubi distantiarum à centro virium, tempora, quibus integræ peripheriæ aut arcus similes percurreuntur, sunt ut quadrata earundem (§. 645).

SCHOLIUM.

650. Quodsi supponamus vim centripetam urgere corpus versus centrum C, ut pro effectu ejus sumatur portio secantis EG; omnia manent ut ante, propterea quod in casu infinite parvi, EG & DE pro equalibus haberi possint, atque adeo eadem in utroque casu eruatur mensura, vis centralis. Nimirum cum CA (§. 308. Geom.) & DE per hypoth. sint perpendiculares ad AG: erunt inter se parallelæ (§. 256. Geom.), adeoque angulus GED = ECM (§. 233. Geom.). Quare cum etiam recti ad D & M sint æquales (§. 145. Geom.); erit GE: ED = EC: CM (§. 267. Geom.) Quoniam sagitta AM infinite parva per hypoth. CM & CA æquales habentur (§. 4. Analys. infin.). Ergo etiam CM = CE (§. 40. Geom. & §. 87. Arithm.) Est igitur etiam GE = DE (§. 149. Arithm.). Quod vero sit etiam EG ut AE<sup>2</sup>: AB, quemadmodum supra ostendimus esse ED (§. 627), ita evincitur. AG<sup>2</sup> = NG. EG (§. 379. Geom.), hoc est, quia in casu arcus AE infinite parvi NG = NE (§. 4. Analys. infinit.), NE. EG = AB. EG = AG<sup>2</sup>, seu, quia arcus infinite parvus AE à portiuncula tangentis AD assignabiliter non differt, AB. EG = AE<sup>2</sup>. Unde prodit EG = AE<sup>2</sup>: AB, aut quod perinde est, vis centrifuga est ut quadratum arcus infinite parvi per diametrum divisum.

THEOREMA CXXXV.

651. Si corpus in linea curva versus easdem partes cava ea lege incedat, ut radius CB ex ipso in punctum fixum

C, quod in eodem plano situm est, ductus areas BAC, BEC, &c. describat temporibus proportionales, seu dato tempore æquales: corpus à vi centripeta versus punctum C urgetur.

DEMONSTRATIO.

Progrediatur corpus sola vi insita per rectam seu arcum infinite parvum AB dato minimo quovis instanti: momento itaque altero ab eadem promoveretur per BD ipsi AB æqualem (§. 31) & in directum sitam (§. 72). Sed per vim centripetam à DB retrahitur & per arcum BE incedere cogitur estque  $\triangle CAB = \triangle CBE$ , per hypoth. & ducta recta CD, ob  $AB = DB$  per demonstrata,  $\triangle CBD = \triangle CBA$  (§. 385. Geom.). Ergo  $\triangle CDB = \triangle CEB$  (§. 87. Arithm.), consequenter perpendiculara ex E & D in BC demissa æqualia sunt (§. 385. Geom.) & hinc DE ipsi FB parallela (§. 226. Geom.) Cum adeo vires, quibus urgetur mobile per diagonalem BE parallelogrammi DEFB, agant juxta directiones BD & BF (§. 241), vis centripeta in B tendit ad punctum C. Idem cum eodem modo in quovis alio elemento curvæ demonstretur, patet vim centripetam à motu rectilineo versus C retrahere mobile. Q. e. d.

THEOREMA CXXXVI.

652. Si corpus secundum directionem rectæ AD progrediatur & una à vi centripeta ad punctum fixum C in eodem plano situm urgeatur; curvam describit versus C cavam, cujus area

Tab.V.  
Fig.  
57-

quæcunque duobus radiis AC & BC comprehensa sunt temporibus, quibus describuntur, proportionales.

DEMONSTRATIO.

Vis enim insita vel impressa cum agat juxta BD & centripeta juxta BF seu BC, per *hypoth.* viribus conjunctis describitur diagonalis BE parallelogrammi DEFB (§. 241). Quoniam itaque quovis instanti directio mobilis à vi centripeta mutatur, curva describitur, eaque versus C cava, quia qualibet particula curvæ BE à proxima AB versus centrum C declinat. *Quod erat unum.*

Sunt vero ob  $AB = BD$  per *hypoth.*  $\triangle ABC$  &  $BDC$  æqualia (§. 385. *Geom.*) & ob ED & BC parallelas (§. 241).  $\triangle BCD$  &  $BCE$  (ductâ rectâ CE) itidem æqualia sunt (§. 385. *Geom.*), consequenter  $ABC = BEC$ . Quod cum eodem modo demonstraretur de triangulis quotcunque aliis æqualibus tempusculis descriptis; patet, areas rectis ex centro C ductis interceptas temporibus, quibus describuntur, proportionales esse. *Quod erat alterum.*

THEOREMA CXXXVII.

Tab. 653. Si mobile in linea curva incedens vi centripeta versus centrum immobile urgetur, celeritas ejus est reciproce ut perpendicularum à centro illo in tangentem Curvæ demissum.

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim temporibus æqualibus describuntur portiunculæ Curvæ infinite parvæ AB, BE & in tempusculis infinite parvis motus æquabilis; erunt

celeritates in A & B ut AB ad BE (§. 33), hoc est, ut bases triangulorum ACB & BCE. Sunt vero triangula ista æqualia per *hypoth.* adeoque bases AB & BE reciproce ut eorum altitudines (§. 393. *Geom.*), hoc est, reciproce ut perpendiculara ex centro C in bases AB & BE continuatas, quæ sunt tangentes curvæ in punctis A & B (§. 20. *Analys. infin.*), demissa (§. 227. *Geom.*). Ergo celeritates in punctis A & B sunt reciproce ut perpendiculara ex centro C in tangentes demissa (§. 167. *Arithm.*) *Q. e. d.*

DEFINITIO LXVIII.

654. Centrum virium diximus punctum O, ad quod mobile in linea curva revolutum à vi centripeta continuo urgetur. Curva vero, in qua mobile incedit, dicitur Orbis vel Orbita, item Trajectoria.

DEFINITIO LXIX.

655. Radius vector est recta MO ex centro virium O in punctum quodlibet curvæ M ducta, in quo mobile hæere supponitur.

COROLLARIUM.

656. Est adeo radius vector distantia mobilis à centro virium (§. 192. *Geom.*).

THEOREMA CXXXVIII.

657. In omni curva vis centralis est in ratione composita ex directâ radii vectoris & reciproca radii osculi simplici atque triplicata perpendiculari ex centro virium in tangentem orbis demissi.

DEMONSTRATIO.

Tangat PN curvam in puncto M, sitque O centrum virium, OM radius vector

vector & CM radius osculi. Ducatur ex O perpendicularis OP ad tangentem PN: ducantur etiam radius vector ON radio alteri MO & radius osculi CR alteri CM infinite propinquus: arcus curvæ Mm haberi potest pro arcu circuli radio CM descripti (§. 313. 314. *Analys. infin.*). Vis centripeta agens versus centrum circuli erit ut  $mR$ , quæ vero agit versus centrum virium Orbis O ut  $mN$ . Quoniam radius osculi CM ad tangentem perpendicularis (§. 317. *Analys. infin.*) &  $mRN = CMN + MCR =$  (§. 239. *Geom.*)  $= CMN$ , ob MCR infinite parvum  $= 0$  (§. 3. *Analys. infin.*), angulus R recto æqualis, consequenter etiam ipsi P (§. 145. *Geom.*). Jam  $PMO = MNO + MON = MNO$ , ob MON infinite parvum  $= 0$  (§. 239. *Geom.*). Ergo  $mR : mN = PO : MO$  (§. 267. *Geom.*), hoc est, vis centripeta agens versus centrum circuli osculatoris C est ad vim centripetam versus centrum virium O agentem, ut PO ad MO *per demonstrata*. Quodsi celeritas, qua arculus Mm describitur, fuerit  $= C$ : erit vis centripeta agens in centrum osculi  $C = C^2 : MC$  (§. 627. Est vero C reciproce ut PO, hoc est ut  $\frac{1}{PO}$  (§. 653), adeoque vis centripeta agens in centrum osculi  $C = \frac{1}{PO^2 \cdot MC}$ . Quare cum sit *per demonstrata* vis petens centrum osculi ad vim quæ centrum orbis petit, ut PO ad MO, reperitur tandem vis centripeta agens versus centrum Orbis  $O = \frac{MO}{PO^3 \cdot MC}$ , at-

que adeo est in ratione composita ex directa radii vectoris MO, reciproca radii osculi MC & reciproca triplicata perpendiculari ex centro Virium Orbis in tangentem demissi PO. *Q. e. d.*

THEOREMA CXXXIX.

658. Si corpus in peripheria circuli revolvatur & vis centripeta idem urgeat versus punctum fixum O in peripheria situm; erit ea in ratione quintuplicata reciproca radii vectoris OM.

DEMONSTRATIO.

Tangat PR circulum in puncto dato M & ex centro virium ducatur perpendicularis ad tangentem OP atque radius vector OM. Radius circuli MC erit quoque radius osculi (§. 324. *Analys. infin.*). Jam cum CM (§. 308. *Geom.*) & OP *per hypothes.* sint perpendiculares ad PR; erunt inter se parallelæ (§. 256. *Geom.*), consequenter  $o = x$  (§. 233. *Geom.*). Quare cum OPM sit rectus *per construct.* & MON itidem rectus (§. 317. *Geom.*); erit  $MN : MO = MO : OP$ , (§. 267. *Geom.*), adeoque  $OP = \frac{MO^2}{MN}$ , consequenter  $OP^3 = \frac{MO^6}{MN^3}$ . Est vero vis centripeta in M  $= \frac{MO}{OP^3 \cdot MC}$  (§. 657.) Quare si pro  $OP^3$  substituat<sup>r</sup>ur ejus valor  $\frac{MO^6}{MN^3}$ , prodibit vis centripeta  $\frac{MO \cdot MN^3}{MO^6 \cdot MC}$  Sunt vero MN &

Tab. XVI. Fig. 162.

MC

MC in omni puncto peripheriæ constantes, adeoque ubi tantummodo cum ratione virium centripetarum in diversis punctis peripheriæ negotium fuerit, vis centripeta  $\frac{MO}{MO^6}$  seu  $\frac{1}{MO^5}$  (§. 178.

181. *Arithm.*), hoc est, in ratione quintuplicata radii vectoris reciproca. *Q. e. d.*

### THEOREMA CXL.

659. *Si corpus in peripheria circuli revolvitur & vis centripeta ad punctum quodcumque intra circulum datum O tendat; erit ea in ratione composita reciproca ex duplicata radii vectoris OM & triplicata chorda AM.*

### DEMONSTRATIO.

Tab. XVI. Ducatur ex centro virium O ad tangentem PR perpendicularis OP, itidem *Fig.* chorda DM, sitque in C centrum circuli. Quoniam angulus P *163.* per construct. & AMD (§. 317. *Geom.*) rectus est, ac præterea  $o = x$  (§. 323. *Geom.*); erit  $AD : AM = OM : OP$  (§. 267. *Geom.*) adeoque  $OP = \frac{OM \cdot AM}{AD}$ , consequenter  $OP^3 = \frac{OM^3 \cdot AM^3}{AD^3}$ . Est vero vis centripeta in M  $= \frac{MO}{OP^3 \cdot DC}$  (§. 657. *Mech.* & §. 324. *Analys. infin.*). Quare eadem  $= \frac{MO \cdot AD^3 \cdot DC}{AM^3 \cdot OM^3}$ , consequenter cum AD & DC constantes sint, seu in omni puncto curvæ eadem, vis centripeta  $= \frac{1}{AM^3 \cdot OM^2}$  (§. 178. 181. *Arithm.*), hoc est, in ratione compo-

sita reciproca ex duplicata radii vectoris OM & triplicata chordæ AM. *Q. e. d.*

### THEOREMA CXLI.

660. *In omni sectione conica vis centripeta tendens ad focus curvæ est reciproce in ratione duplicata radii vectoris, seu distantie à foco.*

### DEMONSTRATIO.

Sit AMN sectio conica quæcumque, parabola, ellipsis vel hyperbola. Sit focus in O & in eo centrum virium. Tangat TM sectionem conicam in M. Ducatur radius vector OM & ex O perpendicularis ad tangentem OP. Ducatur præterea MH ad curvam normalis & ex H perpendicularis HR ad radium vectorem OM; erit ob OP & MH parallelas (§. 256. *Geom.*)  $POM = x$  (§. 233. *Geom.*), adeoque ob rectos ad P & R per construct.  $MO : OP = MH : MR$  (§. 267. *Geom.*), consequenter  $OP = \frac{MO \cdot MR}{MH}$ . Est vero MR æqualis semiparametro (§. 418. 438. 504. *Analys. finit.*) adeoque  $= \frac{1}{2}a$ , si ea dicatur  $a$ . Ergo  $OP = \frac{MO \cdot \frac{1}{2}a}{MH}$  & ideo  $OP^3 = \frac{MO^3 \cdot a^3}{8 MH^3}$ . Porro in omni sectione conica radius osculi  $= \frac{4 MH^3}{a^2}$  (§. 322. 325. 327. *Anal. infin.*) Quare cum vis centripeta sit ut  $\frac{M()}{PO^3 \cdot MC}$  substitutis valoribus  $PO^3$  & radii osculi MC reperitur ea  $\frac{8 MO \cdot MH^3 \cdot a^2}{4 MO^3 \cdot MH^3 \cdot a^3} = \frac{2}{MO^2 \cdot a}$ , hoc est,

ob 2 & a constantes quantitates in  
 omni puncto curvæ, =  $\frac{I}{MO^2}$  (§. 178.  
 181. *Arithm.*). Vis igitur centripeta  
 tendens ad focum sectionis conicæ est  
 reciproce ut quadratum distantia à fo-  
 co seu radii vectoris. *Q. e. d.*

SCHOLIION.

661. Quoniam proprietas hæc sectionibus  
 conicis communis & ex communibus earum  
 proprietatibus fluit; ideo conveniens est ut  
 generaliter ex iisdem demonstretur. Mensu-  
 ram virium centripetarum ut  $\frac{MO}{PO^3.MC}$  supe-  
 rius demonstratam (§. 657.) invenit ABRA-  
 HAMUS DE MOIVRE, Geometra eximius.  
 Quod vero eadem conveniat cum mensuris  
 aliorum, quas quantitates infinite parvæ in-  
 trediuntur, sequente problemate ostendere  
 lubet.

PROBLEMA CVI.

662. Invenire vim centripetam in  
 qualibet curva.

RESOLUTIO.

Sit O centrum virium, MO radius  
 vector, MC radius osculi, & OP ad  
 tangentem PM perpendicularis. Def-  
 cribatur ex centro virium O radio vec-  
 tore MO arcus infinite parvus MK.  
 Fiat  $MC = n$ ,  $MO = x$ ; erit  $mK = dx$ .  
 Sit porro  $MK = dz$  & arculus curvæ  
 $Mm = ds$ : tempus vero per arcum  $Mm$   
 $= dt$ . Quoniam hoc est ut sector  
 $OMK$  (§. 652); erit  $dt = MK \cdot \frac{1}{2} MO$   
 seu ob determinatam quantitatem  $\frac{1}{2}$ ,  
 ut  $MK.MO$  (§. 178. *Arithm.*), adeoque  
 ut  $x dz$ . Porro cum angulus ad P sit rec-  
 tus per constr. & K rectus (§. 38.  
*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

*Analys. infin.*) & ob infinite parvum  
 $MOm = o$  (§. 3. *Analys. infin.*)  $PMO$   
 $= MmK$  (§. 239. *Geom.*); erit  
 $Mm : MK = MO : OP$

$$ds : dz = x : \frac{x dz}{ds}$$

Est igitur  $OP^3 = \frac{x^3 dz^3}{ds^3}$  & hinc cum

$$\begin{aligned} \text{Vis centralis} &= \frac{MO}{OP^3.MC} \text{ (§. 657) erit ea} \\ &= x : \frac{nx^3 dz^3}{ds^3} \\ &= \frac{ds^3}{nx^2 dz^3} \end{aligned}$$

Est vero  $dt = x dz$  per demonstr.  
 & hinc  $dt^2 = x^2 dz^2$

$$\text{Quare Vis centralis} = \frac{ds^3}{ndz dt^2}$$

Atque hic est character Analyticus unus,  
 quem dedit VARIGNONIUS (a).

Aliter.

Quoniam angulus  $CMR$  rectus (§.  
 337. *Anal. infin.*), erit  $MRm$  ab eo-  
 dem non differens nisi quantitate in-  
 finite parva  $MCR$  (§. 239. *Geom.*)  
 itidem rectus (§. 4. *Analys. infin.* &  
 §. 145. *Geom.*), & ex eadem ratione  
 $MmR$  etiam rectus. Quamobrem  $mR$   
 haberi potest pro arculo, radio  $Mm$   
 descripto ex centro  $M$  (§. 38. *Ana-  
 lys. infin.*). Cum adco sit  $Mm = MR$   
 (§. 40. *Geom.*); erit  $RN$  differentia  
 inter arcum  $Mm$  & portionem tan-  
 gentis  $MN$  seu differentia secunda  
 arculi  $Mm$ . Unde si  $Mm = ds$ , ut  
 ante,  $RN = dds$ . Sit porro ut ante  
 $MK = dz$ ,  $MO = x$ , adeoque  $Km$   
 $Y = dx$ :

(a) In Comment. A. 1701, p. 28. edit. Bar.

$\equiv dx$ : tempusculum vero per arcum  $Mm \equiv dt$ . Cum  $MmK + KmC$  sit rectus (§. 137. *Analys. infn.*), &  $RNn + RmN$  itidem rectus (§. 241. *Geom.*), fit vero  $KmC = RmN$  (§. 156. *Geom.*); erit  $MmK = RNm$  (§. 91. *Ariithm.*).

Est vero præterea  $NRm$  rectus per *demonstr.* &  $MKm$  itidem rectus (§. 38. *Analys. infn.*). Quamobrem (§. 276. *Geom.*)

$$Km, KM = NR : mR$$

$$dx : dz = dds : \frac{dds dz}{dx}$$

Porro cum  $CMR$  sit rectus &  $Mm$  ad  $RC$  perpendicularis per *demonstr.* erit (§. 327. *Geom.*)

$$mR : mM = mM : mC$$

$$\frac{dds dz}{dx} : ds = ds : \frac{ds^2 dx}{dz dds}$$

$$\text{Est itaque } CM = n = \frac{ds^2 dx}{dds dz}$$

Jam vis centralis ante reperta fuit

$$\frac{ds^3}{ndz dt^2}$$

Quare si substituatur valor radii circuli osculatoris  $n$  modo inventus;

$$\text{prodibit vis centralis} = \frac{ds^3 dz dds}{ds^2 dx dz dt^2}$$

$$= \frac{ds dds}{dx dt^2}$$

Atque hæc est formula altera quam dedit VARIGNONIUS (a).

#### SCHOLIUM.

663. Quodsi beneficio harum formularum vis centralis in circulo & sectionibus conicis eruere volueris, quemadmodum ante factum est: multo difficilius idem fieri intelliges, quam in anterioribus à nobis fac-

(a) In Comment. Acad. Reg. Scient. A. 1700. p. 286.

tum est. Sufficit itaque ostendisse, quomodo formula, qua nos usi sumus, in VARIGNONIANAS degeneret.

#### PROBLEMA CVII.

664. Data lege virium centripetarum & concessis quadraturis, invenire trajectoriam, in qua mobile incedit.

#### RESOLUTIO.

Sit in  $O$  centrum virium,  $AC$  trajectoria,  $AO$  ejus axis,  $AL$  arcus circuli radio  $AO$  descriptus. Ducantur radii  $OL$  &  $Ol$  infinite propinqui & radiis  $OB$  ac  $Ob$  describantur arcus  $EB$  &  $eb$ . Fiat denique  $AO = a$ ,  $AL = z$ ,  $OE = x$ ; erit  $Ee = BN = dx$ ,  $Ll = dz$  &  $ob$  sectores similes  $ObN$  ac  $OlL$  (§. 138. 412. *Geom.*).

$$OL : Ll = Ob : bN$$

$$a : dz = x : \frac{x dz}{a}$$

Sit celeritas qua mobile fertur in  $B = c$  & vis centralis  $= v$ . Quoniam massa mobilis eadem existente sive  $= 1$ , elementum celeritatis  $dc$ , quod positivum vel negativum esse potest, prout celeritas vel augetur, vel minuitur, est ut elementum temporis in vim sollicitantem sive centralem ductum (§. 113); tempus vero per  $BN$ , ob motus in spatio infinite parvo æquabilitatem, ut  $\frac{dx}{c}$  (§. 39); erit

$$— dc = \frac{v dx}{c}$$

$$— cdc = v dx$$

$$— \frac{1}{2} c^2 = \int v dx$$

hoc



hoc est omiffa quantitate constante  $\frac{1}{2}$ , cum hic tantummodo rationum habeatur ratio, (§. 187. *Arithm.*) & addita constante homogenea ex lege integrationis (§. 95. *Analys. infin.*)

$$\frac{ab - c^2 = f v dx}{ab - f v dx = c^2}$$

$$\sqrt{(ab - f v dx)} = c.$$

Quoniam motus per Bb in tempufculo infinite parvo peractus æquabilis, erit spatium Bb = cdt (§. 34.

ædeoque Bb = dt  $\sqrt{(ab - f v dx)}$   
Sed dt = BO. bN (§. 652)

$$\text{Ergo } Bb = \frac{x^2 dz \sqrt{(ab - f v dx)}}{a}$$

$$Bb^2 = \frac{x^4 dz^2 (ab - f v dx)}{a^2}$$

Jam BN<sup>2</sup> = dx<sup>2</sup>  
bN<sup>2</sup> =  $\frac{x^2 dz^2}{a^2}$

$$Bb^2 = dx^2 + \frac{x^2 dz^2}{a^2}$$

$$= \frac{a^2 dx^2 + x^2 dz^2}{a^2}$$

Habemus itaque

$$\frac{a^2 dx^2 + x^2 dz^2}{a^2} = \frac{x^4 dz^2 (ab - f v dx)}{a^2}$$

hoc est, ut observetur lex homogeneorum,

$$\frac{a^2 c^2 dx^2 + a^2 c^2 x^2 dz^2 = x^4 dz^2 (ab - f v dx)}{a^2 c^2 dx^2 = x^4 dz^2 (ab - f v dx) - a^2 c^2 x^2 dz^2}$$

$$\frac{a^2 c^2 dx^2}{x^4 (ab - f v dx) - a^2 c^2 x^2} = dz^2$$

$$\frac{a^2 c dx}{\sqrt{(ab x^4 - x^4 f v dx - a^2 c^2 x^2)}} = dz$$

$$z = \int (a^2 c dx : \sqrt{(ab x^4 - x^4 f v dx - a^2 c^2 x^2)})$$

Hæc est æquatio generalis ad trajectoriam, in qua mobile data vi centrali v ad punctum O urgetur, & in qua c denotat quantitatem arbitrariam constantem ex lege homogeneorum assumendam.

SCHOLIUM.

665. *Æquationem hanc generalem ad trajectoriam invenit JOANNES BERNOULLI problema inversum de trajectoriis, in quibus vires centrales sunt reciproce ut quadrata distantiarum, soluturus, ac inde casum hunc specialem non sine artificio deduxit (a): majoris enim artis est solvere problema in casu speciali, quam generaliter. Ut vero solutionem nostro more cum primis Matheseos principiis perspicue connectamus, problemata quadam per modum Lemmatum præmittenda sunt.*

PROBLEMA CVIII.

666. *Invenire æquationem ad Parabolam, abscissis à foco computatis.*

Tab. XVII. Fig. 163. b.

RESOLUTIO.

Sit in Parabola QO = x, QM = y, parameter = p; erit AO =  $\frac{1}{4}p$  (§. 396. *Analys. fin.*) adeoque AQ =  $\frac{1}{4}p + x$ , consequenter y<sup>2</sup> =  $\frac{1}{4}p^2 + px$  (§. 388. *Analys. fin.*). Q; e. i. & d.

PROBLEMA CIX.

967. *Invenire æquationem ad Ellipsin, abscissis à foco computatis.*

Tab. XVII. Fig. 165.

(a) In Comment. Acad. Reg. Scient. A. 1710. p. 691. & seqq.

RESOLUTIO.

Tab. XVII. Fig. 165.

Sit in F focus Ellipsis & in C centrum. Fiat AB = m, parameter = p, FP = x: erit FA =  $\frac{1}{2}m - \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)}$  (S. 427. *Analys. fin.*), adeoque  
 AP =  $\frac{1}{2}m - \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)} - x$   
 PB =  $\frac{1}{2}m + \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)} + x$ .

AP.PB =  $\frac{1}{4}pm - 2x\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)} - x^2$   
 Jam ex natura Ellipseos (S. 420. *Analys. fin.*).

$$y^2 : \frac{1}{4}pm - 2x\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)} - x^2 = p : m$$

Ergo

$$y^2 = \frac{1}{4}p^2 - \frac{2px}{m} \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm)} - \frac{px^2}{m}. \quad Q. e. i. \& d.$$

PROBLEMA CX.

Tab. XVII. Fig. 163. b

668. *Invenire equationem ad Hyperbolam, abscissis à foco computatis.*

RESOLUTIO.

Sit focus Hyperbolæ in O, centrum C, axis dimidius transversus CA. Sit 2AC = m, parameter = p, OQ = x, QM = y: erit AO =  $\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} - \frac{1}{2}m$  (S. 463. *Anal. fin.*), adeoque  
 AQ =  $\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} - \frac{1}{2}m + x$   
 AQ + 2AC =  $\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} + \frac{1}{2}m + x$ .

$$AQ (AQ + 2AC) = \frac{1}{4}pm + 2x\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} + x^2$$

Quare cum sit ex natura Hyperbolæ (S. 459. *Analys. fin.*)

$$y^2 : \frac{1}{4}pm + 2x\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} + x^2 = p : m$$

erit

$$y^2 = \frac{1}{4}p^2 + \frac{2px}{m} \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm)} + \frac{px^2}{m}$$

Q. e. i. & d.

PROBLEMA CXI.

669. *Invenire trajectoriam, in qua mobile incedit, si vis centripeta, qua urgetur, fuerit reciproce in ratione duplicata radii vectoris.*

Tab. XV. Fig. 16.

RESOLUTIO.

Quoniam in solutione generali radium vectorem diximus x, erit vis centralis  $v = \frac{I}{x^2} = \frac{a^2g}{x^2}$ , servata lege homogeneorum, ut commode valor in formula generali substitui possit. Cum itaque elementum arcus Ll = dz (S. 664) in casu generali; =

$$\frac{a^2 c^2 dx}{\sqrt{(abx^4 - x^4 \int v dx - a^2 c^2 x^2)}} \text{ erit idem in casu speciali } \frac{a^2 c^2 dx}{\sqrt{(abx^2 - x^2 \int \frac{a^2 g dx}{x^2} - a^2 c^2)}}$$

$$Sed \int \frac{a^2 g dx}{x^2} = \int a^2 g x^{-2} dx = a^2 g x^{-1}$$

$$Quare dz = \frac{a^2 c^2 dx}{x \sqrt{(abx^2 + a^2 g x - a^2 c^2)}}$$

Cum dz five Ll fit elementum arcus à forma ordinaria discedens, ut ad eam reducatur, fiat

$$x = \frac{a^2}{y}$$

$$\text{erit } dx = -\frac{a^2 dy}{y^2} \& x^2 = \frac{a^4}{y^2}$$

adeoque

$$\begin{aligned} \text{adeoque } dz &= - \frac{a^2 c^2 dy : y^2}{\frac{a^2}{y} \sqrt{\left(\frac{a^3 b}{y^2} + \frac{a^4 g}{y} - a^2 c^2\right)}} \\ &= - \frac{a^2 c^2 dy}{a^2 y \sqrt{\left(\frac{a^3 b}{y^2} + \frac{a^4 g}{y} - a^2 c^2\right)}} \\ &= - \frac{a^2 c^2 dy}{a^3 \sqrt{(a^3 b + a^2 g y - c^2 y^2)}} \\ &= - \frac{a c^2 dy}{\sqrt{(a^3 b + a^2 g y - c^2 y^2)}} \end{aligned}$$

Fiat porro  $y = \frac{a^2 g}{2c^2} - t$

erit  $y^2 = \frac{a^4 g^2}{4c^4} - \frac{a^2 g t}{c^2} + t^2$

adeoque  $-c^2 y^2 = -\frac{a^4 g^2}{4c^2} + a^2 g t - c^2 t^2$

$a^2 g y = \frac{a^4 g^2}{2c^2} - a^2 g t$

$dy = - dt$

Unde tandem habetur

$$dz = \frac{a c d t}{\sqrt{\left(a b + \frac{a^2 g^2}{4c^2} - c^2 t^2\right)}}$$

Fiat denique  $a^3 b + \frac{a^4 g^2}{4c^2} = c^2 b^2$

erit  $dz = \frac{a c d t}{c \sqrt{(b^2 - t^2)}}$

$\frac{dz}{a} = \frac{d t}{\sqrt{(b^2 - t^2)}}$

$= \frac{1}{b} \frac{b d t}{\sqrt{(b^2 - t^2)}}$

Habemus adeo elementum circuli  $\frac{b d t}{\sqrt{(b^2 - t^2)}}$ , cujus radius  $b$ , finus rectus  $t$  (§. 153. *Anal. infin.*), per radium  $b$  divisum &  $\frac{dz}{a}$  est itidem ele-

mentum circuli  $Ll$  per radium  $LO$  divisum vi denominationis in solutione generali (§. 664) facta. Jam dato radio datoque arcu, datur angulus (§. 57. *Geom.*), atque adeo ratio arcus ad radium, consequenter arcus per radium divisus (§. 129. *Aritbm.*), exprimit angulum, nempe  $\frac{dz}{a}$  angulum  $LOl$  &  $\int \frac{dz}{a}$  angulum

$AOL$ , pariterque  $\frac{b d t}{b \sqrt{(b^2 - t^2)}}$  angulum

priori  $LOl$  &  $\int \frac{b d t}{b \sqrt{(b^2 - t^2)}}$  alium posteriori  $AOL$  æqualem, cujus radius  $b$ , finus rectus  $t$ . Unde jam fluit constructio curvæ  $ABC$  istiusmodi.

Radio  $b = \sqrt{\left(\frac{a^3 b}{c^2} + \frac{a^4 g^2}{4c^4}\right)}$  describatur Quadrans  $MKT$  sumtoque arcu  $AL = z$  pro arbitrio ducatur recta  $OL$  fecans quadrantem istum in  $K$ , erit arcus  $KM = \int \frac{b d t}{\sqrt{(b^2 - t^2)}}$  &  $KI = t$ .

Jam porro inveniri potest radius  $OB$  sive  $OE$ . Quoniam enim

$y = \frac{a^2 g}{2c^2} - t = \frac{a^2 g - 2c^2 t}{2c^2}$

&  $x = \frac{a^2}{y}$

erit  $x = \frac{2a^2 c^2}{a^2 g - 2c^2 t} = \frac{c^2 t}{g - 2 \frac{c^2 t}{a^2}}$

Est igitur  $a : c = c : \frac{c^2}{a}$  &  $a : t = \frac{c^2}{a} : \frac{c^2 t}{a^2}$ ,

ac denique  $g - 2 \frac{c^2 t}{a^2} : c = c : \frac{c^2}{g - 2c^2 t : a^2}$ .

Quodsi recta OB hoc modo inventa, ex centro O describatur arcus EB, interfecabit is radium OL in B eritque punctum B in trajectoria quæsita.

## PROBLEMA CXII.

670. *Invenire æquationem ad trajectoriam, in qua vires centripetae sunt reciproce ut quadrata distantiarum à centro virium.*

## RESOLUTIO.

Tab. XVII. Sit  $OQ = \frac{a^2g}{2c^2}$  &  $OP = t$ ; erit  $PQ = \frac{a^2g}{2c^2} - t = y$  (§. 669). Quoniam

$OB = z = \frac{a^2}{y}$ ; si intra asymptotos

QO & QR describatur Hyperbola GNV, latere potentiaë existente =  $a$  (§. 489. *Analys. finit.*) erit  $PN = z$  (§. 488. *Analys. finit.*). Fiat jam  $OF = x$ ,  $FB = y$ , reliqua sint ut ante; erit (§. 268. *Geom.*):

$$OP : OS = OF : OB$$

$$t : b = x : \frac{bx}{t}$$

Sed  $OB = \frac{2a^2c^2}{a^2g - 2c^2t}$  (§. 669).

$$\text{Ergo } \frac{bx}{t} = \frac{2a^2c^2}{a^2g - 2c^2t}$$

---


$$a^2ghx - 2c^2htx = 2a^2c^2t$$

---


$$a^2ghx = 2c^2htx + 2a^2c^2t$$

---


$$\frac{a^2ghx}{2c^2hx + 2a^2c^2} = t$$

Porro (§. cit. *Geom.*)

$$OP : PS = OF : FB$$

$$t : \sqrt{(b^2 - t^2)} = x : y$$

---


$$x\sqrt{(b^2 - t^2)} = ty$$

---


$$b^2x^2 - t^2x^2 = t^2y^2$$

---


$$b^2x^2 = t^2x^2 + t^2y^2$$

---


$$\frac{b^2x^2}{x^2 + y^2} = t^2$$

Est vero etiam per demonstrata.

$$t^2 = \frac{a^4g^2b^2x^2}{4a^4c^4 + 8a^2c^4bx + 4c^4b^2x^2}$$

Habemus igitur

$$\frac{b^2x^2}{x^2 + y^2} = \frac{a^4g^2b^2x^2}{4a^4c^4 + 8a^2c^4bx + 4c^4b^2x^2}$$

---


$$\frac{I}{x^2 + y^2} = \frac{a^4g^2}{4a^4c^4 + 8a^2c^4bx + 4c^4b^2x^2}$$

---


$$4a^4c^4 + 8a^2c^4bx + 4c^4b^2x^2 = a^4g^2x^2 + a^4g^2y^2$$

---


$$y^2 = \frac{4c^4b^2x^2}{a^4g^2} + \frac{8c^4bx}{a^2g^2} + \frac{4c^4}{g^2} - x^2$$

Quæ est æquatio ad Trajectoriam quæsitam. Cum ea sit quadratica, erit ad sectionem conicam. Habemus itaque

*Theorema.* Si corpus in trajectoria urgeatur à vi centripeta, quæ est reciproce ut quadratum distantiaë à centro virium; erit trajectoria ista aliqua sectio conica.

Ut appareat, ad quamnam sectionem conicam sit æquatio; comparetur ea cum æquationibus singularum sectionum conicarum, quas ante reperimus, abscissis à foco computatis. Quoniam pro Parabola, cujus parameter =  $p$ , (§. 666).

$$y^2 = \frac{1}{4}p^2 + px$$

Æqua-

Æquatio vero ad trajectoriam per demonstr.

$$y^2 = \frac{4c^4 h^2 x^2}{a^4 g^2} + \frac{8c^4 hx}{a^2 g^2} + \frac{4c^4}{g^2} - x^2$$

Ob deficientem in Parabola secundum terminum, erit

$$\frac{4c^4 h^2}{a^4 g^2} - 1 = 0$$

$$4c^4 h^2 = a^4 g^2$$

$$h^2 = \frac{a^4 g^2}{4c^4}$$

$$h = \frac{a^2 g}{2c^2}$$

Est vero per constructionem  $h = OT = OS$  &  $\frac{a^2 g}{2c^2} = OQ_c$

Trajectoria igitur Parabola est, si  $OT = OQ_c$ .

In calculo sumimus

$$h = \sqrt{\left(\frac{a^3 b}{c^2} + \frac{a^4 g^2}{4c^4}\right)}$$

in casu parabolæ

$$\frac{a^3 b}{c^2} = 0$$

adeoque  $b = 0$

$$p = \frac{8c^4 h}{a^2 g^2}$$

$$\frac{1}{4}p^2 = \frac{4c^4}{g^2}$$

$$= \frac{8c^4 a^2 g}{2a^2 c^2 g^2}$$

$$p^2 = \frac{16c^4}{g^2}$$

$$= \frac{4c^2}{g}$$

$$p = \frac{4c^2}{g}$$

Parameter Padeo arabolæ est tertia proportionalis ad  $g$  &  $2c$ .

Æquatio pro Ellipsi, abscissis à foco computatis, est (S. 657),

$$y^2 = -\frac{px^2}{m} - \frac{2px}{m} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm\right)} + \frac{1}{4}p^2$$

Æquatio ad trajectoriam per demonstrata

$$y^2 = \frac{4c^4 h^2 x^2}{a^4 g^2} + \frac{8c^4 hx}{a^2 g^2} + \frac{4c^4}{g^2} - x^2$$

Habemus itaque

$$\frac{1}{4}p^2 = \frac{4c^4}{g^2}$$

$$p^2 = \frac{16c^4}{g^2}$$

$$p = \frac{4c^2}{g}$$

Parameter adeo eadem, quæ in Parabola.

$$\text{Porro } \frac{p}{m} = \frac{4c^4 h^2}{a^4 g^2} = 1$$

$$\text{hoc est } 1 = \frac{4c^2}{mg} = \frac{4c^4 h^2}{a^4 g^2}$$

$$a^4 g^2 = \frac{4a^4 c^2 g}{m} = 4c^4 h^2$$

$$h^2 = \frac{a^4 g^2}{4c^4} = \frac{a^4 g}{mc^2}$$

$$h = \sqrt{\left(\frac{a^4 g^2}{4c^4} = \frac{a^4 g}{mc^2}\right)}$$

In Ellipsi adeo  $\frac{a^2 g}{2c^2} > h$

hoc est,  $CQ > OT$ .

Quodsi ulterius desideretur valor ipsius  $m$ , fiat

$$-\frac{2p}{m} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}pm\right)} = \frac{8c^4 h}{a^2 g^2}$$

hoc

$$\begin{aligned} \text{hoc est, } & -\frac{8c^2}{mg} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 - \frac{c^2m}{g}\right)} = \frac{8c^4b}{a^2g^2} \\ & -\sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 - \frac{c^2m}{g}\right)} = \frac{mc^2b}{a^2g} \\ & \frac{\frac{1}{4}m^2 - \frac{c^2m}{g}}{g} = \frac{m^2c^4b^2}{a^4g^2} \\ & \frac{\frac{1}{4}m - \frac{c^2}{g}}{g} = \frac{mc^4b^2}{a^4g^2} \\ & \frac{a^4g^2m - 4a^4c^2g}{4a^4g^2m - 4mc^4b^2} = \frac{4mc^4b^2}{4a^4c^2g} \\ & m = \frac{4a^4c^2g}{a^4g^2 - 4c^4b^2} \end{aligned}$$

Æquatio pro Hyperbola abscissis à foco computatis est (§. 668).

$$y^2 = \frac{px^2}{m} + \frac{2px}{m} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm\right)} + \frac{1}{4}p^2$$

Æquatio ad trajectoriam est

$$\begin{aligned} y^2 &= \frac{4c^4b^2x^2}{a^4g^2} + \frac{8c^4bx}{a^2g^2} + \frac{4c^4}{g^2} - x^2 \\ \frac{1}{4}p^2 &= \frac{4c^4}{g^2} \\ \frac{1}{2}p &= \frac{2c^2}{g} \\ p &= \frac{4c^2}{g} \end{aligned}$$

Eadem ergo parameter in Hyperbola, quæ in ceteris sectionibus conicis.

$$\frac{p}{m} = \frac{4c^4b^2}{a^4g^2} \text{ — I}$$

$$\begin{aligned} \text{hoc est } \frac{4c^2}{gm} &= \frac{4c^4b^2 - a^4g^2}{a^4g^2} \\ \frac{4a^4c^2g^2}{4a^4c^2g^2 + a^4g^3m} &= \frac{4c^4b^2gm - a^4g^3m}{4c^4b^2gm} \\ \frac{4a^4c^2g + a^4g^2m}{4c^4m} &= b^2 \\ \sqrt{\left(\frac{a^4g^2}{4c^4} + \frac{a^4g}{c^2m}\right)} &= b \end{aligned}$$

Jam cum  $QO = \frac{a^2g}{2c^2}$  &  $TO = b$ , fit-

que  $\frac{a^2g}{2c^2} < b$ ; erit  $QO < TO$ , quando trajectoria Hyperbola.

Si ulterius desideretur valor ipsius  $m$ , fiat

$$\frac{2p}{m} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm\right)} = \frac{8c^4b}{a^2g^2}$$

hoc est, ob  $p = \frac{4c^2}{g}$ ,

$$\begin{aligned} \frac{8c^2}{gm} \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm\right)} &= \frac{8c^4b}{a^2g^2} \\ \sqrt{\left(\frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm\right)} &= \frac{mc^2b}{a^2g} \\ \frac{1}{4}m^2 + \frac{1}{4}pm &= \frac{m^2c^4b^2}{a^4g^2} \end{aligned}$$

$$m + p = \frac{4mc^4b^2}{a^4g^2}$$

hoc est,  $m + \frac{4c^2}{g} = \frac{4mc^4b^2}{a^4g^2}$

$$\begin{aligned} \frac{a^4g^2m + 4a^4c^2g}{4a^4c^2g} &= \frac{4mc^4b^2}{4a^4g^2m - a^4g^2m} \\ \frac{4a^4c^2g}{4c^4b^2 - a^4g^2} &= m \end{aligned}$$

Quodsi datis  $m$  &  $p$  per literas assumptitias  $b, c, g$  &  $a$  harum valores desiderentur per  $m$  &  $p$ , æquationum reductione facta facile determinantur.

$$\begin{aligned} \text{Est enim } p &= \frac{4c^2}{g} & b &= \frac{a^2g}{2c^2} \\ g &= \frac{4c^2}{p} & c^2 &= \frac{a^2g}{2b} \\ c^2 &= \frac{1}{4}pg & & \\ \frac{1}{4}pg &= \frac{a^2g}{2b} & & \\ p &= \frac{2a^2}{b} & & \\ b &= \frac{2a^2}{p} & & \end{aligned}$$

Si ergo  $p$  datur &  $c$  pro arbitrio assumitur, cum in omni sectione conica sit  $p = 4c^2 : g$ , valor ipsius  $g$  omni sectioni conicæ responderet. Ast cum in Parabola tantummodo sit  $b = a^2g : 2c^2$ ; valor ipsius  $b$  per  $a$  &  $p$  determinatus Parabolæ proprius. Unde si valores quantitatum  $g$  &  $b$  modo repertos substituas in æquatione ad trajectoriam, in æquationem ad Parabolam, abscissis à foco computatis, eadem degenerat. Nimirum æquatio ad trajectoriam (§. 670.)

$$y^2 = \frac{4c^4b^2x^2}{a^4g^2} + \frac{8c^4bx}{a^2g^2} + \frac{4c^4}{g^2} - x^2$$

Porro

$$g = \frac{4c^2}{p} \quad b = \frac{2a^2}{p}$$

$$g^2 = \frac{16c^4}{p^2} \quad b^2 = \frac{4a^4}{p^2}$$

Quare

$$\frac{4c^4b^2}{a^4g^2} = \frac{16a^4c^4p^2}{16a^4c^4p^2} = 1$$

Coëfficiens itaque ipsius  $x^2 = 1 - 1 = 0$ : atque adeo hic terminus in æquatione, quæ quæritur, deficit.

$$\frac{8c^4b}{a^2g^2} = \frac{16a^2c^4p^2}{16a^2c^4p} = p$$

$$\frac{4c^4}{g^2} = \frac{4c^4p^2}{16c^4} = \frac{1}{4}p^2$$

Unde prodit æquatio  $y^2 = px + \frac{1}{4}p^2$ , quæ est ad Parabolam, abscissis à foco computatis (§. 666.).

Quodsi valor ipsius  $b$  in Ellipsi vel Hyperbola desideretur, in æquationibus,

*Wolffi Oper. Mathem. Tom. II.*

$$b^2 = \frac{a^4g^2}{4c^4} - \frac{a^4g}{mc^2} \quad \& \quad b^2 = \frac{a^4g^2}{4c^4} + \frac{a^4g}{mc^2}$$

substituendus est valor ipsius  $g$ . Nimirum.

$$g = \frac{4c^2}{p} \quad g^2 = \frac{16c^4}{p^2}$$

Ergo

$$b^2 = \frac{16a^4c^4}{4c^4p^2} \mp \frac{4a^4c^2}{mpc^2} = \frac{4a^4}{p^2} \mp \frac{4a^4}{mp}$$

$$= \frac{4a^4m \mp 4a^4p}{mp^2}$$

$$b = \frac{2a^2}{p} \sqrt{\left(1 \mp \frac{p}{m}\right)}$$

Si denique valor ipsius  $b$  desideretur, in æquatione  $a^3b \mp \frac{a^4g^2}{4c^2} = cb^2$  substituendus est valor ipsius  $g^2$  &  $b^2$

In parabola

$$g^2 = \frac{16c^4}{p^2} \quad b^2 = \frac{4a^4}{p^2}$$

$$\text{Unde } a^3b + \frac{16a^4c^4}{4c^2p^2} = \frac{4a^4c^2}{p^2}$$

$$\text{h. e. } a^3b + \frac{4a^4c^2}{p^2} = \frac{4a^4c^2}{p^2}$$

$$a^3b = 0$$

$$b = 0$$

Quemadmodum jam supra reperimus.

In Hyperbola

$$b^2 = \frac{4a^4m \mp 4a^4p}{mp^2} \quad g^2 = \frac{16c^4}{p^2}$$

Z

Ergo

$$\begin{aligned} \text{Ergo } a^3 b + \frac{16 a^4 c^4}{4 c^2 p^2} &= \frac{4 a^4 m c^2 + 4 a^4 c^2 p}{m p^2} \\ a^3 b &= \frac{4 a^4 m c^2 + 4 a^4 p c^2}{m p^2} - \frac{4 a^4 c^2}{p^2} \\ &= \frac{4 a^4 c^2}{m p} \\ \hline b &= \frac{4 a c^2}{m p} \end{aligned}$$

In Ellipfi idem prodit valor, sed negativus.

SCHOLIION.

671. *A Theoria virium centralium pendet solutio Problematis de curva, in qua grave descendens eandem ubique premit vi ponderi absoluto æquali: quod à JOHANNÉ BERNOULLI propositum (a) solvit HOSPITALIUS (b). Ejus igitur solutionem hic subnectere libet.*

PROBLEMA CXIII.

Tab. XVII. Fig. 168. *672. Invenire curvam, in qua grave descendens motu naturaliter accelerato eandem in singulis punctis premit vi ubique æquali ponderi corporis absoluto, seu si MC sit radius evolutæ in puncto M, ut ubique filum MC eadem vi tendat.*

RESOLUTIO.

Sit AH axis curvæ, AB altitudo per quam cadendo acquirit celeritatem initialem, qua descensum in curva inchoat: PM & pm sint ordinatæ infinite propinquæ, MC radius evolutæ ad curvam BMK ex evolutione descriptam normalis (§. 317. *Analys. infin.*): Producat PM in N & representet MN pondus absolutum corporis descendentis. Producat itidem radius evolutæ CM in-

(a) In actis Erudit. Supplem. T. 2. p. 291.

(b) In Comment. Acad. Reg. Scient. An. 1700. p. 11.

definite & in eum sic productum ex N demittatur perpendicularis NO; repræsentabit MO partem ponderis, quo premitur curva in puncto M, seu planum in quo est tangens curvæ in puncto M (§. 47. *Geom.*).

Enimvero filum CM non modo tenditur in M ab hac gravitatis parte, quæ est ut MO, verum etiam à vi centrifuga quam habet in arculo Mm radio evolutæ MC descripto. Quamobrem aggregatum ex ea gravitatis parte & conatu centrifugo in M est æquale ponderi absoluto *per hypothes.*

Sit jam conatus centrifugus = V, erit (§. 639).

$$\text{MC} : 2 \text{ PM} = \text{MN} : V$$

$$\text{adeoque } V = \frac{2 \text{ PM} \cdot \text{MN}}{\text{MC}}$$

consequenter

$$\text{MN} = \frac{2 \text{ PM} \cdot \text{MN}}{\text{MC}} + \text{MO}$$

*per demonstr.*

Sit igitur MN = a, quia MN pondus absolutum denotans constans est, AP = x, PM = y, arcus curvæ BM = v; erit Pp = MR = dx, mR = dy, Mm = dv, & MC = t dv : dx (§. 320. *Anal. infin.*).

Ut valor ipsius t determinetur, fiat ut ibidem differentiale ipsius MC = 0. Sed quia in singulis arculis Mm pressio eadem *per hypothes.* ubivis assumendi sunt æquales, atque adeo Mm = dv quantitas constans. Sumta igitur in differentiatione dv pro constante, prodibit

*dv did. x*



$$\frac{dv dt dx - t dv ddx}{dx^2} = 0$$

$$dv dt dx = t dv ddx$$

$$\frac{dt dx}{ddx} = t$$

Est vero  $dt = dy$  (§. cit. *Anal. infin.*)

$$\text{Ergo } t = \frac{dy dx}{ddx}$$

Substituatur hic valor in expressione radii osculi seu evolutæ  $MC = t dv : dx$ ; prodibit

$$MC = \frac{dy dv dx}{dx ddx} = \frac{dy dv}{ddx}$$

Porro  $CMR + RMm$  est rectus (§. 317. *Analys. infin.*) &  $PMC + CMR$  itidem rectus ob  $MR$  &  $Pp$  perpendiculares ad  $pR$  alteri  $PM$  parallelam (§. 230. *Geom.*). Quamobrem  $CMR + RMm = PMC + CMR$  (§. 145. *Geom.*), adeoque  $RMm = PMC$  (§. 91. *Arith.*) Est vero  $PMC = OMN$  (§. 156. *Geom.*) Ergo  $RMm = OMN$  (§. 87. *Arithm.*). Quoniam præterea anguli  $O$  &  $R$  recti sunt *per constr.* erit (§. 267. *Geom.*).

$$Mm : MR = MN : MO$$

$$dv : dx = a : \frac{adx}{dv}$$

Denique cum sit

$$MC : MN = 2 PM : \frac{2 PM. MN}{MC}$$

$$\text{hoc est, } \frac{dy dv}{ddx} : a = 2y : \frac{2 ay ddx}{dy dv}$$

$$\text{habebimus ob } \frac{2 PM. MN}{MC} + MO = MN$$

$$\text{per demonstrata, } 2 \frac{ay ddx}{dy dv} + \frac{adx}{dv} = a$$

$$2 ay ddx + ady dx = ady dv$$

$$2 y ddx + dy dx = dy dv$$

Quodsi coëfficiens 2 abesiet, summa membri primi foret  $y dx$ . Sed si integrabile fieri debet, dividendum est per  $2 \sqrt{y}$ : quo facto prodit

$$\frac{2 y ddx + dy dx}{2 \sqrt{y}} = \frac{dy dv}{2 \sqrt{y}}$$

$$dx \sqrt{y} = dv \sqrt{y}, \text{ quia } dv \text{ constans.}$$

Quoniam vero  $dv > dx$ , cum  $dv$  sit differentiale arcus,  $dx$  abscissæ, adjicienda est quantitas constans, quæ vi legis homogeneorum fieri debet —  $dv \sqrt{a}$ . Habemus adeo

$$dx \sqrt{y} = dv \sqrt{y} - dv \sqrt{a}$$

$$y dx^2 = y dv^2 - 2 dv^2 \sqrt{ay} + a dv^2$$

$$\text{Sed } dv^2 = dx^2 + dy^2$$

Ergo

$$y dx^2 = y dx^2 + y dy^2 - 2 dx^2 \sqrt{ay} - 2 dy^2 \sqrt{ay} + a dx^2 + a dy^2$$

$$2 dx^2 \sqrt{ay} - a dx^2 = y dy^2 + a dy^2 - 2 dy^2 \sqrt{ay}$$

$$dx \sqrt{(2 \sqrt{ay} - a)} = dy \sqrt{y} - dy \sqrt{a} = dy (\sqrt{y} - \sqrt{a})$$

$$dx = \frac{dy (\sqrt{y} - \sqrt{a})}{\sqrt{(2 \sqrt{ay} - a)}}$$

$$\text{Fiat } z = 2 \sqrt{ay} - a$$

$$\text{erit } dz = \frac{dy \sqrt{a}}{\sqrt{y}}$$

$$\frac{dz \sqrt{y}}{a} = dy$$

$$\text{Jam } z = 2 \sqrt{a} \sqrt{y} - a$$

$$\frac{z}{2 \sqrt{a}} = \sqrt{y} - \frac{1}{2} \sqrt{a}$$

$$\frac{z}{2 \sqrt{a}} + \frac{1}{2} \sqrt{a} = \sqrt{y}$$

$$\text{five } \frac{z+a}{2\sqrt{a}} = \sqrt{y}$$

$$\text{Porro } \frac{z}{2\sqrt{a}} - \frac{1}{2}\sqrt{a} = \sqrt{y} - \sqrt{a}$$

$$\text{feu } \frac{z-a}{2\sqrt{a}} = \sqrt{y} - \sqrt{a}$$

Quodsi ergo valores hactenus inventi substituantur in formula

$$dy = \frac{dy(\sqrt{y} - \sqrt{a})}{\sqrt{(2\sqrt{ay} - a)}}; \text{ prodibit}$$

$$dx = \frac{dz(z+a)(z-a)}{4a\sqrt{a}\sqrt{z}}$$

$$= \frac{(z^2 - a^2)dz}{4a\sqrt{az}}$$

$$4adx\sqrt{a} = \frac{z^2 dz - a^2 dz}{\sqrt{z}}$$

$$= z^{3/2} dz - a^2 z^{-1/2} dz$$

$$4ax\sqrt{a} = \frac{2}{5} z^{5/2} - 2a^2 z^{1/2}$$

$$2ax\sqrt{a} = \frac{1}{5} (z^2 - 5a^2)\sqrt{z}$$

$$\text{Jam } z^2 = 4ay - 4a\sqrt{ay} + a^2$$

$$\sqrt{z} = \sqrt{(2\sqrt{ay} - a)}$$

Quamobrem

$$10ax\sqrt{a} = (4ay - 4a\sqrt{ay} - 4a^2)\sqrt{(2\sqrt{ay} - a)}$$

$$5ax = (2y - 2\sqrt{ay} - 2a)\sqrt{(2a\sqrt{ay} - a^2)}$$

Sit  $x = 0$ ; erit

$$2y - 2\sqrt{ay} - 2a = 0$$

$$2y - 2\sqrt{ay} = 2a$$

$$y - \sqrt{ay} = a$$

$$\frac{1}{4}a \quad \frac{1}{4}a$$

$$y - \sqrt{ay} + \frac{1}{4}a = \frac{5}{4}a$$

$$\sqrt{y} - \frac{1}{2}\sqrt{a} = \frac{1}{2}\sqrt{5a}$$

$$\sqrt{y} = \frac{1}{2}\sqrt{a} + \frac{1}{2}\sqrt{5a}$$

$$y = \frac{5}{4}a + \frac{1}{2}a\sqrt{5}$$

$$2y = 3a + a\sqrt{5} = 2AB$$

Fiat  $y = 0$

$$\text{erit } 5ax = -2a\sqrt{a^2}$$

$$x = -\frac{2}{5}a$$

Curva igitur KMB continuatur ultra punctum B. Nimirum si fiat  $AD = a$  & erecta perpendiculari  $CD = \frac{2}{5}a$ ; curva huic in puncto C occurrit.

Quoniam curva verticalem ad angulos rectos secat, ubi differentiale semiordinatae  $= 0$ ; ut punctum reperiat, in quo curva rectam AB secat ad angulos rectos, fiat  $dy = 0$ , erit ob

$$dx\sqrt{(2a\sqrt{ay} - a^2)} = dy(\sqrt{y} - \sqrt{a})$$

$$dx\sqrt{(2a\sqrt{ay} - a^2)} = 0$$

$$2a\sqrt{ay} - a^2 = 0$$

$$2\sqrt{ay} = a$$

$$4ay = a^2$$

$$y = \frac{1}{4}a$$

Quamobrem si fiat  $AG = \frac{1}{4}a$ , curva secabit AB in G ad angulos rectos.

#### PROBLEMA CXIV.

673. Invenire curvam, in qua mobile descendens eandem quidem constanter eadem vi premit, sed qua non equalis est ponderi absoluto.

#### RESOLUTIO.

Sint omnia ut in problemate precedente, nisi quod vis premens dicatur  $b$ ; erit (§. 672).

$$\frac{2ayddx}{dydv} + \frac{adx}{dv} = b$$

$$2ayddx + adydx = bdydv$$

$$\frac{2ayddx + adydx}{2\sqrt{y}} = \frac{bdvdy}{2\sqrt{y}}$$

$$adx\sqrt{y} = bdv\sqrt{y} - adv\sqrt{a}$$

$$a^2 y dx^2 = b^2 y dv^2 - 2 ab dv^2 \sqrt{ay} + a^3 dv^2$$

$$dv^2 = dy^2 + dx^2$$

$$a^2 y dx^2 = b^2 y dy^2 + b^2 y dx^2 - 2 ab dy^2 \sqrt{ay} - 2 ab dx^2 \sqrt{ay} + a^3 dy^2 + a^3 dx^2$$

$$a^2 y dx^2 - b^2 y dx^2 + 2 ab dx^2 \sqrt{ay} - a^3 dx^2 = b^2 y dy^2 - 2 ab dy^2 \sqrt{ay} + a^3 dy^2$$

$$dx \sqrt{(a^2 y - b^2 y + 2 ab \sqrt{ay} - a^3)} = dy (b \sqrt{y} - a \sqrt{a})$$

$$dx = \frac{dy (b \sqrt{y} - a \sqrt{a})}{\sqrt{(a^2 y - b^2 y + 2 ab \sqrt{ay} - a^3)}}$$

Fiat  $b = 0$ , erit

$$dx = \frac{ady \sqrt{a}}{\sqrt{(a^2 y - a^3)}} = \frac{ady}{\sqrt{(ay - a^2)}}$$

$$x = 2 \sqrt{(ay - a^2)}$$

$$x^2 = 4ay - 4a^2$$

Est igitur in hoc casu curva, per quam mobile descendit Parabola, cujus parameter  $= 4a$ . Quando vero  $b = 0$ , perinde est ac si mobile in vacuo libere descendit. Quamobrem consensus Hypothesium praesentium cum curva descensus GALILAEANA patet (§. 482).

SCHOLIUM.

674. Monuit jam VARIGNONIUS (a) eandem solutionem ad alia Problemata similia extendi posse: quod quomodo fiat sequente Problemate ostendere lubet.

PROBLEMA CXV.

675. Invenire curvam, quae à pendere in ea descendente premitur in ratione dignitatum altitudinum PM.

RESOLUTIO.

Si omnia sint ut in antecedentibus, erit per hypothes.

$$\frac{2ayddx + adxdy}{dydv} = \frac{y^n}{a^{n-1}} \quad (\S. 672)$$

(a) In Comment. Acad. Reg. Scient. A. 1710. p. 196.

$$2yddx + dx dy = y^n a^{-n} dv dy$$

$$\frac{2yddx + dx dy}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2} y^{n-1/2} a^{-n} dv dy$$

$$dx \sqrt{y} = \frac{y^{n+1/2} dv}{(2n+1)a^n} = \frac{y^n dv \sqrt{y}}{(2n+1)a^n}$$

$$(2n+1)a^n dx = y^n dv$$

$$(2n+1)^2 a^{2n} dx^2 = y^{2n} dv^2 = y^{2n} dx^2 + y^{2n} dy^2$$

$$(2n+1)^2 a^{2n} dx^2 - y^{2n} dx^2 = y^{2n} dy^2$$

$$dx \sqrt{(a^{2n} (2n+1)^2 - y^{2n})} = y^n dy$$

$$dx = \frac{y^n dy}{\sqrt{(a^{2n} (2n+1)^2 - y^{2n})}}$$

Quodsi jam fuerit  $n = 1$  adeoque curva prematur in ratione altitudinum, per quas mobile descendit, consequenter in ratione duplicata celeritatum (§. 86): erit

$$dx = \frac{y dy}{\sqrt{(9a^2 - y^2)}}$$

$$x = \frac{3a^2 - y^2}{\sqrt{(9a^2 - y^2)}}$$

Fiat  $y = 0$ , relinquetur  $\sqrt{9a^2} = 3a$ , consequenter (§. 107. Anal. infin.)

$$x = 3a - \sqrt{(9a^2 - y^2)}$$

$$3a - x = \sqrt{(9a^2 - y^2)}$$

$$9a^2 - 6ax + x^2 = 9a^2 - y^2$$

$$y^2 = 6ax - x^2$$

Est ergo curva quaesita circulus, cuius radius est  $3a$ .

Sit  $n = 2$ , hoc est, prematur curva in ratione duplicata altitudinum descensus, seu quadruplicata celeritatum (§. 86); erit

$$dx = \frac{y^2 dy}{\sqrt{(25a^4 - y^4)}}$$

Quae

Quæ est æquatio ad Curvam Elasticam BERNOULLIANAM (*a*).

Sit  $n = \frac{1}{2}$ , hoc est, prematur curva in ratione subduplicata altitudinum, seu in ratione celeritatum (§. *cit.*); erit.

$$dx = \frac{y^{1.2} dy}{\sqrt{(4a-y)}}$$

$$dx^2 = \frac{y dy^2}{4a-y}$$

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 &= dv^2 = \frac{y dy^2}{4a-y} + dy^2 \\ &= \frac{y dy^2 + 4a dy^2 - y dy^2}{4a-y} \\ &= \frac{4a dy^2}{4a-y} \end{aligned}$$

$$dv = \frac{2 dy \sqrt{a}}{\sqrt{(4a-y)}} = \frac{2 a dy}{\sqrt{(4a^2-ay)}}$$

$$v = 4 \sqrt{(4a^2-ay)}$$

Fiat  $y = 0$ . erit residuum  $= -8a$ , adeoque

$$v = 8a - 4 \sqrt{(4a^2-ay)}$$

Tab. XVII. Quodsi diameter circuli HB  $= 4a$ ,

Fig. HI  $= y$ ; erit IB  $= 4a - y$ .

166. Quare IB<sup>2</sup>  $= 16a^2 - 8ay + y^2$

$$IN^2 = 4ay - y^2$$

(§. 377. *Anal. fin.*)

$$BN^2 = 16a^2 - 4ay$$

$$BN = 2 \sqrt{(4a^2-ay)}$$

$$2BN = 4 \sqrt{(4a^2-ay)}$$

= arcui Cycloidis BM (§.

168. *Anal. infin.*)

$$2BH = BM + AM$$

$$8a = BMA$$

$$8a - 4 \sqrt{(4a^2-ay)} = \text{arcui AM.}$$

Atque adeo patet curvam, quæ à mobili descendente premitur in ratione celeritatum, seu altitudinum subduplicata, esse Cycloidem ordinariam.

#### COROLLARIUM

676. Quodsi in Cycloide AP  $= x$ , PM  $= y$ , & diameter circuli genitoris  $= 4a$ ; æquatio ad eandem est  $dx = \frac{dy \sqrt{y}}{\sqrt{(4a-y)}}$ . Quare si diameter circuli genitoris fuerit  $= a$ , reliqua maneant ut ante; æquatio ad Cycloidem est  $dx = \frac{dy \sqrt{y}}{\sqrt{(a-y)}} = \frac{y dy}{\sqrt{(ay-y^2)}}$ , consequenter area Cycloidis APM  $\int \frac{y^2 dy}{\sqrt{(ay-y^2)}}$ .

## CAPUT XIV.

### De Resistentia Medii.

#### DEFINITIO LXX.

677. **P**ER Resistentiam medii intelligitur resistentia fluidi, per quod mobile fertur.

(*a*) In Actis Eruditorum A. 1694. p. 272. & A. 1695. p. 538.

#### COROLLARIUM.

678. Quoniam mobile fluidum, quod motui ejus resistit, loco pellere tenetur, atque adeo quandam motus partem amittit; celeritas ejus, massa quippe manente eadem, minuitur (§. 22).

PRO-

PROBLEMA CXVI.

979. *Data celeritate mobilis in medio resistente motu equabili lati, invenire celeritatem dato tempore amissam, spatium confectum & curvam resistentiæ, in qua semiordinata sunt ut celeritates amissæ.*

RESOLUTIO.

Sit AB celeritas, qua mobile initio fertur =  $a$ , ANG curva definiens celeritates totales in temporibus AP =  $x$  amissas, PN celeritas amissa =  $r$ ; erit NM celeritas residua, quæ dicatur  $v$ . Sit jam  $pm$  alteri PM infinite propinqua; erit NK differentia positiva semiordinatarum PN &  $pn$  seu celeritatum extinctarum =  $dr$ , eademque differentia negativa semiordinatarum NM &  $nm$  seu celeritatum residuarum =  $-dv$ . Unde resultat.

I.  $dr = -dv$ .

Sit porro curva ESI, cujus ordinatæ sunt ut NK (Fig. 169), seu legem resistentiæ exponunt. Quodsi ergo NK dividas per PS, quotus erit, quantitas constans; perinde enim fere est ac si eandem quantitatem dividas per se ipsam. Sit PS =  $z$ . Quoniam NK =  $-dv$  per demonstrata; erit  $\frac{NK}{PS} = -\frac{dv}{z}$ . Jam cum Pp =  $dx$ , quia AP perinde ac in curva præcedente tempus exponit, sit constans; erit per legem homogenorum

$$\frac{dv}{z} = \frac{dx}{a}$$

II.  $-adv = zdx$

Sit denique spatium à mobili tempusculo  $dx$  percursum =  $ds$ . Quoniam, idem est  $vdx$  (§. 34), erit

$$ds = vdx$$

accoque III.  $s = \int vdx$

SCHOLIUM.

680. *Ex formulis hisce generalibus, quas dedit VARIGNONIUS (a), deducuntur quæ de resistentia medii in hypothesibus specialibus à WALLISIO, NEWTONO, HUGENIO atque LEIBNITIO inventa sunt: quemadmodum ex sequentibus patet.*

THEOREMA CXLII.

681. *Si mobile motu equabili fertur per medium, in quo eidem resistitur in ratione celeritatum, curva resistentiæ totalis ANG est Logarithmica cujus asymptotus tempus, semiordinata ad ipsum relate celeritates residuas representant.* Tab. XVII. Fig. 169.

DEMONSTRATIO.

Quoniam mobili resistitur in ratione celeritatum per hypothesi. seu celeritates in instanti amissæ sunt ut celeritates; si omnia sint ut in problemate præcedente (§. 679): erit  $z = v$ . Est vero  $-adv = zdx$ , vi num. II. (§. cit.). Ergo  $-adv = vdx$ ; consequenter  $a = -\frac{vdx}{dv}$ . Est vero

$-\frac{vdx}{dv}$  subtangens curvæ, cujus abscissæ sunt  $x$ , semiordinatæ decrescentes  $v$  (§. 20. Anal. infin.). Ergo sub-

(a) In Comment. Acad. Reg. Scient. A. 1707. p. m. 503.

tangens curvæ resistantiæ totalis ANG est Logarithmica, cujus asymptotus BF ( §. 54. Anal. infin. ). Repræsentat autem BF tempus & semiordinatæ ad ipsum relata expriment celeritates residuas à resistantia medii. *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

682. Si quis dubitet hanc esse Logarithmicam proprietatem propriam, quod subtangens sit constans: haud difficulter idem demonstratur. Sint enim  $z$  &  $y$  dua semiordinate, &  $x$  ipsis respondentes abscissæ: erunt subtangentes  $\frac{ydx}{dy}$  &  $\frac{zdv}{dz}$ , adeoque  $ydx:dy = a$  &  $zdv:dz = a$  ( §. 54. Anal. infin. ), consequenter  $ydx:dy = zdv:dz$  ( §. 87. Arithm. ) Quoniam differentiale abscissæ sumitur constans; erit  $dx = dv$ , consequenter  $y:dy = z:dz$  ( §. 183. Arithm. ), adeoque  $y + dy: y = z + dz: z$  ( §. 190. Arithm. ). Habemus adeo semiordinate in proportione Geometrica. Jam ipsis respondentes abscissæ  $x + dx$  &  $x$  atque  $v + dv$  &  $v$  ob  $dx = dv$  sunt æqui-differentes ( §. 322. Arithm. ). Abscissis adeo æqui-differentibus respondent semiordinate in Geometrica progressionem, consequenter curva constantis subtangentis est Logarithmica ( §. 552. Anal. fin. ). Ceterum ANG dicitur curva resistantiæ totalis ad differentiam curvæ resistantiæ instantaneæ, in qua semiordinate sunt ut celeritates in instanti amissæ.

## THEOREMA CXLIII.

683. Si mobile motu æquabili per medium fertur, in quo eidem resistitur in ratione celeritatum & tempora sumuntur æqualia; erunt celeritates in principiis singulorum temporum in pro-

gressione Geometrica & partes singulis temporibus amissæ erunt iisdem proportionales seu ut totæ; vel etiam ut celeritates in fine illorum temporum.

## DEMONSTRATIO.

Si enim mobili à medio per quod Ta  
XVI  
Fi  
16 motu æquabili fertur, resistitur in ratione celeritatum; curva resistantiæ ANG Logarithmica est, cujus asymptotus BF tempus repræsentat, abscissæ vero NM celeritates residuas exhibent ( §. 681 ). Quodsi ergo tempora sumuntur æqualia, celeritates in principiis temporum sunt in Geometrica progressionem ( §. 552. Anal. fin. ) Quod erat unum.

Quodsi fiat  $BM = MR$ , tempora; quibus amittuntur celeritates AO & NV, æqualia sunt. Est vero  $AB:NM = NM:TR$  per demonstr. Ergo  $AB - NM: AB = NM - TR: NM$  ( §. 193. Arithm. ) hoc est,  $AO:AB = NV:NM$ , consequenter  $AO:NV = AB:NM$  ( §. 173. Arithm. ), seu celeritates temporibus æqualibus amissæ sunt ut totæ in principiis illorum temporum. Quod erat secundum.

Quoniam  $AB:NM = NM:TR$  per demonstr. erit etiam  $AB - NM:NM = NM - TR:TR$  ( §. 139. Arithm. ); hoc est,  $AO:NM = NV:TR$ , consequenter  $AO:NV = NM:TR$  ( §. 173. Arithm. ), seu celeritates temporibus æqualibus BM & MR amissæ sunt ut celeritates NM & TR in fine illorum temporum. Quod erat tertium.

Ultimum quoque ita ostenditur.  
 $AO : NV = AB : NM$  per num. 2. &  
 $AB : NM = NM : TR$  per num. 1. Er-  
 go  $AO : NV = NM : TR$  (§. 167.  
*Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA CXLIV.

684. Si mobile motu equabili per medium fertur, in quo eidem resistitur in ratione celeritatum; spatia singulis temporibus descripta sunt ut celeritates amissæ, & si tempora sumantur equalia, ut celeritates totæ in principio vel in fine illorum temporum.

DEMONSTRATIO.

Si omnia sint ut in Problemate generali (§. 679); erit —  $adv = zdx$ , vi num. II. &  $vdx = ds$ , vi num. III. Est vero  $z = v$  per hypoth. Ergo —  $adv = vdx$  (§. 15. *Arithm.*), consequenter  $ds = —adv$  (§. 87. *Arithm.*). Est igitur  $s = a^2 — av$  (§. 95. *Anal. infinit.*), seu ob constantem  $a$  est  $s$  ut  $a — v$  (§. 181. *Arithm.*). Sed  $a — v$  est celeritas à mobili tempore  $x$  amissæ. Quamobrem spatia sunt ut celeritates amissæ. *Quod erat unum.*

Quodsi tempora sumantur equalia, celeritates amissæ sunt ut totæ in principio, vel fine illorum temporum (§. 683). Sunt vero etiam ut celeritates amissæ istis temporibus, ita spatia movendo iisdem confecta per demonstrata. Ergo eadem spatia sunt ut celeritates in principio vel etiam in fine illorum temporum (§. 167. *Arithm.*), *Q. e. d.*

THEOREMA CXLV.

685. Si mobili motu equabili lato in ratione celeritatum resistitur, & tempora sumantur equalia seu in progressionem Arithmetica, erunt celeritates in instanti seu tempusculo infinite parvo amissæ ut celeritates in fine illorum temporum.

DEMONSTRATIO.

Curva enim resistentiæ Logarithmica est, cujus asymptotus tempora, semiordinatæ ad eandem relatæ celeritates in fine illorum temporum representant (§. 681). Quare si tempora sint  $x$  &  $t$ , semiordinatæ ipsis respondententes  $y$  &  $z$ ; erit  $\frac{ydx}{dy} = \frac{zdt}{dz}$  (§. 54. *Anal. infinit.*), consequenter cum tempora sumantur in progressionem arithmetica per hypoth. sitque adeo  $dx = dt$  (§. 333. *Arithm.*)  $y : dy = z : dz$ . Est itaque  $y : z = dy : dz$  (§. 173. *Arithm.*), hoc est, celeritates in fine temporum istorum  $y$  &  $z$  sunt ut celeritates in instanti inde amissæ  $dy$  &  $dz$ . *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

686. Quoniam in curva resistentiæ Tab. instantaneæ ESI abscissa EP est ut ten. XVII. pus, semiordinata PS ut celeritas in instanti amissæ (§. 682); PS vero est celeritas in fine temporis EP mobili residua (Fig. 170, §. 685) & in curva resistentiæ totalis abscissis, tanquam temporibus, respondent semiordinatæ, tanquam celeritates istis amissæ (§. 682); curva resistentiæ totalis eadem quæ curva resistentiæ instantaneæ, si mobili motu æquabili lato resistitur in ratione velocitatum.

## THEOREMA CXLVI.

687. Si mobili motu æquabili lato resistitur in medio, per quod fertur, in ratione celeritatum; spatia adhuc percurrenda sunt celeritatibus residuis proportionalia.

## DEMONSTRATIO.

Est enim ut spatium integrum percurrendum ad spatium aliud percurrendum, ita celeritas, quam initio motus habet mobile ad celeritatem residuam (§. 684). Quamobrem spatium quodlibet adhuc percurrendum est ad integrum ut celeritas residua, qua percurrendum, ad celeritatem initialem, seu quam in principio habet mobile (§. 193. *Arithm.*): quod cum de omni spatio percurrendo verum sit; erit spatium percurrendum unum ad aliud quodcumque ut celeritas residua, qua illud percurrendum, ad celeritatem residuam, qua hoc percurrendum (§. 195. *Arith.*), hoc est, spatia adhuc percurrenda sunt celeritatibus residuis, quibus percurrenda, proportionalia (§. 155. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

Tab. XVII. 688. Si ergo celeritas initialis AB exponatur per spatium integrum percurrendum, cum spatia percursa sint AO, AQ &c. (§. 684). erunt percurrenda OB, QB &c. seu applicatæ NM & TR ad asymptotum BF Logisticae ANG.

## THEOREMA CXLVII.

689. Si mobili motu æquabili lato à medio resistitur in ratione celeritatum, & spatia adhuc percurrenda sint ut numeri,

erunt tempora insumta percursis ut illorum Logarithmi.

## DEMONSTRATIO.

Spatia enim adhuc percurrenda sunt ut semiordinatæ Logisticae NM, TR &c. applicatæ ad tempora insumta BM, BR, spatiis jam percursis AO, AQ (§. 688). Enimvero si in Logistica NM, TR sumuntur ut numeri, abscissæ BM, BR sunt ut eorum Logarithmi (§. 553. *Anal.*). Ergo si spatia percurrenda sunt ut numeri, tempora sunt eorum Logarithmi. *Q. e. d.*

## THEOREMA CLXVIII.

690. Si mobile æquabili motu incedit in medio, quod in ratione velocitatum eidem resistit, celeritas non nisi tempore infinito extinguitur & spatium percurrendum integrum AB nunquam absolvit, etsi semper accedat ad limitem.

## DEMONSTRATIO.

Celeritates enim continuo decrescentes sunt ut semiordinatæ Logarithmicæ ad asymptotum BF applicatæ & asymptotus tempus exhibet (§. 681). Quare cum AB celeritatem integram repræsentet, quam mobile in principio motus habet; ea prorsus extingui nequit, nisi punctis G & F coincidentibus, seu Logistica ANG cum asymptoto BF concurrente; quod cum fieri non possit nisi infinito intervallo (§. 655. *Anal. infn.*); celeritas quoque nullo tempore finito extingui potest. *Quod erat primum.*

Jam cum celeritate, quam in principio motus habet mobile, non prorsus extincta



extincta terminum B attingere non possit, nullo quoque tempore finito eundem attingere valet, adeoque spatium percurrendum integrum AB nunquam absolvit. *Quod erat secundum.*

Quia tamen motus indefinenter continuatur, adeoque spatium celeritatibus amissis descriptum continuo crescit; mobile ad terminum suum B continuo propius accedit. *Quod erat tertium.*

SCHOLIION.

691. Nemo objiciat propositionem præsentem experientiæ repugnare: neque enim hypothesis resistentiæ in ratione velocitatum naturæ rerum conformis, quemadmodum suspicatus fuit WALLISIUS. Et si vel maxime hypothesis naturæ prope ad eam accederet, ex naturæ consuetudine motus in praxi tandem insensibilis fieri deberet, quemadmodum à LEIBNITIO (a) jam annotatum est.

THEOREMA CXLIX.

692. Si intra asymptotos rectangulas AB & BK describatur Hyperbola FLS, &, motus initio, celeritas exponatur per rectam AB, elapso aliquo tempore vero per rectam OB; tempus per aream AFLO & spatium eo tempore descriptum per rectam AO exprimi potest.

DEMONSTRATIO.

Si enim BQ & BO fuerint celeritates in fine temporum BM & BR restantes; dicaturque BQ = y, BO = z; erit  $y : z = dy : dz$  (§. 685). consequenter  $y : dy = z : dz$  (§. 173. Arithm.). Sunt vero  $\frac{dy}{y}$  &  $\frac{dz}{z}$  elementa spatii Hy-

(a) In Actis Erudit. An. 1689. p. 41.

perbolici asymptotici (§. 120. *Anal. infin.*). Quamobrem elementa ista æqualia sunt, si eorum altitudines, quæ sunt abscissarum in asymptoto BA sumatarum differentialia, fuerint ut celeritates in instanti amissæ. Quodsi ergo ab initio motus usque ad plenariam extinctionem sumantur continuo AO, AQ ut celeritates extinctæ; Spatium Hyperbolicum asymptoticum resolvitur in elementa inter se æqualia. Atque adeo area FAOL successiva elementorum æqualium additione gignitur, quemadmodum abscissa AP continua accessione elementorum æqualium resultat. Enimvero abscissa AP exponitur tempus, quo celeritas PN sive AO amittitur per hypoth. Ergo etiam spatium Hyperbolicum AFLO tempus designare debet, quo celeritas AO amittitur. *Quod erat unum.*

Jam rectæ AO & AQ sunt ut celeritates temporibus BM & BR amissæ per hypoth. Sunt vero spatia temporibus BM & BR movendo confecta ut celeritates iisdem temporibus extinctæ (§. 684). Ergo spatia temporibus BM & BR seu, quod perinde est per demonstrata, temporibus AFLO & AFHQ confecta sunt ut rectæ AO & AQ. *Quod erat alterum.*

THEOREMA CL.

693. Si motui aquabili in medio resistitur in ratione celeritatum, decrementa celeritatum sunt incrementis spatiorum proportionalia.

## DEMONSTRATIO.

Spacia enim & celeritates amissæ eodem tempore per eandem rectam exponuntur (§. 692). Ergo etiam incrementa illorum, & harum decremента eodem tempore per eandem rectam exponi debent. Quoniam itaque tempore eodem incrementa spatiorum & decremента celeritatum iisdem rectis proportionalia sunt; spatiorum quoque incrementa celeritatum decremента proportionalia sunt (§. 167. *Arithm.*) Q. e. d.

## SCHOLIUM I.

694. WALLISIUS, qui primus de resistentia aëris in motu corporum determinanda cogitavit (a) & resistentiam in ratione celeritatum fieri supposuit; rationem celeritatis  $a$ , quæ initio motus est, ad residuam uno momento seu tempusculo infinite parvo elapso sumit ut  $m$  ad 1. Celeritas igitur residua est  $\frac{a}{m}$ .

Jam cum celeritates residuæ in progressionem Geometricam decrescant (§. 685), per hanc seriem exhibentur celeritates ab initio motus usque ad

ejus extinctionem  $a, \frac{a}{m}, \frac{a}{m^2}, \frac{a}{m^3}, \frac{a}{m^4}, \&c.$

in infinitum, donec scilicet quod restat est respectu ipsius  $a$  infinite parvum, adeoque nullum. Summa igitur celeritatum

$a \mp \frac{a}{m} \mp \frac{a}{m^2} \mp \frac{a}{m^3} \mp \frac{a}{m^4} \mp \frac{a}{m^5} \&c.$

in infinitum ob terminum ultimum contemtilis parvitatatis  $= \frac{a}{m-1} \mp a$  (§. 120. *Anal. fin.*)

$= \frac{a \mp ma - a}{m-1} = \frac{ma}{m-1}$ . Jam vero singulis

celeritatibus tempusculis aequalibus describuntur singula spatiosa, quæ cum sint ut celeritates, spatium integrum, celeritate prorsus ex-

(a) In Algebra c. 101. f. 438. Vol. 2. Oper.

tinctæ, erit  $\frac{ma}{m-1}$ , seu, si  $a = 1$ ,  $\frac{m}{m-1}$ ; quemadmodum idem determinat WALLISIUS.

## SCHOLIUM II.

695. NEWTONUS (b) cum deprehenderet hypotbesin resistentiæ in ratione celeritatis magis Mathematicam esse, quam naturalem & naturæ magis conformem censens alteram de resistentia in duplicata ratione celeritatum, motus corporum ex hac lege resistentiæ oriundos considerare cepit. Nostrum igitur est ut eisdem hic more nostro explicemus. Ex superioribus enim formulis generalibus deducuntur, quæ de eodem notanda veniunt, prouti ex sequentibus patet.

## THEOREMA CLI.

696. Si corpus motu æquabili per medium simile fertur, ipsique resistitur in velocitatis ratione duplicata, curva resistentiæ totalis est Hyperbola æquilatera ANG intra asymptotos HK & KF, puncto B, in quo celeritas initialis AB applicatur, à centro K intervallo rectæ AB, quæ celeritatem initialem exponit, distante.

Tab.  
XV.  
Fig.  
17)

## DEMONSTRATIO.

Si celeritas initialis  $AB = a$ , celeritas amissa  $= v$ , tempus quo amittitur  $= x$ , decrementum celeritatis instantaneum ut  $z$ ; erit  $adv = zdx$  (vi num. II. §. 679). Est vero decrementum celeritatis instantaneum in ratione duplicata celeritatis extinctæ per hypot. adeoque servata lege homogeneorum  $z = \frac{v^2}{a}$ .

Quamobrem

$$adv = \frac{v^2 dx}{a}$$

$$\frac{dv}{v^2} = \frac{dx}{a^2}$$

hoc

(b) In Princ. Lib. 2. Prop. 5. & seqq. p. m. 239.

hoc est,  $\frac{-v^{-2} dv}{v^{-1}} = dx : a^2$

Sive, si quantitas constans in integratione adjiciatur,  $\frac{1}{v} + b = \frac{x}{a^2}$ .

Fiat  $x = 0$ : erit  $v = a$ , quia ibidem applicata recta AB exprimit celeritatem initialem, adeoque

$$\frac{1}{a} + b = 0$$

$$b = -\frac{1}{a}$$

Ergo  $\frac{1}{v} - \frac{1}{a} = \frac{x}{a^2}$   
 $a^2 - av = vx$   
 $a^2 = vx + av$

Curva igitur resistentiæ totalis ANG est Hyperbola æquilatera intra asymptotos HK & KF, latere potentiæ Hyperbolæ existente linea recta, quæ celeritatem exponit, & applicata AB, quæ eandem exponit sui intervallo à centro K remota (§. 490. Anal. fin.).

COROLLARIUM.

697. Quoniam tempus repræsentatur per asymptotum BF, celeritates residuæ per semiordinatas NM, Hyperbola vero cum asymptoto ANG non concurrit (§. 481. Anal. fin.); celeritas, qua fertur mobile, integra nonnisi infinito tempore per resistentiam medii extinguitur, seu mobile nunquam motu suo prorsus privatur.

THEOREMA CLII.

698. Si mobili motu æquabili lato resistitur à medio in ratione duplicata celeritatis, celeritas residua erit ad extinctam in ea ratione, quam habet latus

potentiæ Hyperbolæ KB ad partem asymptoti BM exponentem tempus, quo celeritas extincta fuit.

DEMONSTRATIO.

Si enim potentiæ Hyperbolæ latus KB = BA = a, recta tempus exponens BM = x, celeritas residua MN = v, adeoque extincta PN = a - v; erit  $a^2 - av = vx$  (§. 696). Est igitur  $a : x = v : a - v$  (§. 299. Arithm.), hoc est, AB : BM = MN : NP, seu celeritas residua est ad extinctam, ut latus potentiæ Hyperbolæ ad partem asymptoti tempus exponentem, quo celeritas extincta fuit. Q. e. d.

THEOREMA CLIII.

699. Si mobili motu æquabili lato resistitur à medio in ratione duplicata celeritatis, spatium dato tempore est ut Logarithmus rationis, quam habet celeritas initialis ad residuam tempore isto elapso.

DEMONSTRATIO.

Si enim spatium sit s, reliqua sint ut ante; erit  $v dx = ds$  (§. 679). Est vero in hypothesis propositionis  $\frac{a^2 dv}{v^2} = dx$  (§. 696), adeoque  $v dx = -a^2 dv : v$ ; consequenter  $ds = -a^2 dv : v$ . Sed  $-a dv : v$  est differentiale Logarithmi fractionis  $a : v$  (§. 243. Analys. infn.). Quamobrem  $s = al(a : v)$ , hoc est, ob constantem a, spatium dato percursum tempore est ut  $l(a : v)$ ; seu ut Logarithmus celeritatis initialis a ad residuam v. Q. e. d.

## THEOREMA CLIV.

Tab. XVII. Fig. 171.  
 700. Si mobili æquabili motu per medium resistens lato resistitur in ratione duplicata celeritatum, tempore, quod per partem asymptoti  $BM$  Hyperbolæ  $ANG$  exponitur, confectum spatium representatur per spatium Hyperbolicum asymptoticum  $ABMN$  inter celeritatem initialem  $AB$  & residuam  $NM$  interceptum.

## DEMONSTRATIO.

Si enim tempus  $BM = x$  & celeritas restans  $MN = v$ ; erit  $v dx$  elementum areæ  $ABMN$  (§. 97. *Analys. infin.*). Sed si spatium tempore  $BM$  descriptum  $= s$ ; erit  $ds = v dx$  (§. 679). Ergo  $s = \int v dx = ABMN$ . Spatium igitur Hyperbolicum tempori, quod per  $BM$  exprimitur, respondens  $ABMN$ , exprimit spatium à mobili tempore isto confectum. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM

701. Quoniam spatia motu æquabili dato tempore confecta sunt in ratione composita temporum ac celeritatum (§. 34); mobile celeritate initiali  $AB$  tempore  $BM$  percurreret spatium, quod est ut  $BM \cdot AB$  (§. 159. *Arithm.*); consequenter spatium istud exponit rectangulum  $ABMP$  (§. 376. *Geom.*). Quare cum motu resistentis in duplicata celeritatum ratione impedito, tempore  $BM$ , conficiatur spatium per spatium Hyperbolicum asymptoticum  $ABMN$  exprimentum (§. 700); erit spatium celeritate in ratione duplicata celeritatis continuo impedita descriptum, ad spatium quod eodem tempore in medio non resistente describeret mobile; ut spatium hyperbolicum asymptoticum  $ABMN$ , ad rectangulum  $ABMP$ .

## THEOREMA CLV.

702. Si motus æquabilis impeditur resistentis, que sunt in ratione duplicata celeritatum; decremента celeritatum instantanea sunt in ratione composita ex celeritate residua & incremento momentaneo spatii percurfi.

## DEMONSTRATIO.

Constat ex demonstratione Theorematis 151. (§. 696), esse —  $adv = v^2 dx : a$ . Est igitur —  $dv$  ut  $v^2 dx$  propter constantem  $a^2$  (§. 181. *Arithm.*). Enimvero  $v^2 dx = v \cdot v dx$  &  $v$  designat celeritatem residuam,  $v dx = ds$  (§. 679) incrementum momentaneum spatii in medio resistente percursum. Ergo in hypothesi Theorematis decremента momentanea velocitatis  $= -dv$  sunt in ratione composita celeritatum residuarum & incrementorum momentaneorum spatii percurfi. *Q. e. d.*

## THEOREMA CLVI.

703. Si recta  $AB$  celeritatem initialem mobilis exponit, cui in medio, per quod æquabiliter movetur, in ratione duplicata celeritatum resistitur, & erectis perpendicularibus  $AC$  &  $BF$  describantur due Logarithmica  $ANG$  &  $BOR$ , quarum communis est subtangens  $AB$ , altera vero  $BOR$  ad asymptotum  $AC$ , altera  $ANG$  ad asymptotum  $BF$  relata; ducta  $PO$  ipsi  $AB$  parallela, exponet  $MO$  tempus,  $PN$  celeritatem isto tempore amissam &  $NM$  celeritatem in fine illius temporis adhuc residuam.

DEMONSTRATIO.

Si enim subtangens communis AB = a, tempus = x, celeritas in fine ejusdem residua = v; erit

$$a^2 = vx + av \quad (\S. 696)$$

$$0 = vdx + xdv + adv$$

$$-adv - xdv = vdx$$

$$\frac{dv}{v} = \frac{dx}{a+x}$$

Sunt adeo  $\frac{dv}{v}$  &  $\frac{dx}{a+x}$  duo Logarithmi æquales (§. 243. *Analys. infin.*). Quare si fit BM = y & NM

= v; erit  $\frac{dy}{a} = -\frac{dv}{v}$ , adcoque

ANG Logarithmica ad asymptorum BF relata, cujus subtangens a = AB.

Et quia etiam  $\frac{dy}{a} = \frac{dx}{a+x}$  (§. 87. *Arithm.*)

erit itidem BOR Logarithmica ad asymptotum AC relata, cujus itidem subtangens AB (§. 54. *Anal. infin.*).

Quoniam vero AB exponit celeritatem initialem, tempus = x, celeritas residua = v, *vi denominationis*; recta MO = x tempus, NM = v celeritatem in fine ejus residuam & PN celeritatem tempore MO amissam exponit. *Q. e. d.*

THEOREMA CLVII.

704. Si tempus BM resolvitur in tempuscula, quæ sunt in progressione Geometrica, spatiola istis tempusculis descripta equalia sunt & velocitates residua sunt in eadem ratione decrescente, in qua tempora crescunt quantitate quadam constante aucta.

DEMONSTRATIO.

Si enim tempus exponitur per partem BM asymptoti KF Hyperbolæ æquilateræ ANG; spatium Hyperbolicum ABMN exponit spatium à mobili tempore BM in medio resistente descriptum (§. 700). Enimvero ostendimus in superioribus (§. 692), si BM resolvitur in particulas, quæ sunt in progressione Geometrica, aream ABMN resolvi in spatiola seu elementa inter se equalia. Spatiola igitur tempusculis in ratione Geometrica progredientibus descripta sunt inter se equalia. *Quod erat unum.*

Si AB exprimat celeritatem initialem & duæ fuerint Logisticae ANG & BOR ad asymptotos BF & AC relatae; MO tempus denotat, & MN celeritatem in fine istius residuam (§. 703). Sumantur jam in asymptotis abscissæ BM vel AP in progressione Arithmetica, erunt NM & PO in progressione Geometrica & quidem semiordinatæ NM in decrescente, semiordinatæ vero PO in crescente (§. 552. *Anal. fin.*). Patet igitur, temporibus quantitate constante AB (= PM) auctis in ratione Geometrica crescentibus, celeritates residuas NM in ratione Geometrica de- crescere. *Quod erat alterum.*

Tab. XVII. Fig. 172.

COROLIARIUM.

705. Quoniam spatia dato tempore descripta sunt ut Logarithmi negativi celeritatum in fine illorum temporum residuarum (§. 699.): si celeritates residuæ sumantur ut numeri, spatia sunt ut eorum Logarithmi & tempora etiam sunt ut numeri (§. 704).

COROL.

COROLLARIUM II.

706. Quare cum AP vel BM sit ut Logarithmus MN vel PO; erit BM vel AP ut spatium tempore MO celeritate PN, utpote extincta tempore MO (§. 705), descriptum (§. 453. Anal. fin.)

SCHOLION.

707. Eadem methodo ad alias Hypotheses resistentiæ applicari poterant formulæ generales. Sed cum istiusmodi Hypotheses magis Geometricæ, quam naturales sint, plura in præsentem non addimus ad resistentias in motu gravium explicandas progressuri in duabus Hypothesibus anterioribus. Supponimus autem motum gravium æquabiliter acceleratum in Hypothesi GALILÆANA, utpote experimentis in iis à centro Telluris distantius consentiente, in quibus ea capere licet.

PROBLEMA CXVII.

Tab. XVIII. 708. Invenire curvam resistentiæ, celeritatem residuam & spatium dato Fig. tempore descriptum in motu gravium seu 173. æquabiliter accelerato.

RESOLUTIO.

Exponat recta AC tempus. Fiat AP = PM; exponet PM celeritatem tempore AP à mobili acquisitam (§. 68) & AMF erit linea recta, ac APM triangulem æquicrurum. Sit PN celeritas extincta tempore AP per resistentiam & MN celeritas in fine illius temporis residua; erit ANG curva resistentiæ totalis. Ducatur pm ipsi PM infinite propinqua & demissa perpendiculari NR; erit nR particula celeritatis tempusculo Pp extincta. Fiat PS ut nR; erit ESI curva resistentiæ instantaneæ (§. 682). Denique fiat QP = NM; erit AQH curva celeritatum residuarum.

Sit jam AP = PM = x, NM = PQ = v, PS = z, PN = r; erit

$$\frac{v = x - r}{r = x - v}$$

I.  $dr = dx - dv$   
Porro ut supra (§. 679).

$$\frac{dr}{z} = \frac{dx}{a}$$

Unde  $\frac{dx - dv}{z} = \frac{dx}{a}$

II.  $adx - adv = zdx$   
quæ est æquatio ad curvam resistentiæ instantaneæ ESI.

Tandem si s spatium tempore x confectum denotet, erit ut supra (§. 679).

III.  $vdx = ds.$

SCHOLION.

709. Ex formulis hisce generalibus perinde ac supra deducuntur quæ de motu gravium in medio resistente à NEWTONO, HUGENIO & LEIBNITIO inventa sunt, quemadmodum ex sequentibus intelligitur.

THEOREMA CLVIII.

710 Si gravi descendenti resistitur in ratione celeritatum, curva celeritatum residuarum AQH est Logarithmi a, Fig. cuius asymptotus BF tempus exponit, 17 semiordinate vero OQ ad asymptotum relate sunt differentie inter celeritates residuas PQ & subtangentem AB.

DEMONSTRATIO.

Si AP = x, PQ = v, AB = a; erit  $adx - adv = zdx$  (§. 708).

Est

Est vero  $z = v$  per *hypoth.*

Ergo  $adx - adv = vdx$

$$\frac{adx - vdx = adv}{dx = \frac{adv}{a-v}}$$

$$dx = \frac{adv}{a-v}$$

Quæ est æquatio ad curvam AQH.

Fiat  $a - v = y$

erit  $a - y = v$

$dy = dv$

$$\frac{ady}{y} = \frac{adv}{a-v} = dx$$

Quæ est æquatio ad Logarithmicam, cujus subtangens =  $a$  (§. 54. *Anal. infin.*).

Sit itaque  $AB = a$ ,  $AP = BO = x$ ; erit  $Oo = Pp = dx$ . Quoniam  $PQ = v$ ; erit  $QO = a - v = y$ , adeoque  $QL = dy$ . Quodsi ergo sumpta  $AB$  pro subtangente describatur Logarithmica, cujus asymptotus  $BF$ ; erit

$$dx = \frac{ady}{y} \text{ æquatio ad eandem. Est}$$

igitur curva celeritatum residuarum in fine singulorum temporum AQH Logarithmica, cujus asymptotus  $BF$ , semiordinatæ vero sunt differentiæ inter lineas, quæ celeritates in fine singulorum temporum residuas exponunt atque rectam quandam constantem  $AB$ , cui subtangens æqualis est (§. 54. *Anal. infin.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

711. Quodsi fiat  $PM = AP$  &  $MN = PQ$ ; erit  $PN$  celeritas per resistantiam amissa tempore  $AP$ , consequenter  $ANG$  curva resistantiæ totalis (§. 682). Data igitur  
*Vulsi Oper. Mathem. Tom. II.*

curva celeritatum residuarum in fine singulorum temporum, datur curva resistantiæ totalis  $ANG$ .

THEOREMA CLIX.

712. Si gravi descendenti resistitur in ratione celeritatum, spatia movendo confecta sunt ut celeritates extinctæ.

DEMONSTRATIO.

Si omnia fuerint ut in Theoremate precedente, erit  $vdx = adx - adv$  (§. 708). Est vero  $vdx = ds$  (§. cit.). Ergo  $ds = adx - adv$ , consequenter  $s = ax - av$ . Est igitur propter constantem  $a$  spatium movendo confectum ut  $x - v$  (§. 181. *Arithm.*) Quoniam  $PM = x$ ,  $MN = v$ ;  $PM$  vero est celeritas cadendo tempore  $AP$  acquisita &  $MN$  celeritas in fine temporis in medio resistente residua, erit  $PN = x - v$  celeritas tempore  $AP$  extincta. Sunt igitur spatia movendo confecta ut celeritates extinctæ. *Q. e. d.*

COROLLARIUM

713. Quoniam  $PM$  exprimens celeritatem in medio non resistente à gravi acquisitam est ut tempus  $AP$  (§. 68).  $PN$  vero denotans celeritatem extinctam ut spatium movendo confectum (§. 712); igitur dantur lineæ temporibus insumptis proportionales, à quibus spatia movendo in medio resistente confecta si subtrahantur relinquunt rectas  $NM$  celeritati in medio resistente à gravi acquisitæ proportionales.

THEOREMA CLX.

714. Si complementa celeritatum à Tab. gravi in medio resistente in ratione celeritatum cadendo acquisitarum ad celeritatem maximam, quam corpus cadendo acquirere valet, sumantur ut numeri, erunt tempora insumpta ut eorum Logarithmi. XVIII. Fig. 174.

## DEMONSTRATIO.

Tab. XVIII. Si BF exponit tempus, curva AQH celeritatum residuarum est Logarithmica; cujus asymptotus BF, subtangens AB (§. 710). Quoniam Logistica AQH cum asymptoto BF non concurrat nisi infinito intervallo (§. 553. *Anal. fin.*); AB est celeritas, quam in medio resistente infinito tempore grave cadendo acquirere potest, adeoque absolute maxima. Est itaque QO celeritatis tempore AP in medio resistente acquisitæ complementum ad maximam. Quamobrem si complementa celeritatum acquisitarum ad maximam sunt ut numeri; erunt tempora insumta quæ per AP, sive BO denotantur, ut ipsorum Logarithmi (§. 550. *Anal. fin.*) *Q. e. d.*

## THEOREMA CLXI.

Tab. XVIII. 715. Si grave in medio cadit quod in ratione celeritatum descensui ejus resistit; celeritatem absolute maximam nunquam acquirit.

## DEMONSTRATIO.

Est enim curva celeritatum residuarum in medio resistente, seu acquisitarum, si medium in ratione celeritatum resistit, AQH Logarithmica, cujus asymptotus BF. (§. 710). Quoniam celeritates acquisitæ sunt semiordinatæ QP ad axem AK applicatæ; celeritas maxima representatur per semiordinatam, quæ respondet puncto, in quo curva AQH asymptotum BF fecat. Quare cum id fiat infinito intervallo (§. 553. *Anal. fin.*), seu

quando AK infinita evadit; tempus infinitum requiritur ut grave cadendo celeritatem absolute maximam acquirat. Eam igitur nunquam acquirit. *Q. e. d.*

## THEOREMA CLXII.

716. Si grave descendit per medium in ratione velocitatum resistens, celeritatum temporibus in progressionem Arithmetica auctis, cadendo acquisitarum à maxima quam per idem cadendo acquirere potest, differentia in progressionem Geometrica decrescunt.

## DEMONSTRATIO.

Constat enim ex antecedentibus, si AQH sit Logarithmica, cujus asymptotus BF & AK eidem parallela; esse QP celeritatem tempore AP vel BO cadendo acquisitam (§. 710) & BA celeritatem maximam, quam corpus per medium in ratione celeritatum resistens cadendo acquirere valet (§. 714). Sunt igitur abscissæ BO, BR ut tempora, semiordinatæ ipsis respondentibus OQ & RV ut celeritatum QP & VT istis temporibus acquisitarum differentia à maxima, seu ut earundem complementa ad maximam. Enimvero si in Logarithmica abscissæ crescunt in progressionem Arithmetica, semiordinatæ in Geometrica decrescunt (§. 552. *Anal. fin.*). Ergo si grave per medium in ratione velocitatum resistens cadit & tempora in progressionem Arithmetica crescunt, celeritatum temporibus istis acquisitarum differentia à maxima in Geometrica decrescunt. *Q. e. d.*



THEOREMA CLXIII.

717. Si gravi per medium descendentem resistatur in ratione celeritatum & axis AK tempora descensus representet, ANG sit Curva resistentiæ totalis, AQH vero Curva celeritatum acquisitarum, & circa axem AD ad AK normalem describatur Parabola AIC cujus parameter est ut dupla celeritas maxima, quam corpus cadendo acquirere valet; spatium in medio resistente confectum est ad spatium eodem tempore in vacuo conficiendum in ratione PN ad PI, seu ut semiordinata Curvæ resistentiæ totalis ad semiordinatam Parabolæ externæ ad eundem axem relata.

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim spatium, in medio resistente in ratione celeritatum, movendo confectum est tempore  $AP = x$  ut  $ax - av$  (§. 712), spatium vero eodem tempore in vacuo conficiendum ut  $\frac{1}{2} x^2$  (§. 80); erit istud ad hoc ut  $ax - av$  ad  $\frac{1}{2} x^2$ , consequenter ut  $x - v$  ad  $x^2 : 2a$  (§. 181. Arithm.). Jam cum ANG sit curva resistentiæ totalis per hypoth. erit  $PN = x - v$  (§. 712) & quia AQH est curva celeritatum temporibus  $x$  acquisitarum per hypoth. celeritas maxima, quam corpus cadendo acquirere potest, est ut recta  $AB = a$  (§. 715). Enimvero si circa axem AD parametro  $2a$ , quæ est ut dupla celeritas maxima à gravi acquisitu possibilis, describatur Parabola AIC, cum sit  $QI = AP = x$ ; erit  $AQ = PI = x^2 : 2a$  (§. 398. Anal. fin.). Est igitur spa-

tium movendo in medio resistente confectum, ad spatium eodem tempore in medio non resistente conficiendum, ut PN ad PI. Q. e. d.

THEOREMA CLXIV.

718. Spatium à gravi per medium in ratione velocitatum resistens descende confectum tempore infinito infinitum est; celeritas vero tempore isto acquisita finita est.

Tab. XVIII. Fig. 174.

DEMONSTRATIO.

Iisdem enim positis, quæ in antecedentibus, spatium movendo confectum tempore AP est ut semiordinata PN. Quare cum crescente AP crescat etiam PN; ubi AP fit infinita, etiam applicata ad AP infinita evadere debet, consequenter tempore infinito percursum spatium infinitum est. Quod erat unum.

Jam celeritas absolute maxima, quam corpus in medio resistente cadendo acquirere potest, exponitur per subtangentem Logisticæ AQH ipsi AB æqualem, adeoque per lineam finitam, consequenter & ipsa finita est. Celeritas igitur tempore infinito acquisita finita est. Quod erat alterum.

THEOREMA CLXV.

719. Si intra asymptotos CB & BA rectangulas describatur Hyperbola æquilatera & recta AB vel rectangulum ABNE exponat celeritatem maximam, quam corpus per medium in ratione celeritatum resistens acquirere valet; area AILE exponet tempus, rectangulum

Tab. XVIII. Fig. 175.

AIKE celeritatem cadendo acquisitam & EKL spatium tempore isto confectum.

DEMONSTRATIO.

Sit  $AB = a$  seu ut celeritas maxima, quam corpus acquirere valet,  $AI = v$ , seu ut celeritas tempore  $x$  acquisita, &  $AE = b$ ; erit ob constantem  $b$ ,  $ab : bv = a : v$  (§. 178. *Arithm.*) adeoque etiam rectangulum ABNE exponet celeritatem maximam, quam corpus cadendo in medio resistente acquirere valet & AIKE exponet celeritatem dato tempore  $x$  acquisitam. *Quod erat primum.*

Quoniam medium resistit in ratione celeritatum; erit  $dx = \frac{adv}{a-v}$  (§. 710), adeoque  $b dx = \frac{abd v}{a-v}$  Quoniam  $AB = a$ ,  $AI = v$ ; erit  $BI = a - v$ . Est vero in Hyperbola BA.AE = BI.IL (§. 486. *Anal. fin.*), adeoque  $(a-v).IL = ab$ , consequenter  $IL = ab : (a-v)$ . Est igitur  $abd v : (a-v)$  elementum areæ AILE. Quamobrem  $bx$  æquatur areæ AILE, & hinc  $x$  seu  $AP = AILE : AE$ . Ob constantem itaque AE tempus  $x$  est ut spatium Hyperbolicum asymptoticum AILE (§. 178 *Arithm.*). *Quod erat secundum.*

Jam si tempus  $x$  exponatur per rectam AP & celeritas eodem acquisita  $v$  per rectam AI, spatium cadendo confectum est ut  $x-v$  (§. 712). Quare si tempus exponitur per spatium Hyperbolicum AILE & celeritas isto tempore acquisita per rectangulum AIKE; spatium descensus exponitur per eorum differentiam, adeoque per trilineum Hyperbolicum EKL. *Quod erat tertium.*

COROLLARIUM I.

720. Quoniam celeritas per resistantiam mediæ in ratione celeritatis extincta est; ut spatium dato tempore cadendo confectum (§. 712), spatium vero hoc est ut trilineum hyperbolicum EKL (§. 719); erit etiam celeritas tempore AILE extincta ut trilineum KLE.

COROLLARIUM II.

721. Et quia rectangulum AIKE celeritatem cadendo tempore AILE acquisitam exponit (§. 719); celeritas acquisita est ad celeritatem extinctam ut rectangulum AIKE ad trilineum hyperbolicum EKL.

THEOREMA CLXVI.

722. Si recta dimidia AB sit subtangens & AC asymptotus Logarithmica BOI, ductaque BF ipsi AC parallela, fiat ut semiordinata Logarithmica OP aucta dupla subtangente AB ad OK semiordinatam, ita abscissa AP ad quartam proportionalem PQ; erit punctum Q in curva celeritatum residuarum AQH, seu abscissa AP tempus, semiordinata PQ celeritatem hoc tempore cadendo à gravi acquisitam exponet, siquidem eadem resistitur in ratione celeritatum duplicata.

Ta  
X'  
Fi  
i

DEMONSTRATIO.

Sit  $AB = a$ ,  $AP = x$ ,  $PQ = v$ ; erit  $adx - adv = z dx$  (§. 708). Est vero  $z = v^2 : a$ , per hypoth. observata scilicet lege homogeneorum. Ergo

$$\begin{aligned}
 adx - adv &= \frac{v^2 dx}{a} \\
 \frac{a^2 dx - a^2 dv}{a} &= \frac{v^2 dx}{a} \\
 a^2 dx - v^2 dx &= a^2 dv \\
 dx &= \frac{a^2 dv}{a^2 - v^2}
 \end{aligned}$$

Fiat

Fiat  $v = \frac{ay - a^2}{y + a}$

$$dv = \frac{aydy + a^2dy - aydy + a^2dy}{(y+a)^2} = \frac{2a^2dy}{(y+a)^2}$$

$$\& v^2 = \frac{a^2y^2 - 2a^3y + a^4}{y^2 + 2ay + a^2}$$

adeoque  $a^2 - v^2 = a^2 - \frac{a^2y^2 - 2a^3y + a^4}{y^2 + 2ay + a^2}$

$$\frac{y^2 + 2a^3y + a^4 - a^2y^2 + 2a^3y - a^4}{(y+a)^2} = \frac{4a^3y}{(y+a)^2}$$

Ergo  $\frac{a^2dv}{a^2 - v^2} = \frac{2a^3dy(y+a)^2}{4a^3y(y+a)^2} = \frac{\frac{1}{2}ady}{y}$

Habemus itaque  $dx = \frac{1}{2}ady : y$ , quæ est æquatio ad Logarithmicam, cujus subtangens  $\frac{1}{2}a$ .

Sit itaque  $AB = a$ , BF ad AB in puncto B, AC ad eandem rectam in altero extremo A perpendicularis. Describatur Logarithmica BOI, cujus asymptotus AC, subtangens  $= \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}a$ . Si jam sumatur  $AP = x$ , erit  $PO = y$ , adeoque  $OK = y - a$ , consequenter  $dx = \frac{1}{2}ady : y$  (§. 54. Anal. infin.). Jam vero vi calculi  $v = (ay - a^2) : (y + a)$ , adeoque  $y + a : y - a = a : v$ . Est itaque  $PO + AB : OK = AB : PQ$ . Quare cum  $PQ = v$  sit celeritas tempore  $x$  residua; recta AP tempus, PQ celeritatem residuam seu hoc tempore acquisitam exponit, consequenter AQH est curva celeritatum residuarum (§. 682). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

723. Quodsi fiat  $PM = AP$  &  $MN = QP$ ; erit punctum N. in curva resistentiæ totalis ANG. Quoniam enim AP tempus exponit, PM est ut celeritas cadendo in vacuo seu medio non resistente acquisita (§. 68).

Quare cum QP sit ut celeritas in medio resistente tempore AP acquisita (§. 722); si MN ipsi QP æqualis fiat, erit PN ut celeritas resistentia medii extincta tempore AP. Est igitur ANG curva resistentiæ totalis (§. 682).

THEOREMA CLXVII.

724. *Iisdem positis, quæ in propositione præcedente, dupla subtangens AB Logarithmica BOI, cujus ope curva celeritatum residuarum AQH construitur, celeritatem maximam exponit, quam grave, in medio in ratione duplicata celeritatum resistente cadendo, acquirere potest; eam vero grave non acquirit nisi tempore infinito elapso, & recta BF est curvæ celeritatum residuarum AGH asymptotus.* Tab. XVIII. Fig. 176.

DEMONSTRATIO.

Ponamus femiordinatam QP quæ celeritatem in medio resistente tempore AP acquisitam exponit, fieri ipsi AB seu subtangenti Logarithmicæ BOI æqualem; punctum H coincidet cum puncto F, curva nimirum AQH cum recta BF concurrente. Est vero  $PO + AB : OK = AB : PQ$  (§. 822), hoc est,  $OK + 2AB : OK = AB : PQ$ . Quare si PQ ipsi AB æqualis fieri debet, necesse est ut OK æqualis evadat ipsi  $OK + 2AB$ . Enimvero hoc fieri nequit, nisi quando  $2AB$  respectu ipsius OK infinite parva evadit (§. 4. *Analys. infin.*), consequenter quando OK, adeoque etiam BF infinita evadit. Ergo PQ ipsi AB æqualis fieri nequit, nisi quando AC infinita evadit. Curva igitur celeritatum residuarum cum recta BF nonnisi infinito intervallo concurrat, atque

adeo BF est ipsius asymptotus & AB exponit celeritatem maximam, quam corpus in medio resistente acquirere potest, cumque recta tempus repræsentans AP infinita evadat, quando fit  $PQ = AB$ , celeritas maxima non nisi infinito tempore acquiritur. *Q. e. d.*

### COROLLARIUM I.

725. Quoniam  $OK \div 2AB : OK = AB : PQ$  (§. 722); erit  $AB - PQ : PQ = 2AB : OK$  (§. 193. *Arithm.*), hoc est,  $KQ : QP = 2AB : OK$ , seu differentia celeritatis dato tempore acquisitæ à maxima quæ in medio resistente acquiri potest, est ad celeritatem dato tempore acquisitam; ut dupla maxima, quæ acquiri potest, ad semiordinatam OK Logarithmicæ BOI applicatam ad asymptotum BF curvæ celeritatum in medio resistente acquisitarum AQH.

### COROLLARIUM II.

726. Quoniam celeritas maxima à gravi cadente in medio, quod in ratione duplicata celeritatum resistit, non acquiritur, nisi infinito tempore elapso (§. 724.); grave cadens eandem nunquam attingere potest.

### SCHOLION.

727. HUGENIUS celeritatem maximam, quam grave in medio resistente acquirere potest, celeritatem terminalem appellat (a).

### THEOREMA CLXVIII.

728. Si grave descenderet in vacuo seu medio non resistente, tempore finito eam celeritatem acquireret, quam in medio sive in simplici, sive in dupli-

(a) In Discursu de causa gravitatis p. 170.

*cata ratione celeritatum resistente non nisi tempore infinito acquirere potest.*

### DEMONSTRATIO.

Sive enim mobile descendat in medio, quod in ratione celeritatum simplici resistit, sive in medio cadat, quod in illorum duplicata ratione descensum impedit; celeritas maxima, quam cadendo acquirere potest grave, est ut linea quædam data (§. 715. 724), adeoque finita. Quamobrem cum celeritates in vacuo acquisitæ sint ut tempora (§. 68); celeritas terminalis gravium in medio resistente tempore finito acquiritur in non resistente. Enimvero eadem celeritas in medio utroque resistente non acquiritur nisi tempore infinito (§. 715. 726): Ergo in non resistente finito tempore acquiritur, quæ in resistente utroque infinito acquiritur. *Q. e. d.*

### THEOREMA CLXIX.

729. *Spatium in vacuo celeritate terminali AB tempore AP à gravi percursum, est ad spatium eodem tempore percursum in medio sive in simplici, sive in duplicata ratione celeritatum resistente; ut rectangulum ABKP ad aream AQP.*

### DEMONSTRATIO.

Quoniam enim mobile in vacuo celeritate terminali latum motu æquabili movetur per hypob. erit idem in ratione composita celeritatis terminalis AB & temporis AP (§. 34), adeoque ut rectangulum ABKP. Enimvero in omni medio resistente spatium tempore AP per-

percursum est ut area curvæ celeritatum residuarum AQP (§. 708). Est igitur spatium à gravi in medio resistente percursum, sive motus impediatur in ratione celeritatum, sive in ratione earundem duplicata, ad spatium eodem tempore celeritate terminali in vacuo confectum; ut area curvæ celeritatum residuarum AQP ad rectangulum ABKP. *Q. e. d.*

THEOREMA CLXX.

730. Si celeritate terminali tanquam radio describatur quadrans circuli & celeritas in medio, quod in ratione duplicata celeritatum resistit, à gravi cadendo acquisita exponatur per cosinum arcus, spatium in medio isto descriptum erit ut differentia Logarithmorum sinus versi & excessus diametri supra eundem.

DEMONSTRATIO.

Si enim tempus =  $x$ , celeritas in medio resistente acquisita =  $v$ ; erit spatium in eodem percursum  $\int v dx$  (§. 708). Reperimus vero supra (§. 722)  $dx = \frac{a^2 dv}{a^2 - v^2}$ . Ergo  $v dx = \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$ . Sed  $\frac{v dv}{a^2 - v^2} = \frac{\frac{1}{2} a dv + \frac{1}{2} v dv}{(a-v)(a+v)} = \frac{\frac{1}{2} dv}{a-v} - \frac{\frac{1}{2} dv}{a+v}$ . Ergo  $v dx = \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$  per demonstrata =  $\frac{\frac{1}{2} a^2 dv}{a-v} - \frac{\frac{1}{2} a^2 dv}{a+v}$ . Jam  $\int d v : (a - v) = -l(a - v)$  &  $\int d v : (a + v) = l(a + v)$

=  $l(a + v)$  quia quantitate constante  $a$  sumpta pro unitate  $a - v$  exprimit numerum unitate minorem, adeoque Logarithmum habet negativum (§. 351. *Arithm.*). Ergo  $\int v dx = -\frac{1}{2} a^2 l(a - v) - \frac{1}{2} a^2 l(a + v)$ . Sunt ergo spatia in medio resistente tempore  $x$  percurfa ut  $-\frac{1}{2} a^2 l(a - v) - \frac{1}{2} a^2 l(a + v)$ , consequenter ob constantem  $\frac{1}{2} a^2$  ut  $-l(a - v) - l(a + v)$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, ut differentia Logarithmorum quantitatum  $a - v$  &  $a + v$ . Quod si jam celeritate terminali AB describatur quadrans BD ducaturque recta QE ipsi PD parallela; erit AL, sinus arcus ED, seu cosinus arcus BE, =  $v$ , adeoque BL, sinus versus arcus ejusdem BE, =  $a - v$ , consequenter Logarithmus negativus  $a - v$ , Logarithmus sinus versi BL. Jam diameter circuli =  $2a$ . Quare si inde subducas  $a - v$ , relinquetur  $a + v$ . Est igitur  $a + v$  excessus diametri BS supra sinum versum BL, adeoque Logarithmus positivus  $a + v$ , Logarithmus excessus diametri BS supra sinum versum BL. Jam cum  $-l(a - v) - l(a + v)$  sit differentia Logarithmi negativi ipsius BL & positivi LS; spatium à mobili in medio in ratione celeritatum duplicata resistente descriptum, est ut differentia Logarithmorum sinus versi BL & excessus diametri BS supra sinum versum BL, si celeritate terminali describitur Quadrans circuli BED & AL, cosinus arcus BE fiat æqualis rectæ QP, quæ celeritatem tempore AP acquisitam exponit, quo spatium istud confectum est. *Q. e. d.*

Tab. XVIII. Fig. 176.

## COROLLARIUM.

731. Quoniam excessus diametri supra finem versum est hujus complementum ad diametrum, & differentia Logarithmorum sinus versi & excessus ejus supra diametrum est Logarithmus sinus versi per complementum ejus ad diametrum divisi (§. 243. *Arithm.*), consequenter Logarithmus rationis sinus versi ad complementum ejus ad diametrum (§. 128. *Arithm.*); si celeritate terminali sumpta pro sinu toto, cosinus arcuum sint ut celeritates cadendo acquisitæ, erunt Logarithmi rationis sinuum versorum ad eorum complementa ad diametrum, ut spatia temporibus istis descripta, quibus celeritates fuere acquisitæ.

Tab.  
XVIII.  
Fig.  
176.

## THEOREMA CLXXI.

732. Si gravis descensus impeditur in ratione duplicata celeritatum, & celeritate terminali AB describitur quadrans circuli BED, sitque  $ER = AL$  sinus arcus ED ut celeritas in medio resistente cadendo acquisita, erit spatium percursum ut Logarithmus sinus complementi EL.

## DEMONSTRATIO.

Patet ex demonstratione precedentis Theorematis, si spatium sit  $s$ ,  $AL$

$$= ER = v, AB = a, \text{ esse } ds = \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}.$$

Sit  $EL = y$ : erit (§. 377. *Anal. fin.*)

$$y^2 = a^2 - v^2$$

$$2y dy = - 2v dv$$

$$y dy = - v dv$$

$$a^2 y dy = - a^2 v dv$$

$$\frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2} = - \frac{a^2 y dy}{y^2}$$

$$\text{hoc est, } ds = - \frac{a^2 dy}{y}$$

$$s = - a^2 \int \frac{dy}{y} = - a^2 ly$$

Sunt igitur spatia ut  $- a^2 ly$ , seu propter constantem  $a$  (§. 181. *Arithm.*) ut  $- ly$ . Est vero  $- ly$  Logarithmus sinus EL, utpote negativus, quia sinus EL, continuo decrescunt, crescentibus sinibus ER. Quare si velocitates residuæ sumuntur ut sinus arcuum ED, erunt spatia descripta eodem tempore, quo celeritates istæ cadendo acquisitæ, ut Logarithmi cosinum EL, seu sinuum complementorum arcuum ED. *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

733. Quodsi dubites summam differentialis  $- a^2 dy$ :  $y$  esse  $- a^2 ly$ , propterea quod quantitas constans eidem in integratione adjici possit (§. 95. *Anal. infin.*): adice quantitatem constantem  $c$  ut sit  $s = c - a^2 ly$ . Quoniam in casu  $v = 0$  evadit  $y = la$ , erit  $c - a^2 la = 0$ . Sumatur  $a$  pro unitate, erit  $c - la = 0$ , adeoque  $c = la$ . Sed Logarithmus unitatis  $= 0$  (§. 334. *Arithm.*) Ergo etiam  $c = 0$ . Patet igitur si AB sumatur pro unitate, non opus esse ut quantitas quedam constans in summatione elementi cosinus EL adjiciatur.

## THEOREMA CLXXII.

734. Si gravi descendenti resistitur in ratione duplicata celeritatum & cosinus arcus EB exponit celeritatem cadendo acquisitam, radius vero AB celeritatem terminalem; tempus, quo celeritatem istam cadendo acquisivit grave, est ut Logarithmus rationis SL

ad

ad LB, seu complementi sinus versi ad diametrum, ad sinum versum.

DEMONSTRATIO.

II. Si fit  $AB = a$ ,  $AL = ER = v$ ,  
tempus descensus  $= x$ ; erit  $dx = \frac{a^2 dv}{a^2 - v^2}$   
prouti apparet ex demonstratione Theo-  
rematis 169. (§. 730). Jam vero  
 $\frac{a^2 dv}{(a-v)(a+v)} = \frac{\frac{1}{2}adv}{a-v} + \frac{\frac{1}{2}adv}{a+v}$  utpote  
(facta reductione ad denominationem  
eandem) =

$$v + \frac{1}{2}avdv + \frac{1}{2}a^2dv - \frac{1}{2}avdv : (a-v)(a+v)$$

$$\text{Ergo } \frac{a^2 dv}{a^2 - v^2} = \frac{\frac{1}{2}adv}{a-v} + \frac{\frac{1}{2}adv}{a+v} = dx.$$

$$\text{Quoniam } \int \frac{dv}{a-v} = -l(a-v)$$

$$\& \int \frac{dv}{a+v} = l(a+v); \text{ erit } x = \frac{1}{2}al(a+v)$$

$-\frac{1}{2}al(a-v)$ . Sunt igitur propter  
constantem  $\frac{1}{2}a$  tempora, quibus cele-  
ritates  $v$  acquiruntur, ut  $l(a+v) -$   
 $l(a-v)$ . Jam  $l(a+v) - l(a-v)$

$$= l \frac{a+v}{a-v} \text{ (§. 243. Arithm.)}, \text{ hoc est,}$$

cum sit  $a+v = LS$  &  $a-v = BL$ ,  
 $l(a+v) - l(a-v) = l(LS:LB)$ , qui  
est Logarithmus rationis LS ad LB (§.  
129. Arithm.). Ergo si radius cir-  
culi AB exponit celeritatem termina-  
lem & AL cosinus arcus BE celerita-  
tem in medio resistente data lege ac-  
quisitam; erit tempus, quo celeritas  
hæc à gravi cadendo acquiritur ut  
Logarithmus rationis complementi si-

nus versi ad diametrum LS ad sinum  
versum LB. Q. e. d.

COROLLARIUM.

735. Patet ex demonstratione Theore-  
matis præsentis esse tempus  $x$  ut  $l \frac{a+v}{a-v}$   
si  $a$  exponat celeritatem terminalem &  $v$   
celeritatem tempore  $x$  acquisitam. Est  
vero  $a+v$  celeritas acquisita terminali  
aucta &  $a-v$  differentia ejus à termi-  
nali, seu complementum ad terminalem;  
consequenter  $(a+v) : (a-v)$  exprimit  
rationem celeritatis acquisitæ terminali  
auctæ, ad ipsius complementum ad termi-  
nalem. Tempus igitur est ut Logarith-  
mus rationis celeritatis acquisitæ termi-  
nali auctæ, ad ipsius complementum ad  
terminalem.

COROLLARIUM

736. Quoniam  $QP = v$ ,  $KQ = a-v$ ;  
si fiat  $PT = AS = AB$ ; erit  $QT = a+v$ ,  
consequenter Logarithmus rationis TQ  
ad QK ut tempus.

THEOREMA CLXXIII.

737. Si rationes inter summam ce-  
leritatis terminalis & acquisitæ atque  
differentiam acquisitæ à terminali su-  
mantur ut numeri, & descensui gravis  
resistitur in ratione duplicata celerita-  
tum; erunt tempora, quibus celerita-  
tes fuerant acquisitæ, ut Logarithmi.

DEMONSTRATIO.

Quodsi enim descensus gravis im-  
peditur in ratione duplicata celerita-  
tum & celeritas terminalis fuerit  $= a$ ,  
acquisita  $= v$ ; erit summa terminalis  
& acquisitæ  $a+v$  & differentia acqui-  
sitæ à terminali  $a-v$ , consequenter  
ratio summæ istius ad hanc differen-

$$\text{tiam} = \frac{a+v}{a-v} \text{ (§. 129. Arithm.)}$$

Sunt vero tempora, quibus celeritates

istæ acquiruntur, ut  $l \frac{a+v}{a-v}$  (§. 734).

Quare si ratio summæ terminalis celeritatis ac acquisitæ ad differentiam acquisitæ à terminali sumitur ut numerus; erit tempus, quo celeritas acquisita fuit, ut Logarithmus. *Q. e. d.*

#### THEOREMA CLXXIV.

Tab. XVIII. Fig. 176. 738. Si descensui gravis resistitur in ratione duplicata celeritatum & spatia percurfa sint ut Logarithmi Sinuum LE arcus BE quadrantis BD celeritate terminali tanquam radio descripti; tempora insumta sunt ut Logarithmi rationis, inter sinum versum BL & complementum ejus ad diametrum LS.

#### DEMONSTRATIO.

Si enim descensus gravis impeditur in ratione duplicata celeritatis & celeritate terminali AB descripto quadrante BED cosinus arcus BE, seu arcus ED sinus LA est ut celeritas acquisita, spatia percurfa sunt ut Logarithmi sinuum EL (§. 732), tempora vero insumta ut Logarithmi rationum inter sinum versum BL & ejus complementum ad diametrum LS (§. 734). Quamobrem quando spatia percurfa sunt ut Logarithmi sinuum; tempora insumta sunt ut Logarithmi rationum inter sinum versum BL & ejus ad diametrum complementum LS. *Q. e. d.*

#### THEOREMA CLXXV.

739. Incrementum celeritatis gravium in medio non resistente est ad incrementum acquisitæ in medio, quod in ratione duplicata celeritatis resistit, ut quadratum celeritatis terminalis ad ejus supra quadratum celeritatis acquisitæ excessum.

#### DEMONSTRATIO.

Quoniam celeritas gravium in medio non resistente crescit in ratione temporis (§. 68); si tempus dicatur  $x$ , erit incrementum celeritatis momentaneum, in tempusculo scilicet  $dx$ , uti  $dx$ . Jam si celeritas terminalis  $= a$ , celeritas toto tempore  $x$  in medio, quod in ratione duplicata celeritatis resistit, acquisita  $= v$ ; erit  $a^2 dx - v^2 dx = a^2 dv$ , prouti patet ex demonstratione Theorematis 166. (§. 722). Est igitur  $dx : dv = a^2 : a^2 - v^2$ . Quare cum  $dv$  fit incrementum momentaneum celeritatis in medio data lege resistente acquisitæ, erit incrementum celeritatis in vacuo, ad ejus incrementum in medio resistente; ut quadratum celeritatis terminalis, ad ejus excessum supra quadratum acquisitæ. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM.

740. Quoniam  $(a^2 - v^2) = (a + v)(a - v)$ ; erit  $dx$  ad  $dv$  in ratione composita  $a$  ad  $a + v$  &  $a$  ad  $a - v$ , hoc est, incrementum celeritatis in vacuo momentaneum est in casu dato ad incrementum in medio resistente, in ratione composita celeritatis terminalis ad eandem celeritate acquisita auctam, & ejusdem celeritatis terminalis ad ipsius supra acquisitam excessum.

THEO-



THEOREMA CLXXVI.

741. Si motus gravium impeditur in ratione duplicata celeritatum & celeritas terminalis exponitur per rectam AB = CF; qua tanquam radio describitur quadrans, eadem vero pro latere potentie Hyperbolæ sumta intra asymptotos AC & CD describatur Hyperbolæ BME, fiatque HF celeritati in medio resistente acquisitæ aequalis; area Hyperbolica APMB exprimit spatium eo tempore à gravi percursum, quo celeritatem ut HF acquisivit.

DEMONSTRATIO.

Sit enim AB = AC = CF = a, HF = v; erit, ob GF<sup>2</sup> = GH<sup>2</sup> + HF<sup>2</sup> (§. 417. Geom.), GH = PC = √(a<sup>2</sup> - v<sup>2</sup>), consequenter ob PC. PM = AB<sup>2</sup> (§. 488. Anal. fin.) PM = a<sup>2</sup>: √(a<sup>2</sup> - v<sup>2</sup>). Jam differentiale rectæ AP = a - √(a<sup>2</sup> - v<sup>2</sup>) =  $\frac{vdv}{\sqrt{a^2 - v^2}}$ . Quamobrem elementum areæ APMB =  $\frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$ , consequenter area APMB =  $\int \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$ . Est vero spatium à gravi interea temporis percursum, quo celeritas v acquisita,  $\int \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$  (§. 730). Ergo spatium Hyperbolicum APMB exprimit spatium à gravi interea temporis percursum, quo celeritas ut HF acquisita.

Q. e. d.

COROLLARIUM.

742. Quando celeritas acquisita FH in terminalem FC degenerat, semiordinata PM cum asymptoto CD coincidit, adeoque area Hyperbolica ABMP degenerat in infinitam EBACD, consequenter spatium representat infinitum à gravi percursum, aut percurrendum. Quoniam itaque celeritatem terminalem non attingit nisi tempore infinito elapso (§. 726); spatium infinitum à gravi nonnisi tempore infinito percurritur.

THEOREMA CLXXVII.

743. Si intra asymptotos rectangulas DC & AC describatur Hyperbolæ equilatera EMB, cujus latus potentie est ut celeritas terminalis, AP vero ut tertia proportionalis ad celeritatem terminalem & celeritatem tempore finito acquisitam, spatium Hyperbolicum ABMP exponet spatium eodem tempore à gravi in medio descriptum, quod in ratione duplicata descensui resistit, quo celeritas acquisita fuit. Tab. XVIII. Fig. 177.

DEMONSTRATIO.

Sit AC = a, erit etiam latus potentie Hyperbolæ = a. Sit celeritas tempore dato à gravi cadendo acquisita = v; erit PA =  $\frac{v^2}{a}$ , consequenter CP = a -  $\frac{v^2}{a}$  =  $\frac{a^2 - v^2}{a}$ . Unde ob CP. PM = a<sup>2</sup> (§. 488. Anal. fin.), reperitur PM =  $\frac{a^3}{a^2 - v^2}$ .

Jam differentiale abscissæ PA =  $\frac{2vdv}{a}$ , consequenter elementum spatii Hyperbolici ABMP =  $\frac{2a^2 v dv}{a^2 - v^2}$ , adeo-

Cc 2 que

que ABMP =  $2 \int \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$ . Est igitur

area Hyperbolica ABMP ut  $\int \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$

propter constantem 2 (§.181 *Arithm.*).  
Ex antecedentibus constat spatium à  
gravi, in medio data lege resistente, in-  
terea temporis descriptum, dum cele-

ritatem  $v$  acquirit, esse ut  $\int \frac{a^2 v dv}{a^2 - v^2}$

(§.730). Idem igitur spatium est ut  
spatium Hyperbolicum asymptoticum  
ABMP.

SCHOLIUM.

744. Patet adeo, unum idemque spa-  
tium descensus multis modis per figuras re-  
presentari posse.

CAPUT XV.

*De Machinis Simplicibus.*

DEFINITIO LXXI.

745. **M**achina vocatur, quic-  
quid ad motum produ-  
cendum conducit, ut vel virium, vel  
temporis compendio efficiatur.

SCHOLIUM.

746. Quoniam effectus Machinarum ex  
structura ipsarum secundum immutabiles mo-  
tum leges consequuntur: omnes operationes  
rerum corporearum Mechanicæ dicuntur, quia  
agunt structurae suæ convenienter & juxta  
æternas motuum leges. Hinc manifestum  
est, illum demum Mechanicæ Philosophari,  
qui evidenter ostendit, quomodo vi legum  
motus effectus rerum ex structura ipsarum  
consequantur. Nec difficulter hinc colligitur,  
paucos admodum esse, qui Mechanicæ Philoso-  
phantur. Apparet etiam, Philosophiam Me-  
chanicam liberam esse ab ea labe, quam im-  
periti eidem adspargere conantur. Immo nec  
obscurum est, sine Matheseos præsidio de re-  
bus naturalibus temere Philosophari.

DEFINITIO LXXII.

747. Per *Potentiam* intelligo Vim,  
quæ Machinæ applicata ad motum  
tendit, sive actu eundem producat,  
sive non. In priore casu dicitur *Po-  
tentia movens*; in posteriore *Potentia  
sustentans*.

DEFINITIO LXXIII.

748. *Pondus* appello, quod ope  
Machinæ vel sustentatur, vel move-  
tur, vel motui producendo utcumque  
resistit.

DEFINITIO LXXIV.

749. *Vectis* est linea recta inflexi-  
lis & gravitatis expers AB, unico sui  
puncto C fulcro firmo D innixus, cir-  
ca quod moveri potest.

COROLLARIUM.

750. Omnia ergo instrumenta, in quibus rectam circa punctum fixum mobilem concipere licet, cui uno in loco pondus aliquod, in alio potentia in usu applicatur, ad vectem revocantur, consequenter quæ de vecte demonstrantur, ad eadem recte applicantur.

SCHOLION I.

751. Ex natura vectis adeo ratio redditur non modo structuræ & effectuum omnium instrumentorum in officinis artificum atque opificum, nec non passim in vita communi obviorum; sed & motuum animalium: quod posterius primus docuit JOANNES ALPHONSUS BORELLUS in peculiari de motu animalium opere.

SCHOLION II.

752. In genere autem notandum est, ubi Machinarum leges investigamus, non considerari materiam, ex qua constant, nec materiæ affectiones, neque varias figuras, quæ ob certos usus inducuntur; sed tantum eorum rationem haberi, quæ Machinæ essentiam absolvent, ut nempe constat, quæ Machinæ quæ tali convenient. Quodsi enim contingat, vel materiam, vel figuram, vel aliud quodcunque obstaculum impedire, quominus Lex ista accurate observari queat; ea ex suis principiis seorsim sunt determinanda.

DEFINITIO LXXV.

753. *Hypomochlium* est fulcrum, cui vectis innititur.

DEFINITIO LXXVI.

754. *Vectis Homodromus* est, in quo pondus medium locum tenet inter locum potentiæ B & hypomochlium C, vel potentia A medium locum occupat inter locum ponderis B & hypomochlium C.

DEFINITIO LXXVII.

755. *Vectis heterodromus*, est in quo hypomochlium medium locum C tenet inter locum ponderis A & locum potentiæ B. Tab. V. Fig. 58.

DEFINITIO LXXVIII.

756. *Axis in peritrochio* est circulus AB basi cylindri concentricus & una cum ipso circa axem ejus EF mobilis. Tab. V. Fig. 60. Cylindrus ille *Axis*, circulus *Peritrochium*, radii circuli (qui subinde soli comparent) *Scytalæ* appellantur.

SCHOLION

757. *Proprie per axem intelligitur virga ferrea, cui circumpositus est cylindrus ligneus scytalis instructus. Enimvero rationem paulo ante reddidi (§. 746), cur definitiones ad Geometriam puram revocari consultum sit.*

COROLLARIUM.

758. Axi adeo in peritrochio locus est, quotiescunque in motu Machinæ concipere licet circulum circa axem fixum descriptum & cylindri huic circumpositi plano concentricum.

DEFINITIO LXXIX.

759. *Trochlea* est circulus circa centrum C volubilis. Tab. V. Fig. 61.

DEFINITIO LXXX.

760. *Cochlea* est cylindrus rectus AB spirali similiter sulcatus. Describitur autem illa spiralis, si recta FG motu æquabili in superficie cylindri circumferatur & interea punctum I ex F versus G motu itidem æquabili descendit. *Cochlea mas* est, si superficies convexa; *Cochlea fœmina* vero, si concava fuerit sulcata. Tab. V. Fig. 62. 63.

## SCHOLIUM.

Tab.V. 761. *Mas & fœmina, si motus gigni debet, semper conjunguntur. Loquor nimirum de cochleæ simplicis usu. Si enim cum axe in peritrochio conjungitur, fœmina opus non est, cum is vices ejus adimpleat. Sed hoc in casu machina composita prodit.*

## DEFINITIO LXXXI.

762. *Cuneus est prisma triangulare, cujus bases sunt triangula æquicrura acutangula.*

## AXIOMA X.

763. *Potentia æqualis est ponderi quod, salvo effectu, in ejus locum substitui potest.*

## SCHOLIUM.

764. *Patet ex ipsa æqualitatis definitione (§. 15. Arithm.)*

## THEOREMA CLXXVIII.

765. *Si potentia B vecti sive homodromo, sive heterodromo applicata sustentat pondus in A applicatum, rationem reciprocam distantiarum ab hypomochlio ad pondus habet.*

## DEMONSTRATIO.

Tab.V. 58. *Sit primum vectis AB heterodromus. Quoniam supponitur horizonti parallelus; linea directionis utriusque ponderis erit ad ipsum perpendicularis, centrumque gravitatis unius in A, alterius in B (§. 215.) Quodsi ergo pro potentia in B applicata substituatur pondus æquale; habebimus duo pondera, quorum centra gravitatis recta AB connectuntur, eaque in æquilibrio, cum potentia pondus sustentet per hypoth.*

Est igitur C centrum gravitatis commune (§. 122), consequenter pondus in B, hoc est potentia, ad pondus in A reciproce se habet, ut AC ad CB (§. 144). *Quod erat unum.*

Si vectis fuerit homodromus CB, ponderis G non aliam partem sustentat potentia in B applicata, quam quæ ferenda est à fulcro ibi supposito. Est igitur ad pondus A; ut distantia ponderis ab Hypomochlio AC, ad distantiam potentia CB (§. 231). *Quod erat secundum.*

Si vectis fuerit inclinatus, hoc est, si linea directionis ponderis & potentia cum vecte AB angulum efficiat obliquum, erunt CD & CE ad lineas directionis AF & EG perpendiculares distantia à centro motus C (§. 229), consequenter eodem, quo ante, modo demonstratur, potentiam sustentantem, quæ in B applicatur, esse ad pondus in A suspensum, ut DC ad CE (§. 272). *Quod erat tertium.*

## COROLLARIUM.

766. *Quodsi potentia, quæ pondus sustentat, augeatur; præpollebit, adeoque dato vecte pondus movebit.*

## SCHOLIUM.

767. *Facile itaque ad vectem ea omnia transferuntur, quæ superius de æquiponderantibus (§. 144. & seqq. itemque §. 231. & seqq. §. 272. & seqq.) demonstrata sunt.*

## PROBLEMA CXVIII.

768. *Data gravitate vectis heterodromi AB, distantia centri gravitatis ab hypo-*

Tab  
Fig  
59.Tab  
Fig  
65.Tab  
Fig  
58.

*hypomochlio CV, distantis ponderis atque potentia AC & CB, una cum pondere O, invenire potentiam, qua ipsum sustentare valet.*

RESOLUTIO.

1. Concipiamus vectem gravitatis expertem & ejus loco in V appensum pondus eidem æquale G. Quodfi fiat ut AC ad CV, ita gravitas vectis ad quartum: reperietur pondus, quod vectis sustentare valet (§. 765).

2. Subtrahatur id à pondere dato, residuum erit pondus à potentia sustentandum.

3. Fiat igitur ut CB ad CA ita pondus residuum ad quartum: & reperietur potentia in B applicanda, ut dato vecte datum pondus sustentet (§. 765).

Sit e. gr. CA = 1, CV = 2, CB = 5, G = 10 librarum, O = 300. Fiat

1-2-10	5-1-280
<u>10</u>	<u>1</u>
20	280
<u>300</u>	
20	3
<u>280</u>	280

(56. Potentia.)

PROBLEMA CXIX.

769. *Datis gravitate vectis heterodromi AB, distantia centri gravitatis ab hypomochlio CV, distantis potentia atque ponderis BC & CA, invenire pondus sustentandum.*

RESOLUTIO.

1. Quæratut ut in Problemate præcedente pars ponderis à vecte solo sustentanda.

2. Quæratut eadem ratione pars altera ponderis, quam potentia in B applicata sustentare valet.

3. Jungantur partes figillatim repertæ in unam summam. Ita prodit pondus quæsitum.

Sit e. gr. CA = 1, CV = 2, CB = 5, G = 10, potentia 56 librarum: invenietur

ponderis pars prima =	20
	<u>altera = 280</u>
pondus integrum =	300

PROBLEMA CXX.

770. *Datis gravitate vectis heterodromi AB, pondere sustentando G, potentia in B applicanda, longitudine ac centro gravitatis vectis V, invenire centrum gravitatis commune seu centrum motus C.*

Tab.V.  
Fig.  
58.

RESOLUTIO.

1. Concipiatur vectis gravitatis expertis & ejus loco in centro gravitatis V appensum pondus G. Quæratut centrum gravitatis commune Z potentia in B applicata & ponderis G (§. 149).

2. Subtrahatur ZB ex AB, relinquetur AZ.

3. Concipiatur denique in Z appensum pondus, gravitati vectis & potentia junctim sumptis æquale, & inveniatur hujus ponderis & ponderis dati O centrum gravitatis commune C (§. 149), quod quærebatur.

E. gr. Sit potentia in B 56, gravitas vectis 10, pondus O 300 librarum, AB = 6, VB = 3. Fiat:

$$\begin{array}{r}
 66 - 10 - 3 \\
 \hline
 3 \\
 30
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 ZB = \frac{30}{11} = \frac{5}{11} \\
 AB = \frac{66}{11} \\
 \hline
 AZ = \frac{61}{11} \\
 (1 = AC)
 \end{array}$$

PROBLEMA CXXI.

Tab.V. Fig.59.

771. *Datis gravitate & centro gravitatis F vectis Homodromi CB, pondere G, distantia ejus ab hypomochlio CA, una cum distantia potentia CB, invenire potentiam, quæ pondus sustentare valet.*

RESOLUTIO.

1. Concipiatur vectis gravitatis expers & ejus loco in F appensum pondus ei æquale, quæraturque potentia vectem solum sustentatura (§. 765).
2. Quæratur porro potentia requisita ad pondus datum G sustentandum (§. cit.).
3. Addantur potentiaë sigillatim reperiæ in unam summam. Ita prodit potentia quæsitæ.

Sit e. gr. CA = 1, CF = 3, CB = 6, pondus datum 300, gravitas vectis 10 librarum. Reperietur potentia vectem sustentatura 5, pondus vero solum sustentatura 50, adeoque potentia integra 55 librarum.

THEOREMA CLXXIX.

772. *Si potentia vecte sive Heterodromo, sive Homodromo pondus attollit, spatium illius est ad spatium hujus, ut hoc ad potentiam, quæ idem pondus tantum sustentare valet.*

DEMONSTRATIO.

Dum pondus attollitur per arcum Aa, potentia movetur per arcum Bb. Sunt vero arcus Aa & Bb similes, in vecte Heterodromo ob angulos verticales ad C æquales (§. 156. *Geom.*); in Homodromo, quia concentrici, consequenter  $Aa : Bb = AC : CB$  (§. 138. 412. *Geom.*). Sed ut AC ad CB ita potentia ad pondus, quod sustentare valet (§. 756). Ergo spatium potentiaë, ad spatium ponderis; ut pondus, ad potentiam, quæ idem sustentare valet (§. 167). *Q. e. d.*

Tab. Fig. 58

COROLLARIUM.

773. *Lucrum itaque virium cum temporis dispendio conjungitur & contra.*

PROBLEMA CXXII.

774. *Stateram construere, hoc est, instrumentum quo, unico pondere mediante, diversorum corporum gravitates explorare licet.*

RESOLUTIO.

1. In virga ferrea aut lignea, aut ex quacunque materia alia parata AB, assumatur ad arbitrium punctum C & in eo perpendiculariter erigatur examen seu lingula CD.
2. Jugum intra trutinam seu scapum GF suspendatur &
3. Brachium minus AC unco AH & lance G alioque quocunque modo oneretur, donec majori æquilibretur, aut non multum ab æquilibrio absit.

Tab. Fig.

4. Pon-

4. Pondus I huc illucque promoveatur, donec cum una, duabus, tribus, quatuor &c. libris in lance G collocatis æquilibretur, & notentur puncta, in quibus I ponderat ut una, duo, tres, quatuor &c. libræ. Ipsa constructio loquitur, hoc modo unici ponderis I ope pondera corporu madmodum differentium explorari posse (§. 756).

SCHOLION I.

775. Quodsi onera ingentia, quales sunt currus scæno onusti, ponderanda, non opus est, ut ad æquilibrium reducantur brachia; ingentes vero illæ statera trutina & lingula non habent opus. Situs enim jugi horizontalis, quantum ad praxin sufficit, nudo oculo facile dignoscitur,

SCHOLION II.

776. Empirica statera, qua utuntur artifices, divisio Geometricæ præferenda est, qua brachium longius BC ejusdem ubique spissitudinis in partes æquales dividi jubetur. Neque enim materiæ conditio artificumque negligentia putitur, ut constructio satis sit accurata.

SCHOLION III.

777. Cum pondera non ubivis locorum æqualia sint: statera quoque empirico modo constructa universales non sunt.

SCHOLION IV.

778. Utut autem commodissimus sit statera usus, quia non multis opus est ponderibus & axis minus gravatur; è vita tamen communi eam proscribi præstat, quoniam venditores fraudulentis fallacem facile reddunt, nec adeo in promptu sit fallaciam retgere. Ad communem itaque usum construuntur libræ equalium brachiorum. Sed antequam constructionem tradamus; fundamenta quadam theoretica sunt præmittenda.

THEOREMA CLXXX.

779. Si libra, cujus centrum motus C fuerit supra rectam, è cujus extremis pendent pondera æqualia H & I, horizonti sit parallela, quiescit; sed si inclinatur, tandiu movetur, donec iterum horizonti sit parallela. Tab.V.  
Fig.67.

DEMONSTRATIO.

Si enim jugum AB horizonti parallelum, lineæ directionis ponderum ad id sunt perpendiculares, (§. 212) adeoque brachia AL & LB coincidunt cum distantis à centro motus (§. 229.) Quare cum sit AL = LB, erit in L centrum gravitatis commune ponderum (§. 244). Ex hoc igitur suspensa quiescunt (§. 124). Quod erat unum.

Quodsi ex situ suo dimoveatur, ducatur CD ad horizontem perpendicularis & GF cum eodem parallela: erunt distantia GE & EF (§. 229), quæ cum inæquales sint, pondera non æquilibrantur (§. 765), sed alterum I præponderat (§. 152): quod cum descendat, redit libra in statum horizonti parallelum. Quod erat alterum.

THEOREMA CLXXXI.

780. Si libra æqualibus ponderibus utrinque onusta, cujus centrum motus infra jugum AB, fuerit horizonti parallela, quiescit; si vero inclinatur, in situm horizontalem non revertitur, sed descendit pondus unum, donec libra pervenerit in situm priori contrarium. Tab.V.  
Fig.68.

## DEMONSTRATIO.

Si jugum AB fuerit horizontale, erunt lineæ directionis ponderum H & I ad id perpendiculares (§. 212), adeoque distantia à centro motus rectæ AL & LB (§. 229.) Est vero  $AL = LB$ , ex natura libræ, adeoque cum pondera itidem æqualia sint, *per hypoth.* centrum gravitatis commune eorundem est in C (§. 145), adeoque situm non mutat (§. 124). *Quod erat unum.*

Si jugum inclinetur, ducatur DC ad horizontem perpendicularis & per E recta GF eidem parallela; erunt distantia GE & EF à centro motus C inæquales. Præponderat ergo H ex majori distantia EG adeoque continuo descendit, donec A, B & L sint in eadem recta horizontali (§. 152). *Quod erat alterum.*

## THEOREMA CLXXXII.

Tab.V. Fig.69. 781. *Si libra, equalibus ponderibus utrinque onusta, cujus centrum motus C in ipso jugo AB, fuerit horizonti parallela, quiescit, nec quomodocunque inclinata situm mutat.*

## DEMONSTRATIO.

Prius eodem modo patet, quo in Theoremate præcedente. Posterius ita demonstratur. Ducatur DE per C horizonti parallela, erunt DC & CE distantia ponderum H & I (§. 229). Sed ob rectos ad E & Datque verticales angulos ad C æquales (§. 156. *Geom.*), itemque  $AC = CB$ , ex natura libræ, erit  $DC = CE$  (§. 252. *Geom.*). Qua-

re cum pondera H & I æqualia sint *per hypoth.* adhuc æquilibrantur (§. 765). Libra igitur quiescit. *Q. e. d.*

## PROBLEMA CXXIII.

782. *Libram construere, hoc est, instrumentum, in cujus extremitatibus appensa gravia æqualia æquiponderant in situ horizontali.*

## RESOLUTIO.

1. Jugum AB bifariam dividatur in C, ita ut brachia AC & CB sint ejusdem longitudinis, sintque tum brachia cum uncis suis A & B, tum lances D & E ejusdem prorsus ponderis, ita ut jugum ex puncto C appensum, tam lancibus instructum, quam sine iisdem, situm tueatur horizontalem.
2. In medio jugi puncto C excitetur perpendiculariter examen sive lingua CF.
3. Jugum denique intra trutinam HI ita suspendatur, ut centrum motus C sit paulo supra jugum seu rectam AB, quæ appensionum puncta A & B conjungit, vel ut centrum motus sit in ipsa recta AB.

Dico, si, libra ex trutina HI suspensa, examen intra eandem abscondatur, gravia lancibus imposita esse æqualia, seu gravitatem utriusque esse eandem.

## DEMONSTRATIO.

Si libra ex I suspendatur, erit trutina HI ad lineam horizontalem perpendicularis (§. 215). Quodsi ergo lingua



lingula intra eam absconditur, cum ea sit ad jugum AB perpendicularis per constructionem, jugum AB erit horizonti parallelum. Quare cum centrum motus C sit vel in jugo AB, vel supra jugum, per construct. pondera utrinque suspensa æqualia sunt (§. 779. 781).  
Q. e. d.

COROLLARIUM.

783. Si brachia sint inæqualia, libra dolosa est.

SCHOLIUM I.

784. Præstat brachia esse longiora, quam breviora, quia idem error in divisione brachiorum admissus minorem in ponderibus producit, si brachia longiora, quam si breviora. Fac enim brachium AC esse justo longius uno scrupulo quarto seu una decima lineæ. Si brachium AB = 5'', erit BC : AC = 500 : 501. Si AB = 5', erit BC : AC = 5000 : 5001. In casu itaque posteriori differentia brachiorum est  $\frac{1}{5000}$ ; in priore  $\frac{1}{500}$  brevioris. Hinc & pondus majus in casu posteriore excedere debet minus  $\frac{1}{5000}$  sui, in priore autem  $\frac{1}{500}$  sui.

SCHOLIUM II.

785. Vulgares librae ita construuntur, ut centrum motus sit paulo altius jugo, quo libra ex situ horizontali emota, ponderibus utrinque æqualibus appensis, non quiescat, nisi eadem restituta (§. 780). Non tamen nimis ab eo removeri debet, ut lingula minores declinationes indicet.

SCHOLIUM III.

786. Ne affricus impediatur jugi è situ horizontali emotionem, axis ejus, qui trutinæ inseritur, cylindricus sit & foramen in in trutina rotundum, ut contactus exiguus evadat. Immo motus jugi perniciosus evadit, si axis in aciem desinat, qua parte trutinam

tangit. Unde & jugum leve ac tenue esse debet, quantum per materiam ponderandam fieri potest, ut minori vi è situ suo dimoveatur sicque accuratius indicet æquilibrium.

PROBLEMA CXXIV.

787. Libram propositam examinare, utrum accurata sit, necne.

RESOLUTIO.

Permutentur lances aut pondera in iis æquilibrata. Quodsi enim maneat æquilibrium, libra accurata est; sin minus, dolosa.

DEMONSTRATIO.

Si enim libra dolosa est, brachia inæqualia sunt (§. 783) adeoque lance ex majori brachio suspensa levior altera (§. 765). Quare si lancem leviolem è minori, graviorem è majori brachio suspendas: præponderabit è majori brachio suspensa adeoque æquilibrium tollitur (§. 152.). Q. e. d.

PROBLEMA CXXV.

788. Libram dolosam verum pondus mercis explorare.

Tab. V.  
Fig. 70.

RESOLUTIO.

1. Merce in lance E collocata, notetur pondus in altera D ipsi æquilibratum.
2. Eadem translata in D, notetur pondus in E ipsi æquilibratum.
3. Pondera ista in se invicem ducantur &
4. Ex facto radix quadrata extrahatur. Dico hanc esse verum mercis pondus.

Sit e. gr. pondus in E = 10, in D = 9 librarum, reperietur verum mercis pondus  $9\frac{48}{100}$ .

DEMONSTRATIO.

Est enim ut AC ad BC ita merx ad pondus in D positum & ut AC ad BC ita pondus in E ad mercem (§. 765). Ergo mercis pondus est medium proportionale inter pondera in lancibus D & E collocata (§. 167. 156. *Arithm.*), consequenter æquale radici ex facto ponderum in se invicem extractæ (§. 501. *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

789. Si verum mercis pondus inventum, ratio brachiorum non amplius latet. Est enim AC ad CB ut pondus mercis ad pondus in D ipsi æquilibratum (§. 765), e. gr. in nostro exemplo ut 948 ad 900 seu ut 237 ad 225 (§. 181. *Arithm.*)

COROLLARIUM II.

790. Data ratione brachiorum AC & CB facile determinatur error in æquilibrio admissus (§. 765). Æquiponderentur e. gr. in lance E 100 libræ merci in altera D collocatæ. Ut habeatur quæsitum, fiat

$$237 - 225 = 100$$

$$\frac{100}{2250} 237 \left) \begin{array}{r} 22500 \\ 2133 \\ \hline 1170 \\ 1185 \end{array} \right. (95 \text{ fere}$$

Dolus ergo committitur 5 librarum.

COROLLARIUM III.

791. Invenitur quoque pars, qua brachium longius excedit minus, iisdem datis. Sit enim jugum integrum 1000 partium. Fiat ut summa brachiorum  $237 \frac{1}{2} 225$  seu 462 ad majus 237 ita 1000 ad idem brachium in partibus jugi millesimis 513 fere. Sed ex natura libræ esse debet 500: excedit ergo veram quantitatem particulis 13, qualium scilicet jugum est 1000.

THEOREMA CLXXXIII.

792. Si potentia ope axis in peritrochio sustentet pondus G sitque linea directionis AL ad Peripheriam rota vel ad scytalam perpendicularis; erit ut radius axis CE ad radium rota CA seu longitudinem scytala, ita potentia ad pondus.

DEMONSTRATIO.

Quodsi potentia in A applicata deprimat rotam vel scytalam, perinde est ac si vecte Heterodromo ACE, cujus centrum motus in C, pondus G sustentaret. Si vero in a applicata eandem attollit, perinde est ac si vecte homodro aEC pondus idem G sustentaret. Omnes enim machinæ partes reliquæ ad ponderis sustentationem nil conferunt, cum utrinque sibi mutuo æquilibrium, ut machina tanquam gravitatis expers considerari possit. Jam cum linea directionis potentiæ in A vel a sit ad AC vel aC perpendicularis, per hypoth. & funis EG à pondere G extensus ad EC horizontalem per hypoth. similiter normalis (§. 215); erit ut CE ad CA, vel ut CE ad Ca; ita potentia ad pondus (§. 765). *Q. e. d.*

THEOREMA CLXXXIV.

793. Si potentia in F deprimat rotam juxta lineam directionis FD ad radium rotae obliquam sed directioni perpendiculari parallelam; ad potentiam, que juxta directionem perpendicularem AL agit, eam habet rationem, quam sinus totus ad sinum anguli directionis DFC.

DEMONSTRATIO.

Quoniam FD perpendicularis ad AC, per hypoth. erit DC potentia in F applicatae distantia à centro motus C (§. 229). Est ergo ut potentia in F, ad pondus G; ita EC, ad CD (§. 272): & ut potentia in A, ad pondus G; ita EC, ad CA (§. 792). Ergo potentia in F ad potentiam in A ut DC ad AC (§. 199. *Arithm.*). Sed si AC vel FC (§. 40. *Geom.*) sumatur pro sinu toto, erit DC sinus anguli DFC (§. 2. *Trigon.*). Potentia igitur in A, est ad potentiam in F; ut sinus totus, ad sinum anguli directionis DFC. *Q. e. d.*

COROLLARIUM

794. Quare cum distantia potentia in A sit radius CA; dato angulo directionis DFC inveniri potest distantia DC.

Sit e. gr.  $FC = 4''$  &  $DFC = 48^\circ$ : Calculus ita subducetur:

Log. sin. Tot.	1000000000
Log. FC	0.6020600
Log. sin. DFC	98710735

Log. DC 04731335.  
cui quam proxime respondent in tabulis 2' 9" 7".

THEOREMA CLXXXV.

795. Potentia in diversis punctis F & K rotam juxta directiones FD & KI perpendiculari AL parallelas deprimentes sunt inter se ut distantia à centro motus CD & CI reciproce.

DEMONSTRATIO.

Est enim potentia in F ad pondus G ut EC ad CD & idem pondus G ad potentiam in K ut IC ad CE (§. 799). Ergo potentia in F ad Potentiam in K ut IC ad CD (§. 198. *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

796. Crescente adeo distantia à centro motus, potentia decrescit & contra, pondere manente eodem.

COROLLARIUM II

797. Quare cum radius AC sit distantia maxima & potentia juxta lineam directionis ad eundem perpendicularem agenti conveniat (§. 792); erit potentia perpendicularis omnium minima, quæ datum pondus G sustentare valent juxta diversas directiones parallelas agentes.

COROLLARIUM. III.

798. Si ex centro C erigatur radius CH ad AC perpendicularis, erit FD eidem parallela (§. 256. *Geom.*). Quare si ex F demittatur perpendicularis FM, erit eadem ipsi AC parallela (§. cit.), consequenter  $FM = DC$  (§. 257. *Geom.*) Cum adeo FM sit distantia potentia in F applicata; in praxi facile definitur absque calculo.

THEOREMA CLXXXVI.

799. Si potentia juxta perpendicularem AL deprimit rotam & pondus G attollit, erit spatium potentia, ad spatium ponderis; ut pondus, ad potentiam, quæ id sustentare valet.

Tab. VI. Fig. 71.

DEMONSTRATIO.

Dum rota semel circumvolvitur, potentia integram ejus peripheriam percurrit. Interea autem pondus attollitur per spatium peripheria axis æquale. Est itaque spatium potentia,

ad spatium ponderis; ut peripheria rotæ, ad peripheriam axis, consequenter ut radius rotæ AC, ad radium axis CE (§. 412. *Geom.*) Sed ut AC, ad CE; ita pondus, ad potentiam, quæ id sustentare valet (§. 729). Ergo spatium potentia, est ad spatium ponderis; ut pondus, ad potentiam, quæ id sustentare valet. *Q. e. d.*

### PROBLEMA CXXVI.

800. Dato pondere, dataque potentia ipsum sustentatura, axem in peritrochio construere.

#### RESOLUTIO.

1. Assumatur radius axis ponderi sustentando conveniens, ne scilicet axis frangatur.
2. Fiat ut potentia, ad pondus; ita radius axis, ad radium rotæ, seu longitudinem scytalæ (§. 792).

#### COROLLARIUM.

801. Quodsi potentia fuerit pars ponderis exigua, radius rotæ enormis prodit. E. gr. Sit pondus 3000, potentia 50 librarum; erit radius rotæ, ad radium axis; ut 60, ad 1. Hinc si radius axis non excederet pedem dimidium, foret radius rotæ pedum 30.

#### SCHOLIUM.

802. Huic malo medela affertur, rotas cum axibus multiplicando, & ut una alteram circumagere valeat, dentibus vel etiam tympanum paxillis instruendo.

### THEOREMA CLXXXVII.

Tab. VI. 803. Si pluribus rotis dentatis potentia aliqua, cujus linea directionis Fig. KL peripheriam ultima tangit, pondus 72. H sustentat; erit ea in ratione composita omnium earum, quas radii axium

ad radios rotarum habent, nempe CB : CD, EF : GE, HI : HK.

#### DEMONSTRATIO.

Quodsi concipiamus potentiam applicari in D: erit ea ad pondus A ut CB ad CD (§. 792), consequenter = A. CB : CD (§. 297 *Arithm.*). Axis igitur DF tantopere gravatur, ac si pondus A. CB : CD appenderetur. Concipiamus itaque porro potentiam in G applicari, quæ hoc pondus ope rotæ alterius solius, consequenter pondus A ope duarum sustentet. Cum sit ad pondus A. CB : CD, ut EF ad EG (§. 792); reperietur = A. CB. EF : CD. EG (§. 297. *Arithm.*). Quare axis tertius GI tantopere gravatur, ac si pondus A. CB. EF : CD. EG appenderetur. Quoniam potentia in K, est ad hoc pondus; ut HI, ad HK (§. 792); reperietur ea = A. CB. EF. HI : CD. EG. HK (§. 297. *Arithm.*) & ita porro, si plures fuerint rotæ. Est igitur potentia in K applicata, ad pondus A, quod ope plarium rotarum sustentat, ut A. CB. EF. HI : CD. EG. HK, ad A; hoc est, ut A. CB. EF. HI, ad A. CD. EG. HK (§. 178. *Arithm.*), adeoque & ut CB. EF. HI, ad CD. EG. HK (§. 181 *Arithm.*), consequenter in ratione composita CB : CD, EF : EG & HI : HK (§. 159. *Arithm.*) *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM I.

804. Quodsi pondus ducas in factum ex radiis axium & productum divides per factum ex radiis rotarum; potentia ipsam sustentatura reperitur, quæ aucta idem attollet.

attollet. Sit e. gr.  $A = 6000$  librarum,  $BC = 6''$ ,  $CD = 34''$ ,  $EF = 5''$ ,  $EG = 35''$ ,  $HI = 4''$ ,  $HK = 27''$ ; erit  $BC \cdot EF \cdot HI = 120$ . &  $CD \cdot EG \cdot IK = 32130$  & hinc potentia  $= 6000 \cdot 120 : 32130 = 22\frac{13}{3213}$   $= 22\frac{146}{377}$   $= 22\frac{1}{3}$  quam proxime.

COROLLARIUM. II.

805. Si vero potentiam ducas in factum ex radiis rotarum, & productum dividas per factum ex radiis axium; prodibit pondus, quod sustentare valet. Sit e. gr. Potentia  $22\frac{146}{377}$  librarum, reliqua omnia sint ut ante; reperietur pondus 6000.

SCHOLIUM.

806. Loco ultimæ rotæ in praxi adhibetur manubrium ABCD, ubi AE radio axis, CD radio rotæ respondet.

PROBLEMA CXXVII.

807. Data potentia datoque pondere, invenire numerum rotarum & in unaquaque rationem radii axis ad radium rotæ definire, ita ut potentia peripheriæ rotæ ultimæ applicata juxta directionem perpendiculararem pondus datum sustentet.

RESOLUTIO.

1. Dividatur pondus per potentiam.
2. Quotus dispergatur in factores.

Dico, numerum factorum indicare numerum rotarum, radiosque axium se habere ad radios rotarum ut unitatem ad radios singulos.

Sit e. gr. pondus 3000 librarum & potentia 60, erit quotus 500, qui resolvitur in factores 4. 5. 5. 5. Quatuor igitur construi possunt rotæ, in quarum una ra-

dus axis est ad radium rotæ ut 1 ad 4, in reliquis ut 1 ad 5.

DEMONSTRATIO.

Si pondus per potentiam dividitur, unitas est ad quotum; ut potentia, ad pondus (§. 66. *Arithm.*). Est igitur potentia ad pondus in ratione composita unitatis ad singulos factores (§. 159. *Arithm.*). Quare si radii axium fiant ad radios rotarum; ut unitas, ad eosdem factores; potentia erit ad pondus in ratione composita radiorum axium ad radios rotarum. Potentia igitur pondus sustentare valet ope machinæ constructæ (§. 803). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

808. Quoniam in excessu peccari nequit, consultum est, ubi potentia non exacte dividit pondus, quotum unitate majorem assumere. Similiter unam, immo aliquot unitates quoto addere licet, si in factores commode dispergi nequit.

THEOREMA CLXXXVIII.

809. Si ope duarum rotarum potentia movet pondus, revolutiones tardius motæ, sunt ad revolutiones celerius motæ; ut peripheriæ axis celerius motæ, ad peripheriam rotæ, cui occurrit. Tab. VI. Fig. 72.

DEMONSTRATIO.

Interea dum rota tardius mota M unam revolutionem absolvit, peripheria axis FD, qui eidem occurrit, totam ejus peripheriam emetiri debet. Toties igitur axis FD, consequenter rota N, circumvolvitur, antequam rota M unam revolutionem absolvit, quoties peripheria axis FE in peripheria rotæ M continetur.

Sunt

Sunt adeo revolutiones rotæ tardius motæ, ad revolutiones velocius motæ; ut peripheria axis FD, ad peripheriam rotæ M, cui occurrit. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

810. Eadem igitur revolutiones sunt ut radius axis FE, ad radium rotæ DC (§. 412. *Geom.*).

## COROLLARIUM II.

811. Cum numerus dentium in axe FD, sit ad numerum dentium in peripheria rotæ M; ut peripheria illius, ad peripheriam hujus; erunt revolutiones rotæ tardius motæ M, ad revolutiones celerius motæ N; ut numerus dentium seu paxillorum in axe, ad numerum dentium in rota M, cui iste occurrit.

## THEOREMA CLXXXIX.

812. *Si ope plurium rotarum M, N, O &c. potentia movet pondus A, erunt revolutiones rotæ celerrime motæ O, ad revolutiones tardissime motæ M, in ratione composita ex rationibus reciprocis peripheriarum axium IG, FD &c. & peripheriarum rotarum N, M &c. quibus illi occurrunt.*

Tab. VI. Fig. 72.

## DEMONSTRATIO.

Sint peripheriæ rotarum M & N  $m$  &  $n$ , peripheriæ axium DF & GI  $a$  &  $b$ : erit ut  $a$ , ad  $m$ ; ita  $1$ , ad numerum revolutionum rotæ N (§. 809)  $= m : a$  (§. 302. *Arithm.*). Est vero porro ut  $b$ , ad  $n$ ; ita  $m : a$ , ad numerum revolutionum rotæ O (§. 809)  $= mn : ab$  (§. 302. *Arithm.*). Quare revolutiones rotæ celerrime motæ O, sunt ad revolutiones rotæ tardissime motæ M; ut  $mn : ab$ , ad  $1$ , hoc est ut  $mn$ , ad  $ab$  (§. 178.

*Arithm.*) consequenter in ratione composita ex rationibus peripheriarum rotarum M & N ad peripherias axium DF & GI, qui ipsis occurrunt (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

813. Quoniam numeri dentium sunt in ratione peripheriarum; revolutiones rotæ tardissime motæ M, sunt ad revolutiones rotæ velocissime motæ O, in ratione composita earum, quas habent numeri dentium in axibus FD, IG &c. ad numeros dentium in rotis N & M &c. quibus occurrunt.

## COROLLARIUM II.

814. Quia peripheriæ sunt ut radii, (§. 412. *Geom.*) revolutiones rotæ tardissime motæ M, sunt ad revolutiones rotæ velocissime motæ O, in ratione composita earum, quas habent radii axium GH, DE &c. ad radios rotarum GE, DC &c. quibus occurrunt.

## COROLLARIUM III.

815. Quare si factum ex radiis rotarum GE, DC &c. ducas in numerum revolutionum rotæ tardissime motæ M, & productum divides per factum ex radiis axium, qui ipsis occurrunt, GH, DE &c. prodit numerus revolutionum rotæ velocissime motæ O (§. 302. *Arithm.*). E. gr. sit  $GE = 8$ ,  $DC = 12$ ,  $GH = 4$ ,  $DE = 3$ , & revolutio rotæ M una, erit numerus revolutionum rotæ O  $= 96 : 12 = 8$ .

## PROBLEMA CXXVIII.

816. *Datis revolutionibus rotæ velocissime circumactæ O interea absolutis, dum tardissime mota M semel in orbem redit; invenire dentium in axibus & rotis numerum.*

RESOLUTIO.

- 1. Numerus datarum revolutionum dispergatur in factores.
  - 2. Numerus dentium seu paxillorum in axibus pro arbitrio assumptus ducatur figillatim in singulos factores.
- Dico, facta exhibere numeros dentium in periphæriis rotarum, quibus totidem axes occurrunt.

E. gr. Si rota velocissime mota 40 revolutiones absolvat, dum tardissime mota semel circumagitur; resolvatur numerus 40 in factores 5 & 8. Hinc intelligitur, duabus opus esse rotis totidemque axibus dentatis, qui istis occurrant. Quodsi axis habuerit dentes 6; rota una habebit 30, altera 48, tertia, cui potentia applicatur, nullis instruenda, figuram fortitura pro potentia applicanda conditione.

DEMONSTRATIO.

Revolutiones rotæ tardissime motæ, sunt ad revolutiones velocissime circumactæ, in ratione composita numerorum dentium in axibus, ad numeros dentium in rotis, quibus occurrunt (§. 811). Cum itaque numeros dentium in rotis invenerimus; numeris dentium in axibus per factores multiplicatis, in quos numerus revolutionum rotæ velocissime circumactæ resolvitur, sitque adeo unitas, ad factores hosce; ut numerus dentium in axibus, ad numerum dentium in rotis, quibus occurrunt (§. 66. *Arithm.*); revolutiones rotæ tardissime motæ, erunt ad revolutiones velocissime circumactæ, in ratione composita unitatis ad factores numeri revolutionum posteriorum dati, *Wolfi Oper. Mathem.* Tom. II.

consequenter ut unitas ad ipsum hunc numerum (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA CXC.

817. Si ope plurium rotarum potentia movet pondus, spatium ponderis, est ad spatium potentia; ut potentia sustentans, ad pondus.

DEMONSTRATIO.

Sint periphæriæ rotarum M, N, O *Tab. &c. a, b, c, &c. axium CB, DE, CH VI. &c. d, e, f &c. erit numerus revolu-* *Fig. 72.*  
 tionum rotæ O interea peractarum, dum M semel in orbem redit,  $ab : ef$  (§. 812). Jam si rota M semel circumagitur, spatium à pondere percursum æquatur periphæriæ axis BC, spatium verò potentia, periphæriæ rotæ O per numerum revolutionum interea absolutarum multiplicata. Est igitur spatium ponderis, ad spatium potentia; ut  $d$ , ad  $abc : ef$ , consequenter ut  $def$  ad  $abc$  (§. 178. *Arithm.*). Sed  $d : a = CB : CD$ ,  $e : b = DE : EG$ ,  $f : c = GH : HK$  (§. 412. *Geom.*) adeoque  $def : abc = CB. DE. GH : CD. EG. HK$  (§. 218. *Arithm.*). Ergo spatium ponderis, ad spatium potentia; ut  $CB. DE. GH$ , ad  $CD. EG. HK$  (§. 167. *Arithm.*). & ideo ut potentia sustentans, ad pondus (§. 812). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

818. Quo major itaque potentia, eo velocior ponderis motus; quo illa minor, eo hic tardior.

THEOREMA CXCI.

819. Spatia ponderis atque potentia sunt in ratione composita revolutionum  
*E c* *rota*

*rota tardissime mota, ad revolutiones rota velocissime mota, & peripheria axis istius, ad peripheriam hujus.*

DEMONSTRATIO.

Sit numerus revolutionum rotæ tardissime motæ =  $m$ , numerus revolutionum velocissime motæ =  $n$ , peripheria axis in rota priore =  $a$ , peripheria posterioris =  $b$ . Cum in una revolutione spatium ponderis sit  $a$ , potentia  $b$ ; erit spatium ponderis, durantibus revolutionibus  $m$ , =  $ma$ ; spatium potentia, durantibus revolutionibus  $n$ , =  $nb$ . Est igitur spatium ponderis ad spatium potentia ut  $ma$  ad  $nb$ , hoc est in ratione composita revolutionum  $m$  &  $n$ , atque peripheria axis rotæ tardissime motæ  $a$  & peripheria rotæ velocissime motæ  $b$  (§. *Arihm.* 159). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

820. Cum spatia ponderis & potentia sint reciproce ut potentia sustentans, ad pondus (§. 817); potentia sustentans pondus, erit ad pondus; in ratione composita revolutionum rotæ tardissime motæ, ad revolutiones velocissime motæ, & peripheria axis istius, ad peripheriam hujus.

PROBLEMA CXXIX.

821. *Data peripheria axis rota tardissime mota, cum peripheria rota velocissime mota, & ratione revolutionum rotæ istius, ad revolutiones hujus, invenire spatium, quod potentia decurrit, donec pondus emetiatur spatium datum.*

RESOLUTIO.

1. Ducatur peripheria axis rotæ tardissime motæ in antecedentem & pe-

ripheria rotæ velocissime motæ in consequentem rationis.

2. Quærat ad hæc duo facta & spatium ponderis datum numerus quartus proportionalis: erit is spatium potentia quæsitum. (§. 819).

Sit e. gr. ratio revolutionum rotæ tardissime motæ, ad revolutiones rotæ velocissime motæ = 2 : 7, & spatium ponderis 30 pedum. Peripheria axis rotæ tardissime motæ, sit ad peripheriam velocissime circumactæ; ut 3, ad 8. Reperietur spatium potentia = 7. 8. 30 : 2. 3 = 7. 4. 10 = 280'.

PROBLEMA CXXX.

822. *Data peripheria rota velocissime mota, una cum numero revolutionum ejusdem, & ratione tam peripheriarum ejusdem rotæ atque axis rota tardissime motæ, quam revolutionum utriusque, invenire spatium ponderis.*

RESOLUTIO.

1. Ducatur peripheria rotæ velocissime motæ in numerum revolutionum ejusdem, factum erit potentia spatium.

2. Ducantur quoque in se invicem tam antecedentes, quam consequentes datarum rationum.

3. Quærat ad hæc duo facta & spatium potentia modo inventum numerus quartus proportionalis: erit is spatium ponderis quæsitum (§. 819).

E. gr. Sit peripheria rotæ velocissime motæ 10, ratio ejus ad peripheriam axis, ex quo pondus suspenditur, = 8 : 3, numerus revolutionum = 28: ratio revolutionum = 7 : 2. Reperietur spatium ponderis = 3. 2. 28. 10 : 8. 7 = 3. 10 = 30.

PRO-



PROBLEMA CXXXI.

823. *Data ratione peripheriarum rotæ velocissime motæ atque axis rotæ tardissime motæ, itemque revolutionum utriusque, una cum pondere, invenire potentiam, quæ id sustentare valet.*

RESOLUTIO.

- I. Ducantur in se invicem tam antecedentes, quam consequentes datarum rationum.
2. Quærat<sup>r</sup> ad factum antecedentium, factum consequentium, & pondus datum numerus quartus proportionalis; erit is potentia quæsitæ (§. 820).

Sit ratio peripheriarum 8 : 3, ratio revolutionum 7 : 2, pondus 2000. Reperietur potentia = 3. 2. 2000 : 8.7 = 12000 : 56 = 214 $\frac{2}{7}$ .

SCHOLIION.

824. *Non absimili modo pondus invenitur, si potentia detur, & ratio tam peripheriarum axis rotæ tardissime motæ & rotæ velocissime circumactæ, quam revolutionum utriusque.*

PROBLEMA CXXXII.

825. *Datis revolutionibus rotæ velocissime motæ interea absolvendis, dum tardissime mota semel in orbem redit, una cum spatio, per quod pondus elevari debet, & peripheria rotæ tardissime motæ, invenire tempus elevationi quæsitæ impendendum.*

RESOLUTIO.

- I. Fiat ut peripheria axis rotæ tardissime motæ, ad spatium ponderis datum; ita numerus revolutionum ro-

tæ velocissime motæ datus, ad quartum proportionalem, qui erit numerus revolutionum interea absolvendarum, dum pondus emittitur spatium datum.

2. Per experientiam determinetur numerus revolutionum rotæ velocissime, circumactæ, intra unius horæ spatium aut tempus datum quodcunque, absolvendarum.
3. Per hunc dividatur numerus quartus proportionalis paulo ante inventus. Quotus erit tempus elevationi ponderis impendendum. *Q. e. d.*

THEOREMA CXCII.

826. *Si potentia P ope trochleæ simplicis Q pondus sustentat, ita ut linea directionis utriusque tangat peripheriam; erit huic æqualis.* Tab.V. Fig.61.

DEMONSTRATIO.

Quoniam lineæ directionis potentiaæ atque ponderis peripheriam trochleæ tangunt, per *hypoth.* ad radios AC & CB perpendiculares sunt (§. 304. *Geom.*). Jam cum ad sustentationem præter rectam ACB partes reliquæ nil conferant, fitque centrum motus in C (§. 759); potentia erit ad pondus ut CB ad CA (§. 765). Sed CB = CA (§. 759). Ergo potentia ponderi æqualis. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

827. Trochlea igitur simplex, si lineæ directionis potentiaæ atque ponderum peripheriam tangunt, nec juvat, nec impedit potentiam, sed ejus directionem tantum mutat.

## COROLLARIUM II.

828. Utimur ergo trochlea, quoties potentia trahentis directio verticalis in horizontalem, aut sursum tendens in tendentem deorsum & contra mutari debet.

## SCHOLIUM I.

Tab. VI. Fig. 74. 829. Hoc ipso securitati trahentium sapisfime prospicitur. Fac enim pondus ingens sse ad insignem altitudinem attollendum ab operariis funem trahentibus. Quodsi contingat funem DE abrumpi & operariorum capitibus imminere pondus, in extremo vite periculo constituantur. Enimvero si ope trochleæ B directio verticalis AB in horizontalem BC mutatur, rupto fune DE nihil metuendum periculi.

## SCHOLIUM II.

830. Hæc ipsa mutatio lineæ directionis ope trochlearum in horizontalem hunc etiam præstat usum, ut, si potentia aliqua secundum unam directionem plus virium impendere possit, quam secundum alteram, vi maxima utamur, nec non ut potentiis uti liceat, quæ juxta datam directionem agere non possent. E. gr. equus non trahit secundum directionem verticalem, trahit tamen secundum horizontalem. Verticalis igitur tractio si mutatur in horizontalem, equus pondus attollere poterit.

## THEOREMA CXCIH.

Tab. VI. Fig. 75. 831. Si potentia in E applicata secundum lineam directionis BE, quæ trochleam in B tangit & funi AD parallela est, pondus F ex centro trochleæ C suspensum sustentet; ponderis subdupla est.

## DEMONSTRATIO.

Patet enim præter rectam AB partes trochleæ reliquas nihil conferre ad ponderis F sustentationem. Cum vero

trochlea sit circa centrum C mobilis (§. 759) in eo erit centrum motus. Et quia tam linea directionis ponderis CF, quam linea directionis potentia BE ad AB perpendicularis, *per hypoth.* erit potentia in E ad pondus F ut AC ad AB (§. 765). Est vero  $AC = \frac{1}{2} AB$  (§. 759). Ergo potentia ponderis F subdupla. *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

832. Cum trochlea cum unco suo & loculamento, quod in usu abesse nequit, una attollatur à potentia sursum trahente secundum directionem EB, ejus gravitas ponderi F addenda est.

## THEOREMA CXCIV.

833. Si potentia in B applicata ope polypasti sustentet pondus F ita ut omnes funes AB, HI, GF, EL, CD sint inter se paralleli, erit potentia, ad pondus; ut unitas, ad numerum funium HI, GF, EL, CD, quæ à pondere F trahuntur.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam funes omnes sunt inter se paralleli, adeoque à centris trochlearum suarum intervallo radiorum utrinque distant; nulla est ratio, cur à pondere F unus magis trahatur quam alter. Pondus igitur æquali vi omnes extendit adeoque æqualiter per eos dividitur, ita ut, si fuerint funes quatuor, perinde sit ac si tantum pars quarta ponderis ex fune CD suspenderetur. Potentia igitur in B applicata cum æqualis sit ponderi ex fune CD suspensio (§. 826); quartam

quartam non nisi ponderis partem in presenti casu sustentat, hoc est, in genere eam ad pondus rationem habet, quam unitas ad numerum funium, quos pondus F extendit. *Q. e. d.*

SCHOLIUM I.

834. Ne polyspastorum altitudo in nimium excrescat, si ex pluribus trochleis componantur; trochleæ ita junguntur, ut tam omnes superiores, quam omnes inferiores circa communem axem versatiles existant. Tum vero omnes inter se æquales esse debent, ut funes sint paralleli.

SCHOLIUM II.

835. Usus trochlearum insignis est in ponderibus elevandis, tum quod machina spatium exiguum occupet & facile huc illucque transportetur, tum quod insigni virium compendio pondus satis ingens attolli possit.

COROLLARIUM I.

836. Cum numerus trochlearum inferiorum & superiorum simul sumtarum æqualis sit numero funium inferiores sustentantium; potentia pondus F opẽ polyspasti sustentans, est ad pondus; ut unitas, ad numerum trochlearum inferiorum & superiorum simul sumtarum.

COROLLARIUM II.

837. Datis igitur trochlearum numero & potentia, facile invenitur pondus sustentandum; potentia nempe per pondus multiplicatur. Sit e. gr. potentia 50 librarum, numerus trochlearum 5; erit pondus 250.

SCHOLIUM III.

838. DECHALES (a) autor est, experientia constare, quod homo simpliciter solo insistens 150 libras elevare possit. Cum igitur 150 librarum potentia ope polyspasti ex 6 trochleis compositi 900 libras sustentare

(a) Mecha ic. lib. 4. prop. 4. Mund. Math. Tom. 2. f. m. 189.

possit; evidens est, quod unus homo ejus ope pondus 900 fere librarum attollere possit.

SCHOLIUM IV.

849. Mire multiplicantur trochlearum vires, si polyspasti plures conjunguntur, tum enim potentia in polyspasto uno ad attollendum pondus Q applicanda vicem subit ponderis F ex polyspasto altero appensi. Ponamus igitur pondus Q esse 1000 librarum & trochleas in unoquoque polyspasto quatuor; erit ergo pondus P ex altero polyspasto suspensum nonnisi quarta illius pars, nempe 250, consequenter potentia quarta pars hujus, hoc est, decima sexta totius,  $62\frac{1}{2}$ .

PROBLEMA CXXXIII.

840. Datis pondere atque potentia, invenire numerum trochlearum, ex quibus componendus est polyspastus.

RESOLUTIO.

Pondus per potentiam dividatur, quotus erit numerus quæsitus (§. 836).

Sit e. gr. pondus 600 librarum, potentia 150; erit numerus trochlearum 4; quarum omnium eadem diameter, si duæ in parte inferiore, duæ in superiore circa communem axem versatiles construantur (§. 834).

THEOREMA CXCIV.

841. Si potentia trochlearum ope movet pondus, erit spatium potentie, ad spatium ponderis; ut pondus, ad potentiam sustentantem.

DEMONSTRATIO.

Ponamus enim pondus F per pedem unum attolli: evidens est, funium omnium, ex quibus trochleæ inferiores cum pondere sustentantur, longitudinem intervallo unius pedis minui

E c 3 debe-

debere. Potentia igitur tot pedes extrahere debet, quot sunt funes trochleas inferiores sustentantes. Quare spatium ejus, est ad spatium ponderis; ut numerus funium trochleas inferiores sustentantium, ad unitatem, consequenter ut pondus, ad potentiam sustentantem (§. 833). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

842. Quo minor itaque potentia pondus ope polyspasti attollit; eo tardius id movetur: ut adeo virium compendium cum temporis dispendio conjungatur.

## THEOREMA CXCVI.

Tab.  
XVIII.  
Fig.  
178.

843. Si potentia in F applicata suspendit pondus E secundum directionem obliquam BD, & hujus directio sit itidem obliqua ED, linea vero directionis trochleæ DG per centrum C transit; erit potentia ponderi equalis, & tam ista, quam hoc ad vim, qua trochleæ in L retinetur, ut sinus anguli ADB, ad sinum anguli dimidii.

## DEMONSTRATIO.

Quoniam enim funes DF & DE quomodocunque extensi trochleam in B & A tangunt, si ex centro C ducantur radii AC & CB; erunt anguli ad A & B recti (§. 308. Geom.) & AD = DB (§. 325. Geom.). Quare cum etiam sit AC = CB (§. 40. Geom.); erit angulus ADC ipsi CDB equalis (§. 179. Geom.). Jam perinde est ac si mobile aliquod secundum directionem CD trahens trahatur a duabus viribus secundum directiones AD & DB trahentibus, illique aequipollentibus,

propter statum æquilibrii, ex hypothesis. Est adeo vis in F applicata, ad pondus E; ut sinus anguli ADC, ad sinum anguli CDB (§. 253). Sunt vero anguli æquales per demonstrata, adeoque & sinus eorum (§. 142. Geom. & §. 2. Trigon.). Quamobrem pondus potentiaæ æquale est. *Quod erat unum.*

Jam potentia, est ad vim trochleam secundum directionem DC sustententem; ut sinus anguli ADC, ad sinum anguli ADB; & pondus E, ad eandem vim; ut sinus anguli BDC, ad sinum anguli ADB (§. 253). Quare cum anguli ADC & BDC æquales sint per demonstrata, adeoque dimidii anguli ADB; erit vis trochleam sustentans in statu æquilibrii ponderum E & F, ad horum alterutrum; ut sinus anguli ADB, quem directiones obliquæ AD & BD interceptiunt, ad sinum anguli dimidii. *Quod erat alterum.*

## THEOREMA CXCVII.

344. Si ponderis G linea directionis DC per centrum trochleæ transit, & trochleæ trahatur secundum directiones obliquas ED & DF; erunt hæ vires inter se æquales; earum vero alterutra, ad pondus; ut sinus anguli à directionibus obliquis intercepti ADB, ad sinum anguli dimidii ADC.

## DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ theorematis præcedentis, ita ut præcedens vix unica immutata litera huc transcribi tota possit.

COROL-

COROLLARIUM.

345. Quoniam sinus anguli dimidii non est dimidius totius, seu, quod perinde est, simpli anguli sinus non est dimidius dupli (§. 325. *Analys. fin.*); in casu directionum obliquarum, potentia pondus, cujus directio per centrum trochleæ transit, sustentans non est ponderis dimidia.

SCHOLIUM.

346. *Ex duobus hisce Theorematis deduci possunt, quæ de trochleis in casu directionum obliquarum præterea demonstranda sunt, quemadmodum videre est apud VARIGNONIUM, qui hanc Staticæ partem diffuse pertractat (a).*

THEOREMA CXCVIII.

847. *Si pondus vel resistentia cochleæ superanda, fuerit ad potentiam, ut peripheria a potentia percurrentia, ad distantiam binarum helicum BI, potentia ponderi æquipollet.*

DEMONSTRATIO.

Celeritates, quibus moventur potentia & pondus, sunt ut spatia eodem tempore descripta, nempe ut peripheria a potentia percurrentia, ad distantiam helicum BI (§. 33) Sed vires mortuæ sunt in ratione composita celeritatum & massarum (§. 278). Quare cum potentiæ pondus æquale substitui possit (§. 763), fitque ut pondus potentiæ æquale, ad pondus elevandum aut deprimendum; reciproce ut peripheria a potentia percurrentia, ad distantiam helicum BI per hypoth. celeritates sunt ut massæ reciproce. Ergo vis potentiæ, est ad vim

ponderis; ut factum ex massa potentiæ in massam ponderis, ad factum ex massa ponderis in massam potentiæ (§. 159. *Arithm.*). Quare cum hæc facta æqualia sint (§. 207. *Arithm.*); vires æquales sunt. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

848. Cum peripheria a potentia percurfa in una cochleæ conversione sit spatium ejus, distantia autem duarum helicum BI respondeat spatium ponderis; erit hic quoque spatium ponderis, ad spatium potentiæ; ut reciproce potentia sustentans, ad pondus.

COROLLARIUM II.

849. Virium itaque compendium cum temporis dispendio denuo conjungitur.

THEOREMA CXCIX.

850. *Si distantia helicum BI minor fuerit, potentia ad eandem resistentiam superandam applicata minor est, quam si illa major fuerit.*

DEMONSTRATIO.

Est enim ut spatium potentiæ, ad helicum distantiam; ita pondus, ad potentiam (§. 847). Quod si ergo helicum distantia minuitur, spatium potentiæ ad eandem (§. 205. *Arithm.*) adeoque & pondus ad potentiam rationem majorem habet, quam ante. Est igitur potentia in casu posteriore minor, quam in priore (§. 206. *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA CC.

851. *Si cochlea mas intra fæminam quiescentem convertitur, minor potentia ad eandem resistentiam superandam requiritur, si scytala CD longior, quam si brevior.*

Tab. VI. Fig. 78.

(a) Nouvelle Mécanique, ou Statique Tom. 1. Sect. 3. p. 285. & seqq.

## DEMONSTRATIO.

Ut peripheria scytala CD tanquam radio descripta, ad helicum distantiam IK; ita resistentia superanda, ad potentiam (§. 848). Sed si scytala longior, major peripheria describitur, quam si brevior (§. 412. *Geom.*). Ergo in illo casu ad distantiam helicum IK (§. 203. *Arith.*), consequenter & resistentia superanda ad potentiam, majorem rationem habet, quam in hoc casu. Quare cum resistentia eadem maneat, *per hypoth.* potentia in casu posteriore major, quam in priore (§. 189. *Arithm.*)  
*Q. e. d.*

## PROBLEMA CXXXIV.

852. *Data distantia potentie à centro cochleæ CD, distantia helicum IK, & potentia in D applicata, determinare resistentiam superandam, vel hac data invenire illam.*

## RESOLUTIO.

1. Quærat peripheria circuli radio CD describenda (§. 429. *Geom.*).
  2. Quærat porro ad distantiam helicum, peripheriam modo inventam, & potentiam datam; vel ad peripheriam inventam, distantiam helicum IK, & resistentiam datam numerus quartus proportionalis: erit is in priore casu resistentia superanda, in altero potentia, qua ad resistentiam datam vincendam utendum (§. 847).
- E. gr. Sit distantia helicum 3", distantia potentie à centro cochleæ CD 25", potentia 30 librarum. Fiat

$$100 - 314 - 50''$$

$$\frac{50}{175 | 00}$$

Peripheria à potentia conficienda.

Fiat porro

$$3 - 157 - 30$$

$$\frac{1}{10 \quad 10} \quad (\text{§. 316. } \textit{Arithm.})$$

1570 pondus, cui resistentia æqualis.

## PROBLEMA CXXXV.

853. *Data resistentia, qua data potentia superari debet, cochleæ diametrum, distantiam helicum IK, & longitudinem scytalæ CD definire.*

## RESOLUTIO.

1. Distantia helicum & diameter cochleæ pro arbitrio assumantur, si ope scytalæ convertenda est cochlea intra matricem.
2. Fiat ut potentia data, ad resistentiam, quam superare debet; ita helicum distantia, ad quartum: quæ erit peripheria à scytala CD in conversione cochleæ describenda (§. 847).
3. Quodsi ergo quærat per semidiameter hujus peripheriæ (§. 429. *Geom.*); habebitur longitudo scytalæ CD.
4. Quodsi vero cochlea fœmina circa marem convertitur sine scytala, peripheria *per n.* 2. inventa eadem fere est, quæ cochleæ, adeoque semidiameter *per n.* 3. reperta cochleæ semidiameter.

E. gr. Sit pondus 6000 librarum, potentia 100, distantia helicum 1". Reperietur peripheria à potentia percurrenda 6000:100 = 60, adeoque longitudo scytalæ, si qua utaris, 1' 9": si nulla utaris, erit latus cochleæ fœminæ 19".

## COROL-

COROLLARIUM.

ab. 854. Quodsi peripheria cochleæ in IV. rectam BC transferatur, & in B perpendicularis BA erigatur altitudini cochleæ Fig. 9. æqualis, tandemque factis B 1, 1 2, 2 3 &c. distantia helicem æqualibus, ducantur rectæ C 1, D 2, E 3 &c. parallelogrammum circa cylindrum, cujus peripheria rectæ BC æqualis, circumvolutum helicem, qua cylindrus sulcandus, exhibebit.

DEFINITIO LXXXII.

855. Cochlea infinita seu perpetua vocatur, si rotam stellatam F circumagat.

COROLLARIUM.

856. Dum cochlea semel circumvolvitur; rota nonnisi unius dentis intervallo promovetur.

SCHOLION

857. Dicitur autem ideo infinita, quia sine fine circumagi potest.

THEOREMA CCI.

858. Si potentia manubrio cochleæ infinitæ AB applicata fuerit ad pondus, in ratione composita ex peripheria axis rotæ EH, ad peripheriam manubrio versato à potentia descriptam, & revolutionum rotæ F, ad revolutiones cochleæ CB; ponderi æqualebit.

DEMONSTRATIO.

Si peripheriam axis HE per numerum revolutionum rotæ stellatæ F multiplices, prodibit spatium ponderis G. Sed si peripheria manubrio AB descripta multiplicetur per numerum revolutionum cochleæ CB; factum est  
Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.

spatium potentia. Sunt igitur celeritates, quibus pondus & potentia moventur, ut ista spatia (§. 33). Quare cum pondus ad potentiam sit in ratione reciproca eorundem spatiorum (per hypoth. & §. 159. Arithm.); vires sunt in ratione composita earum, quas habet spatium ponderis, ad spatium potentia; & spatium potentia, ad spatium ponderis (§. 278), hoc est, ut factum ex spatium ponderis in spatium potentia, ad factum ex spatium potentia in spatium ponderis (§. 159. Arithm.), adeoque æquales (§. 207 Arithm.). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

859. Quoniam rotæ motus tardissimus (§. 569); exigua potentia ingens pondus moveri potest ope cochleæ infinitæ.

COROLLARIUM II.

860. Utimur adeo cochlea infinita, vel si ingens admodum pondus per exiguum spatium movendum, vel si motus tardissimus efficiendus.

SCHOLION.

861. Commodus igitur ejus usus est in horologiis. Unde HUGENIUS eadem utitur in automato planetario.

PROBLEMA CXXXVI.

862. Datis dentium numero, distantia potentia à centro cochleæ AB, & radio VI. axis HE, una cum potentia invenire pondus. Tab. Fig. 80.

RESOLUTIO.

I. Ducatur distantia potentia à centro cochleæ AB in numerum dentium:  
Ff factum

factum est ut spatium potentiæ interea absolutum, dum pondus conficit spatium peripheriæ axis æquale (§. 413. *Geom.* & 858. *Mech.*).

2. Queratur numerus quartus proportionalis ad radium axis, spatium potentiæ modo inventum, & potentiam; erit is pondus, quod potentia sustentare valet (§. 858).

E. gr. Sit  $AB = 3$ , radius axis  $HE = 1$ , potentia 100 librarum, numerus dentium rotæ  $F 48$ ; erit pondus  $= 3. 48. 100 : 1. 1 = 14400$ .

### SCHOLIUM I.

863. Apparet hinc, cochleam infinitam in amplificandis potentiarum viribus reliquas omnes antecellere.

### SCHOLIUM II.

864. Solent etiam cochleæ construi, quæ à rotis dentatis circumaguntur, cumque cochleæ à singulis dentibus semel circumvolvatur, motus efficitur velocissimus. Hinc ejus usus est in Machinis, quæ ad poliendum corpora aspera, veluti ad poliendum vitra, adhibentur.

### THEOREMA CCII.

Tab. V. Fig. 64. 865. Si potentia cuneo ita applicata, ut linea directionis  $CD$  sit ad latus  $AB$  perpendicularis, fuerit ad resistantiam superandam; ut  $AB$ , ad  $CD$ , resistantia æquipollet.

### DEMONSTRATIO.

Ponamus cuneum detrudi usque ad rectam  $GF$  ipsi  $AB$  parallelam: erit  $DE$  spatium potentiæ,  $FG$  spatium ponderis. Est vero  $DE : FG = DC : AB$  (§. 366. *Geom.*) Ergo celeritates potentiæ & ponderis sunt, ut  $DC$  ad  $AB$  (§. 33). Sed vires potentiæ ac ponderis sunt in ratione composita ipsorummet atque celeritatum (§. 278), potentia vero ad pondus ut  $AB$  ad  $DC$ , per hypoth. Ergo vires sunt ut  $AB. DC$  ad  $DC. AB$  (§. 159. *Arithm.*) adeoque æquales (§. 207. *Arithm.*) Q. e. d.

### COROLLARIUM I.

866. Potentia igitur dimidiæ resistantiæ æquivalens, est ad eam; ut  $AC$ , ad  $DC$ , hoc est, ut ad sinum totum, tangens anguli dimidii cunei  $ADC$  (§. 7. *Trigon.*).

### COROLLARIUM II.

867. Cum tangens anguli minoris minor sit quam majoris (§. 7. *Trigon.*), potentia ad dimidiam resistantiam majorem rationem habet, si angulus major, quam si minor (§. 203. *Arithm.*). Unde in priori casu major est quam in posteriori (§. cit), hoc est, cunei acutiores magis potentiæ vires amplificant quam minus acuti.

### SCHOLIUM.

868. Ex natura cunei reddenda est ratio omnium fere instrumentorum, quibus ad scindendum aut dividendum utimur: qualia sunt cultri, enses, secures, scissella aliaque instrumenta celatoria.



C A P U T X V I.

*De Potentiarum ad Machinas Applicatione.*

DEFINITIO LXXXIII.

869. **P**ER *Potentias animatas* intelligo homines & animantia bruta: per *inanimatas* vero aërem, aquam, ignem, gravitatem, elaterem.

DEFINITIO LXXXIV.

870. *Potentia* dicitur *trudendo movere*, si linea directionis tendit in plagam moventi oppositam.

DEFINITIO LXXXV.

871. *Potentia* dicitur *deprimere*, si linea directionis tendit à movente deorsum.

DEFINITIO LXXXVI.

872. *Potentia* dicitur *trahere*, si linea directionis tendit ad moventem, seu si mobile sequitur moventem vel ad eum accedit.

DEFINITIO LXXXVII.

873. *Potentia* dicitur *elevare*, si linea directionis tendit sursum, seu si mobile ascendit.

DEFINITIO LXXXVIII.

874. *Potentia animata* dicitur *calcando movere*, si pedibus deprimat vel protrudit mobile.

DEFINITIO LXXXIX.

875. *Potentia animata* *versando mo-*

*vere* dicitur, si eidem loco insistentis manus per peripheriam circuli movetur.

PROBLEMA CXXXVII.

876. *Machinam construere, quam Homo trudendo movere possit.*

Tab. VII.  
Fig. 81.

RESOLUTIO.

1. *Cylindrus ligneus* EF verticaliter erigatur, ita ut in punctis E & F circa axem EF versari possit.
2. In quatuor fere pedum altitudine infigatur vectis GI.

Quodsi enim Homo manibus continuo protrudat vectem GH, cylindrus EF circa axem suum circumagetur (§. 870).

SCHOLIUM.

877. Si *Machina ita simplex ad pondera attollenda adhibetur*, Ergata appellari solet.

COROLLARIUM I.

878. Quodsi GH fuerit temo cum libra; Equus vel Taurus *trahendo Machinam* movebit (§. 872).

Tab. VII.  
Fig. 82.

COROLLARIUM II.

879. Si annulo L alligetur funis, quem manibusprehendat Homo aut corpori suo circumplicet; *Machinam trahendo* movebit (§. 872).

Tab. VII.  
Fig. 81.

PROBLEMA CXXXVIII.

880. *Machinam construere, quam Homo versando movere possit.*

Tab. VI.  
Fig. 83.

## RESOLUTIO.

Ad cylindrum horizontalem applicetur manubrium vel rectangulum BDC, vel in arcum circuli incurvatum HI. Cum enim Homo manu circa centrum radium BD circumducit; versando Machinam movet (§. 875. *Mech.* & §. 131. *Geom.*).

## SCHOLIUM.

881. Si duo manubria eidem Machina applicantur, necesse est, ut situm habeant contrarium, quia dum unus manubrium ABDC deprimit, alter alterum EFGH attollere debet.

## PROBLEMA CXXXIX.

882. Machinam construere, quam Homo partim trahendo, partim deprimito movere possit.

## RESOLUTIO.

Tab.V. Talis est axis in peritrochio EABF.  
Fig. Quodsi enim scytalam A manu prehen-  
60. das & ad te adducas, trahendo axem EF movebis (§. 872): sed ubi ulterius eandem deorsum urgeas, deprimito eundem axem movebis (§. 871).

Tab. Loco peritrochii sufficiunt scytalæ  
VII. solæ GH & KI: quæ si duobus in lo-  
Fig. cis ad axem aptentur, duo homines  
84. una eandem partim trahendo, partim deprimito movebunt.

## SCHOLIUM.

883. Si Cylindrus horizontaliter positus & solis Scytalis instructus ad pondera attollenda aut attrahenda adhibetur, Súcua vocatur.

## PROBLEMA CXL.

884. Machinam construere, quam partim trahendo, partim protrudendo movere possit Homo.

## RESOLUTIO.

1. Vectis homodromus HFG circa punctum G mobilis trajiciatur per V. annulum F virgæ ferreæ EF, aut F virga alio quocunque modo ad eum firmetur.
2. Per annulum E alteri extremo ejusdem virgæ affixum transeat uncus rectangulus ABCD cylindro interrupto KL infixus.

Quodsi enim manu applicata vectem HG ad te adducas, radius AB semiperipheriam describet, sicque trahendo movebis Machinam (§. 872). Si vero manubrium ABCD, quod nunc partem sui BC tibi obvertit, in pristinum situm redigas; idem radius BA alteram semiperipheriam describet; sicque trahendo movebis Machinam (§. 870.)

*Aliter.*

Idem præstabis, si vectis HFG solo affigatur, ita tamen ut, quemadmodum ante, circa punctum G moveri libere possit: reliqua omnia eadem ratione se habeant, ut ante.

## SCHOLIUM.

885. Uncus interdum geminatur, ut alter sit altero superior & in contrarium positus: ita nimirum duo simul machinam agitare possunt motibus contrariis, uno scilicet trahente, dum alter trudit; & contra.

## PROBLEMA CXLI.

886. Machinam construere, quam Homo calcando movere possit.

RESO-

RESOLUTIO.

Construatur tympanum AB cum cylindro circa axem ejus mobile, & ejus altitudinis, ut Homo unus vel plures intra ejus ambitum stare possint. Hunc enim calcando cylindrum cum rota circumagent (§. 874).

*Aliter.*

Construi quoque potest rota ad horizontem inclinata AB, cujus inferior superficies dentibus, superior scalis infuitur: quamvis autem rationem plani inclinati habeat, ut adeo potentia non tota vi sua in eam agat (§. 261), major tamen distantia à centro motus esse potest, quam in verticaliter erectis.

*Aliter.*

b. I. Si pondus movendum sit exiguum & motus celer requiritur, vecte homodromo FH ad horizontem parumper inclinato & circa centrum F mobili utimur, qui virga ferrea HE cum manubrio BE connexus cylindrum GL circumducit, si pede deprimatur. Tornatores filum cylindro circumducunt perticæ flexili aut laminæ elasticæ KN alligatum. Quoniam potentia in G, adeoque in minori distantia, applicatur, motus est celer, utut potentia major esse debeat resistentia in H vincenda (§. 765. 772).

PROBLEMA CXLII.

887. *Machinam construere, quam Equus vel Bos trahendo movere possit.*

RESOLUTIO.

Utendum est cylindro verticaliter Tab. erecto ND cum temone HG 8 mini- VII. mum pedum, ut supra (§. 775). Præf. Fig. 82. tat autem temonem esse longiorem, quam brevior, ne vertigine capiat brutum in peripheria circuli continuo decurrens.

PROBLEMA CXLIII.

888. *Machinam construere, quam Equus vel Bos calcando movere possit.*

RESOLUTIO.

Construendum est tympanum AB Tab. subscudibus transversis munitum, & su- VIII. per eo stabulo includatur Equus vel Fig. Bos per solum pertusum pedibus pos- 91. terioribus rotæ insistens, subscudemque ad horizontem inclinatam protrudens.

*Aliter.*

Si pondera minora moveri debent, veluti veru cum assa, tympanum eum in modum construi solet, quo majora (§. 885), ab Hominibus intra eorum ambitum consistentibus impellenda, & Canis intus collocatur; tam pedibus, quam corporis sui mole idem circumagens.

SCHOLION.

889. *Cum Machina hætenus descriptæ omnes, ad Axem in peritrochio revocentur, nisi quod nonnullæ earum sint ex Vecte & Axe in peritrochio compositæ, si attendatur ad lineam directionis Potentiæ & inde determinetur distantia à centro motus (§. 229), virium aestimatio haud difficulter instituitur (§. 765. 792. 793).*

## PROBLEMA CXLIV.

Tab. 890. *Machinam construere, qua a*  
VIII. *pondere descendente moveatur.*

Fig.

92.

## RESOLUTIO.

1. Circa cylindrum AB horizontaliter positum funis circumvolvatur, &
2. idem circa trochleam C circumducatur in magna a pavimento distantia.
3. Ejus denique extremitati alligetur pondus Q, quod dum descendit, cylindrum AB circumagitat.

## COROLLARIUM I.

891. Quo major est altitudo, per quam pondus Q descendit, eo diutius durat motus.

## SCHOLIUM.

892. *Hinc horologia, quæ a pondere descendente moventur, in editis turribus collocantur, aut, si index circumagendus fuerit exiguus, in suprema conclavis parte.*

## COROLLARIUM II.

893. Ut pondus Q lento gradu descendat, nec motus ejus acceleretur (§. 70); cylindri AB motus esse debet quam tardissimus, consequenter pondus ad movendam Machinam adhiberi nequit, nisi in Machinis compositis, ubi motus in principio tardus, sed per plures Machinæ partes propagatus fit celerior (§. 528).

## COROLLARIUM III.

894. Cum adeo pondus in minori a centro distantia applicandum sit, ibi potissimum huic potentia est locus, ubi non magna est resistentia.

## COROLLARIUM IV.

Tab. 895. Quodsi pondus P ex polyspastro VIII FH suspendatur, pondus celerius cylindrum LM circumagere potest. Dum enim Fig. per spatium peripheriæ cylindri descendit, & funes fuerint quatuor; cylindrus quater circumvolvitur, cum sine polyspastro non nisi semel circumageretur. Sed

quia funis HI a quarta tantum ponderis Q parte trahitur (§. 833.), vel etiam a minore (§. 843); perinde est ac si quarta tantum ejus pars, vel etiam quarta minor, sine polyspastro ad Machinam agendam adhiberetur. Utendum igitur est polyspastro, ubi spatium non satis altum descensui ponderis conceditur.

## PROBLEMA CXLV.

896. *Pondere appenso adjuvare potentiam moventem.*

## RESOLUTIO.

1. Ponderi movendo E alligetur funis EF & circa trochleam G circumducatur.
2. Alteri ejus extremo alligetur pondus D movendo fere æquilibratum.

Quodsi ergo exigua vis applicetur ad funem HD, pondus E movebit.

## PROBLEMA CXLVI.

897. *Machinam elateris vi movere.*

## RESOLUTIO.

1. Lamella chalybea AB altero sui extremo axiculo CD afferruminata in gyros contorqueatur, & thecæ cylindricæ, cui altero sui extremo afferruminata, includatur.
2. Huic affigatur catenula, altero suo extremo axi coniformi GH alligata. Quoniam enim laminæ vis elastica continuo minuitur, sub initium utique utpote fortius trahens in minori a centro motus distantia GL applicanda; sub finem vero, ubi segnius trahit, in majori IK (§. 792); quo obtinetur, ut potentia hæc in se sat inæquabilis, ad motum tamen regularem, qualis est horologiorum portatiliū, adhiberi possit.

SCHO-

SCHOLIION

898. *Equidem figura fusi GH non Conica, sed alia Conoidica esse debebat, & celeberrimus DE LA HIRE (a) in ejus constructionem inquirat. Sed cum hypotheses assumere cogatur a rigore veritatis alienas; ipsemet non diffitetur, regulam quam invenit, praxi non satis exacte respondere. Ceterum vi elastica animantur quoque automata culinaria.*

DEFINITIO XC.

899. *Rota directa est quæ ab aqua desuper labente & intra cavitates palmularum collecta movetur. Rota vero retrograda vocatur, quæ ab aqua celeriter profuente & in infimam rotæ palmulam impetum faciente circumagitur.*

COROLLARIUM I.

900. Quoniam aqua rarissime ea rapiditate fertur ut rotas molares circumagere possit; ex alto præcipitata impetum acquirat necesse est (§. 79. 58;).

COROLLARIUM II.

901. Cum itaque corpus grave tamdiu deorsum tendat, quamdiu centro Telluris propius fieri potest; locus, ubi rotæ collocantur, centro Telluris vicinior esse debet quam is, unde aqua in eas derivatur.

COROLLARIUM III.

902. Et cum aquæ fluentes successive cadant, a latice seu origine earundem nonnisi exigua declivitas, nempe quam sufficere experientia loquitur, ad distantiam 100 pedum minimum  $\frac{1}{4}$  unius pedis, ad summum dimidii, concedenda; reliqua

(a) *Traité de Mécanique* prop. 72. p. 233. & seqq.

autem proxime ante rotam in præcipitium mutanda.

COROLLARIUM IV.

903. Inquirendum itaque quanto depressior sit locus, ubi rotæ molares constituantur, quam origo aquarum.

DEFINITIO XCI.

904. *Ars libellandi est Ars determinandi declivitatem aquarum seu generalius, quanto intervallo punctum aliquod sit Terræ centro propius quam alterum.*

COROLLARIUM.

905. Quoniam lineæ horizontalis puncta singula a centro Telluris æqualiter distant (§. 207): aquæ libellantur si lineæ horizontalis in datorum locorum superiore inventa usque ad inferiorem continetur, & ejus a superficie aquarum distantia utrobique investigetur. Distantiarum enim differentia declivitatem metitur.

DEFINITIO XCII.

906. *Libella est instrumentum, quo invenitur lineæ horizontalis, & ad datum quodcunque intervallum continuatur.*

PROBLEMA CXLVII.

907. *Libellam construere.*

RESOLUTIO.

1. Ex centro semicirculi C suspendatur pondusculum H.
2. Diametro AB insignantur unci E & F.

Tab. VIII. Fig. 96.

Quodsi enim funis per uncas E & F ita extendatur, ut filum CD semicirculum appensum bifariam fecet; lineam horizontalem apparentem representabit.

DEMONSTR.

## DEMONSTRATIO.

Quia pondusculum H filum CD extendit: erit CD linea directionis ejus (§. 17). Et quia semicirculum bifariam fecat *per hyp.* ad AB perpendicularis est (§. 143. 78. *Geom.*). Ergo AB est linea horizontalis apparens (§. 215). *Q. e. d.*

*Aliter.*

- Tab. VIII. Fig. 97. N. 1.
1. Regulæ Orichalceæ AB afferruminentur dioptræ & inferius in C lamina cochlea E instructa.
  2. Laminæ vero huic afferruminentur prisma excavatum FG cum stylo GHIK bifurcato.
  3. Inferius afferruminetur annulus cum ansula, ut, si opus fuerit, pondus appendi possit.
  4. Paretur denique fulcrum semicirculare aut semi-Ellipticum NO superius in P cochlea PQ instructum, ut instrumentum cruribus IK, in cuspides acutas desinentibus, in punctis S & T insistere queat.

Quodsi enim fulcimentum mediante cochlea ad arborem aut baculum erectum firmetur, instrumentum eidem insistens vi gravitatis in eum situm sese disponet, ut regula cum dioptris sit horizonti parallela (§. 215).

*Aliter.*

- Tab. VIII. Fig. 98.
- RICCIOLUS propria experientia fretus hanc libellam (a) commendat.
1. Super regula AB pedum 12 aut ad summum 20 canaliculo excavato inferatur tubus CABD ex laminis ferreis stanno obductis, vel cupreis

(a) *Geograph. Reformatæ lib. 6.c.26.§.8.f.230.*

paratus, cruribus CA & BD ad angulos rectos reclinatis.

2. In C & D afferruminentur cochleæ orichalceæ fœminæ; quibus aliæ mares inferantur, ut tubus quam arctissime claudi possit.
3. Glutine quodam in cochleis maribus firmentur tubi vitrei EC & FD ad AB normales.
4. Denique in G afferruminetur globus orichalceus, isque cavus, ne gravitate molestus sit, & intra matricem fulcro affixam ita reponatur, ut libere huc illucque libella moveri & in situ eodem, si necesse sit, immota servari possit. Orificia vero tuborum E & F obturentur, ne aqua effluere possit inter transferendum.

Quodsi enim instrumentum aqua repleas & tubum ita constituas, ut aqua utrobique in tubis vitreis eandem altitudinem AH & BI attingat; erit HI linea horizontalis apparens; cum fluidorum quiescentium partes omnes eandem à centro Telluris distantiam habeant: alias enim remotiores vi gravitatis ruerent versus locum inferiorem, qui conceditur.

5. Consultum quoque est, ut ad tubos BD & AC afferruminentur dioptræ K & L ad juvandam collineationem; quamvis etiam sine iisdem per utriusque aquæ superficiem collineatio in omni situ tubi fieri possit.

*Aliter.*

1. Tubus vitreus, cujus longitudo IL ultra pedis longitudinem excrefcere potest,

T. I. F. 9

potest, glutine quodam firmetur intra tubulos orichalceos IP & QL, fitque tubus in altero extremo L apertus, sed obturaculo quodam ex subere parato & capite Orichalceo instructo claudendus.

2. Tubus ita paratus firmetur super regulam ST, ad quam etiam
3. Firmentur dioptræ M & N
4. Infra hanc regulam firmetur alia minor CD circa axiculum in C mobilem, mediante cochlea G nunc attollenda, nunc deprimenda.
5. Intra has regulas sit lamina elastica H ex orichalco aut chalybe parata, ut instrumentum tanto accuratius ad situm horizontalem disponi possit.
6. In medio denique regulæ inferioris afferruminetur matrix seu cochlea foemina, ut libella ad fulcrum quoddam, quoties ea utendum, firmari possit.

Quodsi tubum vel aqua, vel spiritu vini colorato repleas, ita tamen ut pauculum aeris remaneat, bullulam in superficie fluidi formaturum; ascendet bullula in partem superiorem, si tubus fuerit inclinatus, sed datum situm e. gr. in F tuebitur, si horizontalis fuerit. Levia enim sursum ascendunt, quantum datur.

SCHOLION I.

907. *Alia libellarum genera à viris celeberrimis PHILIPPO DE LA HIRE, ROEMERO, HUGENIO, PICARDO inventa describuntur à modo laudato PICARDO (a). Ad*

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

(a) *Traité du Nivellement* c. 2. p. 37. & seqq.

*huc alia dederunt viri CL. COUPLETUS (b) & HARTSOEKERUS (c). Ego eas descripsi, quas mea instrumentorum suppellex mihi suppeditavit. Omnium fere, quæ passim profertant, descriptionem dedit JACOBUS LEUPOLDUS (d).*

SCHOLION II.

908. *Prima libellarum, quam exhibui, non satis fida. RICCIOLUS enim jam observavit, facile aberrari 5 minutis, immo gradu dimidio, nisi ingens fuerit. Sed moles usum molestum reddit. Facile tamen medela paratur, si scilicet loco semicirculi utamur regula AB trium pedum cum altera longiore CD quatuor pedum ad angulos rectos priori insistente: quæ si dioptris instruatur & libere suspendatur, fulcro conveniente adhibito, exactissimam libellam constituit.*

Tab:  
IX.  
Fig.  
100.

SCHOLION III.

909. *Solent quoque à nonnullis in libellationibus præsertim longioribus dioptrarum loco adhiberi telescopia: sed multa circumspeditione opus est, ut rite ad instrumenta applicentur. Enimvero ea de re in Astronomia ex principis Opticis dicitur.*

PROBLEMA CXLVIII.

910. *Rectificare libellam.*

RESOLUTIO.

Ut certus sis, libellam esse revera Tab. in situ horizontali IX.

I. Instrumento in G collocato collineatio fiat in C centrum tabulæ in Dd erectæ. Fig. 102.

G g

2. Li.

(b) *Memoires de l'Academie Royale des Sciences* A. 1699. p. 172.

(c) In *Miscellan. Berolinens.* p. 328. & in *actis Eruditorum* A. 1712. p. 34.

(d) In *Theatro Horizontostatico sive libellationis*, quod est pars quarta *Theatri Statici universalis*.

2. Libella, quæ cum in finem duplicibus dioptris instrui debet, invertatur & denuo collineatio fiat in tabulam eandem.
3. Quodsi idem punctum C fit in linea visuali; libella convenientem habet situm; sin in puncto altiori aut depressiori desinat, paulisper attollenda vel deprimenda est (quo spectant regulæ cum cochleis in libellis paulo ante descriptis), donec linea visualis punctum inter duas collineationes medium attingat.

## DEMONSTRATIO.

Tab. IX. Fig. 202. Ponamus instrumentum esse in linea horizontali AC & visu attingi punctum C. Si situs instrumenti mutetur, ut B in A & A in B constituatur, cum linea horizontalis non sit nisi unica, adhuc linea visualis AB. ultra dioptras continuata in puncto C terminabitur. *Quod erat unum.*

Quodsi instrumentum non sit horizonti parallelum, linea visiva in centro ejus G secabit horizontalem AB, eritque  $HGB = AGF$  (§. 156. *Geom.*), & collineanti per F & H occurret punctum altius D. Quodsi libella invertatur, ut H in *b* & F in *f* constituatur; erit  $bGA = BGf$  (§. 156. *Geom.*). Est vero  $bGA = HGB$ , quia instrumentum, situ respectu lineæ horizontalis immutato, inversum. Ergo  $BGf = HGB$ . Quare cum porro, ob rectam Dd, in quo sunt puncta D & d, ad lineam horizontalem perpendicularem anguli recti ad C æquales sint (§. 245. *Geom.*); erit  $CD = Cd$  (§. 267. *Geom.*), hoc

est, linea horizontalis cadit in punctum C intra duo collineata D & d medium. *Q. e. d.*

## PROBLEMA CXLIX.

911. *Aguas libellare.*

## RESOLUTIO.

1. Eo in loco, ubi origo declivitatis T statuitur, ope ponderis ex fune suspensi exploretur, quanto intervallo F superficies aquæ à ripa ablit. I
2. Idem fiat altero in loco, ubi declivitatis terminus statuitur.
3. Erectis in A & B baculis ad horizontem perpendicularibus cum tabulis D & C nigro colore tinctis, sed cruce alba notatis, atque ope cochleæ in quocunque situ ad baculos firmandis, libella EF collocetur in P.
4. Tabula utraque D & C nunc attollatur, nunc deprimatur, donec per EF collineanti punctum medium, in quo lineæ albæ sese mutuo interfecant, occurrat.
5. Investigentur exactissime altitudines punctorum D & C, nempe AD & BC atque in schedula notentur.
6. Tum instrumento in Q & baculo ex A in M translato, fiat ut ante collineatio in O & P; notenturque altitudines OB & PM. Et ita operatio continuetur, donec terminum declivitatis M attigeris.
7. Addantur in unam summam altitudines AD & BO &c. itemque BC & MP &c. & priori adjiciatur altitudo ripæ in origine declivitatis A, posteriori vero altitudo ripæ in fine declivitatis M.

8. Quod-



8. Quodsi enim aggregatum posterius e priori auferas, relinquetur declivitas aquarum a termino A usque ad alterum M fluentium, respectu lineæ horizontalis apparentis.

9. Quare si tractus AM fuerit longus; quod ab ea subtrahendum est, ut habeatur declivitas respectu lineæ horizontalis veræ, invenitur per Problema 39 (§. 216): aut sine novo calculo in tabula superius exhibita (§. 227). Sit e. gr.

altit. ripæ AL 64	altit. ripæ MN 58
AD 34"	BC 57"
BO 68	PM 102
Summa 166	Summa 217
	166

declivitas LI 51

Sit LK 900 pedum, erit declivitas LI mulstanda 3 lineis, ut relinquatur vera 5'0"7".

DEMONSTRATIO.

Ducantur IN & LK, itemque OQ parallelæ; erit  $DQ = OC$ ,  $PN = QI$ ,  $DL = BC$ ,  $OB = QL$  (§. 226. *Geom.*). Ergo  $DA + AL + OB = QL + BC$  &  $PM + MN + BC = QI + BC$ , consequenter  $QI + BC - QL - BC = LI$  Q. e. d.

SCHOLIUM.

912. Quoniam in hac operatione facile aberrari potest, consultum est, ut libellatio bis instituat, nempe primum a termino A usque ad terminum M, deinde retro à termino M usque ad terminum A.

DEFINITIO XCIII.

913.  *Sectio fluminis* est planum ad angulos rectos secans aquam in alveo fluentem cujus fundus horizontalis, ripæ autem inter se parallelæ.

COROLLARIUM I.

914. Quoniam linea directionis particularum aquæ tanquam corporis gravis est ad horizontalem perpendicularis (§. 215), & fundus alvei atque superficies aquæ horizontalis, ripæ vero inter se parallelæ, per *hypoth.* latera plani secantis erunt ad basin perpendicularia & inter se parallela, consequenter opposita æqualia (§. 226. 238. *Geom.*), adeoque sectio rectangulum est (§. 100. *Geom.*).

COROLLARIUM II.

915. Invenitur adeo, si latitudo alvei in profunditatem aquæ ducatur (§. 375. *Geom.*).

COROLLARIUM III.

916. Sunt etiam sectiones diversæ in ratione composita latitudinum, alveorum & profunditatum aquarum (§. 376.).

SCHOLIUM I.

917. *Cum aquæ fluentes nunc tabescant, nunc intumescant, eo potissimum tempore sectionem fluminis dimetiri debet molendina exstructurus, quo mediocrem habet altitudinem.*

SCHOLIUM II.

918. Quodsi aquæ copia non abundamus, consultum est, ut aqua in stagno coligatur inde per alveum in rotas deducenda, ne minimum ejus pereat. Querendi etiam sunt fontes in vicinia siti & aquæ ex iis in stagnum derivandæ.

SCHOLIUM III.

919. Cum ex superioribus constet, in conflictu corporum non modo habendam esse rationem massæ, sed etiam celeritatis, qua corpus in aliud quiescens impingens movetur (§. 532); in molendinis aquarum vi agitandis considerandæ est & sectio earum &

declivitat̄is in præcipitium mutanda, unde celeritas ejus dependet. Quodsi declivitas fuerit insignis, plurimorum scilicet pedum, e. gr. 10 aut 12, & sectio aquæ exigua, rota construatur directa: ast si declivitas exigua & sectio ingens, rota utendum est retrograda.

PROBLEMA CL.

920. Aquam fluentem in rotam directam deducere.

RESOLUTIO.

1. Ut declivitas in præcipitium mutari possit, aqua per alveum aut canalem ex ligno constructum deducatur ad rotam, & distantia 100 pedum concedatur declivitas  $\frac{1}{4}$  unius pedis, ne aqua nimis segniter fluat.
2. Rota ratione decente constructa sub canali ita constituatur, ut aqua deorsum ruens per planum declive in capsulam ab axe secundam irruat, ipsa vero aquæ effusæ superficiem non attingat, ne motus retardetur.

COROLLARIUM I.

921. Quodsi a declivitate integra subducatur pars, quæ aquæ concedenda, ut intra alveum suum fluere possit & in rotam præcipitanda impetum acquirat, nec non ut aqua effusa defluat; diameter rotæ relinquitur.

COROLLARIUM II.

922. Ut aqua omnis in palmulas incidat, eas canale latiores esse præstat.

PROBLEMA CLI.

923. Rotam directam construere.

RESOLUTIO.

Totum artificium huc redit, ut situs palmularum determinetur, id quod sequentem in modum fieri solet.

1. Semidiametro rotæ (quæ est dimidia altitudo ejus) in scala modica sumta describatur circulus AIKA & semidiametro minore quæ differat a priori quantitate latitudinis orbium AE, quibus palmulæ insiguntur, alius.
2. Recta AE dividatur in tres partes æquales, ita ut DE sit  $\frac{1}{3}$  AE.
3. Ex centro per D describatur circulus in tot partes æquales dividendus, quot palmulis instruenda est rota.
4. Applicata regula ad duo divisionis puncta H & F, tertio intermedio D relicto, ducatur recta HI &
5. in H excitetur perpendicularis HG. Recta HI situm palmulæ unius; recta vero HG situm alterius determinat. Et eodem modo situs binarum quarumcunque aliarum palmularum determinatur.

PROBLEMA CLII.

924. Aquam ad rotam retrogradam deducere.

RESOLUTIO.

1. Ne aqua superflua in rotam incidat & tota ejus declivitas, parte demta, quæ ipsi ut fluere possit concedenda, in præcipitium mutari queat; fossa effodiatur a flumine, ex quo aqua deducitur, tanto intervallo distans, quanto conceditur, tum ut aqua impetu in rotam factò promptius defluat, tum ne aqua intumescens ripis fossæ atque molendino facile damnum inferat.

2. Ne

2. Ne autem aqua intumescens agros vicinos inundet, riparum sufficiens esse debet altitudo. Consultum quoque est, ut fundus fossæ arena complanetur.
3. Quo aquæ sufficiens copia in fossam deducatur, per transversum fluminis excitandus est agger, tantæ altitudinis, quanta permittitur ad aquam citra damnum alterius in motu suo retardandam.
4. In fine fossæ trabs horizontaliter sternatur, quæ *arboris molinariæ* fert nomen, ejus superficies cum fundo fossæ sit in eodem plano, ut aqua omnis in rotas præceps dari possit.
5. Super arbore molinaria perpendiculariter erigantur duæ trabeculæ tertia transversa jungendæ & canaliculis excavandæ, ut tabula nunc elevata, nunc depressa, aqua a rota arceri, vel ad eandem demitti possit.
6. Ut igitur aqua tabula depressa impedita, quo minus ad rotam præcipitetur, aliorsum fluere possit, & ne aqua intumescens ripas fossæ egrediatur; alicubi fossæ molinariæ a latere jungenda est alia, ad arbitrium claudenda & aperienda, aquæ superflue transitum concessura.
7. Alveus denique declivis in fine fossæ excitetur profunditatis AB, quanta est declivitas in præcipitium mutanda, utque in rotam directe impingat aqua, superficies per quam delabitur sternenda est juxta arcum DC ex centro rotæ E, intervallo radio ejus paulo majore, descriptum.

8. Quodsi fossæ molinariæ locus nullus concedatur, agger per transversum fluminis prope rotam construendus, ut aqua in motu retardata in alveum derivetur.

#### COROLLARIUM I.

925. Si ea fuerit fossæ latitudo, ut duabus rotis juxta se invicem constituendis locus concedatur; duo quoque construendi sunt alvei cum tertio intermedio, vel a latere posito, per quem aqua superflua a molendino arceatur.

#### COROLLARIUM II.

926. Quodsi declivitas aquæ in præcipitium mutanda ea fuerit, ut ejus dimidium, vel subtripulum &c. rotæ agitandæ sufficiat; intra unum alveum duæ vel tres &c. rotæ constituuntur, declivitate inter eas divisa, ita tamen ut præcipitium majus sit ante posteriores, quam anteriores rotas.

#### SCHOLIUM I.

927. Aggeres excitantur, palis in fundum fluminis adactis, quorum anteriores altiores, posteriores humiliores, differentia altitudinis primorum & ultimorum existente aequali altitudini, ad quam aquam in motu retardare licet. Spatia palis interjecta arena & sabulo replentur & superius stratum paratur vel ex asseribus, vel ex lapidibus. Fundus fluminis ante aggerem ad 6 vel 7 pedum distantiam complanatur, ne aqua vim ipsi inferre possit.

#### SCHOLIUM II.

928. Rotarum retrogradarum constructio nihil habet difficultatis: palmularum enim situs determinatur per radios ex centro rotæeductos, sive intrâ Orbem collocentur, sive in fronte constituentur. Altitudo illarum variat, quemadmodum & aquæ sectio.

*Minoris altitudo (quam Germani ein Staber-Rad appellant) est 12 pedum; majoris vero (quæ nobis ein Panster-Rad nuncupatur) ordinariè 16 pedum. In illa distantia palmularum digitorum 12 & 13; in hac 16 vel ad summum 19. Sectio aquæ in illa duorum pedum quadratorum; in hac pedum quinque. Quodsi palmule ad peripheriam rata sint perpendiculares, ultra eam eminentes (quales rotas Straub-Ræder dicimus); altitudo rotæ & distantia palmularum variat pro diversa fundi declivitate & sectionis magnitudine.*

## PROBLEMA CLIII.

929. *Vi venti machinam movere.*

## RESOLUTIO.

1. Axi infigantur virgæ AD & CB se mutuo ad angulos rectos in E secantes, quarum longitudo 32 pedum fieri solet.
2. Ad has virgas ex scandulis construuntur alæ figuram trapezii parallelarum basium habentes, quarum latitudo HI sit 6 circiter pedum, inferior FG per radios ex centro E ad I & H ductos determinatur.
3. Ita autem alæ aptandæ sunt, ut FG cum axe FL efficiat angulum  $54^\circ$ .
4. Denique ut alæ vento semper obverti possint; tota machina circa axem NK versatilis esse debet, ut ope vectis PQ huc illucque versari atque in omnes plagas dirigi queat.

*Aliter.*

Tab. Alii turriculam ex lapidibus vel la-  
IX. teribus construunt, ita ut tantummo-  
Fig. do tectum cum axe alato versatile exis-  
106. tat. Eum scilicet in finem

1. Turricula annulo ligneo cingitur & in eo canaliculus effoditur, in cuius fundo hinc inde trochleæ orichalceæ ita immittuntur, ut exiguum segmentum ultra eum promineat.
2. Intra canaliculum alius annulus reponitur, cui tectum superstructum.
3. In exteriori circa turriculam area defiguntur unci ferrei G &
4. Cum annulo mobili connectuntur trabes AB & FC, quarum altera priorem tecto firmitus affigit.
5. Denique in D alligetur funis trabi AD in F circumducendus & altero sui extremo Axi in peritrochio aut Sucleæ alligandus.

Quodsi enim funis per uncum G ducatur & Suclea convertatur, trabs AB ad illum adducitur, consequenter alæ in plagam ipsi oppositam diriguntur.

## SCHOLION I.

930. *Prior modus nostris in oris usitatus, posteriore in Batavia utuntur. Et posterior quidem priori præstat, quia alæ construi possunt majores, consequenter Machinæ à vento agitate, ubi major resistentia superanda. Quodsi vero ad hanc vincendam minores sufficiunt, prior ideo antefertur, quia sumtibus longe minoribus exstruitur.*

## SCHOLION II.

931. *De machinis vi ignis movendis cogitarunt THOMAS SAVERY (a) AMONTONS (b),*  
DIO-

(a) In Transact. Anglican. n. 252. p. 228.

(b) Memoires de l'Academie Royale de Sciences. Anno 1697. edit. Bat. p. 154.

DIONYSIUS PAPINUS (c) & deinceps alii (d): sed valde vereor, ne inventa ipsorum praxi parum respondeant. Hactenus cum successu eadem non usi sunt, nisi automata culinaria huc referre velis, quæ à fumo agitantur: in aliis casibus vis motrix nimis sumtuosa.

SCHOLION GENERALE.

932. Quæ hactenus de potentiarum ad Machinas applicatione diximus, cum unice in finem proposuimus, ut in Machinis inveniendis usui essent, quoniam earum structura externa, ex parte etiam interna inde pendet. Mathematica horum omnium tractatio & plus temporis requirit quam huic operæ impendere conceditur, cum pleraque adhuc in-

desideratis habeantur, nec ad scopum nostrum apprime facere videtur. Neque operas manuaras hic exponere visum est, cum eadem ad Matthesin non spectent, sed ab eadem supponantur. Matthesis enim in dime-tiendis iis occupatur, quæ sub mensuram cadunt; manuaras vero artes non docet: quamvis utile judicemus, ut à Theoria ad Praxin progressurus earum non sit ignarus, ne (de quo vulgo conqueruntur) in Theoria pro veris habeantur, quæ non succedere in Praxi experientia loquitur. Ne igitur in hunc scopulum impingas, nihil assumendum est tanquam arte parabile, quod arte parari posse non jam ante experientia cognoveris aut ex iis, quæ experientia constant, legitima consequentia deduxeris.

CAPUT XVII.

De Resistentia in Machinis, seu frictione.

DEFINITIO XCIV.

933. **F**ric-tio est resistentia superfici-ciei, per quam inceditur.

SCHOLION.

934. Ita perspicacissimus LEIBNITIUS (e) frictionem desinit, qui primus hanc materiam distincte evoluit.

DEFINITIO XCV.

935. Corpus dicitur asperum, in cuius superficie eminentiæ & cavitates alternantur.

(c) In Arte nova ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandam.

(d) Stephani Switzer Introduction to a general systeme of Hydrostatiks and Hydrauliks c. 28. 29. p. 325. & seqq.

(e) in Miscellaneis Berolinens. p. 307.

DEFINITIO XCVI.

936. Superin-cessus radens est, si punctum idem superincedentis lineam in superficie describit, per quam inceditur.

E. gr. Talis est superin-cessus parallelepipedo super plano protrusi.

DEFINITIO XCVII.

937. Superin-cessus volvens est, si punctum contactus continuo mutatur.

E. gr. Talis est rotæ in curru tam respectu axis, quam respectu soli.

DEFINITIO XCVIII.

938. Motus mixtus est, si volutio-

ni.

ni admiscetur motus radens elementaris seu instantaneus.

SCHOLIUM.

939. *Hunc motum distinctius explicat LEIBNITIUS (a) ; sed nos eodem nunc non utemur.*

THEOREMA CCIII.

940. *Si superficies, per quam inceditur, & superficies corporis, quod per illam incedit, fuerint aspera, frictio oritur.*

DEMONSTRATIO.

Cum enim in superficie corporis asperi eminentiæ & cavitates ubique alternentur (§. 933); si tam superficies corporis incedentis, quam ea, per quam inceditur, asperæ fuerint, eminentiæ vel sunt intra cavitates deprimendæ, vel prorsus abradendæ, vel eminentiæ unius ex cavitatibus alterius attollendæ. Sed nihil eorum fieri potest sine motu, nec motus produci sine vi impressa. Vis igitur, qua corpus movetur, vel tota, vel ex parte his effectibus impendenda, adeoque motui corporis resistitur (§. 20), consequenter frictio oritur (§. 933). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

941. Quo asperiores itaque sunt superficies, eo resistentia major.

SCHOLIUM I.

942. *Asperitas estimanda est non modo ex numero eminentiarum abradendarum vel deprimendarum; verum & ex difficultate eas abradendi vel deprimendi, nec non ex mole cavitatum. Fieri namque potest, ut eminentiæ*

(a) In Miscellan. Berolinens. p. 312. 313.

*aliæ minori vi abradantur, vel deprimantur, aliæ autem non nisi majori vincantur.*

COROLLARIUM II.

943. Si corpora frictione continuata politiora fiunt, frictio minuitur.

SCHOLIUM II.

944. *Id ipsum experientia clarissime loquitur.*

COROLLARIUM III.

945. Superficies adeo partium in Machinis, quæ se mutuo tangunt, quantum fieri potest, poliri debent.

COROLLARIUM IV.

946. Quoniam tamen corpus nullum adeo poliri potest, ut omnis asperitas tollatur, microscopiis testibus, consultum est (quod & dudum in praxi receptum) ut partes se mutuo tangentes oleo aut alio unguine illinantur.

THEOREMA CCIV.

947. *Dum pondus corporis incedentis superficiem ejus ad superficiem, per quam inceditur, apprimit; frictio augetur.*

DEMONSTRATIO.

Dum enim pondus corporis incedentis superficiem ejus apprimit ad superficiem per quam inceditur; eminentiæ unius tanto profundius in cavitates alterius descendunt, adeoque majori vi inde rursus attolluntur (§. 265), vel etiam deprimuntur aut abraduntur. Major itaque vis requiritur ad hæc obstacula vincenda, quam si non adeo valide corpus incedens apprimeretur. Unde patet, quod appressio ex pondere superincedentis augeat resistentiam superfici-

ficiæ, per quam inceditur (§. 20), hoc est, frictio augetur (§. 933). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

948. Crescente adeo pondere corporis incedentis aut insistentis, frictio crescit.

SCHOLIUM.

949. *Hinc libra exiguis ponderibus onusta exigua vi ab æquilibrio dimovetur; pluribus autem onusta, majori vix dimovetur.*

THEOREMA CCV.

950. *Si linea directionis corporis incedentis ad superficiem, per quam incedit, fuerit obliqua; frictio intenditur.*

DEMONSTRATIO.

Si enim linea directionis corporis incedentis ad superficiem, per quam inceditur, obliqua; vis, qua movetur, versus superficiem, per quam inceditur, nititur; adeoque perinde est, ac si superficies incedentis à pondere ad eam apprimeretur. Sed appressio ex pondere incedentis frictionem intendit (§. 947). Ergo eadem intenditur, si linea directionis incedentis ad superficiem, per quam inceditur, fuerit obliqua. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

951. Quoniam icus perpendicularis, est ad obliquum; ut sinus totus, ad sinum anguli incidentiæ (§. 552): sinus autem anguli majoris major est, minoris contra minor (§. 2. *Trigon.*); nisus corporis superincedentis in superficiem, per quam inceditur, consequenter frictio major est, quo propius ad perpendicularum accedit linea directionis corporis incedentis.

SCHOLIUM.

952. *Hæc denuo experientia valde consona sunt & præcipue in dentibus rotarum observantur, ut sæpissime hac de causa prorsus frangantur.*

COROLLARIUM II.

953. Tollitur adeo hæc frictio, si linea directionis corporis incedentis fuerit parallela superficiæ, per quam inceditur: tum enim nisus superincedentis in eam nullus est.

THEOREMA CCVI.

954. *Si superincessus volvens, longe minor est frictio, quam si radens extiterit.*

DEMONSTRATIO.

Sit regula dentata AB & super ea Tab. incedat rota DE, cujus dentes sint ad IX. peripheriam normales. Quodsi super- Fig. incessus fuerit radens, dens F, qui re- 107. gulam tangit, lineam rectam in superficie regulæ describere debet (§. 936). Cum adeo ipsi resistat dens regulæ H, progredi omnino nequit, nisi hic frangatur, aut deprimatur, vel dens rotæ F curvetur aut prorsus abradatur. Idem ergo cum contingat, si corporis cujus-que alterius asperi super superficie aspera incedentis superincessus radens fuerit; frictio omnis locum habet, quæ ab asperitate superficiæ oriri potest. Enimvero si rota ED super regula provolvatur, tum dens regulæ H incessui ejus non amplius resistit, nisi quatenus ex cavitate F supra eminentiam dentis H attollendus. Idem cum valeat, si corpus quodcumque asperum super aspera superficie volvitur, frictio minor est, si superincessus volvens, quam si radens extiterit. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

955. Ne igitur in Machinis frictio magnam vis motricis partem absumat, cum cura dispiciendum est, ut, quantum fieri potest, nulla pars Machinæ alteram radat, quin potius una super altera volvatur.

## COROLLARIUM II.

Tab. IX. Fig. 108. 956. Hinc consultum est, ut axiculi cylindrorum non (quod vulgo fieri solet) matrici concavæ, sed rotulis A, B, C, D circa axiculos versatilibus imponantur.

## SCHOLION I.

957. Suasit hoc dudum PAULUS CASATUS (a) & experientia confirmat, quantum virium hoc artificio lucremur. Quodsi metuas, ne axiculus cylindri satis tuto duobus rotulis A & B incumbat, tertiam addere licet.

## SCHOLION II.

958. Hinc etiam, si trochlea circa centrum mobilis, tractioni minus resistitur, quam si eadem fixa foret. Eadem est ratio, cur rota curruum circa axem versatiles sint.

## SCHOLION III.

959. Patet quoque ratio, cur trahæ difficillime trahantur in plateis lapidibus stratis; facillime autem, si nive via obtegatur, ut planiciem probe politam exhibeat.

## SCHOLION IV.

960. Ex eodem fonte OLAUS ROEMERUS, cum Parisiis commoraretur, quamvis non sine subsidio Geometriæ sublimioris deduxit, figuram dentium in rotis Epicycloidalem esse debere: id quod post eum quoque ostendit PHILIPPUS DE LA HIRE (b); sed, quod dolendum, hætenus in praxin recepta non est.

(a) Mechanicorum Lib. 2. c. 1. p. 130.

(b) Memoires de Mathematique & de Physique, p. 51. & seqq.

## COROLLARIUM III.

961. Quoniam rotulæ circa axiculum fixum versatiles volvuntur, dum in superficie corporis alterius incedunt; earum ope superincessus radens in volventem transmutari potest, quotiescunque datur.

## SCHOLION V.

962. Ita in Machinis, quæ ferrarum reciprocatione ligna secant, reſtangi lignei, cui ferræ inferuntur, latera istiusmodi rotulis instrui deberent. Minuta enim frictione, plures ferræ una secare possent. Similiter brachia pistillorum attollendorum CD rotulis instruire juvat, ut super pinnulis curvis EF axis E sine frictione incedant. Pinnulis figuram Epicycloidalem assignat Cl. DE LA HIRE (c).

## COROLLARIUM IV.

963. Et quia axes curvati superincessum plane tollunt (S. 597); iis rotarum loco utendum, quotiescunque datur.

## SCHOLION VI.

964. Equidem nec hic cessat frictio in E & G. Enimvero ea perexigua est, si comparetur cum frictione, quæ ex superincessu rotarum oriri solet.

## SCHOLION VII.

965. Equidem AMONTON, regulam universalem dedit computandi vim ad frictionem in dato quolibet casu superandam requisitam (d): sed cum omnem frictionem à sola appressione ex pondere superincedentis derivet, ex antecedentibus satis apparet, quod proposito satisfacere nequeat.

## CAPUT

(c) Loc. cit. p. 72. & seqq.

(d) Memoires de l'Academie Royale des Sciences, A. 1699. p. 260. & seqq. edit. Bat.



C A P U T XVIII.

*De Machinis Compositis.*

DEFINITIO XCIX.

966. **M**achina composita est, quæ ex pluribus simplicibus tanquam partibus constat.

SCHOLIION.

967. Machinarum compositarum nullus est numerus. Construuntur autem tum ad onera ingentia attollenda, tum ad motus varios producendos, qui in usum vitæ humanæ redundant. Omnia nimirum hominum opera a Machinis perfici possunt, ad quæ idem semper motus vel continuo, vel juxta certam periodum repetitur. Ita ad frumentum in farinam conterendum rotatione continua saxi molaris opus est: unde hæc opera Machinis demandatur. Similiter ad contusionem granorum, ex quibus oleum exprimitur, pistillorum elevatione continuo iteranda opus est: hinc a Machinis contusio ista perficitur. Ut arbor prostrata in asseres disseccetur, continua ferrarum reciprocatione opus est. Quare denuo Machinarum vires ad hunc usum transferuntur. Nostrum equidem non est, Theatrum quoddam Machinarum in præsentia aperire; sed ut compositionis earundem quandam ideam animo comprehendant tyrones, unum saltem alterumque exemplum in medium afferemus, additis regulis quibusdam generalibus, quibus de Machinis inveniendis solliciti juvantur.

PROBLEMA CLIV.

968. Dato opere perficiendo, Machinam componere.

RESOLUTIO.

I. Ante omnia opus est, ut operis perficiendi notionem distinctam & quantum licet, adæquatam habeamus: ad

quam quomodo perveniatur, ex Commentatione de Methodo §. 8 & 10 colligitur, & alibi distinctius explicavi (a). Scilicet singula, quæ in opere perficiendo, ulla ratione distingui possunt, tum sigillatim expendenda, tum inter se conferenda.

2. Ex hac operis perficiendi idea colligendum, quali motu opus sit ad id præstandum, quod requiritur: qui est effectus a Machina producendus.
3. Ex eadem quoque constabit quantitas virium ad resistantiam in motu superandam requisitarum: ubi
4. Inprimis consideranda est frictio ex superincessu mobilis oriunda & de remediis mechanicis capite superiori expositis deliberandum.
5. Antequam vero consilium ineatur, quibusnam Machinis simplicibus combinatis motus desideratus produci queat; de potentia Machinam agitata cogitandum est, quoniam pro ejus conditione variat interna quoque Machinæ structura. Quam primum igitur certus fueris de potentia ad Machinam applicanda: externa ejus structura statim constabit ex Capite decimo quarto.
6. Unde quantitate virium, quæ ad motum ultimum producendum requiruntur, una expensa, vi Capitis undecimi non difficulter determinantur

H h 2

tur

(a) In Philos. ration. seu Logica §. 678.

tur Machinæ simplices in composita combinandæ.

Tab.X. E. gr. Sit construenda Machina, qua onus  
Fig. 110. ingens O in altum attolli possit, & quæ  
commode de loco in locum transferri  
queat. Cum onus attollendum sit corpus  
grave, statim apparet, lineam directionis  
esse ad horizontem perpendicularem. Talis  
ergo construenda est Machina, quæ pondus  
sursum trahat secundum lineam directionis  
ad horizontem perpendicularem. Quoniam vero  
pondus oneris non determinatur, sed saltem  
ingens supponitur; Machinam construere  
sufficit, qua homo pondus aliquod viribus  
suis longe superius elevare possit, tempore  
tamen non nimis longo. Et quia Machina  
compendiosa esse debet, ut commode huc  
illucque transferri possit; moveri optime  
poterit versando, adeoque axe incurvato  
ABC instruenda (§. 175). Enimvero ut  
pondus ingens moveri possit, axis curvatus  
solus non sufficit, sed cum rota dentata  
GF axi horizontali GH infixa combinandus.  
Denique ut funis pondus sursum trahens  
circa cylindrum inferiore loco constitutum  
circumvolvi queat, supra trochleis I & K  
ad axem GH adducendus. Constat ergo  
Machina ex axe GH cum rota stellata GF,  
& axe dentato LC atque incurvato CBA  
duabusque trochleis I & K. Trochleæ ad  
virium incrementum nil conferunt, sed  
sola rota FG & axis incurvatus CBA. Est  
nimirum seposita frictione potentia  
sustentans ad pondus, in ratione composita  
radii axis dentati LC ad BC, & radii axis  
GH ad semidiametrum rotæ F (§. 812).

#### PROBLEMA CLV.

969. *Machinam construere, qua ingens  
admodum pondus ad altitudinem  
mediocrem attolli potest.*

#### RESOLUTIO:

Tab.X. I. Erigatur vectis AB, cujus centrum  
Fig. III. C, & in D infigatur uncus, cui onus  
N. I. attollendum G alligari possit.

2. Alteri vectis extremo B affigatur annulus E, qui cochleæ foem. n. F seu matriæ afferruminetur.
3. Matriæ inseratur cochlea HI, quæ Ergatæ IL circa axem suum in L mobili firmiter insistet.

Quodsi enim mediantibus scyrtalis M, N, O, P, cylindrus IL cum cochleâ HI circumagitur; matrix EF descendit & vectem AB deprimit, consequenter pondus G attollit.

Quod vero exigua admodum vi pondus admodum ingens attolli possit, patet ex Theor. 178. (§. 765) & Theor. 198. (§. 847). Est nimirum potentia ad pondus in ratione composita AC ad CB, si AB fuerit horizontalis, & distantia duarum helicum in cochleâ ad peripheriam scyrtala descriptam. Sit e. gr. distantia helicum  $3''$ , longitudo scyrtalæ  $3'$ , erit peripheria, quæ eadem describitur  $942'''$ , adeoque potentia in N est ad resistentiam in E ut 3 ad 942, hoc est, ut 1 ad 314. Sit jam AC : CB = 1 : 3 : erit ergo resistentia in E  $\frac{1}{3}$  ponderis G, consequenter potentia ad scyrtalam N applicata  $\frac{1}{942}$  ponderis. Quodsi singulis scyrtalis singulæ potentia applicentur; erit una earumdem  $\frac{1}{3768}$  ponderis.

#### COROLLARIUM.

970. Si cochleâ cum Ergatâ remota finis ET alligetur in B, pondus G similiter cum virium compendio, attolletur, quamvis multo minore (§. 765).

#### SCHOLIUM.

971. *Machina posteriore utuntur ad onera ex navi una in alteram contiguam transportanda.*

PROBLE-

## PROBLEMA CLVI.

972. *Molam acuminariam construere, hoc est, Machinam, qua instrumenta ferrea aut chalybea acuuntur.*

## RESOLUTIO.

1. Cotes aquariæ A & B axi CD curriculo F instructo infigantur ad acuendum.
2. Axi alteri EG infigantur duo orbis lignei H & I, super quorum primo H arena politura inchoatur, super altero vero I smyride continuatur. Addantur duo alii minores K & L corio superinducti, super quibus smyridis pulvere subtiliori politura perficitur.
3. Utrique axi DC & GE infigatur etiam rotula M in peripheria crena instructa, ut loro circa utriusque peripheriam circumducto una alteram movere possit.
4. Ad curriculum F circumagendum adhibeatur rota stellata N, quæ communem cum rota molari PQ, e. gr. retrograda, palmulas in fronte gerente, axem habet, ac pro diverso aquæ impetu pluribus vel paucioribus dentibus instruitur, ut motus cotium sit satis celer.
5. Denique cum cotes continuo madidæ esse debeant; ad rotam molarem applicanda sunt duo haustria, quæ aquam in canalem ST effundunt per declivem ex V & Z in cotes delabentem.

## SCHOLIUM.

973. *Solent quoque mola unice ad poliendum construui, tumque orbis axi GE infixi*

*aptantur ad primarium DC, ipsi vero GE, alii minores inseruntur.*

## COROLLARIUM.

974. Si tam aquæ copia, quam declivitas sufficiens fuerit; cotes axi rotæ molaris infigere licet.

## PROBLEMA CLVII.

975. *Molam frumentariam ab aqua agitandam construere.*

## RESOLUTIO.

1. Construatur rota molaris sive directa, sive retrograda, prout casus tulerit, nunc major, nunc minor, prout major vel minor aquæ copia & declivitas fuerit. Sit e. gr. rota retrograda AB 18 pedum, eaque 33 palmulis instructa. Tab. X. Fig. 112.
2. Eiusdem axi infigatur rota DE, cuius diameter illius subdupla, vel etiam major, pro diversa aquarum moventium vi, & quæ dentes, in nostro casu numero 48, in plano gerat.
3. Per curriculum FI 6, 7, 8, immo 9 bacillis instruendum, pro diversa celeritate, qua rota molaris movetur, virga transeat ferrea, cuius capiti pyramidem fere truncatam figura sua referenti incumbat *meta* (seu lapis molaris superior) *catinum* (seu lapidem inferiorem) fixum 4 fere digitis circumcirca superans atque in medio excavatus, ut frumentum inter lapides demitti & comminutum ad circumferentiam propelli possit.
4. Ex scala suspendatur infundibulum *pg* mediante Axe in peritrochio *sz* pro arbitrio attollendum ac deprimendum. Inde

5. Bacillus propendeat in foramen metæ annulo ferreo cum unco M munitum, quo illum propellens infundibulum agitet, ut frumentum in lapidem molarem demittatur.
6. Infundibulo fere insistat capsula H pyramidem truncatam referens & tam superius, quam inferius aperta, cui frumentum indatur.
7. Lapidem cingantur cista cylindrica, spatio inter eam & metam nonnisi duorum digitorum relicto.
8. Arbor farinaria NO prope contactum metæ atque catini foramine pertundatur, ut per id frumentum contritum in sacculum tremulum ex peculiari linteo (nostrates *Beuteltuch* appellant) confectum devolvatur & farina surfure separetur.
9. Sacci, cujus latera loris affluta, extremis vero P & Q annuli ferrei infuti sunt, longitudo in tres partes æquales dividatur & in fine partis tertie affuantur annuli coriacei *a* & *b*, qui infigantur bacillis ad cylindrum *cd* circa axem mobilem affixis.
10. Eidem cylindro *cd* affigatur forcipula *ef*, intra quam ope clavi lignei firmetur regula *hf* alteri *ik* cylindrulo *lm* circa axem suum versatili infixæ in *i* incumbens.
11. Curriculo FI sub angulo obliquo infigantur tres bacilli æqualiter à se invicem distantes, qui regulam *ki* impellentes alteram *hf* protrudunt & sic saccum attollunt, mox iterum relapsurum, regula *ik* in situm pristinum recedente.
12. Quodsi aquæ impetus tantus fuerit, ut molam duplicem circumagere possit; axi rotæ molaris infigitur rotæ stellata LM quæ duas rotas radiatas NO ab utroque latere adjacentes impellit, quarum saltem unam ab uno latere in schemate exprimere libuit: reliqua omnia sunt ut ante. Ratio diametri rotæ LM ad diametrum rotæ molaris AB sit ut 1 ad 2, ad diametrum vero radiatæ ut 3 ad 2: quamvis eidem strictè inhærendum non sit, si aliæ circumstantiæ aliam suadeant.

## SCHOLIUM I.

976. Rotarum demensiones dentiumque numeri variant pro varietate impetus aquæ in rotam molarem impingentis, quæ partim ab ejus sectione, partim à declivitate, per quam ad illam delabitur, pendet. Constat vero ex superioribus (§. 792), rotas fieri debere majores, ubi minor fuerit aquæ vis; minores vero, ubi hæc major. BOECKLERUS (a) diametrum rotæ vel solo impetu fluminis sine declivitate in præcipitium mutata, vel ab exigua copia aquæ per declivem delapsa agitata fieri præcipit 48 pedum, numerum palmularum 86; diametrum rotæ stellatæ LM 18 pedum, numerum dentium 180, numerum bacillorum in rota DE 60. CASATUS (b) annotat in Pado communiter longitudinem rotæ molaris AB esse cubitorum 10, diametrum totam cubitorum 6, inferiorem rotam DE diametrum habere cubitorum  $5\frac{1}{2}$ , dentes 108 plano infixos & curriculum FI in fusos 9 distinguere uncias 6 aut 7, in diametro cubitos  $2\frac{1}{2}$  FRANCISCUS PHILIPPUS FLORINUS (c) rotæ retro-

(a) In der Haus- und Feld-Schule part. 3. Class. 6. p. 500. & 501.

(b) Mechan. lib. 5. c. 7. p. 560.

(c) Im klugen Haus-Vater lib. 2. c. 42. f. 308. & seq.

retrogradæ ab aqua rivuli 4 vel 5 pedum declivitatæ agitandæ diametrum constituit 18 pedum, numerum palmularum 30 vel 36, latitudinem palmularum 10 vel 14 digitorum, altitudinem unius pedis. Rotæ dentatæ DE dentes assignat 72, curriculo bacillos 6, 8 vel 9, prout rota externa vel tardius, vel celerius movetur. In fluvio Halam Saxonum alluente rotarum retrogradarum molam duplicem circumagentium altitudo non excedit 16 pedes.

COROLLARIUM.

977. Quodsi situs rotæ verticalis LM mutetur in horizontalem & dentes in plano I. infigantur; rotæ vero molari substituatur g. vectis veluti in Ergata, reliquis omnibus 3. manentibus ut ante: molendinum habebimus manuarium, à duobus hominibus in loco superiore deambulantibus commode agitandum. Est vero longitudo vectis ex una parte 8 pedum, ex altera totidem pedum, rotæ dentatæ LM diameter  $8\frac{1}{2}$  pedum, alterius DE 10 pedum & 2 digitorum, numerus dentium in priore 72, in posteriore 40, numerus bacillorum in curriculo 6.

SCHOLION II.

978. Multis adhuc modis aliis molæ manuariæ construi possunt. Eminent vero inter eas quoddam genus, quod vi exigua moveri potest, super incessu rotarum penitus sublato: Id igitur ut describatur, è re nostra iudicamus.

PROBLEMA CLVIII.

979. Molam manuariam construere.

RESOLUTIO.

1. Construantur duæ rotæ AB & CD, quarum diameter 5 vel 6 pedum, & inferior ad conservandum impetum plumbo infuso oneretur.
2. Per centrum utriusque defigatur axis incurvatus HG per vectes IK &

IL convertendus, ut supra docuimus (§. 884).

3. In rotæ superioris AB ambitu canaliculus excavatur, ut funis ceratus commode circumduci queat: qui idem
4. Circumducendus circa peripheriam alterius rotulæ minoris MN infixi virgæ ferreæ PQ, cui eidem
5. Infigatur crux ex brachiis ferreis constans RSTV, quibus singulis affixum est pondus plumbeum, ad impetum conservandum.
6. Reliqua fiant, ut in problemate præcedente (§. 979).

SCHOLION

980. Axiculi rotarum ferrei sustentaculo orichalceo incumbere debent, quod & attritum minuit, & ad durabilitatem conducit. In omni autem molarum genere sustentaculum virgæ ferreæ, cui lapis molaris incumbit, ita construendum, ut ad arbitrium attolli ac deprimi possit, prout usus postulaverit. Major enim lapidum distantia requiritur, si grana integra conterenda, quam si jam contrita in farinam convertenda.

PROBLEMA CLIX.

981. Molam jumentariam construere. Tab. VII.

RESOLUTIO.

1. Erigatur cylindrus verticalis DN, cujus diameter 14 digitorum, cum temone GH quatuor virgis ferreis ad rotam firmando. Immo temo geminari potest.
2. Circa eundem cylindrum construat-ur rota stellata IK, cujus diameter  $14\frac{1}{2}$  pedum, 16 lignis transversis (quale IL) quorum latitudo 7, crassities 2 digitorum, connectenda, & adhuc alijs

Fig. 82.

aliis 16 (quale IO) quorum longitudo 7 pedum, latitudo 4 & crassities  $8\frac{1}{2}$  digitorum firmanda.

3. Dentes ex ligno quercino probe sicco parati ita infigendi, ut axes eorundem distent  $4\frac{1}{2}$  digitis.
4. Curriculi P diameter 22 digitorum & numerus fusorum seu bacillorum II, quorum longitudo 18, diameter duorum digitorum.
5. Reliqua fiant ut in Probl. 157. (§. 975).

*Aliter.*

Tab. XI. Fig. 113. Quodsi rota adeo ingens non commoda visa fuerit, construere licet minorem, cujus diameter nonnisi 7 pedum,  $1\frac{1}{2}$  digitorum, dentes 64 in plano gerentem. Hæc rota ut superius (§. 975) circumagit aliam rotam radiatam NO, cujus diameter  $21\frac{1}{2}$  digitorum, numerus bacillorum 16. Cum eadem eidem axi infigitur rota DE, cujus diameter 6 pedum, dentes 72 in plano gerens & curriculum FE 6 fusis instructum circumagens. In rota prior crassities dentis 2, in posteriore  $1\frac{1}{2}$  digitorum. Longitudo temonis 5 pedum.

PROBLEMA CLX.

982. *Molam alatum construere.*

RESOLUTIO.

Structuram externam docuimus supra (§. 929). Interna constat ex rota dentes in plano habente atque curriculo, ut in molis frumentariis, quæ ab aqua moventur (§. 975). Numerus dentium in rota dentata est 72, vel 80: numerus fusorum in curriculo 9 vel 8. Quælibet ala est pedum 30 vel 32.

PROBLEMA CLXI.

983. *Molam oleariam construere.*

RESOLUTIO.

Mola olearia ita construenda, ut tum materiam contundere, tum ex confusa atque tosta oleum exprimere valeat. Utrumque igitur ut præstetur,

1. Axi rotæ molaris infigatur rota stelata AB, quæ circumagat
2. Rotam radiatam AE axi EF insertam, cui hinc inde pinnulæ G infiguntur pistilla HI attollentes.
3. Pistillorum bases itemque fundi vasorum K in trunco LM excavatorum lamina ferrea obducantur, ut semina lini, rapicia, amygdalæ, nuces, nuclei prunorum, vel quæcunque detur materia, probe contundantur, pistillis proprio pondere relabentibus.
4. In parallelepipedo LM excaventur duo minora, quorum basis inferior sit perforata, ut oleum expressum inde in vasa subjecta distillare possit. Intra ea reponitur materia confusa & in aheno super igne tosta, panno ex pilis contexto involuta atque inter duas tabulas P & Q, in quarum una hemisphærium cavum, in altera convexum, comprehensa. A parte postica intruditur cuneus acie sua prominens in H & ab antica infigitur alius N.
5. Ut cuneus alter N vi adigi sicque oleum exprimi possit, malleus P cum veste PQ cylindro RS circa axem suum mobili affigatur, mediante ligno transverso TV ad cuneum dirigendus.

6. Ad

6. Ad eundem cylindrum RS in opposito latere aptetur forceps *ab*, intra quem continetur contus *bd* cum pinnula *ef*, quæ à pinnula cylindro EF infixa deprimitur & malleum P attollit proprio pondere cum impetu in cuneum N mox relabentem.

COROLLARIUM I.

984. Quoniam rota radiata AE cum stellata AB ideo adhibentur, ut cylindrus EF celerius circumagatur; si aquæ sufficiens copia atque declivitas, vel numerus pistillorum exiguus fuerit: ipsi cylindro EF rota molaris ab aqua agitanda infigi potest. Et tales sunt molæ metallica, quæ malleis ferreis 57 librarum pistillis 12 pedum affixis materiam metallicam crudam comminuunt.

COROLLARIUM II.

985. Si vis aquæ sufficiens adfuerit, duo cylindri pinnulis suis pistilla elevantes à rota stellata circumagi solent.

COROLLARIUM III.

986. Et quia perinde est, quæcunque materia contundatur; eadem manet structura si mola construatur, ad materiam pulveris pyrii contundendam. Sint e. gr. pistilla 16 in duas series distributa: rotæ molaris ab aqua convertendæ altitudo erit 18 pedum, numerus palmularum 48, quantum latitudo 2 pedum, altitudo unius; diameter rotæ AB 7' 3", numerus dentium 60; longitudo cylindri EF 15' 10", diameter 14"; diameter rotæ radiatæ 3' 2", numerus fusorum 24; integra pistilli altitudo 9' 2", crassities & latitudo 4". Sed rota externa calcando movetur (§. 886), diameter ejus esse potest 16 pedum, rotæ stellatæ AB 5 ½, numerus dentium 60, numerus fusorum in rota radiata 20; longitudo cylindri EF 16 pedum, numerus pistillorum 9.

SCHOLIUM I.

987. *Structura molarum chartariarum eadem est, quam in Corollario primo (§. 984) exposuimus, nisi quod tudicula AB ferro obducta in B vecti homodromo DC circa baculum EF mobilem ad angulos rectos infigantur, à pinnulis axi rotæ molaris infixis in C impellendo, & per canalem vel ope antlia, vel ope hausrorum ad rotam molarem applicatorum aqua continuo in linamenta contundenda deduci debeat.*

Tab. XI. Fig. 116.

SCHOLIUM II.

988. *Cum structura mola olearia prorsus convenit structura trituratoria, qua anno 1700. Erzæ in ditione Electorali Brunsvicensi inventa & cum insigni fructu ad frumenta straminibus ejicienda adhibetur, nisi quod peculiari artificio opus sit ad flagella dextre applicanda & rota verticalis addatur. Describitur in Miscellaneis Berolinensibus (a).*

PROBLEMA CLXII.

989. *Machinam construere, quæ materiam pulveris pyrii sine pistillis conterat.*

RESOLUTIO.

1. Rota dentata AB communem axem cum aquaria habens impellat radia. Tab. XI. tam CD, ad cujus axem
2. Aptentur duo cylindri plumbei lamina orichalcea obducti, aut (quod melius judicatur) marmorei DE quorum diameter 6, 7 vel 8 pedum, crassities 6 digitorum. Fig. 117.
3. Cylindri, axe HI circumacto, vel in vase cylindrico orichalceo, si plumbei fuerint, vel super saxo marmoreo ad profunditatem duorum digitorum excavato, si marmorei fuerint, incedant.

I i

SCHO.

## SCHOLIUM I.

990. Ideo ex orichalco aut potius è marmore machina construitur, quia ex hac materia per frictionem nulla scintilla eliciuntur, unde non sine ingenti damno in aliis molendinis materia pulveris pyrii ignem concipere solet.

## SCHOLIUM II.

991. Caterum cylindris verticaliter erectis utuntur etiam ad materias alias contendas.

## PROBLEMA CLXIII.

992. Molam ferrariam construere.

## RESOLUTIO.

Tab. XII. In molis ferrariis duplex motus considerandus, quorum altero ferra recipitur, altero vero lignum ad ferram continuo promovetur. Ad motum ferrarum producendum

1. Axi rotæ aquariæ, cujus diameter 17 vel 18 pedum, infigatur rota stellata AB, cujus diameter sine dentibus 8 pedum, numerus dentium 72. Hac
2. Incedat super rota radiata CD 12 vel 8 (pro diversa vi aquarum) bacillis instructa & communem axem habente cum rota verticillari EF, cujus diameter 4 vel 5 pedum.
3. Alteri hujus axis extremo infigatur axis ferreus curvatus G, eique mediante bacillo GH jungatur tendicula lignea IK cum ferra HL, intra duas pilas ita constricta, ut non nisi fursum protrudi ac deorsum trahi possit.
4. Ad motum ligni efficiendum construendus est currus *abcd*, cujus longitudo longitudini ligni secandi proportionata, e. gr. 18 pedibus

major, latus vero, alterum dentibus instructum.

5. Ut ergo lignum, uncis ferreis ad currum firmatum, ad ferram continuo promoveatur, axi *gh* infigatur baculus *ik*, cujus alterum extremum *k* inditum est annulo ad tendiculum IK firmato, & prope alterum extremum forceps *m* contineat furcam *ml* usque ad dentes rotæ ferratæ *ln* extensam, cujus diameter duorum pedum.
6. Porro axi rotæ ferratæ, ferreæ infigenda est alia radiata *pq* 6 bacillis instructa, qua circumagitur rota stellata *rs*, dentes 36 & axem communem cum alia radiata *tv* habens, quæ 6 bacillis instructa currum propellit.

## SCHOLIUM.

993. Dantur & adhuc alii modi currum propellendi, quos representat BOEKLERUS (a). Nos eum descripsimus, quo ordinariè utuntur. Caterum idem BOEKLERUS (b) molam ferrariam manuariam accurate delineat.

## PROBLEMA CLXIV.

994. Horologium oscillatrium HUGENIANUM construere.

## RESOLUTIO.

1. Fiant laminæ AA & BB semipedalis longitudine, pollices duos & semilata, quibus rotarum præcipuarum axes inferantur.
2. Rota infima CC 80 dentibus incidatur in convexo & eidem axi affigatur orbiculus aculeatus DD, ex quo pondera suspendantur.

3. Rota

(a) In Theatro Machinarum f. 60. & seqq.

(b) In der Haus- und Feld-Schule Tom. 1, class. 6, p. 512. & 513.



3. Rota CC impellat tympanum E dentium octo, & una rotam stellatam F dentium 48.
4. Rota F circumagat tympanum G dentium 8 & una rotam coronariam H dentes 48 in plano habentem.
5. Hæc agitet tympanum I dentium 24, & rotam ferratam K dentium 15.
6. Supra eam collocetur axis pinnatus LL eique affigatur clavula S, ima sui parte reflexa, ac foramine oblongo penduli intra duas laminas Cycloidicas duplici filo suspensi virgam ferream, cum appenso pondere plumbeo X, complexa.
7. A lamina AA quarta digiti parte distet alia YY, in qua describantur circuli horarii ex centro axis rotæ infimæ CC. Interior in 12 horas, exterior in 60 scrupula prima dividatur.
8. Axi rotæ C aptetur rota bb tubo ultra laminam YY continuato cohærens, ita ut una cum axe circumagatur, sine eodem tamen converti possit, ubi e re fuerit.
9. In tubuli prædicti extremo e applicetur index horæ spatio circuitum absoluturus atque ita minuta horaria indicaturus.
10. Rota bb impellat aliam gg 30 itidem dentium, cujus axi cohæreat tympanum sex dentium d: quod tandem
11. Convertat rotam dentium 72 indicem horarium minutario breviorum circumferentem.
12. Axi rotæ H affigatur orbis ll & in eo circulus in 60 partes æquales divisus describatur, qui per incisum in lamina YY foramen minuta secunda monstret.

13. Longitudinem penduli, ut jam supra notatum est, HUGENIUS (a) inventor experimentis factis deprehendit esse partium trium, quarum una est ad pedem Parisinum ut 864 ad 881 (§. 470).
14. Pondus perpendiculi X trilibre esse debet; & ne occursum aëris motus impediatur, optima ejus forma est lenticularis. Ponderis b, quo horologium movetur, magnitudo certo definiri nequit, sed per experientiam determinanda. HUGENIUS pondere 6 librarum usus est, diametro orbiculi D unius digiti existente, longitudine autem penduli ea, quam diximus.
15. Caterum ne motus horologii interrumpatur, dum pondus sursum trahitur; peculiari hoc artificio suspendendum, quod a laudato HUGENIO repertum. Funis scilicet in se rediens orbiculum D amplectatur & inde descendens altera sui parte trochileam c subeat, cui pondus b appensum. Hinc super orbiculum D extrinsecus horologio affixum ascendit, iterumque ad trochileam alteram F descendit, cui pondus G appensum majus b retinens, ne aliter quam orbiculo D revoluta descendat. Hic autem ferratis dentibus ita aptatur, ut tracto fune E volvatur, in partem vero contrariam revolvi nequeat.

SCHOLIUM.

995. *Horologia hæc oscillatoria Hugeniana adeo accurate construi possunt, ut tempus æquale accuratius dimetiantur quam*  
*Ii 2 motus*

(a) In Horologio oscillatorio f. 7.

Tab.  
XII.  
Fig.  
120.

*motus Solis diurnus inæqualis, ceu in Chronologicis ostendetur. Unde in Astronomia, ubi accurata temporis mensura requiritur, ingens eorum est usus. Sane Vir Cl. PHILIPPUS DE LA HIRE (a) testatur, se sæpius expertum esse, quod intra octiduum à medio Solis motu vel minuto secundo non aberrent.*

SCHOLIUM II.

996. *Cum pleraque Machinæ ex ligno constructui soleant, non incongruum videtur epilogi loco rotarum dentatarum lignearum constructionem edocere.*

PROBLEMA CLXV.

Tab. XII. Fig. 121. N. 1. 2. 3. 997. *Rotas dentatas & radiatas ligneas construere*

RESOLUTIO.

1. Orbes rotarum, quibus dentes infiguntur, ex diversis partibus componuntur. Si dentes in plano infiguntur, aliæ partes sunt segmenta circuli A, aliæ segmenta annulorum circularium B. Posteriores ita superimponuntur prioribus, ut iuncturæ D partium A medio partium B & contra iuncturæ C partium B medio partium A respondeant. Foraminibus perforatæ clavis ligneis junguntur. Quot vero partes in uno plano habuerit orbis, tot lignis transversis FF firmantur. Quodsi dentes in convexo infigendi: partes in utroque plano sunt segmenta annularia B.
  2. Peripheria circuli, in qua centra dentium infigendorum existunt, in tot partes æquales divisa, quot dentes rota habere debet, intervallum unum dividitur in 16. partes æquales, quales 7. tribuuntur denti, 9
- (a) In Epistola Tabulis Astronomicis præmissa.

vero interstitio inter binos relinquuntur, quarum 8 cedunt diametro bacilli. Vel idem dividitur in 7 partes æquales, quarum 3 spissitudini dentis IK,  $3\frac{2}{3}$  spissitudini seu diametro bacilli tribuuntur.

3. Idem intervallum dividitur in 3 partes æquales & 2 tribuuntur altitudini dentis HG. Sunt & qui HG fere  $\frac{3}{4}$  faciunt.
4. Anguli dentium secundum convexitatem arcus prope contactum bacilli terminati refecantur, ut superincessus super bacillo volvens (§. 937) frictionem imminuat (§. 954).
5. Foramina, quibus dentes infiguntur, esse debent quadrata, & axiculi ferrei in centris rotarum exacte constituendi, eo meliores, quo minores, quia minorum minor est frictio: eadem de causa imponendi concavo orichalceo aut saltem ligneo, nequaquam ferreo.
6. Rotæ radiatæ duplicem plerumque habent orbem, nisi bacilli exiguæ fuerint longitudinis, & si numerus bacillorum exiguus & resistentia ingens, cylindro ligneo inciduntur: id quod in molis ferrariis fieri consuevit.

SCHOLIUM I.

998. *Distantia dentium in rotis, quarum usus in molendinis est, intra spatium 4 & 5 digitorum fere continetur.*

SCHOLIUM II.

999. *Rota horologiorum metallica accuratam imprimis exigunt divisionem, ad quam absolvendam peculiaribus instrumentis opus est à LEUPOLDO. (b) descriptis.*

(b) In Theatro Machinarum generalic. 5. §. 93. 94.

Fig. 1.





Fig. 2.

Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.





Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.

Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.






Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 15.




Fig. 17.





Fig. 22.

Fig. 23.




Fig. 25.




Fig. 18.




Fig. 19.




Fig. 20.




Fig. 27.




Fig. 24.




Fig. 21.




Fig. 29.




Fig. 26.






Fig. 28.




Fig. 30.




Fig. 32.




Fig. 31.




Fig. 33.




Fig. 34.




Fig. 35.




Fig. 36.




Fig. 38.




Fig. 37




Fig. 40.




Fig. 40.



Fig. 41.

Fig. 39.




Fig. 42.





Fig. 47.










Fig. 46.




Fig. 44.




Fig. 43.




Fig. 49.




Fig. 45.



Fig. 48.




Fig. 50.




Fig. 52.




Fig. 51.




Fig. 55.




Fig. 53.



Fig. 54.



Fig. 56.




Fig. 57.




Fig. 59.





Fig. 58.




Fig. 63.

Fig. 63.




Fig. 62.




Fig. 61.




Fig. 64.




Fig. 60.




Fig. 66.




Fig. 70.




Fig. 67.






Fig. 68.

Fig. 69.



















Fig: 81.




Fig: 85.




Fig: 87.





Fig: 82.

Fig: 86.





Fig: 84.




Fig: 88.






Fig: 89.




Fig: 90.




Fig: 92.



Fig: 91.




Fig: 93.




Fig: 96.




Fig: 94.



Fig: 97. N° 2.

Fig: 97. N° 1.




Fig: 95.
















Fig: 98.














Fig. u5.




Fig. u7.




Fig. u6.



Fig. u4.




Fig. u3.








Fig. 121. N.1.




Fig. 121. N.2.




Fig. 118.



Fig. 120.





Fig. 118.




Fig. 118.

Fig. 121. N.3.






















Fig. 131.




Fig. 134.




Fig. 132.




Fig. 135.




Fig. 136.





Fig. 143.

Fig. 138.






Fig. 137.




Fig. 139.




Fig. 140.




Fig. 141.




Fig. 142.





Fig. 143.






















Fig. 154.




Fig. 155.




Fig. 157.




Fig. 156.





Fig. 162.




Fig. 159.

Fig. 161.




Fig. 163.




Fig. 158.


















Fig. 163.














*Fig. 174.*



*Fig. 176.*







ELEMENTA  
HYDROSTATICÆ.

P R Æ F A T I O.



NON dubito fore multos, quibus leges Hydrostaticæ paradoxæ videbuntur. Cum enim Gravitationem sibi imaginentur tanquam Vim in materia persistentem, quæ mutari nequeat, corpore immutato: fluida vero, quamdiu intra eosdem terminos conclusa quiescunt, omnis actionis in corpora alia profus expertia judicent; rationem sane non capiunt cur partem Gravitatis corpori demerso veluti adimant, vel etiam totum ingenti sæpius impetu sursum propellant. Enimvero quemadmodum leges Hydrostaticæ admodum evidenter demonstrantur, ita non minus Experientia singulæ confirmantur. Hinc discant velim, qui in rebus naturalibus cognoscendis sensui ac imaginationi nimium tribuunt, res naturales alias plane esse in intellectu, quam in sensu: cujus veritatis plenior convictio ab Optica speranda. Quodsi hunc solum sui usum Hydrostatica præberet, digna profecto foret, quam meditare nur interiora Naturæ contemplaturi: verum enim vero ipsa quoque clavem

continet ; qua multa abdita referantur. Non exiguus est Phænomenorum numerus, quorum ratio in Hydrostatica continetur, & quæ nec sine ea intelligi, nedum comprehendi possunt. Hydrostaticæ usum in examinanda bonitate metallorum, mineralium, aliorumque corporum solidorum, inprimis autem fluidorum, in *Medicina Hydrostatica* ostendit Celeberrimus BOYLIUS. Varios eosque præclaros in vita humana usus in ipsa pertractatione passim indicavi. Sine ea nec Aerometria intelligi, nec Hydraulica exacte tradi potest. Sat ergo rationis apparet, cur Hydrostaticæ Elementa inter Elementa Matheseos præcipuum quendam locum sibi vendicent, & cur digna sint, quæ ulterius excolantur & ad varios in vita humana usus applicentur. Agite itaque, quotquot natura melioris ingenii ac animi dotibus ditavit, quam ut de pane lucrando solum cogitent, evolvite hæc Hydrostaticæ Elementa, legite, relegite, meditamini, ut genuinam Physicæ pertractandæ ideam animo comprehendatis.



# ELEMENTA HYDROSTATICÆ.

## CAPUT PRIMUM.

### *De Corporum Specifica Gravitate & Levitate.*

#### DEFINITIO I.

1. **H**ydrostatica est Scientia Gravitationis in fluido.

#### SCHOLIUM.

2. Docetur nempe in Hydrostatica non modo ratio gravitatis fluidorum, sed & imprimis actio eorum in solida demersa.

#### DEFINITIO II.

3. *Corpus fluidum* est, cujus massulæ quantalibet sunt inconnexæ, mutua cohæsiōne à causa quacunque impedita.

#### DEFINITIO III.

4. *Corpus solidum* est, cujus massulæ quantalibet sunt connexæ.

#### DEFINITIO IV.

5. *Corpus specificè levius* est, quod sub eodem volumine minus pondus continet, quam alterum.

#### DEFINITIO V.

6. *Corpus specificè gravius* est, quod sub eodem volumine majus pondus continet, quam alterum.

#### SCHOLIUM.

7. Sint duo globi æquales, quorum scilicet diameter unius pedis; alter plumbens, alter ligneus. Quia plumbens gravior ligneo; dicitur specificè gravior, ligneus autem specificè levior.

#### DEFINITIO VI.

8. *Corpus densius* est, quod plus massæ sub eodem volumine continet, quam alterum.

#### COROLLARIUM.

9. Cum massa sit gravitati proportionalis (§. 112. *Mechan.*); corpus specificè gravius densius est specificè leviori, & corpus densius specificè gravius est rariori (§. 5. 6).

#### DEFINITIO VII.

10. *Corpus rarius* est, quod minus massæ sub eodem volumine continet, quam alterum.

#### COROLLARIUM.

11. Quare cum massa sit gravitati proportionalis (§. 112. *Mechan.*); corpus rarius est specificè levius densiori, & specificè levius rarius specificè graviori (§. 5. 6).

#### AXIOMA I.

12. *Corpora ejusdem densitatis sub eodem volumine æqualem massam continent.*

#### COROLLARIUM.

13. Quare si volumina eorundem æqualia fuerint, ejusdem quoque ponderis erunt seu gravitatem eandem habebunt (§. 112. *Mechan.*).

AXIO-

## AXIOMA II.

14. Si duorum corporum volumina fuerint equalia, densitates sunt ut massa.

## SCHOLIUM.

15. Nempe vi defin. (§. 8) corpus dicendum est duplo densius, si duplum massæ sub eodem volumine continet; triplo densius, si triplum, & ita porro.

## COROLLARIUM.

16. Sunt igitur densitates corporum æqualium ut pondera seu ut gravitates (§. 112. *Mechan.*).

## THEOREMA I.

17. Si duo corpora eandem densitatem habuerint, massæ sunt ut volumina.

## DEMONSTRATIO.

Sub eodem enim volumine æqualem massam continent (§. 12), adeoque in volumine duplo continetur massa dupla, in triplo tripla, in quadruplo quadrupla & ita porro. Sunt igitur massæ ut volumina. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

18. Quoniam etiam gravitates sunt ut massæ (§. 112. *Mechan.*); corporum ejusdem densitatis gravitates sunt in ratione voluminum (§. 167. *Arithm.*).

## COROLLARIUM II.

19. Ergo corpora ejusdem densitatis sunt etiam ejusdem gravitatis specificæ; & contra (§. 6).

## COROLLARIUM III.

20. Quare corpora diversæ densitatis sunt diversæ gravitatis specificæ; & contra.

## THEOREMA II.

21. Massæ duorum corporum sunt in ratione composita densitatum atque voluminum.

## DEMONSTRATIO.

Sint trium corporum massæ  $a, b, c,$

volumina primi & secundi  $d,$  tertii  $e,$  densitas primi  $f,$  secundi & tertii  $g$ ; sint nempe primum & secundum ejusdem voluminis, secundum & tertium ejusdem densitatis. Quoniam

$$a : b = f : g \quad (§. 14)$$

$$b : c = d : e \quad (§. 17.)$$

erit  $ab : bc = fd : ge$  (§. 213. *Arithm.*) consequenter  $a : c = fd : ge$  (§. 181. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM III.

22. Quoniam gravitates sunt ut massæ (§. 112. *Mechan.*); eadem etiam sunt in ratione composita densitatum & voluminum (§. 167. *Arithm.*).

## THEOREMA III.

23. Si duorum corporum massæ vel gravitates fuerint æquales; densitates sunt reciproce ut volumina.

## DEMONSTRATIO.

Sint enim omnia ut in Theorematis præcedentis demonstratione, erit  $a : c = fd : ge$  (§. 21). Jam  $a = c$  per *hypoth.* adeoque  $fd = ge$ . Est igitur  $f : g = e : d$  (§. 299. *Arithm.*). Quod erat unum.

Quoniam gravitates sunt ut massæ (§. 112. *Mechan.*). Si massæ æquales sunt, etiam gravitates æquales sunt. Sed si massæ æquales sunt, densitates sunt reciproce ut volumina, *per demonstrata.* Ergo etiam, si gravitates æquales sunt, densitates reciproce sunt ut volumina. *Q. e. d.*

## THEOREMA IV.

24. Duorum corporum quorumcunque densitates sunt in ratione composita ex directa massarum & voluminum reciproca.

DEMONS-

DEMONSTRATIO.

Sint omnia ut demonstratione Theorematis secundi, erit

$$a : c = fd : ge \text{ (§. 21).}$$

Ergo  $age = cfd$  (§. 297. *Arithm.*)  
consequenter  $f : g = ae : cd$  (§. 299. *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

25. Quoniam gravitates corporum sunt ut massæ eorundem (§. 112. *Mechan.*); densitates corporum sunt in ratione composita ex directa gravitatum & reciproca voluminum (§. 15. *Arithm.*)

AXIOMA III.

26. Si duorum corporum volumina fuerint equalia, gravitates specificæ sunt ut gravitates absoluta.

SCHOLIUM.

27. Corpus enim duplo gravius specificè dicitur altero, si duplam gravitatem sub eodem volumine continet; triplo dicitur gravius, si triplam, &c. (§. 6).

COROLLARIUM.

28. Quoniam corporum gravitates absoluta sunt ut massæ (§. 112. *Mech.*); corporum æqualium gravitates specificæ sunt ut massæ (§. 167. *Arithm.*).

THEOREMA V.

29. Corporum ejusdem ponderis gravitates specificæ sunt in ratione voluminum reciproca.

DEMONSTRATIO.

Sit gravitas communis =  $g$ , volumen corporis  $A = a$ , volumen alterius  $B = b$ . Quoniam  $B$  supponitur esse homogœneum; gravitates voluminibus proportionales sunt (§. 130. *Mechan.*) adeoque gravitas ipsius  $B$  sub volumine  $a$ , reperitur  $ag : b$  (§. 301. *Arithm.*). Sunt igitur gravitates specificæ corporum  $A$  &  $B$  ut  $g$ . ad  $ag : b$  (§. 26) hoc est, *Wolfii Oper. Mathem. Tom. II,*

ut  $bg$ , ad  $ag$  (§. 181. *Arithm.*) consequenter ut  $b$ , ad  $a$  (§. 178. *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

30. Quodsi ergo volumina fuerint æqualia, etiam gravitates specificæ æquales erunt, hoc est, corpora ejusdem ponderis & voluminis eandem gravitatem specificam habent.

THEOREMA VI.

31. Gravitates absoluta duorum corporum sunt in ratione composita voluminum & gravitatum specificarum (hoc est, gravitatum sub eodem volumine).

DEMONSTRATIO.

Sint corporum ejusdem voluminis  $c$  gravitates absoluta  $a$  &  $b$ , specificæ  $f$  &  $g$ ; corporum ejusdem ponderis  $a$  volumina  $c$  &  $d$ , gravitates specificæ  $f$  &  $e$ . Erit

$$a : b = f : g \text{ (§. 26)}$$

$$f : e = d : c \text{ (§. 29).}$$

Ergo  $af : be = fd : gc$  (§. 213. *Arith.*)

Unde  $a : b = d : \frac{gc}{e}$  (§. 185. *Arithm.*)

&  $a : b = ed : gc$  (§. 178. *Arithm.*)

*Q. e. d.*

THEOREMA VII.

32. Gravitates specificæ duorum corporum sunt in ratione composita ex directa gravitatum absolutarum & reciproca voluminum.

DEMONSTRATIO.

Sint omnia ut in demonstratione Theorematis præcedentis; erit

$$a : b = ed : gc \text{ (§. 31).}$$

Ergo  $\frac{a}{d} : \frac{b}{c} = e : g$  (§. 185. *Arithm.*)

consequenter  $ac : bd = e : g$  (§. 181. *Arithm.*) *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

33. Quoniam densitates sunt in ratione composita ex directa gravitatum absoluta-

rum & reciproca voluminum (§. 25); erunt etiam gravitates specificæ ut densitates (§. 167. *Arithm.*)

## CAPUT II.

## De Æquilibrio &amp; Pressione Fluidorum.

## THEOREMA VIII.

*Fig. 1.* 34. **S**I in tubis communicantibus fluidi homogenei eadem altitudo fuerit, fluidum in tubo uno æquiponderat fluido in altero.

## DEMONSTRATIO.

I. Si tuborum AB & DC diametri æquales fuerint; columnæ fluidi BE & FD eandem basin & altitudinem habent, adeoque æquales sunt (§. 535 *Geom.*) Quare cum etiam gravitates æquales sint (§. 131. *Mechan.*), fluidum in BE eadem vi premit fluidum in BD, qua idem urgetur à fluido in DF. Fluida ergo in utroque tubo quiescunt & neutrum alterum movet (§. 75. *Mechan.*). *Quod erat unum.*

*Fig. 2.* II. Quodsi basis tubi GI fuerit quadrupla basis alterius HK & aqua descenderet ex L usque ad O, e. gr. per intervallum unius digiti, in tubo altero NK ascenderet ex M in N per altitudinem 4 digitorum (§. 580. *Geom.*). Quare celeritas, qua moveretur fluidum in tubo HK, est ad celeritatem, qua idem moveretur in GI; ut basis tubi GI, ad basin alterius HK (§. 33. *Mechan.*). Sed quia eadem fluidi in utroque tubo altitudo, ipsumque fluidum homogeneum *per hypoth.* massa fluidi in

tubo GI, est ad massam fluidi in altero HK; ut basis tubi GI, ad basin alterius HK (§. 573. *Geom.*). Est ergo vis fluidi in tubo LI, ad vim fluidi in tubo HK; ut factum ex basi tubi GI in basin alterius HK, ad factum ex basi tubi HK in basin alterius GI (§. 278. *Mech.*). Quare cum hæc facta æqualia sint (§. 207. *Arithm.*); vires etiam æquales sunt; adeoque neutrum fluidorum alterum movet (§. 75. *Mech.*). *Quod erat secundum.*

III. Si tubus unus SR fuerit ad alterum QR inclinatus, utriusque vero diameter eadem, & QR ad horizontem perpendicularis; gravitas absoluta fluidi in tubo inclinato SR, est ad gravitatem respectivam ejusdem, qua nititur juxta directionem plani TR; ut longitudo plani TR; ad altitudinem ejus TZ (§. 261. *Mechan.*). Non alia igitur vi urget fluidum in tubo QR, quam quantitas contenta in tubo perpendiculari TZ eandem basin & altitudinem habente cum inclinato TR, consequenter fluido in tubo QR æquiponderat, *per cas. 1. Quod erat tertium.*

IV. Eodem modo ostenditur fluida æquiponderare in tubis inclinatis AB & CD inæqualium diametrorum, si ad eandem

eandem altitudinem constituentur.  
*Quod erat quartum.*

COROLLARIUM.

35. In tubis communicantibus fluidum homogeneum præponderat, cujus major est altitudo.

THEOREMA IX.

36. *In tubis communicantibus quibuscunque fluida diversa gravitatis specificæ æquponderant, si altitudines habuerint rationem gravitatum specificarum reciprocam.*

DEMONSTRATIO.

E. g. Sint tuborum AB & DC diametri æquales & in tubo AB aqua; in tubo DC argentum vivum. Et quia gravitas specificæ aquæ est ad gravitatem specificam argenti vivi ut 1 ad 14; sit reciproce altitudo aquæ in tubo AB 14 digitorum, altitudo vero mercurii in tubo DC digiti unius.

Quoniam bases cylindrorum aquei & mercurialis æquales sunt *per hypoth.* altitudinum rationem habent (§. 573. *Geom.*), consequenter cum tam aqua, quam mercurius sit fluidum homogeneum, licet inter se heterogenea, gravitates absolutæ eorundem erunt in ratione composita ex directâ tam gravitatum specificarum 1 : 4, quam altitudinum EB & DH, 4 : 1 (§. 31), hoc est æquales sunt (§. 159. *Arithm.*). Pro mercuriali itaque cylindro substituere licet aqueum, cujus altitudo est altitudinis ipsius quadrupla (§. 15. *Arithm.*) - Sed hic alteri aquo in BA æquponderat (§. 34.). Ergo etiam mercurialis eidem æquponderat.

Idem non absimili modo ostenditur, si tuborum diametri fuerint inæquales & tubi quomodocunque inclinati.

COROLLARIUM I.

37. Inveniri adeo potest fluidorum duorum quorumcunque gravitas specificæ, si in tuborum communicantium unum AB infundatur fluidum unum, in alterum vero CD alterum & altitudines BG & DH, ad quas subsistunt æquilibrata, ex eadem mensura accurate æstimentur. Est enim gravitas fluidi in AB ad gravitatem in DC ut DH ad BG (§. 36).

*Fig. 1.*

SCHOLIUM.

38. *Quod si fluida facile commisceantur, tubum horizontalem BD mercurio replere debemus, commixtionem impedituri. Etsi autem fluida non facili commisceri soleant, specificæ tamen gravius primo loco infundendum, ne concepto impetu ruat in alterum & fluida turbentur.*

COROLLARIUM II.

39. Quoniam densitates fluidorum sunt ut gravitates specificæ (§. 33); eadem erunt reciproce ut altitudines fluidorum DH & BG in tubis communicantibus æquilibratorum.

COROLLARIUM III.

40. Eadem ergo methodo, quam in *Cor. 1.* (§. 37) exposuimus, ratio densitatum fluidorum determinatur.

THEOREMA X.

41. *In vasis perpendiculararibus ABDC & EGHF æquales bases ED & GH habentibus, fundi premuntur à fluido homogeneo in ratione altitudinum AB & EG.*

*Fig. 5.*

## DEMONSTRATIO.

Quoniam vasa sunt perpendicularia, hoc est, bases eorundem in plano horizontali collocatæ, *per hypoth.* fluida adversus fundos nituntur secundum lineas perpendiculares (§. 215. *Mechan.*), adeoque tota gravitate sua, cum nihil resistat. Premuntur adeo fundi in ratione gravitatum. Sed gravitates sunt ut volumina (§. 130. *Mechan.*), volumina sunt ut altitudines (§. 573. *Geom.*). Ergo fundi premuntur in ratione altitudinum. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

42. Quodsi ergo etiam altitudines æquales sunt, fundi æqualiter premuntur.

## COROLLARIUM II.

43. In vase igitur perpendiculari æquales partes fundi à fluido homogeneo ad libellam consistente æquali vi premuntur. Altitudines enim fluidi æquales sunt super parte qualibet fundi (§. 36<sup>a</sup>).

## COROLLARIUM III.

44. In uno eodemque vase fluidum ad diversas altitudines successive constitutum fundum premit in ratione altitudinum, ad quas consistit.

## COROLLARIUM IV.

45. Decrescente adeo altitudine, decrescit pressio, suntque hujus decremента in ratione decrementorum altitudinis.

## THEOREMA XI.

Fig. 6. 46. In vasis perpendicularibus ABDC & EGHF, bases BD & GH utcumque inæquales habentibus, fundi premuntur à fluido homogeneo in ratione composita basium & altitudinum.

## DEMONSTRATIO.

Ex demonstratione Theorematis præcedentis (§. 41) patet, fundos premi in ratione gravitatum. Gravitates vero fluidorum sunt ut volumina (§. 130. *Mechan.*), volumina sunt in ratione composita basium & altitudinum (§. 572. *Geom.*). Ergo fundi premuntur in ratione composita basium & altitudinum (§. 167. *Aritbm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA XII.

47. Si vas inclinatum ABDC eandem altitudinem & basin habuerit cum perpendiculari BEFG, fundus utriusque æqualiter premitur.

## DEMONSTRATIO.

In vase inclinato ABCD fundus CD premitur secundum directionem BD. Est autem vis gravitatis secundum BD, ad gravitatem absolutam; ut BE, ad BD (§. 261. *Mechan.*). Ergo fundus CD eodem modo premitur, ac si à fluido ad altitudinem BE consistente perpendiculariter premeretur. Fundus igitur vasis perpendicularis BEFG & inclinati ABDC æqualiter premuntur (§. 42). *Q. e. d.*

## THEOREMA XIII.

48. Si bases vasis ABDC inæquales fuerint, fundus eodem modo premitur, ac si superior inferiori æqualis existeret.

## DEMONSTRATIO.

I. Sit basis inferior CD minor superiore AB. Quoniam fluidum fundum CD, quem



quem in plano horizontali supponimus, secundum lineas perpendiculares EC, FD premit (§. 215. *Mechan.*), non nisi fluidum intra cylindrum ECDF comprehensum adversus eum nititur, reliqua massa contra latera vasis nitente. Eodem ergo modo premitur, ac si basis superior inferiori æqualis esset. *Quod erat unum.*

II. Sit vasis inferior basis CD multo major superiore FG. Nempe ut demonstratio facilior evadat, cylindro ABDC infixus intelligatur tubus FE. Quod si ponamus fundum CD attolli in L, ut fluidum moveatur per intervalum CL: in tubo FE per altitudinem EM ascendet, quæ est ad CL; ut basis CD, ad basin GF (§. 580. *Geom.*). Est verò celeritas fluidi in tubo FE, ad celeritatem in vase AD; ut EM, ad CL (§. 33. *Mechan.*), consequenter ut basis CD, ad basin FG (§. 167. *Arith.*). Vis ergo, qua aqua in tubo deorsum nititur, prodit si basis cylindri CD ducatur in altitudinem FK (§. 280 *Mech.*). Summando scilicet vires elementares æquales ad altitudinem FK applicatas (§. 95. *Analys. infin.*) consequenter fundus CD eadem vi premitur, qua a Cylindro HCDCI premeretur (§. 541. *Geom.*). *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

50. Vasorum igitur fundi æquales eadem vi premuntur a fluido ad eandem altitudinem consistente, quæcunque sit figura vasis.

SCHOLION I.

51. Hinc ratio apparet, cur tanta vi fundus superior dolii AB attollatur ab aqua in tubo CD plurimum pedum contenta. Ipse-

met experimentum aliquoties iteravi in vase ligneo AB intus pice probe obducto & tubo CD ex lamina ferrea stanno obducta parato altitudinis 14 fere pedum, nec 800 libra basi superiori imposita impedire potuerunt, quominus attolleretur.

SCHOLION II.

52. Ab hoc principio derivavi Siphonem meum Anatomicum, ab aliquot jam annis cum amicis communicatum. Fieri scilicet curavi ex lamina ferrea stanno obducta vas cylindricum DEGF & eidem afferruminari jussi tubum FIH. Quod si jam vesica, aut ventriculus, aut pellis animantium brutorum, aut alia quæcunque partes membranacea corporis animalis inversæ basi superiori superinducantur, eas non modo ingenti vi in hemisphericam figuram expandit, sed & poros tubintrans omnes membranas & vasa ita dividit, ut, levi incisura facta, solis digitis multo accuratius separentur, quam cultro Anatomico. Jucundum sane est spectaculum, dum non modo substantia membranacea mire intumescit, sed & vasorum per eam dispersorum ramificationes & insertiones minimas distincte spectare tunicasque, quæ vulgo pro una habentur, in plures discerpere licet. Probe autem notandum est, quod si interior vesicæ aut reliquarum partium corporis animalis super vase DG expansarum superficies aquam lambat, aqua per substantiam earum penetrare nequeat. Ceterum si vesicæ ingens pondus imponas, ab aqua in tubo HI vix duarum librarum attollitur.

Fig. II.

SCHOLION III.

53. Veritatem hujus doctrinæ de pressione fluidorum in ratione basis ac altitudinis exploraturus vas metallicum ACDB ita construi curet, ut fundus CD sit mobilis, annulo coriæo madefacto apprimendus, dum experimentum capitur, & basi superiori AB successive tubi aque-alti sed diversarum diametrorum applicari possint. Quod si enim funiculi per tubum FE trajecti alterius extremum annulo K basi mobili afferruminato,

alterum vero brachio alicujus libræ alliges & in lance alteri appensa pondus colloques idque adjectis minoribus tamdiu augeas, donec fundus CD attollatur, non modo hinc discas, eodem semper pondere opus esse ad fundum attollendum, quæcumque sit tubi EF amplitudo, modo aqua constanter ad eandem altitudinem consistat, sed & pondus æquale deprehendes gravitati Cylindri aquei eandem cum vase basin CD, sed altitudinem FK habentis.

## SCHOLIUM IV.

54. Cum iis, quæ de æquilibrio fluidorum demonstrata sunt, non consentire videtur, quod in tubis capillaribus, seu fistulis gracilioribus utrinque patulis unaque sua extremitate sub aquam demersis, aqua ultra libellam assurgat, eo quidem magis, quo minor tubuli Diameter. Enimvero facile colligitur, Phænomenon hoc alteri cuidam causæ adscribendum esse, licet sine principiis Aerometricis describi nequeat.

## CAPUT III.

## De Gravitatione Corporum Specificè Graviorum in Fluidis Levioribus.

## THEOREMA XIV.

55. **C**orpus specificè gravius in fluido leviori eam ponderis sui partem amittit, quantum est pondus fluidi sub eodem volumine.

## DEMONSTRATIO.

Fig. 12. Ponamus e. gr. cubum pollicarem plumbeum F sub aqua demergi. Expelletur adeo ex eo, quem occupat, loco cubus pollicaris aquæ. Sed pondus hujus aquæ a resistentia ambientis sustentabatur. Ergo a resistentia aquæ ambientis tanta quoque ponderis cubi plumbei pars sustentari debet, quantum est pondus aquæ expulsæ. Hac igitur parte gravitas corporis demersi deprehendetur imminuta. Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

56. Cum fluidum specificè gravius sub

eodem volumine majus pondus possideat, quam levius (§. 6); idem corpus in fluido specificè graviori majorem ponderis sui partem amittit, quam in leviori, adeoque in leviori magis ponderat quam in graviori.

## SCHOLIUM

57. Ita globus plumbeus minus ponderat in aqua, quam in spiritu vini.

## COROLLARIUM II.

58. Graviorum igitur homogeneous æqualium in aëre æquiponderantium æquilibrium tollitur, si unum fluido graviori, alterum leviori immergatur.

## COROLLARIUM III.

59. Cum gravitates specificæ sint ut absoluta sub eodem volumine (§. 26); & gravitas fluidi solido immerso mole æqualis, sit ad gravitatem solidi; ut pars ponderis in fluido amissa, ad pondus ipsius integrum (§. 55);

(§. 55) ; erit gravitas fluidi specifica, ad gravitatem solidi demersi; ut pars ponderis à solido amissa, ad pondus ejus integrum (§. 167. *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

60. Duo solida mole æqualia idem pondus in eodem fluido amittunt (§. 55). Sed specificè gravioris pondus majus est, quam specificè levioris (§. 6). Ergo majorem sui ponderis partem amittit specificè levius, quam gravior (§. 205. *Arithm.*).

COROLLARIUM V.

61. Quia corporum pondere æqualium volumina sunt reciproce ut gravitates specificæ (§. 29); specificè levius ejusdem cum graviori ponderis in eodem fluido majus pondus amittit, quam gravior (§. 55). Quare si in uno fluido æquiponderant, in alio non æquiponderabunt, sed specificè gravior præponderabit eo magis, quo fluidum densius.

PROBLEMA I.

62. *Invenire pondus fluidi cujuscunque, e. gr. vini in dolio contenti.*

RESOLUTIO.

1. Quaratur volumen fluidi per regulas Stereometricas.

2. Cubus plumbeus pollicaris ex crine equino suspensus fluido immergatur, & ope bilancis exacte notetur pondus amissum: quod erit pondus fluidi sub volumine unius digiti cubici (§. 55).

3. Quare cum in fluido homogeneo pondus sit volumini proportionale (§. 130. *Mechan.*); pondus fluidi quæsitum per regulam trium (§. 302. *Arithm.*) invenietur.

E. gr. Sit capacitas dolii 88 pedum cubicorum, pes cubicus vini 68 librarum: erit gravitas vini in integro dolio 88. 68: 1 = 5984 librarum.

COROLLARIUM.

63. Eodem ergo modo determinari potest pondus unius pedis cubici fluidi cujuscunque, & in usus futuros annotari.

SCHOLIUM.

64. *Pondus pedis cubici aque investigarunt multi; sed cum in diversis fluviis ac fontibus non eadem sit gravitas specifica aquæ, immo nec omni tempore eadem detur in eodem fluvio: mirum non est, observationes diversorum autorum inter se admodum discrepare.* Morlandus (a) *experimentis sæpius iteratis didicit aquæ pedem cubicum juxta mensuram Parisinam esse 70 librarum cum duabus uncis.*

THEOREMA XV.

65. *Gravitates specifica fluidorum sunt ut pondera ab eodem solido in utroque amissa.*

DEMONSTRATIO.

Gravitates specificæ sunt ut absolutæ sub eodem volumine (§. 26). Sed pondera ab eodem solido in diversis fluidis amissa sunt gravitates absolutæ fluidorum sub eodem volumine (§. 55). Ergo gravitates specificæ fluidorum sunt ut pondera ab eodem solido in iis amissa. *Q. e. d.*

PROBLEMA II.

66. *Invenire gravitatem specificam fluidorum quorumcunque.*

RESOLUTIO.

I. Ex uno brachio libræ suspendatur globus plumbeus & ad alterum appendatur pondus D, quod cum ipso in aëre æquilibrium servet.

2. Glo-

(a) Elevations des Eaux p. 7.

2. Globus successive immittatur diversis fluidis, quorum specifica gravitas determinanda, noteturque pondus, quod in singulis fluidis demerso æquiponderat.
3. Singula hæc pondera subducantur à pondere D: ita relinquentur partes in quolibet fluido amissæ & una ratio gravitatis specificæ fluidorum constabit (§. 65).

## COROLLARIUM.

67. Cum densitates sint ut gravitates specificæ (§. 13); eodem modo invenitur ratio densitatis fluidorum.

## SCHOLIUM I.

68. *Maximi usus est hoc Problema, per id enim gradus puritatis ac bonitatis fluidorum investigantur: quod scire non solum in Scientia naturali excolenda, sed & in vita civili ac praxi Medica proficuum existit.*

## SCHOLIUM II.

69. *Quodsi diverso tempore gravitatem specificam fluidorum investiges; hieme majorem, quam æstate deprehendes. JOAN. CASP. EISENSCHMIDIUS (a) experimenta hanc in rem complura exhibet, ex quibus potiora in hanc tabulam referre libet.*

Pollex cubicus Parif.	Æstate		Hieme	
	Unc.	Gross. Gran.	Unc.	Gross. Gran.
Mercurii	7	1 66	7	2 14
Olei vitrioli	-	7 59	-	7 71
Spiritus vitrioli	-	5 33	-	5 38
Spiritus nitri	-	6 24	-	6 44
Spiritus falis	-	5 49	-	5 55
Aquæ fortis	-	6 23	-	6 35
Aceti	-	5 15	-	5 21
Aceti destillati	-	5 11	-	5 15
Vini Burgundici	-	4 67	-	4 75
Spiritus vini	-	4 32	-	4 42
Cerevisiæ albæ	-	5 1	-	5 9
Cerevisiæ fuscæ	-	5 2	-	5 7
Lactis bubuli	-	5 20	-	5 25
Lactis caprini	-	5 24	-	5 28
Urinæ	-	5 14	-	5 19
Spiritus urinæ	-	5 45	-	5 53
Olei Tartari	-	7 27	-	7 43
Olei olivarum	-	4 53	hieme congelatur.	
Olei terebinthinæ	-	4 39	-	4 45
Aquæ marinæ	-	6 12	-	6 18
Aquæ fluvialis	-	5 10	-	5 13
Aquæ putealis	-	5 11	-	5 14
Aque destillatæ	-	5 8	-	5 11

SCHÖ.

(a) In Disquisitione Nova de ponderibus & mensuris, p. 174 & 175.

SCHOLIION III.

70. Ut accuratissime omnia peragantur, gravitas fili extra fluidum constituti subtrahenda est ponderi solidi in aëre, vis vero, quæ requiritur, ad filum sub fluido demergendum, si specificè levius, addenda est ponderi amisso. Quodsi vero filum, ex quo pendet solidum, fluido gravius fuerit, integrum pondus fili in aëre subtrahendum est à pondere solidi in aëre, & pondus quod filum amittit, à pondere in fluido amisso. Enimvero quoniam filum cum solido immerso idem totum constituit, hac cautione opus non est, si in omnibus fluidis, quorum gravitates specificas inter se conferre volueris, eandem fili portionem una cum solido immergas. Quia crinis equinus eandem fere cum aqua gravitatem specificam habet; experimenta Hydrostatica in aqua instituturi ex eodem solida suspendunt.

PROBLEMA III.

71. Invenire, utrum partes fluidi inferiores comprimantur à superioribus, nec ne.

RESOLUTIO.

Exploretur per *Probl. 2.* (§. 66), quannam ponderis sui partem amittat idem solidum in diversis ejusdem fluidi profunditatibus, ita ut ratio habeatur cautionis modo commendatæ (§. 70). Quodsi enim pondus à solido solo in diversis profunditatibus amissum idem fuerit, eadem erit gravitas fluidi specificæ in partibus inferioribus, quæ in superioribus (§. 55), consequenter eadem densitas (§. 33). Quodsi vero in profunditate majore pondus majus amittitur, quam in minore; in priore casu gravitas specificæ (§. 6), consequenter & densitas (§. 33), major erit quam in altero. *Q. e. i. & d.*

*Wolffii Oper. Mathem. Tom. II.*

SCHOLIION.

72. Tentavit hoc in aqua FRANCISCUS TERTIUS DE LANIS (a). Accepto autem vase duorum pedum altitudine, cum globum vitreum eidem immitteret, qui pondus aquæ 18 granis excedebat, eundem quoque cum æquipondio 18 granorum perfectissimum facere æquilibrium expertus est. Cum eundem ex crine equino pendulum ad infimam aquæ profunditatem descendere permetteret, ponderi ejus dimidium insuper granum decedere observavit: quod tamen decrementum quia in crinem equinum aquæ nunc totum immersum conjici debet, quippe extra aquam grani semissi æquiponderantem, aquæ partes inferiores à superioribus nullam pati compressionem agnovit. Non inutile foret idem experimentum in profunditatibus majoribus instituere.

PROBLEMA IV.

73. Determinare rationem, quam habet gravitas specificæ fluidi ad gravitatem specificam solidi quod fluido specificè gravius existit.

RESOLUTIO.

Ponderetur massa quantalibet solidi in fluido, & notetur accurate pondus in eodem amissum, non neglecta cautione (§. 70) commendata: erit enim gravitas specificæ fluidi, ad gravitatem specificam solidi in ipso demersi; ut pars ponderis à solido amissa, ad pondus ejus integrum (§. 59). *Q. e. d.*

SCHOLIION

74. Si fluidum specificè gravius solido, proposito satisfiet per ea, quæ in Capite subsequente traduntur.

L I THEO-

(a) In Magisterio Naturæ & Artis. Tom. 3. lib. 25. c. 1. exper. 7. f. 492.

## THEOREMA XVI.

75. *Corporum pondere æqualium gravitates specifica sunt reciproce ut partes ponderis in eodem fluido amissa.*

## DEMONSTRATIO.

Gravitates specificæ corporum pondere æqualium sunt reciproce ut volumina (§. 29.). Quare cum partes ponderis in eodem fluido amissæ voluminum rationem habeant (§. 18.); gravitates corporum specificæ sunt reciproce ut partes ponderis in eodem fluido ab iis amissæ. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

76. Invenitur adeo ratio, quam habent gravitates specificæ solidorum, si massæ in aëre æquiponderantes in eodem fluido ponderentur, & pondera a singulis amissa notentur.

## SCHOLIUM.

77. *Gravitatem specificam plurimorum corporum solidorum investigarunt multi. Imprimis prolixæ sunt tabulæ, quæ in hanc rem exhibeantur in Transactionibus Anglicanis (a). Varriorum quoque corporum, præsertim metallorum, gravitatem specificam, jam ante dedit MARINUS GHETALDUS (b) & ex eo GUIELMUS OUGHTREDUS (c); dederunt postea alii. Nobis suffecerit annotasse metallorum & aliorum quorundam corporum gravitatem specificam a PETITO multa solertia investigatam, prout eam exhibuit MERSENNUS (d) & ex ipso postea alii. Nempe si fuerit gravitas*

(a) N. 159. p. 926. & seqq. it. n. 199. p. 994. Conf. Epitome Transact. Angl. Cl. Lowthorpii vol. 1. cap. 6. p. 60. & seqq.

(b) In Archimede promotio.

(c) In Opusculis Mathematicis p. 61.

(d) In Phenomenis Hydraulicis. cor. prop. 47. Cogitatorum Physico-Mathem. p. 192.

Auri librarum 100.

*erit sub eodem volumine gravitas*

Mercurii	lib. 71½	Stanni puri	38¾
Plumbi	60½	Magnetis	26
Argenti	54½	Marmoris	21
Cupri	47½	Lapidis	14
Æris cyprii	45	Sulphuris	12½
Ferri	42	Ceræ	5
Stanni communis	39	Aquæ	5⅓

## PROBLEMA V.

78. *Data gravitate fluidi, invenire gravitatem solidi mole ipsi æqualis.*

## RESOLUTIO.

1. Investigetur ratio gravitatis specificæ fluidi ac solidi (§. 73).
2. Hac data per Regulam trium invenietur gravitas solidi sub volumine æquali.

E. gr. Quæritur gravitas plumbi sub eodem volumine cum aqua 200 librarum. Quia gravitas specifica aquæ, ad gravitatem plumbi; ut 5½, ad 60½ (§. 77), hoc est, ut 32 ad 363 (§. 178. *Arithm.*); reperitur gravitas plumbi 363. 200 : 32 = 2268¾ librarum.

## COROLLARIUM.

79. Eodem modo invenitur, data gravitate solidi unius, gravitas alterius, si ratio gravitatis specificæ investigetur (§. 76). E. gr. quæritur gravitas stanni cum plumbo 30 librarum sub eodem volumine. Quia gravitas stanni, ad gravitatem plumbi; ut 39, ad 60½ (§. 77), hoc est, ut 78, ad 121 (§. 178. *Arithm.*); reperietur gravitas stanni quæsitæ 19¾ librarum.

## PROBLEMA VI.

80. *Dato corporis solidi volumine, invenire volumen solidi alterius pondere æqualis.*

RESO-



mixtum ingreditur  $= x$ , erit pondus specificæ gravioris quod mixtum ingreditur  $= p - x$ , pondus à miscibili  $x$  in fluido amissum  $= cx : p$ , amissum à miscibili  $p - x = (bp - bx) : p$ . Ergo

$$(bp - bx + cx) : p = a$$

$$cx - bx = (a - b)p$$

$$x = (a - b)p : (c - b). \text{ Q.e.d.}$$

## SCHOLIUM.

82. Eodem modo solvi potest Problema ab HIERONE Rege Syracusarum olim ARCHIMEDI propositum, quantum scilicet argenti coronæ aureæ admiscuerit dolosus artifex (a).

## PROBLEMA VIII.

83. Determinare bonitatem massarum, massasque adulteratas distinguere à genuinis.

## RESOLUTIO.

Præsupponendum hic est, bonitatem massæ æstimari ex ratione ipsius ad volumen, e. gr. frumentum eo melius, quo gravitas specificæ major. Quare non alia re opus est, quam ut investigetur decrementum ponderis in aqua.

Quodsi, eodem mediante, gravitatis specificæ massarum ratio ad fluidum aliquod determinetur (§ 73); massæ adulteratæ facile dignoscuntur, si facta ponderatione in eodem fluido, diversa ab hac gravitatis specificæ ratio reperitur (§. cit.).

## SCHOLIUM I.

84. Cum aqua non semper ejusdem sit gravitatis specificæ, diversitas prius per ponderationem ejusdem solidi in eadem detegenda.

(a) Vid. Vitruvius Lib. 9. c. 3. f. 223.

## SCHOLIUM II.

85. Notandum præterea, fieri nonnunquam posse, ut Hydrostaticum examen solum adulterationem factam non prodat. E. gr. Cum stannum argento sit specificæ levius, plumbum specificæ gravior, duo hæc metalla (quod inferius expressius docetur) ita misceri possunt, ut eandem cum argento gravitatem specificam nanciscantur: quæ massa postmodum cum argento permixta examen Hydrostaticum non verebitur. Unde apparet, quantitatem trium vel plurium miscibilium in uno mixto non eodem modo determinari, quo quantitas duorum invenitur (§. 81).

## SCHOLIUM III.

86. Notandum denique, per varia experimenta addiscendam esse diversitatem, quæ in gravitate specificæ corporum ejusdem speciei ad idem fluidum occurrere potest, antequam de adulteratione facta judicium feratur.

## PROBLEMA IX.

87. Fluidum specificæ gravior pondere in specificæ leviori.

## RESOLUTIO.

Sit e. gr. Mercurius in aqua ponderandus.

1. Assumatur vas vitreum v. gr. gravitatis 91, quod aqua plenum intra aquam ponderetur, noteturque pondus amissum 36: quod erit pondus aquæ ejusdem cum vitri massa voluminis.
2. Idem vas argento vivo repletum in aëre ponderetur, noteturque pondus 186.
3. Ponderetur etiam in aqua, ut habeatur pondus amissum 43; quod erit æquale ponderi aquæ ejusdem cum vitro & Mercurio simul sumto voluminis.

4. Qua-



4. Quare si pondus aquæ ejusdem cum vitro voluminis 36 inde subtrahatur; relinquetur pondus aquæ ejusdem cum argento vivo voluminis, hoc est, pondus ab argento vivo in aqua amissum 7.

THEOREMA XVII.

88. *Corpus specificè gravius in fluido specificè leviori ea vi descendit, quæ est excessui ponderis ejusdem supra pondus fluidi sub eodem volumine æqualis.*

DEMONSTRATIO.

Corpus in fluido nonnisi ea vi descendit, quæ ipsi relinquitur, demta parte in resistantiam fluidi vincendam impensa. Quamobrem cum hæc æqualis sit ponderi fluidi sub eodem volumine (§. 55); nonnisi excessu ponderis sui supra pondus fluidi sub eodem volumine descendit. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

89. Quoniam vis ad sustentandum corpus in fluido requisita æqualis est vi, qua nititur deorsum in eodem; Vis, quæ corpus specificè gravius in fluido sustentat, æqualis est excessui gravitatis absolutæ supra gravitatem fluidi sub eodem volumine. E. gr. Cuprum librarum  $47\frac{1}{2}$  in aqua amittit de pondere suo  $5\frac{1}{2}$  libras: vis ergo 42 librarum id sustentare valet.

COROLLARIUM II.

90. Quare cum excessus ponderis solidi supra pondus fluidi specificè gravioris minor sit, quam supra pondus specificè levioris sub eodem volumine, in specificè graviore vi minore descendit, quam in

leviore, consequenter etiam in hoc celebrius, in illo tardius descendit.

COROLLARIUM III.

91. Quamobrem in specificè graviori fluido minor vis requiritur ad corpus aliquod sustentandum, ne fundum petat, quam in specificè leviori (§. 89).

PROBLEMA X.

92. *Data solidi submersi gravitate absoluta datoque volumine, determinare vim, qua in fluido attolli potest.*

RESOLUTIO.

1. Exploretur pondus unius pedis cubici aquæ (§. 63); unde,
2. Ob datum solidi submersi volumen, per Regulam trium inveniri potest pondus aquæ idem cum ipso volumen habentis.
3. Hæc ergo si subducatur à gravitate corporis submersi data relinquetur vis, quæ ipsum in aqua sustentare valet (§. 89), adeoque tantillo aucta attollet.

Sit pondus corporis submersi 3000 librarum, volumen 40 pedum cubicorum. Cum pes cubicus aquæ sit 70 librarum (§. 64); erit pondus aquæ idem cum submerso volumen habentis 2800: quod ex 3000 subductum relinquit vim sustentantem, 200 librarum.

SCHOLIUM.

95. *Hinc patet ratio, cur corpora quadam, quæ scilicet ad gravitatem specificam fluidi propius accedunt (§. 90), in fluido isto exigua vi sustententur, quæ plurimorum vires conjunctas in aere superant.*

## CAPUT IV.

*De Gravitatione Corporum Specificè Leviorum in Fluido Graviori.*

## THEOREMA XVIII.

94. **C**orpus specificè levius in fluido graviore mergitur, donec pondus fluidi sub volumine partis immerse æquetur ponderi totius corporis.

## DEMONSTRATIO.

Cum enim columnæ quantalibet, in quas fluidum concipitur divisum, æquiponderent, (§. 34); si corpus solidum eidem imponitur, perinde est ac si columnæ uni tantum ponderis accessisset, quantum est fluidi sub eodem volumine, consequenter columna ista præponderat (§. 35). Cedunt ergo columnæ collaterales (§. 75. *Mechan.*) corpusque solidum immergitur. Quam primum vero corpus ea sui parte immersum, ut fluidum ejectum ex spatio, quod occupat, pondere æquale sit gravitati totius corporis; columna ista non amplius præponderat. Corpus itaque ita immersum ab aqua sustentatur.  
*Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

95. Quia gravitates specificæ corporum ejusdem ponderis sunt reciproce ut volumina (§. 29), volumina vero fluidorum pondere æqualium sunt ut partes immerse ejusdem solidi (§. 59); gravitates specificæ fluidorum reciproce sunt ut partes immerse ejusdem corporis.

## COROLLARIUM II.

96. Solidum ergo profundius mergitur in fluido leviori, quam in graviori.

## COROLLARIUM III.

97. Quo majorem rationem solidi gravitas specificæ ad fluidi specificè levioris gravitatem habuerit; eo profundius corpus mergitur. (§. 203. *Aritbm.*).

## COROLLARIUM IV.

98. Si solidum fuerit ejusdem gravitatis specificæ cum fluido, corpus totum submergitur & datum intra fluidum locum servat.

## COROLLARIUM V.

99. Si corpus specificè levius in fluido graviori totum submergitur, à columnis collateralibus ea vi ad ascensum urgetur, quæ æqualis est excessui fluidi, volumine solido æqualis, supra pondus solidi (§. 75. *Mechan.*).

## COROLLARIUM VI.

100. Corpus adeo specificè levius fundo vasis incumbens non attollitur, nisi fluidum gravius affusum ultra partem assurgat, quæ volumine æqualis est fluido ejusdem cum solido toto ponderis.

## THEOREMA XIX.

101. *Gravitas specificæ solidi, est ad gravitatem specificam fluidi, in quo mergitur; ut volumen partis immerse, ad volumen integrum.*

DEMONSTRATIO.

Volumen enim fluidi solido toti pondere aequalis æquatur volumini partis immerse (§ 94). Cum adeo gravitates specificæ æquiponderantium sint reciproce ut volumina (§ 29.); erit gravitas specifica solidi, ad gravitatem fluidi, in quo mergitur; ut volumen partis immerse, ad volumen integrum. *Q. e. d.*

THEOREMA XX.

102. *Solidorum æquiponderantium partes in fluido graviore immerse sunt æquales.*

DEMONSTRATIO.

Etenim pars immerfa solidi A æqualis est volumini fluidi, quod est ejusdem cum toto corpore A ponderis, & pars immerfa solidi B æqualis est volumini fluidi, quod est ejusdem cum toto corpore B ponderis (§. 94). Est vero gravitas solidi A æqualis gravitati solidi B *per hypoth.* & fluidum idem *per hypoth.* consequenter gravitas fluidi expulsi eadem. Ergo pars immerfa ipsius A est æqualis parti immerse ipsius B. *Q. e. d.*

THEOREMA XXI.

103. *Solidorum æqualium gravitates specificæ sunt ut partes eorundem in eodem fluido demerse.*

DEMONSTRATIO.

Solidorum A & B partes in eodem fluido demerse sunt ut gravitates fluidi expulsi (§. 130. *Mechan.*), adeoque

ut gravitates absolutæ corporum A & B (§. 94). Sunt vero volumina A & B eadem *per hypoth.* Ergo gravitates specificæ sunt ut absolutæ (§. 26), consequenter gravitates specificæ solidorum æqualium A & B sunt ut partes immerse. (§. 167. *Arithm.*) *Q. e. d.*

PROBLEMA XI.

104. *Data gravitate pedis cubici fluidi e. gr. aquæ, una cum volumine partis immerse solidi, invenire pondus totius corporis.*

RESOLUTIO.

Quia pondus corporis solidi æquale est ponderi fluidi, quod idem cum parte immerfa volumen habet (§. 94); ad pedem cubicum, volumen partis immerse, & gravitatem pedis cubici unius fluidi quærendus est numerus quartus proportionalis, qui erit pondus totius corporis.

E. gr. Pes cubicus aquæ est 70 librarum, (§. 84). Si itaque fuerit volumen partis immerse 40 pedum cubicorum: reperietur pondus totius corporis 2800 librarum.

PROBLEMA XII.

105. *Data gravitate e. gr. unius pedis cubici aquæ, & gravitate solidi, invenire volumen partis immergenda.*

RESOLUTIO.

Cum sit ut gravitas unius pedis cubici aquæ, ad pondus integrum corporis; ita pes

pes cubicus unus, ad volumen partis immergendæ (§. 94); tribus terminis in analogia datis, *per hypoth.* quartus per Regulam trium invenitur.

E. gr. Sit gravitas corporis 3000 librarum: quia pes cubicus aquæ est librarum 70 (§. 64), reperietur volumen partis immergendæ pedum cubicorum  $42\frac{6}{7}$ .

### PROBLEMA XIII.

106. *Datis gravitate & volumine solidi specificè levioris, una cum gravitate fluidi specificè gravioris, invenire vim, qua illud sub hoc demersum detinetur.*

#### RESOLUTIO.

Quoniam vis ista æqualis est excessui ponderis fluidi sub eodem volumine, quod habet solidum submersum, supra pondus hujus (§. 99),

1. Ex datis volumine solidi, & gravitate unius pedis cubici aquæ, quærat per Regulam trium gravitas fluidi sub æquali volumine.
2. Inde subtrahatur pondus solidi: ita nimirum vis quæsita relinquetur.

E. gr. Quæritur, qua vi opus sit ad corpus 100 librarum, cujus volumen 8 pedum, sub aquis detinendum. Quoniam pes cubicus aquæ est 70 librarum (§. 64); pondus aquæ sub volumine 8 pedum est 560. Unde si subducatur pondus solidi 100, relinquitur vis ad detinendum solidum sub aqua 460 librarum.

### COROLLARIUM.

107. Quoniam corpus specificè levius eadem vi ascendit in fluido graviori, qua ad ascensum ejus impediendum, opus est (§. 75. *Mechan.*); per præsens Problema invenitur quoque vis, qua solidum specificè levius in fluido graviori ascendit.

### PROBLEMA XIV.

108. *Instrumentum construere, quo explorare licet, quantum salis in aqua data contineatur.*

#### RESOLUTIO.

1. Ex tenui lamina cuprea construatur *Fig.* globus AB cum tubo BC ejus cavitatis, ne in aqua pura totus mergatur.
2. Granula plumbea globo AB indantur, donec instrumentum in D usque immergatur.
3. Pondus totius aquæ, in qua mergitur, dividatur per 99: quotus indicabit, quantum salis sit in ea dissolvendum, ut partem ponderis centesimam absolvat.
4. Postquam igitur tantum salis in aqua fuerit dissolutum, instrumentum de novo in ea mergatur, noteturque punctum E, quod hæret in superficie aquæ falsæ. Ita nimirum constabit terminus immersionis in aqua, quæ sub volumine 100 librarum salis libram unam comprehendit.
5. Quodsi eodem modo inveniantur puncta alia F, G &c. quæ indicent terminos immersionis in aqua, sub volumine 100 librarum, duas, tres, qua-

quatuor &c. libras falis continente; instrumento hoc explorare poteris, quantum falis in aqua data contineatur.

DEMONSTRATIO.

Quodsi enim instrumentum in aqua falsa mergatur, statim apparebit, quot libræ falis in aqua falsa centum librarum contineantur. Quamobrem si pondus aquæ falsæ exploretur, per Regulam trium invenitur quantitas falis in ea dissoluti. *Q. e. d.*

SCHOLION I.

109. Ut Problema præsens rectius intelligatur, exemplo sequente id illustrare libet. Sit gravitas aquæ puræ 2000 scrupulorum, Divide 2000 per 99, quotus  $20\frac{20}{99}$  indicabit, quot scrupula falis in aqua dissolvenda, ut ponderis centesimam partem constituat. Divide ulterius 2000 per 98, quoti  $20\frac{40}{98}$  duplum  $40\frac{80}{98}$  indicat, quantum falis in aqua sit dissolvendum, ut sit  $\frac{2}{100}$  totius ponderis. Divide similiter 2000 per 97, quoti  $20\frac{60}{97}$  triplum  $61\frac{83}{97}$  indicat, quantum falis in aqua dissolvi debeat, ut si  $\frac{3}{100}$  totius ponderis &c. Enimvero cum non sine tadio, ad singula divisionum puncta inveniendâ, aqua pura uti liceat; numerum sequentem continuo subduc à proxime præcedente, residuum enim indicabit, quantum adhuc falis sit addendum ad inveniendum punctum proxime sequens. E. gr. ubi in aqua dissolveris falis  $20\frac{20}{99}$  pro inveniendâ puncto E: ut alterum F reperias addenda sunt insuper scrupula  $20\frac{2}{99}$  fere, quæ est differentia inter  $20\frac{20}{99}$  &  $40\frac{80}{98}$ .

Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.

SCHOLION II.

110. Similia instrumenta ex vitro construi solent, tubo BC in partes æquales diviso, & hermetice in C sigillato, globo vero geminato, ad examinandam fluidorum gravitatem specificam (§. 101). Fig. 14.

PROBLEMA XV.

III. Data gravitate vasis ex materia specificè graviore parandi, & gravitate fluidi specificè levioris, determinare cavitatem, quam habere debet, ut fluido supernatet.

RESOLUTIO.

Cum detur pondus fluidi sub volumine unius pedis cubici, per hypoth. volumen fluidi vasi pondere æqualis per Regulam trium inveniri potest. Quodsi ergo cavitas paulo major fiat, vas sub eodem volumine minus ponderis continebit, quam fluidum, adeoque eodem specificè levius erit (§. 5), consequenter ipsi supernatabit (§. 94).

E. gr. Sit parandus globus ferreus aquæ supernatans, cujus pondus 30 librarum. Quia pondus unius pedis cubici est 70 librarum, reperietur volumen aquæ 30 librarum  $428'' 571'''$ , adeoque cubus diametri sphæræ  $818924$  (§. 552, Geom.): unde radix cubica extracta  $9'' 3'''$  est diameter sphæræ aqueæ 30 librarum. Quodsi ergo diameter cavitatis fiat paulo major e. gr. unius pedis, eo minor ipsius pars mergetur, quo major fuerit diameter.

## PROBLEMA XVI.

112. *Invenire gravitatem fluidi idem cum corpore quodam specificè leviori volumen habentis, cujus pondus datur.*

## RESOLUTIO.

1. Ponderetur corpus quodcumque solidum specificè gravius in fluido dato, ut habeatur pondus fluidi sub eodem volumine (§. 55).
2. Hoc corpus combinetur cum altero specificè leviori, quam fluidum, & massa utriusque simul in eodem fluido ponderetur, ut habeatur pondus fluidi idem cum utraque massa volumen habentis (§. cit.).
3. Quodsi itaque ab hoc pondere subducas pondus fluidi primo inventum, relinquetur pondus fluidi idem cum corpore specificè leviori volumen habentis.

E. gr. Sit in aqua ponderanda cera 15 librarum. Quoniam plumbum 60½ librarum amittit in aqua 5½; idem vero plumbum ceræ 15 librarum conjunctum amittit 21½; reperietur pondus aquæ idem cum cera volumen habentis 16 librarum.

## THEOREMA XXII.

Fig. 15. 113. *Vis que requiritur ad vas vacuum DFEG ad lineam AC in aquam immergendum, ad quam aqua plenum immergitur, æquatur vi tantundem aquæ in aëre sustentanti.*

## DEMONSTRATIO.

Vis aquam in aëre sustentans gravitati ejus æqualis est. Sed vis vas vacuum DFEG ad lineam AC in aquam immergens æquatur gravitati aquæ vas replentis, quia eadem ad eandem lineam AC vas immergit, *per hypothes.* Ergo hæc vis æquatur alteri, quæ aquam in vase contentam in aëre sustentare valet.

## THEOREMA XXIII.

114. *Vis, que impenditur in solidum specificè levius sub fluido graviore detinendum, itemque pondus à solido graviore in fluido leviori amissum, gravitati fluidi accrescit & cum ea ponderat.*

## DEMONSTRATIO.

Vis enim, quæ impenditur in solidum specificè levius sub fluido graviore detinendum, premit fluidum subiectum, adeoque perinde est, ac si massa tantundem premens eidem imponeretur. Sed hæc massa, utpote unum grave cum fluido constituens, unà cum eodem ponderaret. Ergo & vis eidem æquivalens cum fluido ponderare debet. *Quod erat unum.*

Pars ponderis à solido specificè graviore in fluido leviori amissum à fluido sustentatur, ceu patet ex demonstratione Theorem. 14. (§. 55). Sed pondus, quod fluido incumbit, unum cum eodem totum constituit, adeo-

que perinde cum eo gravitare debet, ac si massa fluidi tantundem ponderans affunderetur. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

115. Hinc Problema 13. (§. 106) etiam experimentando resolvere licet.

COROLLARIUM II.

116. Liquet etiam, vim nullam perdi; sed tantum aliorum impendi in corporum gravitatione.

SCHOLION.

117. *Præsens Theorema, si volupe fuerit, non minus ac præcedentia omnia Experimentis facile comprobantur. Respondent Experimenta in istiusmodi materiis Examinibus Arithmeticis, uti jam innuimus in Arithmeticae Elementis (§. 225),*

THEOREMA XXIV.

118. *Si corpus specificè levius quodam fluido, cum corpore, quod eodem specificè gravius est, quomodocunque jungatur, ut unum absque altero moveri non possit, fueritque excessus fluidi istius, supra pondus specificè levioris in eodem demersi, æqualis excessui ponderis specificè gravioris, supra pondus fluidi sub eodem volumine; corpora ista simul sumpta eandem cum fluido gravitatem specificam habent.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim gravitas corporis

specificè gravioris, tantum excedit gravitatem fluidi sub eodem volumine, quantum gravitas fluidi excedit gravitatem corporis specificè levioris sub eodem volumine *per hypoth.* in volumine fluidi, quod voluminibus utriusque corporis simul sumptis æquale est, tantundem præcise gravitatis inest, quanta est gravitas utriusque corporis simul. Quamobrem cum corpora ista ita conjuncta, ut unum absque altero moveri non possit *per hypoth.* adeoque vi gravitatis suæ simul deorsum nitantur (§. 4. *Mechan.*), consequenter quoad gravitationem pro uno eodemque corpore haberi debeant; simul sumpta eandem cum fluido isto gravitatem specificam habent (§. 5. 6). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

119. Quia solidum ejusdem gravitatis specificæ cum fluido, in eodem totum submergitur, & datum intra fluidum locum servat (§. 96); corpora diversæ gravitatis specificæ inter se & cum fluido, in hypothese Theorematis, tota simul in fluido demerguntur, datumque intra ipsum locum servant, consequenter nec ascendant, nec descendant.

THEOREMA XXV.

120. *Vis corpus solidum in fluido specificè leviori demersum detinens, est ad gravitatem corporis; ut excessus voluminis supra partem qua in fluido isto mergitur, ad hanc partem.*

## DEMONSTRATIO.

Quodsi in volumine corporis tantumdem gravitatis contineretur, quantum in æquali volumine fluidi inest; totum in eodem submergeretur, & datum in eodem locum servaret, vi nulla extrinsecus accedente (§. 98). Quare cum sub volumine fluidi, quod parti immerse solidi æquale est, tantum gravitatis inest, quantum per totum corpus diffunditur (§. 94); vis, quæ extrinsecus superaccedere debet, ut solidum in dato loco intra fluidum detineatur, æqualis est gravitati fluidi per volumen diffusæ, quod æquale est excessui corporis solidi integri supra partem, qua in fluido mergitur vi gravitatis propriæ. Enimvero in fluido tanquam gravi homogeneo gravitas est volumini proportionalis (§. 131. *Mechan.*). Ergo vis ad corpus solidum in fluido specificè leviori detinendum requisita, est ad gravitatem totius solidi; uti excessus voluminis supra partem in eodem vi gravitatis propriæ immerfam, ad hanc partem immerfam. *Q. e. d.*

## THEOREMA XXVI.

121. *Vis corpus solidum in fluido specificè leviori demersum detinens, est ad gravitatem corporis; ut differentia gravitatum specificarum solidi atque fluidi, ad gravitatem specificam solidi.*

## DEMONSTRATIO.

Est enim gravitas specificæ fluidi, ad

gravitatem specificam solidi; ut volumen totius solidi, ad partem ejus, qua in fluido vi gravitatis propriæ demergitur (§. 101). Ergo differentia gravitatum specificarum fluidi & solidi, est ad gravitatem specificam solidi; ut excessus voluminis solidi supra partem immerfam, ad hanc ipsam partem (§. 193 *Arithm.*). Quoniam itaque vis in fluido corpus specificè levius suspensum detinens, est ad gravitatem ejus; ut excessus voluminis supra partem qua vi gravitatis suæ in eodem demergitur, ad hanc partem (§. 120); erit etiam eadem vis, ad gravitatem corporis; ut differentia gravitatum specificarum solidi ac fluidi, ad gravitatem specificam solidi (§. 167. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## PROBLEMA VII.

122. *Dato pondere corporis fluido specificè gravioris, una cum parte ejusdem in fluido amissa, dataque ratione gravitatis specificæ fluidi ac corporis alicujus specificè levioris, invenire pondus ejusdem, quod requiritur ut specificè graviori quomodocunque conjunctum idem intra fluidum in dato quocunque loco detineat.*

## RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Subtrahatur pars ponderis quam corpus solidum specificè gravius in fluido leviori amittit, a pondere corporis dato, ut relinquatur vis, quæ solidum intra fluidum in dato loco detinere potest (§. 75. *Mechan.*).



2. Ex data gravitate specifica fluidi & corporis specificè levioris, atque vi ad sustentandum specificè gravius intra fluidum modo reperta, seu, quod perinde est, ad detinendum specificè levius a graviore requisita; investigetur gravitas totius corporis specificè levioris: quod vi Theorematis præcedentis (§. 121) per Regulam trium, (§. 302. *Arithm.*) reperiri potest. *Q. e. i. & d.*

COROLLARIUM I.

123. Quoniam solidum ejusdem gravitatis specificæ est cum fluido, quod datum intra fluidum locum servat (§. 98), cum specificè gravius in eodem descendat (§. 88), specificè levius aliqua tantum sui parte mergatur (§. 94); per præsens Problema patet, quomodo combinando duo corpora, quorum alterum fluido specificè levius, alterum specificè gravius, efficiatur corpus eandem cum fluido gravitatem specificam habens.

COROLLARIUM II.

124. Si pondus corporis specificè levioris tantisper augeatur, specificè gravius ad superficiem fluidi attollet.

SCHOLION.

125. Theorema præsens cum ejus Corollariis etiam per Theorema 24 (§. 113) demonstrari poterat.

THEOREMA XXVII.

126. *Vis corpus solidum in fluido specificè leviori sustentans, est ad pondus ejusdem; ut differentia gravitatum spe-*

*cificarum illius ac fluidi, ad gravitatem specificam solidi.*

DEMONSTRATIO.

Est enim gravitas specifica solidi, ad gravitatem fluidi; ut pondus integrum solidi, ad partem ejus in fluido amissam (§. 59). Quamobrem convertendo erit, ut differentia gravitatum specificarum, ad gravitatem solidi; ita excessus solidi supra fluidum, ad pondus solidi integrum (§. 193. *Arithm.*). Est vero excessus solidi supra fluidum æqualis vi ad solidum intra fluidum sustentandum requisitæ (§. 89). Ergo hæc vis, est ad pondus integrum solidi sustentandi; ut differentia gravitatum specificarum, ad gravitatem solidi. *Q. e. d.*

PROBLEMA XVIII.

127. *Datis gravitate & volumine solidi specificè levioris, una cum gravitate unius pedis cubici fluidi specificè gravioris, nec non gravitate specifica ejusdem fluidi & corporis solidi eodem specificè gravioris, invenire quantum hujus pondus esse debeat, ut specificè leviori quomodocunque conjunctum idem intra fluidum in dato quocunque loco detineat.*

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

I. Ex datis gravitate & volumine solidi specificè levioris, una cum gravitate unius pedis cubici fluidi specificè gravioris; inveniatur vis ad solidum in fluido detinendum requi-

sita (§. 106): quæ erit excessus  
solidi specificè gravioris supra pon-  
dus fluidi mole æqualis (§. 89).  
Unde

2. Ex data ratione gravitatum speci-  
ficarum solidi specificè gravioris &  
fluidi, atque vi ista, seu excessu præ-  
dicto; invenitur pondus solidi spe-  
cificè gravioris cum leviori conjun-  
gendum, ut idem in fluido susten-  
tet (§. 115). *Q. e. i. & d.*

## COROLLARIUM.

128. Quodsi solidi specificè gravioris  
pondus tantisper augeatur, cum specificè  
leviori una descendet, seu specificè levius  
ad fundum secum abripiet.

## SCHOLIUM.

129. *Non absimili modo plura alia Pro-  
blemata solvi possunt, quæ in Philosophia Ex-  
perimentalis & vita communi ac Arte usum  
suum habere possint.*

FINIS HYDROSTATICÆ.



Fig. Hydrost.










Fig. 14.



Fig. 10.







# ELEMENTA AEROMETRIÆ.

## P R Æ F A T I O.



MULTO jam tempore in more positum, ut Physicæ quædam capita in numerum disciplinarum Mathematicarum relata fuerint, postquam, facta ad Experientias indubias Arithmeticæ, Geometriæ & Analyseos, hoc est, Matheos puræ applicatione, formam Mathematicam iis induere licuit. Non alia sane de causa Hydrostatica, Hydraulica, Optica cum Catoptrica atque Dioptrica, itemque Astronomia in numero isto comparent. Quamobrem cum multa de viribus atque affectionibus Aëris more Geometrarum & ex principiis Matheos puræ demonstrari, demonstrata ad varios usus dextre applicari possint; Anno 1709, numerum disciplinarum Mathematicarum augere animum induxi, editis Aërometriæ Elementis, quæ anno sequente 1710, in Tomo secundo Elementorum Matheos Germanicorum, Hydrostaticæ subjunxi, tanquam ejus filiam atque alumnam. Enimvero tanto majori jure locum semel adeptum tuetur, quod Hydraulica, dudum in Matheos recepta, in multis opem ejus impleret.

ploret. Quemadmodum enim Aërometriæ facem præfert Hydrostatica; ita Aërometria Hydraulicam illustrat. Antequam igitur ad Aërometriad animam appellas, Hydrostaticæ dogmatibus eundem imbuas opus est. Antequam ad Hydraulicam pedem promoveas, Aërometriad tibi sociam jungas è re tua omnino esse deprehendes. Jucundum vero est Aerometriæ studium, idemque utilissimum, tum quod inde ratio plurimorum Naturæ Phænomenorum desumitur, tum quod variarum Machinarum ac Instrumentorum structura in ea continetur. Ut brevitati consulatur & sequentia antecedentibus respondeant; non integra exhibeo Aërometriæ Elementa, quæ ante quinque fere annos à me edita esse modo meminì, sed quæ digniora reliquis visa sunt, in compendio exhibere & nonnullis augere constitui. Cæterum Aërometriæ Elementa, æquis harum rerum arbitris consentientibus, iis potissimum commendo, quibus curæ cordique fuerit, ad Experimenta applicare Mathesin. Hunc fructum cupidis polliceor, & ut eundem consequantur ex animo apprecor.



# ELEMENTA AEROMETRIÆ.

## CAPUT PRIMUM.

### *De Principiis Aërometriæ.*

#### DEFINITIO I.

1. **A**erometria est scientia metiendi Aërem.

#### COROLLARIUM.

2. Cum metiri idem sic ac rationem quantitatum ad aliam homogeneam datam investigare (S. 23. *Geom.*); in Aërometria tradendæ sunt leges, juxta quas omnia de aëre conceptibilia & extensionis terminos vel intensitatis gradus habentia accurate determinari possunt.

#### DEFINITIO II.

3. *Aër* est corpus fluidum Telluri circumfusum & spatia ab aliis corporibus in eadem relicta occupans, nisi impediatur.

#### SCHOLION.

4. Definitionem aëris nonnisi nominalem tradere intendo. Sufficit igitur exhibuisse notam aëre præsentem semper obviam, ex qua ejus præsentia certo colligi potest.

#### DEFINITIO III.

5. *Compressio* est coarctatio massæ in minus volumen per impulsum aut pressuram alterius corporis facta.

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

#### DEFINITIO IV.

6. *Condensatio* est coarctatio massæ in minus volumen vi frigoris facta.

#### DEFINITIO V.

7. *Dilatatio* est expansio massæ in majus volumen, quam facta compressione habuerat.

#### DEFINITIO VI.

8. *Rarefactio* est expansio massæ in majus volumen vi coloris facta.

#### DEFINITIO VII.

9. *Elater aëris* est vis, qua vi comprimente sublata dilatatur.

#### AXIOMA I.

10. *Quo corpus est gravius, eo magis premit alia sibi subjuncta.*

#### SCHOLION.

11. Patet ex definitione gravitatis (S. 4. *Mechan.*). Corpus scilicet vi gravitatis nititur deorsum, adeoque premit alterum descensu resistens. Quo majore itaque vi deorsum nititur, eo magis quoque premit alterum sibi subjunctum.

## AXIOMA II.

12. *Quamdiu dilatatio per elaterem facta eadem est, elater quoque immutatus sit necesse est: quodsi vero elater majorem dilatationem produxerit, crevisse; sita minorem, decrevisse censendus est.*

## EXPERIENTIA I.

13. *Promove celeriter manum per spatia, quæ vacua esse videntur, faciem versus; impetum quendam in eam fieri animadvertes, utut manus ipsam non contingat.*

## COROLLARIUM.

14. *Necessè est adeo, ut interstitia inter corpora terrestria, quæ vacua esse videntur, materia quadam repleantur, cujus partes sint admodum subtiles, cum non videantur, & inconnexæ. cum motum corporum non impediunt. Spatia igitur in Tellure ab aliis corporibus derelicta fluidum aliquod subtilissimum occupat (§. 3. Hydrostat.) hoc est, aër datur (§. 3.).*

## EXPERIENTIA II.

15. *Globo cupreo aut orichalceo satis sapaci afferriminetur epistomium cum cochlea fœmina, ita ut syrinx mediante cochlea mari ad arbitrium ei adaptari rursusque removeri possit. Quodsi ope syringis plus aëris in globum intrudas, eumque clauso epistomio bilanci imponas, pondus ejus auctam deprehendes: ubi vero epistomium rursus aperies, aërem erumpere animadvertes, & globus metallicus recuperabit pondus, quod ante intrusionem aëris habuerat.*

## SCHOLION.

16. *Experimentum hoc excogitavit GALILÆUS GALILÆI, lagena vitrea usus (a); sed cum vasa vitrea ab aëre compresso facile nec sine periculo adstantium frangantur, ego metallico uti soleo, in gratiam curiosorum idem repetens.*

## COROLLARIUM I.

17. *Quoniam in globum metallicum plus aëris intrudi potest, quam ordinarie capit; evidens est, aërem in minus volumen coarctari posse, quam ordinarie occupat. Comprimi ergo potest (§. 5.).*

## COROLLARIUM II.

18. *Cum epistomio aperto aër rursus egrediatur, ipsoque egresso pondus pristinum recuperet globus, quod ante compressionem aëris in ipso factam habuerat; certo hinc intelligitur, tantum præcise aëris rursus egressum, quantum intrusum fuerat. Aër itaque compressus ad pristinam expansionem redit, si vis comprimens aut expansioni resistens removeatur, adeoque elatere gaudet (§. 9.).*

## COROLLARIUM III.

19. *Certum itaque compressionis indicium est, quod aër intra vas quoddam magis compressus sit, quam externus; si orificio ejus aperto, ceteris paribus, aëris quædam portio egredi observetur,*

## COROLLARIUM IV.

20. *Denique quia pondus vasis augetur, si aër intra ipsum comprimitur; massa aërea nifum exerceat opus est deorsum juxta lineas rectas ad horizontem perpendiculares (§. 215. Mechan.). Gravis ergo existit (§. 4. Mechan.).*

## COROLLARIUM V.

21. *Premit ergo corpora subjecta secundum lineas rectas ad horizontem perpendiculares (§. 215. Mechan.).*

Ex



EXPERIENTIA III.

22. Quodsi vesicam aëre mediocriter repleam firmiterque constrictam ad ignem admoveas; ea non solum distenditur, sed & ingenti prorsus fragore tandem disrumpitur. Quodsi vero eam ab igne removeas, antequam disrumpatur, statim flaccida evadit.

COROLLARIUM I.

23. Cum intra vesicam nil nisi pauculum aëris contentum fuerit; expansio vesicæ expansionem aëris inclusi arguit. Aër itaque rarefit (§. 8).

COROLLARIUM II.

24. Quia calore expirato vesica distenta rursus flaccida fit; frigore in volumen minus rursus coarctatur, adeoque condensatur (§. 6).

EXPERIENTIA IV.

25. Si aër in vase comprimatur, ejus quandam portionem aperto orificio ex ipso iterum expirare notabis in quacunque orificii directione.

COROLLARIUM.

26. Elater igitur aëris nititur quaquaversum secundum quamlibet directionem.

EXPERIENTIA V.

27. Si tubum oblongum AB, cujus altitudo 32 pedibus Rhenanis major, in C epistomio instructum & verticaliter erectum aqua repleas, orificium inferius A in aquam immergas, & aperto orificio B epistomium aperias, aqua tota cum impetu effluit: si vero obtura-

to orificio B epistomium C recludas, aqua usque ad D descendit, ac in altitudine 31 pedum Rhenanorum, ultra libellam aqua in vase GH contenta, pendula hæret.

COROLLARIUM.

28. Quoniam aqua intra tubum AB pendula aquam in vasculo sibi subjectam premit, nec tamen descendit; necesse est, ut, si aqua in vasculo contenta in istiusmodi columnas divisa concipiatur, qualis est, quæ tubo AB subjacet, singulæ æquali vi premantur. Sed circa tubum superficiæ aquæ incumbit aër (§. 3), eamque premit (§. 21). Columna igitur aërea, a superficie aquæ in vasculo contentæ usque ad extremitatem atmosphæræ extensa, eandem habet gravitatem cum cylindro aqueo super eadem basi, sed altitudinis 31 pedum Rhenanorum (§. 36. Hydrost.).

SCHOLIUM.

29. Hoc æquilibrium aëris cum aqua primus observavit hortulanus quidam Florentinus, aquam in antlia tractoria ultra 18 cubitos attolli non posse miratus, atque cum GALILÆO Phenomenon insperatum communicavit ipse causam ejus ignorans (a). Iterarunt hoc experimentum complures, quos inter MARIOTTUS (b) altitudinem aquæ in tubo pendula reperit 32 pedum Parisiensium. EVANGELISTA TORRICELLUS, discipulus GALILÆI, aquæ substituit Mercurium, cujus altitudo, utpote quatuordecies gravioris aqua, reperitur 28 circiter digitorum Rhenanorum (§. 36. Hydrost.).

Nn 2

CAPUT

(a) Mechan. Dial. I. p. m. 15. 16.

(b) Trait. du mouvement des Eaux. part. 2. Disc. I. p. 9.

## CAPUT II.

## De Elatere &amp; Gravitate Aëris.

## THEOREMA I.

30. **E**later aëris inferioris æquatur ponderi totius superioris ipsi incumbentis.

## DEMONSTRATIO.

Aër enim superior premit inferiorem (§. 21). Elater vero æquatur ponderi prementi (§. 553. *Mechan.*). Ergo elater aëris inferioris æquatur ponderi totius superioris ipsi incumbentis. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

31. Quoniam pondus aëris superioris inferiori incumbentis æquatur ponderi columnæ aqueæ, cujus eadem cum volumine aëris basis, sed altitudo 31 pedum (§. 28), vel etiam columnæ mercuriali, cujus altitudo 28 digitorum (§. 29); elater aëris inferioris eidem columnæ aqueæ & mercuriali æquatur.

## SCHOLIUM.

32. Pondus hujus columnæ aqueæ vel mercurialis dicemus in posterum, brevitatis gratia, Pondus Atmosphæricum.

## COROLLARIUM II.

33. Elater aëris inclusi, si cætera cum ambiente externo paria sint, æquatur similiter ponderi totius superioris incumbentis.

## COROLLARIUM III.

34. Inclusus adeo aër eadem vi premit, qua pondus Atmosphæricum.

## COROLLARIUM IV.

35. Ergo etiam hic mercurium, ad altitudinem 28 digitorum, aquam vero ad altitudinem 31 pedum in tubo vacuo suspendit (§. 28. 29).

## THEOREMA II.

36. Si vas aliquod ab aëre vacuum prope Tellurem aperiatur, aër ambiens externus extemplo in cavitatem ejus ruet, eamque replebit.

## DEMONSTRATIO.

Est enim aër in statu compressionis (§. 28), cumque elatere gaudeat (§. 18), ad majorem continuo expansionem nititur (§. 9) & quidem quaquaversum (§. 26). Quare cum, intra vas vacuum, nisi huic nihil resistat, expansio per cavitatem vasis actu sequetur (§. 75. *Mechan.*). Et quia, si aliquod spatium vacuum intra cavitatem vasis ab aëre irruente non occupatum supponamus, illud instar vasis vacui intra aërem aperti considerari potest, aër in vas irruens etiam hoc spatium replere debet. Si itaque vas aliquod ab aëre vacuum prope tellurem aperiatur, aër ambiens externus extemplo in cavitatem ejus ruit, eamque replet. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

37. Si ergo syrinx orificio alicujus vasis firmiter infigatur, & embolus postea extrahatur, aër in vase contentus per siphonis cavitatem expandetur.

## DEFINITIO VIII.

38. *Antlia Pneumatica* est Machina, qua mediante aër ex vasis educi potest.

## SCHOLIUM.

39. *Primus Antlia Pneumatica inventor est OTTO DE GUERICKE, Consul Magdeburgicus,*

qui

qui experimenta sua jam sub finem comitiorum Imperialium, anno 1654. Ratisbonæ celebratorum, in præsentia Imperatoris, Electorum ac Principum quorundam iteravit (a). Ut ut vero inter externos non desint, qui laudem inventionis ROBERTO BOYLIO, experimentatori celeberrimo, tribuunt, quos inter ex Anglis ROBERTUS HOOKIUS, recensente CL. WALLERO (b) & ex Gallis, JOANNES BAPTISTA DU HAMEL variis scriptis celebris (c); ipse tamen BOYLIO pro eo, qui decet virum doctum, candore (d) agnoscit, quod OTTO DE GUERICKE ipsum prævenit, quodque ipse ab iis, quæ CASPARUS SCHOTTUS, in *Mechanica Hydraulico-pneumatica A. 1657. edita, de vasis vitreis à GUERICKIO ab ære evacuatis publicaverat, ad sua experimenta & Antliæ Pneumaticæ constructionem incitatus fuerit. Structuram immutavit ipse GUERICKIUS (e): aliud artificium embolum extrahendi applicuit BOYLIO, quo nunc ordinarie utuntur. Recentiùs structuram Antliæ Pneumaticæ immutavit HAUKSBEIUS, Mechanicus Anglus, cujus formam describit CEL. S' GRAVESANDIUS (f), ipseque inventor delineat (g).*

PROBLEMA I.

40. Antliam Pneumaticam construere.

RESOLUTIO.

1. Paretur cylindrus AB ex orichalco, intus cavus & satis capax, cujus interior superficies optime polita, ut embolus DE arcèssime ipsam un-

(a) Vid. Præfatio ad Experimenta nova Magdeburgica.

(b) In vita Hookii operibus ejus posthumis præmissa f. 3.

(c) In Philos. Vet. & Nov. Tom. 4. Phys. gener. Tract. 2. dissert. 3. c. 10. p. m. 234.

(d) In Præf. ad Nova Experim. Phys. Mech. de vi aëris elastica, p. m. 3.

(e) L. c. f.

(f) In Elementis Physicæ Mathematicis Tom. 1. Lib. 2. c. 6. p. 309. Edit. sec.

(g) Physico Mechanical Experiments. p. 1. & seqq.

diquaque contingat, ne ulli moleculæ aëreæ inter eam & embolum locus relinquatur.

2. Embolus constare debet ex orbibus coriaceis firmiter sibi mutuo appressis mediante cochlea orbi orichalceo E afferruminata. Corium optimum est bubulum, ex quo succin-gula militum parari solent. Probe autem notandum est, corium imbibe-re debere oleum olivarum tertiæ parti pinguedinis suillæ excoctæ per-mixtum, ne successu temporis indu-rescat.
3. Embolo affigatur lamella ferrea den-tata DC, ut ope rotulæ dentatæ, ma-nubrio NO versato, commode ex-trahi ac intrudi possit.
4. In B afferruminetur basi cylindri tu-bulus BFKL cum epistomio GHI ex cylindro cavo HF & operculo cy-lindrico solido I composito.
5. Denique tubulus KL in L instrua-tur cochlea, ut vasa, quorum ori-ficia cochleis foeminis seu matricibus instructa, ad eundem firmari possint. Eodem modo adaptandus est, quo-ties usus postulat, catinus orichal-ceus PQ, cui vitra companiformia commode imponere liceat.

Dico ex vasis, ad hanc Machinam firmatis, aërem educi posse.

DEMONSTRATIO.

Cum enim embolus CE extrahitur, epistomio versus antliam AB & tubu-lum KL aperto, aër in vase contentus per tubuli LKGB & cylindri AB cavi-

tatem expanditur (§. 36). Quodsi jam epistomium claudatur versus tubulum KL, sit tamen apertum versus antliam AB, & remoto operculo I embolus DE rursus intrudatur, aër per epistomium FH extruditur, consequenter aeris aliqua portio ex vase educata. Quo pluries itaque hæc operatio reperitur, eo plus aëris ex vase educitur. Ope adeo Machinæ constructæ aër ex vasis educi potest.  
*Q. e. d.*

## SCHOLION I.

41. In usu antliæ notandum, embolum oleo olivarum illini & fundo catini orbem coriaceum bubulum (quali ad constructionem emboli utendum) probe malefactum & in medio perforatum applicandum esse, ut embolus facile extrahatur & antliam undequaque artissime contingat, vas vero evacuandum firmiter catino apprimatur.

## SCHOLION II.

42. In evacuandis vasis rationem habendam esse tantum vis elasticæ, ad quam solam in demonstratione respeximus experimenta probant. Aërem enim, iteratis emboli agitationibus, continuo rariorem fieri, docet expansio vesicæ sub campana suspensæ, firmiter constricto collo & nonnisi pauculo aëris intus relicto. Enimvero dilatationem tantum fieri per elaterem, nec quicquam conferre gravitatem, in Actis Lipsiensibus (a) ante triennium circiter experimento docui: quod hic repetere juvat. Fieri curavi tubum ex lamina orichalcea coehleæ afferruminatum, ut ad antliam firmari posset, atque fornicem vasis evacuandi fere attinentem. Quantum, per hunc tubum, aëris facta qualibet emboli agitatio-

(a) A. 1711. mens. Jan. p. 14.

ne ex vase educeretur, maxima cum circumspeditione notavi: embolo enim intruso, donec aër in antlia contentus eandem cum externo densitatem haberet, numeravi dentes virgæ dentata extra antliam conspicendos. Max tubo isto remoto, evacuationem ejusdem vasis denuo tentavi: quam eadem prorsus ratione ut antea contingere didici. Ulus autem sum vasis & majoribus, & minoribus eodem semper successu, estque diameter luminis in antlia mea 4 digitorum 6 linearum, longitudo cylindri 2 pedum Rhenanorum. Quoniam vero doctissimis Diarii Trevoltiensis collectoribus (b), quorum erga me humanitatem ut gratus prædicem fas est, hoc experimentum non sufficere visum est ad vim gravitatis ab evacuatione vasorum excludendam; ideo (§. 47) mox ex natura elateris id demonstrabimus, ut in Aërometria A. 1709. edita. Caterum hæc ratio est, cur antliæ situs ad horizontem inclinatus esse possit, nec opus sit, ut, quod post GUERICKIUM etiam BOYLIUS & nuper HAUKSBEJUS fecit, ut ad horizontem perpendicularis fiat.

## SCHOLION III.

43. Aliud antliæ genus ex duplici cylindro construxit experimentator industrius FRANCISCUS HAUKSBEË, cujus descriptionem exhibent Actorum Eruditorum collectores (c). Eam, pro more suo, in multis immutavit LEUPOLDUS variis inventionibus Mechanicis celebris (d). Sed cum in comprimendo aëre usus ejus sit nullus, qui tamen in experimentis frequens esse solet, nec vasa tam exacte evacuari posse videantur, quam antlia ordinaria utendo: ideo antiquum antliæ genus huic recentiori præferendum esse judico, nisi accedat medela.

## THEO-

(b) Memoires pour l'Histoire des Sciences & des beaux Arts. Aout. 1711. art. 120. p. 1404.

(c) Supplem. Tom. V. Sect. 9 p. 403. Confer Autores arte, not. f & g, pag. præc. citatos.

(d) Act. Erudit. A. 1713. p. 95.

THEOREMA III.

44. *Aër Telluri circumfunditur, nec uno in loco altior esse potest quam in altero.*

DEMONSTRATIO.

Aut enim aër Telluri circumfunditur, aut non. Ponamus posterius. Dabitur ergo super aliqua Telluris parte spatium ab aëre vacuum. Jam cum aër vacuo huic contiguus existat, per spatium illud expandetur (§. 36). Impossibile igitur, ut intra aërem sit spatium aliquod ab aëre vacuum. Tale vero cum necessarium foret ob rotunditatem Telluris, nisi aër eam undiquaque ambiret; necesse est aërem Telluri circumfundi. *Quod erat unum.*

Quodsi ponamus aërem uno in loco esse altiore, quam in altero; aër vacuo contiguus statim expandetur (§. 36.), adeoque non quiescet nisi undiquaque eandem habuerit altitudinem. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

45. Quare si cætera sint paria, duobus corporibus eandem basin habentibus, in æqualibus à centro Terræ distantibus, æqualia Atmosphæræ pondera incumbunt, adeoque ab aëre incumbente æqualiter premuntur (§. 42. *Hydrost.*)

COROLLARIUM II.

46. In æqualibus itaque à centro Terræ distantibus, si cætera fuerint paria, aër eandem densitatem habet, adeoque sub æqualibus voluminibus massas æquales continet (§. 8. *Hydrost.*), consequenter æqualia volumina ejusdem gravitatis existunt.

THEOREMA IV.

47. *In eodem vase, vel etiam in vasis communicantibus, aër ubique eandem densitatem habet, si cætera paria fuerint.*

DEMONSTRATIO.

Aut enim eandem habet densitatem, aut non. Ponamus aërem in vase uno esse rariorem, in altero densiorem. Illius ergo densitas per pressuram minoris ponderis producet, hujus per pressuram majoris. Ast elater aëris æquatur ponderi prementi (§. 53. *Mechan.*). Ergo in aëre rariore minor vis elastica, quam in densiore. Quare cum aër uterque vi elateris quaquaversum sese expandere nitatur (§. 26.); majore vi aër densior nititur versus rariorem, quam rarior versus densiorem. Ergo rarior cedit densiori (§. 75. *Mechan.*); comprimetur ergo ab elatere densioris (§. 5) & densior proprio elatere dilatabitur (§. 7), nec reddetur aëri in utroque vase quies, nisi nifus aeris utrinque fuerit idem (§. 75. *Mechan.*), hoc est, nisi eandem densitatem habuerit, *per demonstrata.* Si igitur aër in utroque vase eandem densitatem non habuerit, cæteraque paria fuerint, ad eandem statim reducetur. In vasis igitur communicantibus, adeoque multo magis in eodem, cæteris paribus, aër ubique eandem densitatem habet. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

48. Quare si embolo ex antlia extracto aër ex vase ad ipsam firmato in cavitatem ejus ruit (§. 36); qui cavitatem antliæ replet.

replet cum eo, qui in vase evacuando residuus, densitatem eandem habet.

### COROLLARIUM II.

49. Est ergo massa aëris intra cavitationem antliæ contenti, ad massam aëris in vase evacuando residui; ut capacitas antliæ, ad capacitatem vasis (§. 17. *Hydrost.*).

### THEOREMA V.

50. In vase, quod per antliam evacuat, semper est aër primitivus, ad aërem residuum; ut aggregatum ex capacitate vasis & antliæ ad eam dignitatem elevatum cujus exponens aequatur numero agitationum emboli, ad capacitatem vasis solius ad eandem dignitatem evectam.

### DEMONSTRATIO.

Dicatur aër à prima agitatione emboli residuus aër residuus primus; qui à secunda emboli agitatione restat, aër residuus secundus & ita porro.

Quoniam aër in vase contentus, est ad aërem in antlia contentum; ut capacitas vasis, ad capacitatem antliæ (§. 49); erit etiam aggregatum ex aëre in vase & ex aëre in antlia contento, hoc est aër primitivus, ad aërem in solo vase contentum, hoc est residuum primum; ut aggregatum ex capacitate vasis & antliæ, ad capacitatem vasis solius (§. 190. *Arithm.*). Similiter demonstratur, esse quantitatem aëris residui primi, ad quantitatem residui secundi; ut aggregatum ex capacitate vasis & antliæ, ad capacitatem vasis solius; & in eadem ratione esse quantitatem aëris residui tertii &c. Ergo factum ex aëre primiti-

vo in residuum primum, secundum, tertium, quartum &c. ad factum ex aëre residuo primo in secundum, tertium, quartum, quintum &c. ut factum ex capacitate vasis & antliæ junctim toties in se ducta emergens quot numerus agitationum emboli unitates continet, ad factum ex capacitate vasis solius multoties itidem in se ducta enascens (§. 213. *Arithm.*): hoc est, ut dignitas aggregati ex capacitate vasis & antliæ junctim cujus exponens est numerus agitationum emboli, ad capacitatem vasis solius ad eandem dignitatem evectam (§. 250. *Arithm.*), consequenter aër primitivus, ad residuum ultimum earundem dignitatum rationem habet (§. 260, *Arithm.*). Q. e. d.

### PROBLEMA II.

51. Dato numero agitationum emboli in antlia factarum, una cum capacitate vasis & capacitate antliæ, invenire rationem aëris primitivi ad residuum.

### RESOLUTIO.

1. Ex Canone Logarithmorum excerpatur Logarithmus aggregati ex capacitate vasis & capacitate antliæ, una cum Logarithmo capacitatis vasis solius.
2. Logarithmus posterior è priori auferatur, &
3. Differentia in numerum agitationum emboli ducatur; erit factum Logarithmus, cui in tabulis respondet numerus indicans, quoties aër primitivus contineat residuum quaesitum.

E. gr. Sit capacitas antliæ 580'', capacitas vasis 460''; erit aggregatum ex utraque 1040''. Sit numerus agitationum emboli 6; erit logarithmus rationis, quam habet aër primitivus ad residuum  $6(3.0170333 - 2.6627578) = 2.1656530$ , cui in tabulis respondet numerus 146 $\frac{4}{10}$ . Est igitur aër primitivus ad residuum ut 146 $\frac{4}{10}$  ad 1, hoc est, ut 1464 ad 10 seu ut 732 ad 5.

DEMONSTRATIO.

Sit capacitas vasis =  $v$ , capacitas antliæ & vasis simul =  $a$ , numerus agitationum emboli =  $n$ , aër residuus = 1. Quoniam aër primitivus, ad residuum; ut  $a^n$ , ad  $v^n$  (§. 50), erit etiam primitivus, ad residuum; ut  $\frac{a^n}{v^n}$ , ad 1 (§. 181. Arithm.), consequenter si residuus 1, Logarithmus primitivi est  $n(la - lv)$  (§. 341. 343. Arithm.). Q. e. d.

PROBLEMA III.

52. Data capacitate vasis evacuan- di & capacitate antliæ, invenire nume- rum agitationum emboli ad aërem in data ratione dilatandum requisitum.

RESOLUTIO.

1. Excerptantur ex Canone Logarith- morum Logarithmi aëris primitivi, aëris residui, capacitatis vasis, & ag- gregati ex capacitate vasis & capa- citate antliæ.
2. Logarithmus aëris residui subduca- tur ex Logarithmo aëris primitivi: similiter Logarithmus capacitatis va- sis auferatur ex Logarithmo aggre- gati ex capacitate vasis & capacita- te antliæ.

3. Differentia prior dividatur per alte- ram. Dico, quotum esse numerum agitationum emboli quæsitum.

E. g. Sit capacitas antliæ 580'', capaci- tas vasis 460'', aër primitivus ad resi- duum ut 1464 ad 10: reperietur nu- merus agitationum emboli  $(3.0656530 - 10000000) : (3.0170333 - 2.6627578) = 21656530 : 3542755 = 6$ .

DEMONSTRATIO.

Sit aër primitivus  $p$ , residuus  $r$ , reli- qua sint ut in demonstratione Proble- matis præcedentis: erit

$$p : r = a^n : v^n \quad (\S. 50)$$

$$lp - lr = nla - nlv \quad (\S. 341. 343$$


---


$$\text{Arithm.})$$

$$(lp - lr) : (la - lv) = n. \quad Q. e. d.$$

PROBLEMA IV.

53. Data ratione aëris primitivi ad residuum, una cum capacitate vasis & numero agitationum emboli, invenire capacitatem antliæ.

RESOLUTIO.

Sit aër primitivus ad residuum =  $p : r$  capacitas vasis =  $v$ , capacitas antliæ =  $x$ , numerus agitationum emboli =  $n$ ; erit

$$p : r = (v + x)^n : v^n \quad (\S. 50)$$


---


$$lp - lr = n(v + x) - nlv \quad (341. 343$$


---


$$\text{Arith.}).$$

$$lv + (lp - lr) : n = l(v + x)$$

Inveniri adeo potest Logarithmus aggre- gati ex capacitate vasis & antliæ, con- sequenter ipsum hoc aggregatum. Qua- re si hinc auferatur capacitas vasis, re- linquetur capacitas antliæ.

E. gr. Sit  $p:r = 1464:10$ ,  $v = 460''$ ,  
 $n = 6$ ; erit  $l(v+x) = 2.6627578 +$   
 $(3.0656530 - 10000000):6 = 26627578 +$   
 $3542755 = 30170333$ . Ergo vi Canonis  
 $v+x = 1040''$ , consequenter  $x = 580''$ .

## THEOREMA VI.

54. Numeri agitationum emboli, quibus ope duarum antliarum in eodem vase vel equalibus vasis aër ad eandem rationem cum aëre primitivo reducitur, sunt in ratione reciproca differentiarum Logarithmi vasis, à Logarithmo aggregatorum ex capacitate vasis & capacitate antliarum.

## DEMONSTRATIO.

Sit ratio aëris primitivi ad residuum  $= p:r$ , capacitas vasis  $= v$ , antliæ majoris capacitas  $= A$ , minoris vero  $= a$ . Quoniam ratio aëris primitivi ad residuum, in evacuatione per utramque antliam facta, eadem *per hypoth.* si numeri agitationum emboli fuerint  $m$  &  $n$ ; erit  $(v+A)^m : v^m = p:r$  &  $(v+a)^n : v^n = p:r$  (§. 50), consequenter  $(v+A)^m : v^m = (v+a)^n : v^n$  (§. 167. *Arithm.*). Habemus itaque  $ml(v+A) - mlv = nl(v+a) - nlv$  (§. 341. 343. *Arithm.*), consequenter  $m:n = (lv+a) - lv : l(v+A) - lv$ , hoc est, numeri agitationum emboli, quibus aër in eodem vase ope diversarum antliarum ad eandem rationem cum primitivo reducitur, sunt in ratione reciproca differentiarum logarithmorum vasis & aggregati ex vase & antlia. Q. e. d.

## COROLLARIUM.

55. Dato igitur numero agitationum emboli, quibus in vase quodam dato ope antliæ datæ aër residuus reducitur ad rationem datam cum primitivo vel ex eodem prorsus educitur, inveniri potest numerus agitationum emboli, quibus ope alterius antliæ datæ in eodem vase aër residuus ad eandem rationem cum primitivo reducitur, vel ex eodem prorsus educitur.

## PROBLEMA V.

56. Invenire pondus unius pedis cubici aërei.

## RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Vasis vitrei aut metallici BC satis capacis, figura sphaerica, collo oblongo AB & epistomio D præditi, pondus ad bilancem exactam exploretur, dum aëre ejusdem cum ambiente externo densitatis repletur. Quo facto
2. Educatur aër (§. 40) &
3. Globi evacuati pondus denuo ad bilancem examinetur, quod
4. A pondere priore subductum relinquit pondus aëriseducti.
5. Investigetur capacitas vasis (§. 556. *Geom.*), & ratio aëris residui ad primitivum (§. 51): quibus datis, volumen aëris residui per Regulam trium innotescet, à capacitate vasis subducendum, ut relinquatur volumen aëriseducti. Quodsi antlia accurate fuerit constructa & tandiu exerceatur, quamdiu aër evacuatur; volumen aëris residui tantillum reperietur, ut tuto negligi ipsaque capacitas vasis pro volumine aëriseducti assumi possit.

6. Datis



6. Datis adeo pondere atque volumine aëris educi, per Regulam trium reperietur pondus unius pedis cubici aëris (§. 130. *Mechan.*).

SCHOLIUM.

57. *Methodo hac primum usus OTTO DE GUERICKE (a) & post eum BURCHERUS DE VOLDER, qui sequentia annotavit (b). Pondus vasis sphaerici vitrei aëre admissio erat 7 libr. 1 Unc. 2 dr. 48 gr. aëre educito, 7 libr. 1 Unc. 1 dr. 31 gr. aqua admissa 16 libr. 12 Unc. 7 dr. 14 gr. Erat igitur pondus aëris 1 dr. 12 gr. seu 77 gr. pondus aquae 9 libr. 11 Unc. 5 dr. 43 gr. seu 74743 gr. consequenter ratio gravitatis specifica inter aquam & aërem  $74743 : 77 = 970\frac{63}{77} : 1$ . Jam cum VOLDERUS pedem cubicum aquae deprehendisset 64 librarum, inferendo ut 970 ad 1 ita 64 librae seu 1024 unc. ad numerum quartum proportionalem, per Regulam trium pondus unius pedis cubici aërei  $506\frac{79}{77}$  seu 507 gr. fere, hoc est 1 Unc. 0 dr. 27 gr. reperit. Testatur autem, se usum esse bilance, quae, etiamsi vel 25 aut 30 librae utrique imponerentur lanci, grano uno alterove addito demtote, in hanc illamve partem manifeste propenderet.*

PROBLEMA VI.

58. Dato corporis cujuscunque volumine, una cum pondere ejusdem in aëre; invenire pondus ejusdem in vacuo.

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Inveniatur pondus unius pedis cubici aëris (§. 54).
2. Per Regulam trium ex eodem & volumine corporis dati investigetur pondus aëris mole huic aequalis (§. 130. *Mech.*).

(a) Experiment. de Vacuo lib. 3. c. 21. f. 101.

(b) In Quaestionibus Academicis de aëris gravitate thes. 52. p. 35. & seqq.

3. Pondus hoc aëris subtrahatur à pondere corporis dato; quod relinquitur erit pondus ejusdem in vacuo (§. 55. *Hydrost.*) Q. e. i. & d.

E. gr. Pondus unius pedis cubici aërei est 507 gr. (§. 55), pondus trium pedum cubicorum aquae 210 librarum (§. 64. *Hydrost.*) seu 209 libr. 15 unc. 7 drach. 60 gran. Pondus trium pedum cubicorum aëris reperitur 1521 gr. seu 3 unc. 1 dr. 21 gr. Pondus adeo trium pedum cubicorum aquae in vacuo 209 lib. 12 unc. 6 dr. 39 gr.

PROBLEMA VII.

59. Data basi columnae Atmosphaericae invenire pondus ejus.

RESOLUTIO.

1. Basis data multiplicetur per altitudinem columnae aquae ipsi æquiponderantis (§. 28), ut habeatur volumen hujus columnae (§. 539. 541).
2. Quærat ad volumina unius pedis cubici, & columnae illius, atque pondus unius pedis cubici aquae, numerus quartus proportionalis, qui erit pondus columnae aquae Atmosphaericae æquiponderantis (§. 130. *Mech.*), hoc est, pondus ipsius columnae Atmosphaericae quæsitum.

E. gr. Sit diameter circuli 100<sup>''</sup>, erit area 7850<sup>''</sup> (§. 429. *Geom.*). Quia altitudo columnae aquae 3100<sup>''</sup> (§. 27); erit volumen ejus 24335<sup>''</sup>, consequenter, cum 1000<sup>''</sup> sint 70 fere librarum (§. 64. *Hydrost.*) pondus ejusdem  $1703\frac{45}{100}$  seu  $1703\frac{9}{20}$  librarum. Circulus itaque, cujus diameter unius pedis, ab aëre eadem vi premitur, ac si pondus 1703 librarum incumberet.

## COROLLARIUM.

60. Quodsi diameter sphaeræ fuerit unius pedis, basis columnæ Atmosphæricæ incumbentis est circulus, cujus diameter unius pedis. Quare cum hemisphaerium inferius ab elatere aëris urgeatur, qui ponderi ejusdem columnæ æquatur (§. 31); hemisphaeria comprimuntur vi 3407 librarum.

## THEOREMA VII.

61. *Diversa plana premuntur ab aëre in ratione magnitudinum.*

## DEMONSTRATIO.

Pressio enim eadem, quæ foret, si aqua ad altitudinem 31 pedum Rhena- norum in plana subjecta gravitaret (§. 28), consequenter pressiones diverforum planorum ab aëre factæ sunt in ratione planorum istorum (§. 573. *Geom.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

62. Quare si plana, quæ ab aëre premuntur, fuerint circuli; in ratione duplicata diametrorum premuntur (§. 409. *Geom.*).

## COROLLARIUM II.

63. Quoniam aër premit secundum lineas rectas ad horizontale planum perpendiculares (§. 215. *Mechan.*), superficies quomodocunque convexa, vel concava, aut ex convexo, concavo & plano quomodocunque composita eadem premuntur vi, qua premitur planum horizontale eidem subjectum, consequenter pressiones superficierum quarumcunque sunt ut plana horizontalia iisdem subjecta.

## SCHOLION.

64. *In hypothese Propositionis tacite supponitur situm planorum esse horizontalem: ex demonstratione autem apparet Theoremam cum suis Corollariis ad omnem pressionem a fluido gravi factam extendi posse.*

## CAPUT III.

*De Compressione Aëris.*

## PROBLEMA VIII.

65. **A**ërem intra vas comprimere.

## RESOLUTIO.

Tab. I. Fig. 2. I. Epistomio IHG respectu vasis clauso, respectu Antliæ vero aperto, embolus ex Antlia Pneumatica extrahatur: quo facto aër externus in cavitatem Antliæ ruet (§. 36).

2. Converso epistomio, ita ut communicato inter vas & cylindrum detur, superius vero in I obturato, embolus iterum detrudatur; aër ex Antlia in vas expelletur, quod cum jam aëre alio sit plenum, novum intrusum recipere nequit, nisi facta utriusque compressione (§. 5.). Excipiet vero hospitio suo adventantem hunc hospitem, cum comprimî possit (§. 17.).

3. Repe-

3. Repetita igitur hac operatione, aer continuo magis magisque comprimitur. Q. e. f.

THEOREMA VIII.

66. Aer primitivus, est ad aerem in vase ope Antlia Pneumatica dato agitationum emboli numero compressum; ut capacitas vasis, ad aggregatum ex capacitate vasis & facto capacitatis antliae in numerum agitationum emboli.

DEMONSTRATIO.

Sit capacitas antliae =  $a$ , capacitas vasis =  $v$ , numerus agitationum emboli =  $n$ . Erit aer primitivus in antlia, ad aerem in vase; ut  $a$ , ad  $v$  (§. 17. Hydrost. ). Incrementum igitur massae in vase, dato numero agitationum emboli  $n$ , est ut  $na$ , consequenter aer compressus ut  $na + v$ . Unde compressus ad primitivum ut  $na + v$  ad  $v$ . Q. e. d.

COROLLARIUM.

67. Data igitur capacitate antliae 580, & capacitate vasis 260, seu ratione illius ad hanc ut 2 ad 1, una cum numero agitationum emboli 3; reperitur ratio aeris compressi ad primitivum ut 6 ad 1 seu ut 7 ad 1.

PROBLEMA IX.

68. Data ratione aeris primitivi ad compressum, una cum ratione capacitatis antliae ad capacitatem vasis, invenire numerum agitationum emboli ad istam compressionem efficiendam requisitarum.

RESOLUTIO.

Sit ratio aeris primitivi ad compressum =  $p : c$ , ratio antliae ad vas =  $a : v$ ,

numerus agitationum emboli =  $x$ , erit (§. 66 ).

$$p : c = v : ax + v$$

$$cv = pax + pv$$

$$(cv - pv) : pa = x$$

Regula. Factum ex differentia aeris primitivi à compresso, in capacitatem vasis, dividatur per factum ex aere primitivo in capacitatem antliae; quotus est numerus agitationum emboli ad istam compressionem efficiendam requisitarum. Sit e. gr.  $p = 1, c = 7, v = 1, a = 2$ ; erit  $x = 6 : 2 = 3$ .

COROLLARIUM.

69. Quodsi fiat  $p = v$ , erit  $x = (c - p) v : av = (c - p) : a$ , hoc est numerus agitationum emboli invenitur, si differentia aeris primitivi à compresso per capacitatem antliae dividatur. Ita in nostro exemplo  $x = (7 - 1) : 2 = 3$ .

PROBLEMA X.

70. Data capacitate, vasis in quo aer comprimendus, una cum ratione quam aer primitivus ad compressum habere debet, & numero agitationum emboli quibus ista compressio effici jubetur; invenire capacitatem antliae.

RESOLUTIO.

Sit capacitas vasis =  $v$ , aer primitivus =  $p$ , compressus =  $c$ , numerus agitationum emboli =  $n$ , capacitas antliae =  $x$ , erit (§. 66 ).

$$p : c = v : nx + v$$

$$cv = pnx + pv$$

$$(cv - pv) : pn = x$$

Quodsi fiat  $p = v$ ; erit  $x = (c - p) : n$ .

Regula. Factum ex differentia aeris primitivi à compresso, in capacitatem vasis, di-

vidatur per factum ex aëre primitivo in numerum agitationum emboli compressio- nem efficientium, quotus erit capacitas antliæ quæsitæ. Quodsi aër primitivus fue- rit ut capacitas vasis, ejus à compresso dif- ferentia tantum dividenda est per nume- rum agitationum emboli.

Sit e. gr.  $v = 290$ ,  $p : c = 1 : 7$ ,  $n = 3$ ; erit  $x = 6. 290 : 3 = 2. 290 = 580$ .

#### COROLLARIUM.

71. Est ergo  $pn : c - p = v : x$ , hoc est, capacitas vasis, ad capacitatem antliæ; est in ratione composita aëris primitivi, ad ejus à compresso differentiam, & numeri agitationum emboli quibus ista compres- sio efficitur, ad unitatem (§. 159. *Arithm.*).

#### PROBLEMA XI.

72. *Invenire, utrum aër comprima- tur in ratione ponderum, nec ne.*

#### RESOLUTIO.

- Tab. I.  
Fig. 4.
1. Assumatur tubus recurvus ABC, cujus brachium minus EC fit 12 cir- citer digitorum, majus AB 8 circi- ter pedum minori parallelum.
  2. Brachium minus EC hermetice si- gilletur in C, majus in A sit aper- tum: utrumque in particulas æquales dividatur.
  3. Pars tubi BE mercurio repleatur, ita ut CE sit aëre primitivo plenus.
  4. Hinc ulterius per orificium A suc- cessive plus mercurii infundatur; no- tenturque altitudines, ad quas in utroque brachio mercurius successive infusus pertingit.

Dico, si successive fuerint spatia in bra- chio minore super mercurio, reciproce ut differentiæ altitudinum, ad quas in brachio majore mercurius successive

subsistit, 28 digitis auctarum, & alti- tudinum ad quas in minore mercuri- us ascendit, aërem comprimit in ra- tione ponderum. *Q. e. i.*

#### DEMONSTRATIO.

Etenim ab initio aër in brachio mi- nore CE à pondere Atmosphærico com- primitur (§. 21), quod æquatur cylin- dro mercuriali 28 digitos alto (§. 29). Quare cum cylindri æqualium basium sint ut altitudines (§. 573. *Geom.*); tum volumina aëris reducti sunt ut altitu- dines spatiorum à mercurio vacuo- rum in brachio minore EC, tum vo- lumina mercurii in brachio majore sunt ut altitudines, ad quas mercurius ascen- dit. In aërem vero minori brachio in- clusum, præter pondus Atmosphæricum, volumina mercurii gravitant, quorum altitudo est differentia inter altitudines ad quas in brachio minore, & altitudi- nes ad quas in majore successive per- tingit (§. 34 *Hydrost.*). Quare pondera aërem inclusum comprimentia sunt ut differentiæ altitudinum ad quas suc- cessive in brachio minore mercurius ascendit, ab altitudinibus ad quas in majore successive pertingit, 28 digitis auctæ (§. 18. *Hydrost.*). Quodsi adeo volumina aëris successive compressi in eadem ratione reciproca deprehendan- tur, aër omnino in ratione ponderum comprimitur. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM.

73. MARIOTTUS (a) notavit mercurium, in brachio majore AB 8 pedum, ad alti- tudi-

(a) *Essay de la Nature de l'Air* p. 17. & seqq. f. *Operum in Batavia recursorum* Tom. 1. p. 153.

titudinem 18 digitorum ascendentem, in minore 12 digitorum, ad 4 digitorum altitudinem substituisse. Aëris itaque volumen cum à solo pondere Atmosphærico premeretur, erat 12 digitorum; ast cum aër premeretur à pondere Atmosphærico & à cylindro mercuriali 14 digitorum, hoc est, à pondere mercuriali 41 digitorum, erat volumen compressi 8 digitorum. Est vero 8, ad 12; ut 28, ad 42, nempe ut 2 ad 3. Similiterprehendit, si in brachio minori mercurius ad altitudinem 6 digitorum assurgat, altitudinem in majore esse 34. Volumen ergo aëris compressi est 6 digitorum, hoc est, subduplum ejus, quod habebat aër à solo pondere Atmosphærico pressus. Ast pondus premens est  $28 \times 28$ , hoc est, duplum ponderis Atmosphærici. Porro advertit, si altitudo mercurii in brachio minore sit 9 digitorum, altitudinem in majore esse 93. Est itaque volumen aëris compressi 3 digitorum, hoc est, subquadruplum ejus, quod habeat à solo pondere Atmosphærico compressus. Sed pondus premens tum est  $84 \times 28$ , hoc est, quadruplum ponderis Atmosphærici. Evidens ergo per experimentum MARIOTTI, volumina aëris compressi esse reciproce ut pondera comprimentia.

SCHOLIUM I.

74. Idem experimentum succedit, si diameter brachii minoris CE multo major fuerit diametro majoris AB (§. 34. Hydrost.): curandum tamen, ut amplitudo illius sit uniformis, cum in demonstratione supponamus partes quantaslibet tubi CE esse cylindros equalium basium.

SCHOLIUM II.

75. Probe autem notandum est, præter pondera comprimentia, in voluminibus aëris que inter se comparantur, cætera omnia paria esse debere, cavendumque, ne eandem compressionis legem ad diversa aëris volumina applicemus, in quibus, præter pondera comprimen-

tia, aliorum quoque aërem alterantium datur disparitas: quoniam hoc in casu fieri potest, ut elateris, in duobus voluminibus equalibus atque ejusdem densitatis, vires sint inæquales, adeoque & pondera compressionem aëris in utroque efficientia sint inæqualia (§. 553. Mechan.), consequenter & duo volumina aëris equalia ab iisdem ponderibus inæqualiter comprimantur. E. gr. Ponamus duo volumina aërea, in quibus ab initio cætera omnia paria; evidens est, quod paria pondera sustentare debeant. Ponamus porro alterum volumen actioni caloris exponi: rarefiet igitur (§. 23) adeoque pondus premens propellet. Ut itaque aër ad pristinum volumen reducatur, majus imponendum erit pondus, quam quod dilatato incumbit. Ecce tibi duo volumina aëris inter se equalia, cumque ab initio eandem densitatem habuerint, per hypoth. ejusdem densitatis, quæ tamen inæqualia pondera comprimentia sustinent.

SCHOLIUM III.

76. Vana vero est objectio, quod admittit hac compressionis lege sequatur, aërem eo usque comprimi posse, ut spatium occupet infinite parvum ejus respectu, quod ante compressionem obtinuerat, pondere scilicet in infinitum aucto. Nam ubi ad summum compressionis gradum pertingit, ponderi quantocunque prementi resistit, consequenter vi resistendi infinitæ equipollet. Nec ideo vis elastica aëris in statu summæ compressionis viribus infinite variis æquatur (§. 553. Mechan.); sed minima earum, à quibus maxima compressio proficisci valet. Est enim vis minor pars majoris (§. 20. Arithm.). Quamobrem si vis elastica aëris in statu summæ compressionis & vi minori, & majori equalis esset; pars toti equalis foret: id quod absurdum (§. 84. Arithm.). Cum adeo vis elastica in statu summæ compressionis infinita non sit, explicandum est, quomodo vi resistendi infinitæ equipollet. Scilicet si majus pondus aëri incumbere supponamus, quam ad sum-

summam compressionem efficiendam sufficit; excessus ponderis non amplius ad comprimendum aerem, sed ad compressum loco pellendum impenditur. Ut igitur non expellantur corpora aerem compressum ambientia, vi resistendi pradita esse debent, quæ toti ponderi incumbenti æquatur. Utut enim pondus incumbens non omnem vim, qua premit, ad aerem compressum expellendum adhibeat; corpora tamen motum impediunt & vi elastica aeris impressi & vi eidem impressa urgentur, quæ simul sumpta vim ponderis prementis adæquant.

## SCHOLIUM IV.

77. Idem experimentum cum successu repetierunt ROBERTUS BOYLE (a) & AMONTONS (b), hincque in voluminibus aeris majoribus.

## THEOREMA IX.

78. Elater aeris compressi, est ad elaterem dilatati; uti reciproce volumen dilatati, ad volumen compressi.

## DEMONSTRATIO.

Elater aeris magis compressi, est ad elaterem minus compressi; ut pondus isti incumbens, ad pondus huic impositum (§. 553. *Mechan.*). Enimvero in ratione horum ponderum est quoque reciproce volumen aeris minus compressi, ad volumen aeris magis compressi (§. 71). Ergo & elater magis compressi, est ad elaterem minus compressi seu dilatati; uti reciproce volumen dilatati, ad volumen compressi (§. 167. *Arihm.*) *Q. e. d.*

(a) In defensione doctrinæ de elatere & gravitate aeris contra Linum part. 2. c. 5. p. m. 42. & seqq.

(b) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences A 1705. p. m. 155. & seqq.

## COROLLARIUM.

79. Elater igitur aeris magis compressi fortior est, quam elater minus compressi.

## THEOREMA X.

80. Elater aeris magis compressi, est ad elaterem minus compressi, ceteris paribus; ut massa aeris magis compressi, ad massam aeris minus compressi sub eodem volumine contenti.

## DEMONSTRATIO.

Si aer comprimitur in spatium subduplum, subtriplum, subquadruplum &c. erit aeris primitivi duplus, triplus, quadruplus &c. in spatio simplici. Ast in spatium subduplum a duplo; in subtriplum a triplo; in subquadruplum a quadruplo &c. pondere comprimitur (§. 71). Ergo in æqualibus voluminibus massæ aeris diversimode compressi in ratione ponderum comprimantium existunt, consequenter cum in eadem ratione sit elater aeris magis & minus compressi (§. 553. *Mech.*); elater aeris magis compressi, ad elaterem minus compressi; est ut massa illius, ad massam hujus sub æquali volumine (§. 167. *Arihm.*) *Q. e. d.*

## PROBLEMA XII.

81. Data ratione voluminis, quod replet aëra solo pondere Atmosphærico pressus, ad spatium in quod redigitur ulterius compressus, determinare vim elasticam compressi.

## RESOLUTIO.

Cum elater aeris a solo pondere Atmosphærico pressi æquetur ponderi columnæ mercurialis eandem cum volumine aeris basin, sed altitudinem 28 digito-

digitorum habentis (§. 29); si ad volumen compressi, volumen nondum compressi, & pondus istius columnæ mercurialis quæratum numerus quartus proportionalis, designabit is quantitatem vis elasticæ in aëre compresso (§. 78).

COROLLARIUM.

82. Quodsi pondus columnæ mercurialis istius à quantitate vis elasticæ inventa subducatur; relinquitur vis elateris, qua resistantiam ponderis Atmosphærici superat.

PROBLEMA XIII.

83. Dato effectu quem producit aër à solo pondere Atmosphærico pressus, aut in certo compressionis gradu; invenire effectum quem producturus est in alio quocunque compressionis gradu.

RESOLUTIO.

Cum effectus sint viribus productricibus proportionales (§. 530 *Mechan.*), vires vero productrices, in nostro casu, sint reciproce ut volumina in diversis compressionis gradibus (§. 78); si effectus, quem elater aëris in certo compressionis gradu producit, detur, effectus in alio quocunque producendus invenietur inferendo: ut volumen aëris magis compressi, ad volumen minus compressi; ita effectus ab hoc producendus, ad effectum illius.

SCHOLIUM.

84. Idem Problema quoque solvitur per analogiam Theor. 12. (§. 80).

PROBLEMA XIV.

85. Dato effectu quem producit aër à solo pondere Atmosphærico pressus; determinare alium compressionis gradum, in quo idem producat intra Atmosphæram effectum quemcunque majorem datum.

RESOLUTIO.

Sit effectus minor =  $a$ , major =  $b$ ; volumen aëris minus compressi =  $c$ ; volumen magis compressi =  $x$ . Cum alter effectus intra Atmosphæram resistantem sit producendus, & integer tamen desideretur, quærenda erit compressio, quæ in vacuo effectum produceret æqualem aggregato ex effectu desiderato & effectu, quem aër à solo pondere Atmosphærico pressus in vacuo produceret. Erit adeo effectus ab aëre compresso producendus =  $a + b$ , consequenter  $a + b : a = c : x$ , hoc est, ut aggregatum ex effectu aëris à solo pondere Atmosphærico pressi & effectu ab aëre in quæsito compressionis gradu intra Atmosphæram producendo, ad effectum aëris à solo pondere Atmosphærico pressi; ita volumen aëris à solo pondere Atmosphærico pressi, ad volumen aëris in quæsito compressionis gradu (§. 78): quod adeo per Regulam trium invenitur.

SCHOLIUM.

86. Eodem modo Problema resolvitur ope Theorematis 12. (§. 80).

*De Æquilibrio Aëris cum aliis Fluidis Specificè  
Gravioribus.*

## DEFINITIO IX.

Tab. I. 87. **P**ER *Tubum* TORRICELLIANUM intelligo tubum vitreum AB mercurio repletum, cujus osculum superius A hermetice sigillatum, inferius B stagnanti in vasculo CD mercurio immersum.

## SCHOLION.

88. *Vocatur istiusmodi tubus TORRICELLIANUS ab inventore TORRICELLO* (§. 29).

## DEFINITIO X.

89. *Barometrum* est instrumentum, quo gravitatem aëris metiri licet. *Baroscopium* vero est instrumentum, quod variationes gravitatis aëris confuse indicat.

## SCHOLION.

90. *Vulgo pro Synonymis habent has voces: sed mihi necesse esse videtur eas distinguere, cum aliud utique sit saltem cognoscere, aërem hoc tempore esse graviolem, quam altero; aliud vero scire, quoties gravitas Atmosphæra hac die superet gravitatem illius anteriorem: posterius vero constare debet, si gravitatem aëris metiaris* (§. 21. Geom.).

## THEOREMA XI.

91. *In tubo Torricelliano major columna mercurii suspenditur in locis profundioribus, quam in altioribus.*

## DEMONSTRATIO.

Columna mercurii suspensa æquatur columnæ aëreæ, cujus eadem cum ista basis, sed altitudo à superficie mercurii in vasculo stagnantis usque ad extremitatem Atmosphære exporrigitur (§. 36. *Hydrost.*). In locis vero altioribus columnæ aëreæ altitudo minor, quam in profundioribus; adeoque & ipsa columna in his gravior, quam in istis: consequenter minor columna mercurii columnæ aëreæ in locis altioribus æquiponderat, quam in profundioribus. *Q. e. d.*

## SCHOLION.

92. *Veritatem hujus Theorematis experientia confirmarunt plurimi. Primus de eo cogitavit PASCALIUS, qui Phænomena tubi Torricelliani maxima cum solertia scrutatus est in Tractatu De Æquilibrio liquorum.*

## THEOREMA XII.

93. *Si in tubo Torricelliano aëris quaedam quantitas super mercurio, & in genere in vase quocunque, cujus officium apertum fluido immersum, super fluido relinquatur: mercurius vel fluidum quodcunque alterum ad minorem altitudinem suspenditur, quam si vacuus fuerit, & pondus fluidi suspensi æquatur differentie lateris aëris inclusi à pondere Atmospherico.*



DEMONSTRATIO.

Cum ab initio aëris inclusi elater solus ponderi Atmosphærico æquetur (§. 33), mercurius vi gravitatis propriæ descendere incipit. Ast dum descendit, aër inclusus dilatatur (§. 36), adeoque elater ejus minori, quam ponderi Atmosphærico æquilibratur (§. 79). Tantum igitur mercurii, aut fluidi cujuscunque alterius, in tubo vel vase remanere debet, quantum differentiæ elateris aëris inclusi à pondere Atmosphærico æquilibratur: consequenter mercurius ad minorem altitudinem suspenditur, quam si tubus ab aëre vacuus extitisset. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

94. Aër igitur in tubo Torricelliano inclusus rarior ambiente externo, & ejus elater æquatur differentiæ ponderis mercurii suspensi à pondere Atmosphærico (§. 36 *Hydrost.*).

COROLLARIUM II.

95. Hinc liquet, si vas exiguo orificio instructum, nec aqua aut alterius generis liquore prorsus plenum, digito ad orificium applicato, ita invertatur, ut orificium sit horizontale; cur remoto digito ab initio quædam liquoris gutta effluat, reliquus vero intus remaneat: item cur idem eveniat in vase quocunque alio quantumvis amplo, si orificio folium chartaceum imponas, dum illud invertis.

PROBLEMA XVI.

96. *Data ratione altitudinis fluidi in tubo ab omni aëre prorsus vacuo ad altitudinem qua gaudet, si tubi aliqua pars aëre repleatur, una cum volumine aëris dilatati; invenire volumen aëris primitivi.*

RESOLUTIO.

Cum elater aëris primitivi æquetur ponderi fluidi in tubo vacuo suspensi (§. 33), adeoque elater dilatati differentiæ ponderis fluidi suspensi à pondere Atmosphærico (§. 94), pondera vero fluidi sint ut volumina (§. 130. *Mechan.*), volumina ut altitudines (§. 573. *Geom.*); erit ut altitudo fluidi in tubo vacuo, ad differentiam altitudinis in tubo non vacuo à priore; ita volumen aëris dilatati, ad volumen primitivi (§. 78): quod adeo per Regulam trium invenitur. *Q. e. d.*

E. gr. Sit altitudo fluidi in tubo vacuo 28, in tubo non vacuo 14, volumen aëris dilatati 25, erit volumen primitivi  $(28 - 14) 25 : 28 = 350 : 28 = 12\frac{1}{2}$ . Quæ prorsus consona sunt experimento MARIOTTI (a).

PROBLEMA XVII.

97. *Data altitudine fluidi in tubo vacuo, & ratione voluminis aëris primitivi ad volumen dilatati; invenire altitudinem ejusdem fluidi in tubo non vacuo.*

RESOLUTIO.

Sit altitudo fluidi in tubo vacuo =  $a$ ; altitudo in non vacuo =  $x$ , volumen aëris primitivi =  $b$ , dilatati =  $c$ , erit (§. 96).

$$a : a - x = c : b$$

$$x : a = c - b : c \text{ (§. 193. Arith.)}$$

Inveniri adeo debet numerus quartus proportionalis ad volumen aëris dilatati, differentiam voluminis primitivi à volumine dilatati, & altitudinem in tubo vacuo.

P p 2

Sit

(a) Essay de la nature de l'air p. 23. & seqq.

Sit e. gr.  $a = 28$ ,  $b = 12\frac{1}{2}$ ,  $c = 25$ ; erit  $x = (25 - 12\frac{1}{2}) : 28 = 25 : 350 : 25 = 14$ .

## PROBLEMA XVIII.

98. Datis altitudine fluidi in tubo vacuo, & volumine aëris primitivi: invenire volumen dilatati, & altitudinem fluidi in tubo non vacuo data altitudinis.

## DEFINITIO.

Sit altitudo fluidi in tubo vacuo  $= m$ , altitudo tubi ultra libellam fluidi in vase stagnantis  $= a$ , altitudo voluminis aëris primitivi  $= b$ , dilatati  $= x$ , erit altitudo fluidi in tubo non vacuo  $= a - x$ , consequenter

$$m : m - a + x = x : b \quad (\S. 96).$$

$$bm = mx - ax + x^2$$

hoc est, si fiat  $a - m = d$

$$bm = x^2 - dx$$

$$\frac{1}{4}d^2 \qquad \frac{1}{4}d^2$$

$$\frac{1}{4}d^2 + bm = x^2 - dx + \frac{1}{4}d^2$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{2}d + \sqrt{\left(\frac{1}{4}d^2 + bm\right)} = x.$$

Regula. 1. Quadrato semidifferentiæ altitudinis fluidi in tubo vacuo ab altitudine tubi ultra libellam fluidi in vase stagnantis, addatur factum ex eadem altitudine fluidi in altitudinem voluminis aëris primitivi. 2. Ex facto extrahatur radix quadrata, & 3. huic addatur semidifferentia paulo ante memorata. Erit aggregatum altitudo voluminis aëris dilatati. E. gr. sit  $a = 29$ ,  $m = 28$ , erit  $d = 11$ ,  $\frac{1}{2}d = 5\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}dd = 12\frac{1}{4}$ . Sit  $b = 12\frac{1}{2}$ , erit  $bm = 350$ , adeoque  $\frac{1}{4}dd + bm = 12\frac{1}{4} + 350 = 152\frac{1}{4}$ , consequenter  $\sqrt{\left(\frac{1}{4}dd + bm\right)} = \frac{39}{2} = 19\frac{1}{2}$ : unde  $x = 5\frac{1}{2} + 19\frac{1}{2} = 25$ .

## PROBLEMA XIX.

99. Data altitudine fluidi in tubo vacuo, altitudine tubi ultra libellam fluidi in vasculo stagnantis, & altitudine fluidi in tubo non vacuo; invenire altitudinem voluminis aëris primitivi.

## RESOLUTIO.

Sit altitudo fluidi in tubo vacuo  $= m$ , in tubo non vacuo  $= n$ , altitudo tubi  $= a$ , altitudo aëris primitivi  $= x$ , erit altitudo dilatati  $= a - n$ , consequenter (§. 96)

$$m : m - n = a - n : x$$

Invenietur adeo  $x$ , quarendo ad altitudinem fluidi in tubo vacuo, differentiam altitudinis in non vacuo a priore, & differentiam altitudinis fluidi in tubo non vacuo ab integra altitudine tubi, numerum quartum proportionalem.

Sit e. gr.  $m = 28$ ,  $n = 14$ ,  $a = 39$ , erit  $x = (39 - 14) : (28 - 14) : 28 = 25.14 : 28 = 350 : 28 = 12\frac{1}{2}$ .

## PROBLEMA XX.

100. Determinare quantitatem liquoris effluentis, si vas exigui orifici non plenum invertatur.

## RESOLUTIO.

1. Inveniat altitudo, ad quam liquor datus in vase vacuo ab aëre sustentatur (§. 36. *Hydrost.*).
2. Quoniam porro datur altitudo fluidi in vase, atque altitudo totius vasis per *hypoth.* reperietur volumen aëris dilatati (§. 98). Unde si
3. Subducatur volumen aëris primitivi; relinquetur quantitas liquoris expellendi, si vas invertatur (§. 95).

THEOREMA XIII.

101. Si vasis ab aëre prorsus evacuati, cujus altitudo non excedit altitudinem columnæ liquoris Atmosphære æquiponderantis, orificium intra aquam aut alterius generis fluidum demergatur, demersumque aperiatur; liquor ascendens totum replebit: ast si non prorsus evacuatum fuerit; minus spatium liquor ascendens occupabit, quam aëris primitivieducti quantitas repleverat.

DEMONSTRATIO.

Cum enim liquor undiquaque circa orificium vasis demersum a pondere Atmosphære prematur (§. 21), sub orificio autem vasis aperto nulla fit aëris pressura, quia ab aëre prorsus vacuum supponitur; tantum liquoris intra vas ascendere debet, quantum sufficit ad pressuram ei æqualem efficiendam, quæ a ponderet Atmosphærico efficitur (§. 35. *Mechan.*). Sed vasis altitudo liquoris Atmosphære æquiponderantis altitudinem non excedit, per *hypoth.* Ergo pressura æqualis pressuræ ponderis Atmosphærici a liquore intra vas contento effici nequit, nisi totum repleatur. Totum ergo replebitur. *Quod erat unum.*

Quodsi quædam aëris portio residua fuerit, ea super liquore ingrediente constituta rarior sit necesse est quam aër primitivus (§. 49). Majus ergo spatium occupat, quam cum primitivo adhuc jungeretur (§. 10. *Hydrost.*). Quoniam adeo nonnisi spatium reliquum a liquore occupatur, evidens est, liquorem ascendentem minus spatium vasis replere, quam aëris primitivi

educti quantitas repleverat. *Quod erat alterum.*

SCHOLIION.

102. SCHOTTUS autor est (a), cum Heribipoli experimentum sæpius iteraretur, rem nunquam eo adduci potuisse, ut etiam minore vase adhibito omnem excluderent aërem. Equidem cum aqua in vas irrumpens spumescat, ipse id indicium irruentis aëris pronunciat, ignarus unde adveniat aut oriatur; alii rectius ab expansione aëris intra aquam latentis idem Phenomenon deducunt, atque hinc aëris super liquore constituti originem derivant. Enimvero quemadmodum forte negari nequit, quod hac ratione aër in vase residuus aliquid capiat incrementum, ita rationi consentaneum videtur, non omnem aërem ope antliæ ex vasis educi, quia aër ad summum expansionis gradum perductus non amplius evacuatur, moleculis paucis dispersis atheri subtiliori & leviori innatantibus, quemadmodum massula metallicæ in fluidis specificis levioribus natate solent, ut taceam massulas aëreas, quæ ab eminentiolis in superficie vitri non secus ac aliorum fluidorum guttula fulciuntur. Sæpius tamen diverso tempore diversis quoque vasis repetito experimento didici, perexiguam esse aëris, quod super liquore constitutum deprehenditur, vase summa cum diligentia evacuato.

PROBLEMA XXI.

103. Data altitudine vasis evacuati, & altitudine liquoris in ipsum ingressi, invenire volumen aëris primitivieducti.

RESOLUTIO.

I. Inveniatur altitudo, ad quam liquor datus in vase vacuo ab aëre sustentatur (§. 36. *Hydrost.*).

P p 3

2. Quo-

(a) In Techn. Curiosa. lib. I. c. 3, p. 24.

2. Quoniam porro datur altitudo vasis evacuati & altitudo liquoris ipsum ipsum ingressi, inuenietur volumen aëris primitivi (§. 99).

## COROLLARIUM.

104. Quodsi quantitas aëriseducti quærat per Probl. præf. eademque adhuc alia ratione inueniatur (§. 51), atque eadem utrobique reperiatur; certum id erit indicium, nihil aëris ex aqua irruente in summitatem vasis ascendisse.

## SCHOLIUM.

105. Dubito tamen, num hæc subtilitates in praxi satis discerni queant.

## PROBLEMA XXII.

Tab. I.  
Fig. 6.

106. Si vas quoddam ABCD, aperto orificio CD, sub aqua aut alio liquore perpendiculariter demergatur, quo profundius mergitur, eo magis aër in eodem comprimitur.

## DEMONSTRATIO.

Cum enim aër aqua aliisque fluidis leuior existat (§. 55), si vas ABCD perpendiculariter demergitur, ex eodem egredi nequit, quia in aqua descendere deberet, quod fieri nequit (§. 99. *Hydrost.*). Jam elater aëris inclusi aquam subiectam eadem vi premit, qua pondus Atmosphæricum (§. 33), aqua vero in eadem libella circa orificium vasis, præter pondus Atmosphæricum, etiam aqua super ea in vase stagnante premitur. Magis ergo premitur circa orificium vasis CD, quam sub eodem, consequenter cum aër intra vas adhuc compressibilis existat (§. 17) &

in ratione ponderum compressionem patitur (§. 73.); aliqua liquoris quantitas intra vas ascendere debet, eoque major quo profundius mergitur. *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

107. *Veritatem Theorematis experientia confirmat. Imprimis huc pertinent Phænomena Campanæ urinatoriæ à STURMIO (a) enarrata & experimento illustrata.*

## THEOREMA XIV.

108. *Iisdem positis que in propo- Tal  
sitione precedente, elater aëris in vase Fig  
ABCD compressi, una cum pondere liquoris in ipsum ingressi æquatur aggregato ex pondere Atmosphæricæ & pondere columnæ ejusdem fluidi quæ eandem cum fluido ultra libellam orificii CD in vase FG stagnante altitudinem habet.*

## DEMONSTRATIO.

Aër in vase ABCD adhuc compressibilis existit (§. 17): tamdiu itaque vi prementi cedit, donec eadem in fluidum sub orificio CD pressura efficiatur, quam circumcirca efficit aggregatum ex pondere Atmosphærico & columna fluidi eandem cum vase basin eandemque cum fluido ultra libellam orificii vasis CD in vase FG stagnante altitudinem habente (§. 75. *Mechan.*). Sed pressura in aquam sub orificio CD fit ab elatere aëris in vase ABCD compressi & pondere fluidi intrantis (§. 34 & 10). Quare elater aëris in vase ABCD compressi, una cum pondere fluidi intrantis æquatur &c. *Q. e. d.*

(a) Colleg. Curios. part. I. Tent. I. & seqq.  
P R O

PROBLEMA XXIII.

109. *Data gravitate fluidi ultra libellam orificii vasis CD consistentis, una cum volumine ejus, & volumine aëris primitivi cavitatem vasis ABCD implentis; invenire volumen aëris compressi & fluidi in vas intrantis.*

RESOLUTIO.

Sit gravitas fluidi =  $g$ , ejus volumen =  $c$ , pondus Atmosphæricum =  $a$ , volumen aëris primitivi =  $b$ , volumen fluidi in vas ascendentis =  $x$ , erit volumen compressi =  $b - x$ . Jam cum elater aëris primitivi æquetur ponderi Atmosphærico (§ 33), reperietur elater aëris compressi =  $ab : (b - x)$  (§. 78). Et quoniam gravitates corporum homogeneorum sunt ut volumina (§. 130. *Mechan.*); reperietur gravitas fluidi in vas ascendentis =  $gx : c$ . Habemus ergo

$$ab : (b - x) + gx : c = g + a \text{ (§. 108).}$$

$$\underline{abc + bgx - gx^2 = bgc + abc - gcx - acx}$$

$$\underline{x^2 - bx - cx - acx : g = -bc}$$

hoc est; si fiat  $b + c + ac : g = d$

$$\underline{x^2 - dx = -bc}$$

$$\frac{\frac{1}{4}dd}{\frac{1}{4}dd}$$

$$\underline{x^2 - dx + \frac{1}{4}dd = \frac{1}{4}dd - bc}$$

$$\underline{\frac{1}{2}d - x = \sqrt{\left(\frac{1}{4}dd - bc\right)}}$$

$$\underline{x = \frac{1}{2}d - \sqrt{\left(\frac{1}{4}dd - bc\right)}}$$

*Regula. 1.* Aggregato ex volumine aëris primitivi & volumine fluidi super libellam orificii vasis stagnantis, addatur numerus quartus proportionalis ad gravitatem hujus fluidi, pondus Atmosphæricum, & volumen ejusdem fluidi. *2.* Ab hujus novæ

femissumæ quadrato subtrahatur factum ex volumine aëris primitivi in volumen fluidi ultra libellam orificii vasis stagnantis. *3.* Ex residuo extrahatur radix quadrata, quæ si *4.* à femisumma supra inventa subtrahatur relinquetur volumen fluidi in vas ascendentis.

COROLLARIUM I.

110. Cum pondus liquoris vas intrantis sit  $gx : c$  idem substituto valore ipsius  $x$ , reperitur =  $\left(\frac{1}{2}d - \sqrt{\left(\frac{1}{4}dd - bc\right)}\right) g : c$ .

COROLLARIUM II.

111. Et quia elater aëris in vase compressi est  $ab : (b - x)$ , idem substituto valore ipsius  $x$ , reperitur =  $ab : \left(b - \frac{1}{2}d - \sqrt{\left(\frac{1}{4}dd - bc\right)}\right)$ .

PROBLEMA XXIV.

112. *Data profunditate vasis, seu altitudine aëris primitivi in ejus cavitare contenti; invenire profunditatem, ad quam intra fluidum data gravitatis orificium CD deprimendum, ut volumen aëris compressi habeat ad volumen aëris primitivi rationem datam.* Tab. I.  
Fig. 6.

RESOLUTIO.

Sit altitudo voluminis aëris primitivi =  $b$ , pondus Atmosphæricum =  $a$ , gravitas fluidi =  $g$ , ejus altitudo super libella orificii =  $x$ , altitudo aëris compressi =  $c$ , erit altitudo liquoris vas intrantis =  $b - c$ . Cum elater aëris primitivi æquetur ponderi Atmosphærico (§. 33); reperietur elater compressi =  $ab : c$  (§. 78). Et quoniam gravitates corporum homogeneorum sunt ut volumina (§. 133. *Mech.*), erit gravitas fluidi in vas ascendentis =  $(bg - gc) : x$ . Ergo

$ab :$

$$ab : c + (bg - gc) : x = a + g$$

$$\frac{abx + bgc - gc^2 = acx + gcx}{bgc - gc^2 = acx + gcx - abx}$$

$$\frac{bgc - gc^2 = acx + gcx - abx}{(bgc - gc^2) : (ac + gc - ab) = x}$$

*Theorema.* Ut differentia facti ex pondere Atmosphærico in altitudinem aëris primitivi à facto ex aggregato ponderis Atmosphærici & gravitatis fluidi in altitudinem aëris compressi, ad gravitatem fluidi; ita differentia quadrati altitudinis aëris compressi à facto ex eadem in altitudinem primitivi, ad profunditatem orificii CD vasis sub fluido demersi.

#### SCHOLION.

113, *Hactenus supposuimus, aërem, dum comprimitur, cum ambiente externo cetera paria habere. Enimvero quando aqua frigidior aëre ambiente, aër in vase condensatur (§. 24). Dispiciendum itaque, quamnam mutationem frigus inducat.*

#### PROBLEMA XXV.

114. *Datis capacitate vasis, hoc est, volumine aëris primitivi, volumine fluidi demersum ingressi, & volumine fluidi supra orificii vasis libellam stagnantis, una cum pondere Atmosphærico, invenire rationem voluminis aëris compressi tantum, ad volumen compressi & condensati simul.*

#### RESOLUTIO.

Ex datis inveniri potest volumen aëris compressi (§. 105) &, si volumen fluidi vas ingressi à volumine aëris primitivi subducitur, manifestum est, relinqui volumen aëris compressi & condensati simul. Cum igitur in numeris habeatur tam volumen aëris compressi tantum, quam volumen aëris & compressi & condensati, illius ad hoc ratio latere nequit. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM I.

115. *Quodsi volumen aëris compressi & condensati subtrahatur ex volumine aëris compressi tantum, relinquetur pars voluminis, quæ condensationem metitur.*

#### COROLLARIUM II.

116. *Quodsi contingat, hanc differentiam esse nullam; vel aër ambiens non erit calidior aqua, vel aër compressus ab isto frigoris gradu nullam patiatur necesse est condensationem.*

#### COROLLARIUM III.

117. *Quodsi differentia aliqua prodeat, evidens est, aërem compressum adhuc condensatum, & spatium à compresso in condensatione derelictum à fluido ascendente repletum fuisse. Elater igitur aëris compressi facta condensatione decrevit, & hoc decrementum æquatur ponderi fluidi in spatio derelicto contenti (§. 93).*

#### SCHOLION I.

118. *Supposuimus in hactenus demonstratis propositionibus vasa esse cylindrica vel prismatica: alias enim prolixiore subinde opus fuisset calculo.*

#### SCHOLION II.

119. *Nec difficulter intelligitur, quæ in Problemate præsentate de aëre condensato demonstrata sunt, ad rarefactum quoque transferri posse, si vas in fluido calidiorè, quam aër ambiens, demergatur.*

#### THEOREMA XV.

120. *Si pondus Atmosphæra minuitur, mercurius in tubo Torricelliano descendere; si illud augetur, hic ascendere debet.*

#### DEMONSTRATIO.

Etenim columna mercurialis intra tubum Torricellianum suspensa æquatur ponderi

ponderi Atmosphærico (§. 29). Quare si pondus Atmosphære minuitur, mercurius fortius deorsum nititur, quam pondus Atmosphære resistit. Tanta igitur ejus portio ex tubo effluere debet, quanta differentie ponderis columnæ mercurialis & ponderis Atmosphærici æquatur (§. 73. *Mechan.*). Quare si volumen mercurii minuitur, in tubo utique descendere debet. *Quod erat unum.*

Similiter demonstratur, pondere Atmosphærico aucto, mercurium in tubo Torricelliano ascendere debere. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

121. Cum altitudo mercurii in tubo Torricelliano quotidie variet, experientia teste; aëris quoque gravitas quotidie varietur opus est.

SCHOLIUM I.

122. *Mathematici Parisienses maximam Mercurii altitudinem 28'' 4'''*, minimam 26'' 4''' observaverunt, ut adeo omnis variatio intra 2'' seu 24''' pedis Parisini comprehendatur. A. 1711. d. 23. Dec. apud nos flante Coro & cælo nubilo, altitudo maxima fuit 30''<sup>2</sup>/<sub>3</sub> pedis Londinensis, d. 21. Octobr. h. 7. mat. minima vix excessit 28 digitos pedis Londinensis, flante Zephyro & tempestate pluviali, cum nocte precedente procella seviisset. Nec memini, me intra quinquennium ex quo tales observationes annotavi, unquam majorem vel etiam minorem altitudinem Mercurii deprehendisse. Tota igitur variationis scala non excedit 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> digitos pedis Londinensis, qui cum deficiat a Parisino <sup>2</sup>/<sub>144</sub> (§. 26 Geom.); observationes nostræ cum Parisinis satis conspirant.

SCHOLIUM II.

123. Equidem celeberrimus HALLEIUS (a)

(a) *Philos. Transact.* n. 197. p. 650.

cum globum vitreum, collo tenui instructum & mercurio plenum, aqua ad ignem ebullienti immitteret, volumen ejus <sup>7</sup>/<sub>4</sub> sui crescere observavit, atque adeo hinc constat, mercurium rareferi iterumque condensari (§. 6. 8). Quoniam tamen incrementa & decrementa mercurii calori atque frigori proportionalia non sunt, nec caloris mutationibus ullatenus obtemperant, immo maxima plerumque hieme observantur (§. 122); variationes ejus a calore ac frigore minime pendent.

THEOREMA XVI.

124. Si tubus recurvus ABC, in A Tab. I. hermetice sigillatus, in C vero aper- Fig. 7. tus ut Torricellianus, mercurio repletur, erit variatio altitudinis mercurii in crure longiore AB, ob variatum pondus Atmosphære, subdupla variationis altitudinis mercurii in tubo Torricelliano ex eadem causa contingentis.

DEMONSTRATIO.

Altitudo enim mercurii, in brachio majore, Atmosphære æquiponderantis semper computanda est a superficie mercurii in crure minore BC stagnantis (§. 34. 36. *Hydrost.*). Ponamus jam mercurium in crure minore CB consistere ad E, in majore AB ad D, fitque HD = 26''. Aucta Atmosphære gravitate, mercurius ascendat ex D in F (§. 120): tum ex E descendet in G, eritque, suppositis tuborum CB & BA diametris æqualibus, EG = DF. Ponamus esse EG = 1'', erit IF = 28''. Quare si in tubo Torricelliano mercurius ascendit per 2'', in tubo recurvo nonnisi ex D in F, hoc est per 1'', ascendit. Est ergo variatio altitudinis mercurii, ob mutatum pondus Atmosphæ-

spharicum, in istiusmodi tubo recurvo contingens, subdupla variationis altitudinis mercurii ex eadem causa in tubo Torricelliano contingentis. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

125. Quia vasculum, cui tubus Torricellianus immittitur, cruri breviori respondet; evidens est, illud tam amplum esse debere, ut mercurius ex tubo per integram scalam delapsus altitudinem in vasculo stagnantis non sensibilibiter augeat, e. gr. non nisi dimidia lineola. Ita enim mercurius in tubo per unam lineam ascensus propter hoc impedimentum non nisi per lineam parte sui quadragesima octava multatam ( $1''' - \frac{1}{48}$ ) ascendet (§. 122): quæ differentiola vix notabilis.

## COROLLARIUM II.

126. Cum scala integra, per quam Mercurius in tubo Torricelliano, vasculo satis amplo, ascendere ac descendere solet, vix 24 lineas adæquet (§. 122); in tubo recurvo eadem erit non nisi 12 linearum seu digiti unius.

## PROBLEMA XXVI.

127. *Data integra scala, per quam ascendit & descendit mercurius in tubo Torricelliano, una cum diametro tubi; invenire diametrum vasculi, in quo si tubus contineatur, mercurius ex eo delapsus non impediatur, quominus mutationes satis notabiles existant.*

## RESOLUTIO.

Totum negotium huc redit, ut impediatur, quominus mercurius ex tubo delapsus mercurii in vasculo stagnantis altitudinem augeat, cum tantum altitudini in tubo decedat, quantum accedit altitudini mercurii in vasculo, ex demonstratione Theorematis 16 (§. 124). Id autem obtinetur, si

ea sit vasculi amplitudo, ut mercurius per integram scalam delapsus altitudinem in vasculo stagnantis non nisi dimidia lineola augeat (§. 25).

Sit itaque scala mercurialis in tubo Torricelliano =  $a$ , diameter tubi =  $b$ , erit, supposita ratione diametri ad peripheriam =  $d : p$ , cylindrus mercurialis intra scalam continendus =  $pb^2 a : 4d$  (§. 541. *Geom.*). Sit porro diameter vasculi =  $x$ , cum altitudo cylindri, in quem in id delapsus mercurius abire debet, sit dimidiæ lineolæ =  $m$ ; erit soliditas ejusdem =  $mpx^2 : 4d$  (§. *cit.*), consequenter

$$mpx^2 : 4d = pb^2 a : 4d$$

---


$$mx^2 = ab^2$$


---

$$x^2 : b^2 = a : m \text{ seu } x : b = \sqrt{a} : \sqrt{m}$$

*Theorema.* Diameter vasculi, est ad diametrum tubi; in ratione subduplicata scalæ mercurialis in tubo, ad altitudinem ejus delapsi in vasculo, hoc est ut  $\sqrt{8}$  ad 1. (§. 125), seu  $2\sqrt{2}$  ad 1.

## COROLLARIUM.

128. Si  $b = m$ ; erit  $x = \sqrt{ab}$ , hoc est, diameter vasculi est media proportionalis inter altitudinem scalæ & diametrum tubi, si mercurius ex integra scala delapsus in vasculo ascendere debet ad altitudinem diametro tubi æqualem.

## PROBLEMA XXVII.

129. *Datis diametris tubi & vasculi, una cum altitudine intervalli per quod mercurius in tubo descendit; invenire altitudinem intervalli, per quod ascendit in vasculo; & contra.*



RESOLUTIO.

Sit diameter tubi =  $a$ , diameter vasculi =  $b$ , altitudo descensus =  $c$ , altitudinis mercurii in vasculo incrementum =  $x$ , erit (§. 127)

$$a^2pc : 4d = b^2px : 4d$$

---


$$a^2c = b^2x$$

---


$$x : c = a^2 : b^2$$

*Theorema.* Incrementum altitudinis mercurii in vasculo, est ad intervallum descensus in tubo; uti reciproce quadratum diametri tubi, ad quadratum diametri vasculi.

COROLLARIUM.

130. Ergo si mercurius descendit per quodcunque intervallum  $c$ , erit verum descensus intervallum =  $c \cdot \frac{a^2}{b^2} : b^2$ .

PROBLEMA XXVIII.

131. *Baroscopium construere.*

RESOLUTIO

II. I. Tubus vitreus AB, cujus diameter unius circiter lineæ, hermetice sigillatus in A & 36 digitis Rhenanis non brevior, mercurio ita repleatur, ut nihil aëris super eo relinquantur, nec ulli vesiculæ intèr parietes vitri & mercurium locus concedatur: id quod optime succedit ope infundibuli vitrei tubulo capillari instructi.

2. Orificium tubi ita repleti, ut mercurius ex eo redundet, digito fortissime appresso, ne intra eum & mercurium aëris quidpiam remaneat, mercurio in vasculo ligneo, cujus diameter per Probl. 26. (§. 127) determinanda, ita immergatur, ut fundum non attingat.

3. Intervallo a superficie mercurii in vasculo stagnantis 26 digitorum Rhenanorum, affigantur ab utroque tubi latere lamellæ CE & DF in duos digitos divisæ, qui rursus in 12 lineas aut particulas quotcunque æquales alias subdividendi.

4. Tubus denique, ne facile frangatur, canaliculo in tabula LM exciso indatur, & superius alio tegatur, ut ex conspectu figuræ haud difficulter apparet.

Quoniam tubus hic idem est cum Torricelliano (§. 87); Baroscopium utique erit hac ratione constructum (§. 89. 120).

SCHOLIUM I.

132. *Non opus esse ut vasculum ligneum, in quo mercurius stagnat, sit apertum, & evidenti experimento (a) docui, & propria experientia didici. Meum enim Baroscopium non modo vasculum habet undiquaque probe clausum; sed præterea theca alteri lignea includitur, vix quicquam aëris externi ad superficiem vasculi admittenti. Hoc tamen non obstante, mutationes in altitudine mercurii consueta ratione contingunt.*

SCHOLIUM.

133. *Non desuere, qui in eo operam suam collocarunt, ut mutationes sensibiliores efficerent. CARTESIUS primum, postea quoque Tab. I. HUGENIUS commendarunt tubum AB vase Fig. 9. cylindrico CD instructum, & dimidium vasis una cum quadam tubi superioris parte aqua, reliquam vasis partem ac tubum inferiorem mercurio repleti jusserunt. Advertit vero HUGENIUS, votis non respondere eventum. Etenim aër in aqua contentus vinculis suis*

Q q 2

suis

(a) In Actis Eruditorum A. 1710. p. 83.

suis sese liberabat & partem tubi superioris vacuum replebat: quo facto, cum aër inclusus rareferet & condensaretur (§. 23. 24), depressiones & elevationes mercurii à gravitatis Atmosphære variationibus productis non amplius discerni poterant. Cum adeo didicisset consultius esse, ut mercurius locum vacuo proximum occupet, aliam Baroscopii compositi constructionem excogitavit, quam problemate sequente explicamus.

### PROBLEMA XXIX.

134. *Baroscopium compositum construere.*

#### RESOLUTIO.

1. Fiat tubus recurvus ADG, in A hermetice sigillatus, in G vero apertus, & duobus vasis cylindricis BC & EF instructus.
2. Vasa BC & EF sint inter se æqualia & intervallo  $27\frac{1}{2}$  digitorum distant, quanta scilicet est mercurii in media aëris gravitate altitudo in Baroscopio simplici.
3. Baroscopio huic infundatur primum mercurius, dum Baroscopium simplex mediam aeris gravitatem indicat, ita quidem ut à medietate cylindri FE ad medietatem alterius BC assurgat, reliquo spatio ad A usque vacuo non solum à mercurio sed ipso etiam aëre crassiore.
4. Postea quoque infundatur aqua communis cum parte sexta aquæ regię permixta, ne frigore in glaciem vertatur, donec in tubo GF ad altitudinem unius pedis constituatur. Ita Baroscopium compositum constructum.

#### DEMONSTRATIO.

Mercurius enim, ultra libellam mercurii in vasculo EF contenti per tubum AD assurgens, ponderi Atmosphærico & liquoris æquilibratur (§. 34. *Hydrostat.*). Aucto igitur Atmosphære pondere augeri debet columna illa mercurialis: consequenter liquor descendet. Ast imminuto Atmosphære pondere, columna mercurialis quoque imminui debet: consequenter liquor ascendet. Liquoris adeo descensus incrementum gravitatis aëris, ascensus vero decrementum indicat: consequenter instrumentum ita constructum Baroscopium est (§. 89). *Q. e. d.*

#### SCHOLIUM.

135. *Baroscopium HUGENIANUM multo minores gravitatis aëreæ mutationes indicare, quam tubus TORRICELLIANUS, attendentibus manifestum est. Quoniam tamen aqua facile in vaporem agitur, etiamsi ad impediendam evaporationem gutta olei ex amygdalis dulcibus expressi instilletur, liquori innatatura loco aquæ oleum Tartari per deliquium infundi potest.*

### PROBLEMA XXX.

136. *Baroscopium construere, cujus mutationes sint multo sensibiliores quam in Barometro ordinario.*

#### RESOLUTIO.

1. Tubo recurvo ACD, cujus crus CD sit ad alterum AC perpendicularare, CD sit ad alterum AC perpendicularare, cohæreat vasculum cylindricum B, cujus diameter tanto major esse debet, quanto sensibilibus mutationes Baroscopium indicare debet.
2. Crure AC in situm horizontalem incli-

inclinato, mediante infundibulo, Baroscopium repleatur mercurio, ita ut maxima pars tubi vacua fit, nec metuendum, ne in minima Atmosphære gravitate mercurius elabatur.

3. Cruri horizontali aptetur scala in suos digitos divisa & in lineas subdivisa. Dico hoc Baroscopium mutationes gravitatis aëris multo accuratius indicare, quam ordinarium.

DEMONSTRATIO.

Etenim dum pondus Atmosphære augetur, mercurius in vasculo tanto intervallo ascendit, quanto in ordinario Baroscopio ascendere solet (§. 120): consequenter cum diameter vasculi multo major sit diametro tubi horizontalis, in hoc multo ampliori intervallo recedit. Incrementa igitur ponderis Atmosphærici multo minora indicare valet, quam Baroscopium commune sive simplex. Similiter quando pondus Atmosphære minuitur, mercurius in vasculo tanto intervallo descendit, quanto in ordinario Baroscopio descendere solet (§. 120): consequenter cum diameter vasculi multo major sit diametro tubi horizontalis, in hoc multo ampliori intervallo versus orificium excurrit. Decrementa igitur ponderis Atmosphærici multo minora indicat, quam Baroscopium simplex. Q. e. d.

PROBLEMA XXXI.

137. Data diametro tubi CD; invenire diametrum vasculi AB, ita ut scala descensus mercurii in tubo DC

habeat ad scalam ascensus in vasculo AB rationem datam.

RESOLUTIO.

Sit diameter tubi =  $a$ , ratio scalarum  $b : c$ , diameter vasculi =  $x$ . Cum tantum mercurii in vasculum ascendat, quantum per aëris gravitatem in tubo DC deprimitur, positaque ratione diametri ad peripheriam =  $d : p$ , quantitas mercurii in tubo recedentis sit  $a^2pb : 4d$  & quantitas vasculum ingressi =  $x^2pc : 4d$  (§. 541. Geom.); erit.

$$a^2pb : 4d = x^2pc : 4d$$

$$a^2b = x^2c$$

$$x^2 : a^2 = b : c$$

$$x : a = \sqrt{b} : \sqrt{c}$$

Theorema. Diameter vasculi, est ad diametrum tubi; in ratione subduplicata reciproca scalarum.

COROLLARIUM.

138. Datis ergo diametro tubi CD, & diametro vasculi AB, una cum scala mercurii in vasculo; invenitur scala in tubo, inferendo: ut quadratum diametri tubi, ad quadratum diametri vasculi; ita reciproce scala mercurii in vasculo, ad scalam mercurii in tubo.

PROBLEMA XXXII.

139. Datis diametris tuborum & vasculorum, una cum altitudinibus intervalloꝝ per que mercurius descendit; invenire utrum Baroscopia concordent, nec ne.

RESOLUTIO.

Querantur vera descensus intervalla in eadem mensura (§. 130): quæ si utrinque aequalia reperiantur, evidens est, Barometra inter se concordare; sin minus, discordare.

Tab. I.  
Fig.  
II.

## SCHOLION.

140. Apparet adeo, ad judicandam duorum vel plurium barometrorum concordiam aut veram intervallorum ascensus differentiam, non sufficere ut utriusque eadem graduatio applicetur, nisi utriusque vasculi (§. 127) ea fiat amplitudo, ut mercurius ex tubo delapsus, gravitate Atmosphæræ imminuta, altitudinem in vasculo stagnantis sensibilibiter non variet.

## THEOREMA XVII.

Tab. I. Fig. 12. 141. Si tubus Torricellianus AB inclinatur, erit cylindrus mercurialis Atmosphæræ equiponderans, ad cylindrum mercurialem eidem in situ tubi verticali equiponderantem; ut longitudo tubi AB, ad altitudinem BC.

## DEMONSTRATIO.

Si loco ponderis Atmosphæræ egressum mercurii ex tubo AB per osculum A impediens, concipiatur cylindrus mercurialis isti æquiponderans in tubo verticali ad A resistere; erit ejus gravitas, ad gravitatem mercurii in tubo inclinato; ut longitudo AB, ad altitudinem BC (§. 34. Hydrost.). Cum itaque cylindro mercurii verticali pondus Atmosphæræ æquale sit; erit etiam gravitas mercurii in tubo inclinato, ad hoc; ut longitudo tubi AB, ad altitudinem BC. Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

142. Si altitudo BC fiat longitudinis tubi vel subtripla, vel subquadrupla &c. mutationes Baroscopii triplo, vel quadruplo &c. sensibiliores evadunt.

## COROLLARIUM II.

143. Si AB sumatur pro sinu toto, erit CB sinus anguli inclinationis BAC. Est ergo gravitas mercurii in tubo inclinato ponderi Atmosphæræ æquiponderantis, ad pondus Atmosphæricum; ut sinus totus, ad sinum anguli inclinationis.

## COROLLARIUM III.

144. Ergo & scalia integra, & singula intervalla ascensus descensusque mercurii reciproci in tubo inclinato AB ob variationes ponderis Atmosphæræ, ad scalam integram & singula ejus intervalla in tubo verticali; sunt ut sinus totus, ad sinum anguli inclinationis. Ductis enim DF ipsi BC & FE ipsi A parallelis, erit  $\theta = x$  &  $v = y$  (§. 255. Geom.), consequenter  $DE : DF = BA : BC$  (§. 267. Geom.).

## PROBLEMA XXIII.

145. Data longitudine scalæ, per quam mercurius nunc ascendit, nunc descendit in tubo verticaliter erecto; invenire angulum inclinationis tubi inclinandi, ut scala per quam mercurius in ipso nunc ascendit, nunc descendit, habeat ad scalam tubi verticalis rationem datam.

## RESOLUTIO.

Sit longitudo scalæ in tubo verticali  $= a$ , quia datur ratio scalæ in inclinato ad scalam in verticali, datur etiam scala ipsa in inclinato, quæ sit  $= b$ . Sit porro sinus totus  $= t$ , sinus anguli inclinationis  $= x$ ; erit utendo Logarithmis  $lx = la + lt - lb$  (§. 135).

C A P U T V.

*De Rarefactione & Condensatione, Densitate item & Raritate Aëris.*

THEOREMA XVIII.

146. **C**alor elaterem aëris intendit.

DEMONSTRATIO.

Aër vesicæ inclusus eadem vi premit, qua aër ambiens, ante caloris actionem (§. 34). Sed ubi calor in eum agit, vesicam distendit (§. 22). Tum itaque magis premit, quam ambiens externus (§. 75. *Mechan.*). Enimvero vis illa, qua vesicam distendit, est elater ejus (§. 26). Calor adeo elaterem aëris intendit. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

147. Quia aër rarefactus iterum condensatur (§. 24); frigus elaterem ejus minuit.

THEOREMA XIX.

148. *Vis elastica aëris qua rarefiens expanditur, est ad elaterem aëris condensati; uti volumen rarefacti, ad volumen condensati.*

DEMONSTRATIO.

Ponamus aërem rarefactum ea lege comprimi debere, ut idem recuperet volumen quod condensatus obtinuerat: evidens est, tantum ponderis imponi debere, quod vi elastica æquatur, qua expansus fuit (§. 75. *Mech.*). Erit igitur elater aëris quo rarefiens expanditur, ad elaterem condensati; ut pondus illud, ad pondus alterum

quo condensatus premebatur (§. 553. *Mechan.*). Est vero pondus rarefacto incumbens idem quod condensato incumberebat *per hypoth.* Ergo elater aëris quo rarefiens expanditur, est ad elaterem condensati; ut pondus quod sustentat à rarefactione ad pristinum condensationis volumen reductus, ad pondus quo rarefactus premitur; consequenter ut volumen rarefacti, ad volumen condensati (§. 66). *Q. e. d.*

PROBLEMA XXXIV.

149. *Aquam vel liquorem alium in vas quoddam per exiguum tubulum immittere.*

RESOLUTIO.

1. Vas igni admoveatur per aliquod temporis spatium.
2. Mox, ubi ab igne iterum removeatur, orificium tubuli vel foramen liquori immittatur.

Dico, liquorem sua veluti sponte in cavitatem vasis ascensurum.

DEMONSTRATIO.

Dum enim globus igni admovetur; aër rarefit (§. 23): consequenter tanto major quantitas expelletur, quanto diutius ad ignem detinetur (§. 8). Quodsi jam orificium tubuli liquori immergatur, per eum in vas ascendet, dum calor expirat. Dum enim calor

expirat, cæteris paribus, æris quæ refert portio rarior est externo ambiente, adeoque elater ejus minor quam externi (§. 78): consequenter quam ponderis Atmosphærici (§. 30). Quare cum circa tubulum liquor à pondere Atmosphærico prematur (§. 21); aqua per tubulum in vas propelletur (§. 75. *Mechan.*). *Q. e. d.*

## S C H O L I O N.

150. *Quodsi prima vice non tantum æris expulsus fuerit, ut totus globus liquore impleri queat, eadem operatio iteranda. Nec necesse est, liquorem in priore operatione immissum rursus expelli, cum ipse potius, ob propriam rarefactionem, æris adhuc residui expansionem promoveat.*

## T H E O R E M A XX.

Tab. II. Fig. 13. 151. *Sit globus vitreus AB cum annexo tubo BC, cujus orificium C aqua immersum; hæreat aqua pendula in tubo usque ad D: ascendet, si ær ambiens frigidior, vel gravior evadit; descendet, si calidior, vel levior redditur.*

## D E M O N S T R A T I O.

Si enim aer ambiens frigidior redditur, refrigeratur etiam inclusus adeoque condensatur (§. 24): quo facto, elater ejus minuitur (§. 78). Cum igitur is constanter æqualis esse debeat differentię ponderis fluidi suspensi à pondere Atmosphærico (§. 93); si minuitur pondus fluidi, consequenter & volumen ejus (§. 17. *Hydrost.*) augeri debet. Aqua igitur in tubo ascendet necesse est. *Quod erat unum.*

Similiter, si aer gravior redditur, aqua circa tubum magis premitur, quam sub orificio tubi (§. 10). Tantum igitur

aquæ ascendere debet, quantum sufficit ad æquilibrium cum pondere Atmosphærico-constituendum (§. 36. *Hydrost.*). *Quod erat secundum.*

Contra, si ær externus calefit, calefit quoque inclusus, consequenter rarefit (§. 23), adeoque liquorem in tubo detrudit (§. 8). Fluidum descendere, si ær levior redditur, eadem ratione demonstratur, qua ostendimus, illud ascendere, si is gravior evadit. *Quod erat tertium & quartum.*

## S C H O L I O N.

152. *Celeberrimus HALLEIUS (a) observavit, uti supra de mercurio (§. 123), quod spiritus vini insigniter expansus fuerit, atque ab initio celerius, postea tardius in tubulo ascenderit. Cum spiritus vini duodecima voluminis parte dilatatus esset, manus quidem aquæ calorem ferre poterat, ille tamen ebullire incipiat. Vereor autem, ne diversitas spiritus vini expansionis gradum variet. In aqua exiguam expansionem notavit idem HALLEIUS, imprimis sub initium, & ebulliens  $\frac{1}{16}$  circiter spatii prioris augebatur, non amplius expandenda. Quamvis autem ex his experientiis manifestum sit, volumen fluidi calore crescere, frigore decretere debere, consequenter liquorem ascendere conari, dum ab elatere æris inclusi deorsum pellitur, & contra, adeoque rarefactionem liquoris obstare descensui ejus, condensationem vero ascensui: experientia tamen constat, hoc obstaculum non impedire, quominus elateris ærei effectus sint satis sensibiles, quia ær multo magis rarefit & condensatur quam fluidum quodcumque aliud.*

## T H E O R E M A XXI.

153. *Densitas æris, cæteris paribus, crescit in ratione ponderum comprimentium.*

DE-

(a) Philos. Transact. n. 197. p. 650. & seqq.

DEMONSTRATIO.

Sunt enim densitates ut gravitates specificæ (§. 33. *Hydrostat.*). Gravitates specificæ sunt ut volumina reciproce (§. 29. *Hydrost.*). Ergo densitates sunt ut volumina reciproce (§. 167. *Arithm.*): consequenter ut pondera comprimentia (§. 73). *Q. e. d.*

THEOREMA XXII.

154. *Aër inferior densior est superiore.*

DEMONSTRATIO.

Aër superior premit inferiorem (§. 21). Cum adeo inferiori major aëris quantitas incumbat, quam superiori; inferior quoque magis premitur, quam superior (§. 10). Densitas adeo inferioris major est densitate superioris (§. 153). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

155. Quia corpora densiora sunt graviora rarioribus sub eodem volumine (§. 14. *Hydrost.*), & aër gravis existit (§. 20.); aër inferior specificè gravior est superiore.

THEOREMA XXIII.

156. *Densitas aëris inferioris non est ponderi Atmosphericò proportionalis.*

DEMONSTRATIO.

Si præter variationem ponderis Atmospherici cætera in aëre inferiore omnia essent paria, densitates ejus essent ut pondera Atmospherica (§. 153). Sed calor aërem rarefacit, frigus condensat (§. 23. 24), adeoque à calore & frigore densitas diversimode variatur, utat eodem pondere prematur; ac forte adhuc aliæ dantur causæ eandem similiter alterantes. Cum adeo densi-

tas aëris inferioris mutari possit, pondere Atmosphericò immutato, ista huic proportionalis non est. *Q. e. d.*

THEOREMA XXIV.

157. *Si aër redditur densior, pondus corporum in aëre minuitur; si rarior, augetur.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam gravitates specificæ sunt ut densitates (§. 33. *Hydrost.*); aër densior specificè gravior est rariori. Corpus igitur aëre specificè gravius in densiore majorem ponderis partem amittit, quam in rariore (§. 56. *Hydrost.*) Unde si aër redditur densior, pondus minuitur: si rarior, augetur. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

158. Si igitur densitas aëris sensibilibiter alteratur, corporum in aëre rariori æquilibratorum, quorum gravitates specificæ notabiliter differunt, æquilibrium tolletur in densiore, præponderabitque specificè gravius (§. 61. *Hydrostat.*).

PROBLEMA XXV.

159. *Invenire incrementum ponderis, quod volumen aëris unius pedis cubici, ob variationem ponderis Atmospherici, acquirere valet.*

RESOLUTIO.

Si pondus Atmosphæræ cæteris paribus augetur, aër inferior magis comprimitur (§. 66), adeoque densior evadit (§. 153), consequenter pes cubicus aëris à compressione gravior (§. 9. *Hydrost.*). Sit jam pondus Atmosphæræ minimum =  $a$ , maximum =  $b$ , pondus aëris à minimo compressi =  $c$ ,

pressi à maximo =  $x$ . Cum densitates corporum æqualium sint ut pondera (§. 16. *Hydrost.*): erit

$$a : b = c : x$$

---


$$x = bc : a$$

Ergo incrementum  $y$ , quod volumen aëris datum, ob ponderis Atmosphærici variationem, acquirere valet, est  $bc : a - c = (bc - ac) : a$ , consequenter  $a : b - a = c : y$ .

*Theorema.* Ut pondus Atmosphæricum minimum, ad differentiam ejus à maximo; ita pondus aëris à minimo compressi, ad incrementum ponderis, quod à tota variatione ponderis Atmosphærici acquirere valet volumen aëris datum.

E. gr. Pes cubicus aëris in minima Atmosphære gravitate sit 507 granorum (§. 55). Quoniam  $a = 26$ ,  $b = 28$  (§. 122): erit  $y = 39$  granorum. Incrementum adeo, quod pes cubicus aëris ab omni variatione ponderis Atmosphærici suscipere valet, est fere  $\frac{1}{13}$  ejus ponderis quod ipsi à minimo pondere Atmosphærico pressio competit.

#### DEFINITIO XI.

160. *Manoscopium* est instrumentum, quod alterationes densitatis aëris indicat. *Manometrum* est instrumentum, quod easdem metitur.

#### PROBLEMA XXXVI.

161. *Manoscopium construere.*

#### RESOLUTIO.

- Tab. II. I. Assumatur bilanx tam accurate constructa, ut minimas æquilibrii mutationes indicet, cujus centrum motus est super centro jugi.
- Fig. 14. 2. Ex altero jugi brachio suspendatur globus E ex lamina metallica, e. gr. suprea aut orichalcea, construendus,

ne pondus affricatum in libra augeat (§. 782. *Mechan.*), minimas æquilibrii mutationes elufurum. Capacitas globi sit minimum unius pedis cubici, & ex eo educatur aër (§. 40).

3. Trutinæ affigatur Quadrans ADC ex centro jugi B descriptus, ita ut secetur in gradu quadragesimo quinto ab indice BD, si jugum fuerit in situ horizontali.

Dico, Manoscopium esse constructum.

#### DEMONSTRATIO.

Etenim si aër densior redditur pondus globi evacuati minuitur (§. 158). Et licet etiam (*vi* §. *cit.*) vis contrapondii minuatur, cum tamen ejus volumen vix spatium à lamina, ex qua globus constructus, soliditate repletum occupet, nisi ejus deorsum minus minuitur, quam globi (§. 55. *Hydrost.*): consequenter contrapondium globo præponderat, & augmentum gravitatis specificæ aëris, in quo hæret, consequenter & densitatis (§. 33. *Hydrost.*) indicat. Est ergo Machina Manoscopium (§. 160). *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM.

162. Quoniam aëris densitas & raritas non modo à pondere Atmosphære (§. 153), sed & à caloris & frigoris actione pendet (§. 23. 24); Manoscopium hoc Baroscopium esse nequit.

#### SCHOLIUM.

163. *Equidem* OTTO DE GUERICKE (a) & qui ipsum sequitur, BOYLIIUS (b) idem instrumentum pro Baroscopio vendicant: sed non attenderunt, manente eodem pondere, densitatem ac raritatem aëris sepiissime variari.

SCHO-

(a) In Experiment. de Vacuo lib. 3. C. 31. f. 114.  
(b) In Historia frigoris tit. 17.



SCHOLIUM II.

164. Neque vero putandum est, mutationes gravitatis globi adeo exiguas fore, ut in bilance notari nequeant: experientia enim contrarium abunde satis confirmat. Certe GUERICIUS se expertum scribit, quod globi gravitas interdum quovis, interdum secundo, tertio, quarto, quinto die aliquantum variata fuerit, & imprimis ingravescere globum notavit, si pluat. Nec difficulter idem ratione assequimur. Cum enim gravitas unius pedis cubici aërei 39 granorum mutationem, ob variatum pondus Atmosphaericum, sustineat (S. 159); bilanz vero unius vel alterius grani accessionem vel ablationem indicare possit, utut pondere 30 librarum (à quo multum abest globus cum suo contrapondio) oneretur (S. 55); si globus evacuatus pedem aëris cubicum capit, quin variationes densi-

tatis ab Atmosphaera pondere variato pendentes Manoscopium nostrum indicet, dubitandum non est. Tanto minus autem dubitare fas est, quod alia adhuc densitatis variationes à diverso calore ac frigore aëris factae, nec istis minores accedant. Didicit nimirum HALLEIUS aërem ordinarium in Anglia à calore aëstivo extendi  $\frac{1}{3}$  circiter sui voluminis, à maximo autem frigore condensari  $\frac{1}{6}$  fere. Cum adeo pondus unius pedis cubici aërei sit 507 granorum (S. 55); erit decrementum ponderis in casu priore 32, incrementum in posteriore 25 granorum.

SCHOLIUM III.

165. Manometri constructionem dedit Celeberrimus VARIGNONIUS (a): de quo alias nonnulla monuimus (b).

CAPUT VI.

De Motu Aëris.

DEFINITIO XII.

166. **V**entus est agitatio aëris sensibilis.

PROBLEMA XXXVII.

167. Data ratione gravitatis specificæ fluidi cujuscunque ad gravitatem aëris, una cum spatium quod, intra definitum aliquod temporis spatium, fluidum istud percurrit ab aëre premente impulsus; determinare spatium quod ipse aër ob æqualem pressionem, intra idem tempus, emetiri debet.

RESOLUTIO.

Ponatur altitudo ad quam, per da-

tam aëris pressionem, elevari potest fluidum in medio non resistente = *a*. Sit porro ratio gravitatis specificæ fluidi ad gravitatem aëris = *b*:*c*. Spatium, quod fluidum ab aëre premente impulsus describit, dicatur *s*, & denique spatium, quod aër ob æqualem pressionem intra idem tempus emetitur, vocetur *x*. Quoniam altitudines fluidorum ad quas propter æquales pressiones elewantur, sunt in ratione gravitatum reciproca (S. 36. *Hydrost.*); si altitudo ad quam aër eandem cum fluido pressionem sustinens eveheretur, modo

(a) Memoires de l'Acad. Roy. des Sciences A. 1705. p. m. 409. & seqq.

(b) In Element. Aërometriæ p. 284.

modo elatere careret, fiat  $= y$ ; erit  $c : b = a : y$ , consequenter  $y = ab : c$ , Sunt vero velocitates quibus fluida ob eandem pressionem elevantur, in ratione subduplicata altitudinum ad quas ascendunt (§. 87. 322. *Mechan.*), adeoque in casu nostro ut  $\sqrt{a}$  ad  $\sqrt{(ab : c)}$ . Quare cum, ob temporum suppositam æqualitatem, spatia quæ isis temporibus percurreuntur, sint ut velocitates (§. 28. *Mechan.*): erit

$$\sqrt{a} : \sqrt{(ab : c)} = s : x$$

$$a : \frac{ab}{c} = s^2 : x^2 \text{ (§. 260. Arithm.)}$$

$$ac : ab = s^2 : x^2 \text{ (§. 178. Arithm.)}$$

adeoque

$$c : b = s^2 : x^2 \text{ (§. 181. Arithm.)}$$

*Theorema.* Ut gravitas specifica aëris, ad gravitatem fluidi alterius cujuscunque; ita reciproce quadratum spatii quod fluidum hoc quacunqve vi impulsam intra quodcunque temporis spatium percurrit, ad quadratum spatii quod aër ob eandem pressionem eodem tempore emetitur.

#### COROLLARIUM I.

168. Ergo  $x = \sqrt{(bs^2 : c)}$ . Unde si ponamus aquam data vi impulsam, intra minutum temporis secundum, percurrere spatium 2 pedum; erit  $c = 2$ , cumque gravitas specifica aquæ, sit ad gravitatem specificam aëris; ut 970, ad 1 (§. 57), erit  $b = 970$  &  $c = 1$ , consequenter  $x = \sqrt{970}$ .  $\approx \sqrt{3880} = 627''$  fere.

#### COROLLARIUM II.

169. Est etiam  $f = \sqrt{(c.x^2 : b)}$ , adeoque spatium quod, intra certum aliquod temporis spatium, ob certam quandam impressionem, fluidum quodcunque emetitur, determinatur, si ad duos numeros quibus ratio gravitatis specificæ fluidi ad gravi-

tatem aëris exprimitur, atque quadratum spatii quod aër, ob eandem pressionem, intra idem temporis spatium, emetitur, numerus quartus proportionalis quærat ( §. 302. *Arithm.* ), & ex eo radix quadrata extrahatur (§. 269. *Arithm.*)

#### SCHOLIUM.

170. MARIOTTUS (a) notat ventum satis violentum ordinarie spatium 24 pedum intra minutum secundum describere. Quodsi ergo quærat spatium quod aqua, ob eandem pressionem quam aër sustinet, intra idem temporis spatium absolvit, erit  $c = 1$ ,  $x = 24$ ,  $b = 970$  & reperietur  $f = \sqrt{(576 : 970)} = \frac{24}{31}$ .

#### PROBLEMA XXXVIII.

171. Data altitudine ad quam fluidum quodcunque à pressura aëris elevatur, una cum altitudine per quam corpus grave intra minutum secundum descendit; determinare spatium quod fluidum istud, intra minutum secundum, vis impetus impressi, motu æquabili percurrit.

#### RESOLUTIO.

Sit altitudo ad quam fluidum ab aëre premente elevatur,  $= a$ , minutum temporis secundum  $= b$ , spatium quæsitum  $= x$ . Quoniam corpus grave, per vim cadendo acquisitam, elevatur ad altitudinem per quam decidit (§. 322. *Mech.*); vis aëris prementis, qua fluidum ad datam altitudinem elevatur, æqualis erit vi quam id, per eandem cadendo, acquirere valet. Porro vis cadendo acquisita ejus est celeritatis qua corpus motu æquabili; intra idem tempus quo decidit, describere valet lineam altitudinis ex qua decidit duplam (§. 92. *Mech.*)

Repe-

(a) *Traité du mouvement des eaux* p. 226

Reperietur adeo spatium quod fluidum, intra idem tempus quo decidit, vi cadendo acquisita, percurrere valet = 2a. Sit præterea spatium, quod corpus grave descendens intra minutum secundum describit, = c. Quoniam tempora sunt in ratione subduplicata spatiorum à corporibus cadentibus descriptorum, erit tempus, quo grave decidit per spatium a, =  $\sqrt{(ab^2 : c)}$  (§. 87. *Mech.*). Quare si motus æquabilis ponatur, habebimus (§. 34. *Mech.*)

$$\begin{array}{r} \sqrt{(ab^2 : c)} : 2b = a : x \\ \hline 2ab = x\sqrt{(ab^2 : c)} \\ \hline 4a^2b^2 = x^2 \cdot ab^2 : c \\ \hline 4ac = x^2 \\ 2a : x = x : 2c \end{array}$$

*Theorema.* Spatium, quod fluidum ob impetum impressum intra minutum secundum motu æquabili percurrit, est medium proportionale inter altitudinem duplam ad quam idem ab aëre premente elevatur, & altitudinem duplam ejus per quam grave intra minutum secundum decidit.

SCHOLIUM.

172. Ponamus, mercurium per pressionem Atmosphæra in tubo Torricelliano sustentari ad altitudinem 28<sup>''</sup>: erit adeo in Problemate nostro a = 28<sup>''</sup>. Porro c = 15' 1<sup>''</sup> seu 181<sup>''</sup> (pedis Parisini) (§. 327. *Mechan.*). Ergo x, hoc est spatium quod ob eandem pressionem mercurius motu æquabili tempore unius secundi percurreret, = 21' 181.28 = 142<sup>''</sup> quam proxime, seu 11' 10<sup>''</sup>. Ponamus mercurium elevari per aëris pressionem nonnisi 2<sup>''</sup>. Erit in casu Problematum nostri a = 2<sup>''</sup>, c = 181<sup>''</sup>, adeoque x = 21' 181.2 = 38<sup>''</sup> = 3' 2<sup>''</sup>.

PROBLEMA XXXIX.

173. Dãta altitudine fluidi ad quam

propter pressionem aëris elevatur; invenire spatium quod, tempore unius minuti secundi, ob eandem pressionem, percurrere debet aër, in medio non resistente.

RESOLUTIO.

1. Quærat, quantum spatium, ob pressionem aeris qua ad datam altitudinem elevatur, tempore unius minuti secundi, motu æquabili emittetur fluidum datum (§. 169). Hinc enim porro
2. Investigari potest spatium quod aër, in medio non resistente, ob eandem pressionem, percurrere debet (§. 167).

COROLLARIUM I.

174. Per præfens igitur Problema determinari potest spatium quod aër in vas prorsus evacuatum irruens, intra minutum temporis secundum, describit. Si enim vas prorsus evacuatum fuerit, aër irruens pressionem sustinet ei æqualem qua aqua ad altitudinem 32 pedum Parisensium elevatur (§. 29). Quare spatium quod aqua, ob istam pressionem, tempore unius minuti secundi, motu æquabili percurreret, est 528<sup>''</sup> (§. 171). Jam cum ratio gravitatis specificæ aquæ ad gravitatem aëris sit 970 : 1, reperietur spatium, quod aër in vas prorsus evacuatum irruens motu æquabili, tempore unius minuti secundi, percurrere debet, 1370 pedum (§. 167).

COROLLARIUM II.

175. Si detur differentia virium elasticarum in duobus voluminibus aëris contiguus, inveniri potest spatium quod aër, ex volumine fortiori elatere instructo irruens, in volumen elatere debiliori præditum describit.

SCHOLIUM.

176. Si e. gr. differentia virium elasticarum in duobus voluminibus aëris contiguus ea qua mercurius elevari potest ad altitudinem 2 digitorum; reperietur spatium, quod ob

istiusmodi pressionem, tempore unius minuti secundi, motu aquabili mercurius describere valet 38" (§. 171). Cum jam gravitas specifica mercurii, ad gravitatem aquæ; sit ut 14, ad 1 (§. 29) & gravitas aquæ, ad gravitatem aëris; ut 970, ad 1, erit gravitas mercurii, ad gravitatem aëris; ut 13580, ad 1, adeoque reperietur spatium quod, ob aqualem pressionem, aër emetiri debet, tempore unius minuti secundi, fere 368 pedum. Irruet ergo aër ex volumine fortiori in debilius ea celeritate qua, tempore unius minuti secundi, fere 368 pedes percurrere valet. Sit differentia virium elasticarum nonnisi 3": reperietur spatium quod, ob istiusmodi pressionem, tempore unius minuti secundi, motu aquabili mercurius describere valet, fere 12", tandemque spatium quod, ob istiusmodi pressionem, tempore unius minuti secundi, aër emetiri debet, 116½ pedum (§. 167). Ea igitur celeritate qua, tempore unius minuti secundi, spatium 116 circiter pedum percurrere valet, aër ex volumine fortiori in debilius irruiet. Quoniam MARIOTTUS (a) observat ventum satis violentum, intra minutum temporis secundum, 24 pedes percurrere; ejus celeritas multo minor est ea qua aër irruiet ex volumine fortiori in debilius, differentia virium elasticarum nonnisi tanta existente, quanta mercurium in tubo Torricelliano ad altitudinem 3" elevare valet.

#### COROLLARIUM II.

177. Quoniam, data ratione voluminum aëris primitivi atque compressi, inveniri potest altitudo ad quam aër compressus mercurium in tubo Torricelliano elevare potest (§. 83); per Problema præsens determinari etiam potest celeritas qua aër, cessante compressione seu remota vi præmente, sese expandit.

#### PROBLEMA XL.

178. Dato spatio quod aër intra minutum secundum percurrit, determinare pressionem qua celeritatem istam producere valet.

(a) Traité du mouvement des eaux p. 226.

#### RESOLUTIO.

Pressionem determinatam esse patet, si constet altitudo ad quam fluidum quodcunque in tubo vacuo ab aëre elevandum tantam pressionem producere valente. Sit itaque hæc altitudo =  $x$ , spatium quod aër intra minutum secundum percurrit =  $a$ , ratio gravitatis specificæ fluidi ad gravitatem aëris =  $b : c$ ; altitudo denique per quam corpus grave, intra minutum secundum, descendit =  $d$ ; reperietur spatium a fluido, tempore unius minuti secundi, percurrendum =  $\sqrt{a^2 c : b}$  (§. 169). Hinc porro elicitur (§. 171) altitudo quaesita =  $a^2 c : 4bd$ . Est itaque

$$4bd : ac = a : x.$$

*Theorema.* Spatium quod aër, tempore unius minuti secundi, percurrit, est ad altitudinem ad quam fluidum in tubo vacuo elevandum ut pressionem efficiat celeritati qua istud describitur producendæ sufficientem; in ratione composita gravitatis specificæ fluidi, ad gravitatem aëris, atque altitudinis quadruplæ per quam corpus tempore primi minuti secundi descendit, ad spatium aëris prædictum. Sit e. g.  $a = 24'$ , seu 288", ratio mercurii ad aërem  $b : c = 13580 : 1$  (§. 176),  $d = 181''$  (§. 473. *Mechan.*); erit  $x$  minor unica linea seu duodecima digiti parte.

#### SCHOLION I.

179. Apparet adeo, quod exiguas mutationes in Baroscopio, sed subitas, ingentes admodum procellæ subsequi debeant: id quod experientia consentaneum Theoriam nostram confirmat.

#### SCHOLION II.

180. Equidem de actione venti in corpora jam porro agi hic poterat, ac inprimis determinandus erat situs alarum in molendino

dino

dino alato, qualis nempe requiratur ut ad eas circa axem convertendas vim maximam adhibeat ventus: enimvero cum hic opus sit principiis generalibus de motu fluidorum quæ in Hydraulica demum docentur; ideo ibidem uniuersali ratione hoc argumentum exequemur, ne minus dixisse videamur, cum plus dicere possimus.

DEFINITIO XIIH.

181. *Anemometrum* est instrumentum, quo vim ventorum metimur.

PROBLEMA XLI.

182. *Anemometrum construere.*

RESOLUTIO.

1. Construantur alæ A,B,C,D, quales in molis alatis adhiberi solent, multo tamen minores; a plano verticali sub angulo 54 circiter graduum reclinatæ
2. Axi, cui alæ infiguntur, aptetur etiam cochlea perpetua EF, quæ
3. Circumacta deprimat dentes rotæ stellatæ GH.
4. Axi per centrum transeunti infigatur ad angulos rectos brachium satis longum IK, in medio canaliculi instar excavandum, ut intra cavitatem pondus plumbeum L sursum deorsum libere moveri possit, ipsique (nempe brachio) ex altera axeos parte æquilibretur brachium minus Y.
5. Brachii majoris IK longitudo in quotcunque partes æquales dividatur, quarum singulæ radio axis æquantur.
6. Eidem axi infigatur index MN brachio IK ad angulos rectos insistens,

& extra cistam, cui rota stellata cum cochlea perpetua inclusa, emittens.

7. Denique ex centro axis, in pariete cistæ exteriori, describatur quadrans circuli in 90 gradus more solito dividendus, ab indice vel ascendente vel descendente indicandus.

Dico, Anemometrum esse constructum.

DEMONSTRATIO.

Manifestum enim, si alæ A,B,C,D, vento opponantur, cochleam perpetuam EF circumvolvi, atque adeo rotam stellatam GH in orbem agere. Quare cum brachium IK cum rota stellata GH eidem axi infigatur, *per construct.* ubi hæc circumagitur, illud cum pondere L elevabitur. Quoniam vero distantia ponderis a centro motus continuo fit major, quo altius elevatur; tanto quoque gravius fiat necesse est, quo altius attollitur (§.196. *Mechan.*). Vis igitur venti, quæ per minorem angulum elevare potest pondus, non ideo idem elevare valet per angulum majorem. Quamprimum itaque ponderis gravitatio vi venti ipsum elevantis æqualis evadit, motus machinæ sistatur necesse est (§. 75. *Mechan.*); & quia cochlea perpetua EF rotam quidem GH circumagere potest, ipsa autem a rota circumagi nequit brachium IK cum pondere L relabi nequit; Index adeo semper indicat, quantum sit angulus elevationis ponderis, ubi eidem vis venti æquilibretur: unde determinabitur vis venti (§.793. *Mechan.*), atque

atque adeo per Machinam nostram ratio virium ventorum determinari potest, hoc est, vires venti metiri licet (§. 23. *Geom.*). Est igitur Anemometrum (§. 181). *Q. e. d.*

#### SCHOLIUM I.

183. *Ut hæc Machina, sine ullius adjumento, alas ABCD vento semper obvertat, cista ST plano quod alis opponitur, ad angulos rectos assignendus est asserculus POQR figuram trapezii parallelarum basium habens. Ventus enim incidens in asserculum POQR, Machinam circa axem pedamenti mobilem convolvat, donec ala vento opponantur. Alias directio ad ductum vexilli è centro Machinae erecti fieri potest, ut in molendinis vulgaribus alatis.*

#### SCHOLIUM II.

184. *Brachio IK contrapondium Y additur, ut instar linea gravitate carentis considerari possit, nec tædia calculi præter necessitatem multiplicentur.*

#### THEOREMA XXV.

185. *Si elater aëris alicubi debilior evadit quam in locis contiguis, ventus flat per locum in quo elater imminutus.*

#### DEMONSTRATIO.

Cum aër per elaterem suum quaqua-versum se expandere nitatur (§. 26); si elater uno in loco minor quam in altero, nisus aëris vi elastica majore præditi adversus aërem vi elastica minore instructum major erit, quam hujus adversus istum. Ergo aër minus elasticus vi minore resistit, quam à magis elastico urgetur: consequenter minus elasticus loco suo pellitur & magis elasticus in eum succedit. Quodsi adeo excessus elateris in aëre magis elastico

super elaterem minus elastici is sit, quæ exiguam in Baroscopio mutationem inducere valet; motus quoque tam aëris expulsi, quam in ipsius locum succedentis sensibilis evadat necesse est (§. 176). Flat ergo ventus per locum, quem aër minus elasticus replet (§. 166). *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM I.

186. Cum aucto pondere comprimente, elater augeatur (§. 553. *Mech.*), aër vero compressus sit densior minus compresso (§. 78): ventus flat per aërem rariorem ex loco qui densiore repletur.

#### COROLLARIUM II.

187. Quamobrem, quia aër densior rariore specificè gravior (§. 33. *Hydrost.*); extraordinaria aëris aliquo in loco levitas cum ventis extraordinariis seu procellis conjungi debet.

#### COROLLARIUM III.

188. Jam descensus mercurii extraordinarius in Baroscopio aëris levitatem extraordinariam indicat (§. 120). Non ergo mirum quod procellas portendat, si subito fiat.

#### SCHOLIUM.

189. *Non tamen necesse est, ut aëris levitas semper cum ventis jungatur. Sufficit enim gravitatem aëris subitas pati mutationes. Hinc ventum sat valide flantem hoc ipso temporis articulo experimur, utut in media altitudine, 29 nempe digitorum Anglicorum, mercurius in baroscopio consistat, nec nisi  $\frac{1}{8}$  unius digiti depressior nunc factus, quam heri erat. Immo in maxima depressione ventus saepe nullus spirat, quia depressio successive, non subito, facta.*

#### COROLLARIUM IV.

190. Si aër alicubi subito condensatur, elater ejus subito minuitur (§. 148). Quodsi ergo

ergo hæc imminutio ea fuerit, quæ in Baroscopio vix indicari possit (§. 176. 178); ventus per aërem condensatum flabit.

COROLLARIUM V.

191. Quoniam vero subito condensari nequit, nisi magnam ante passus fuerit rarefactionem (§. 6. 8.); ventus flabit per aërem, dum post æstum vehementem refrigeratur.

COROLLARIUM VI.

192. Similiter si aër subito rarefiat, elater ejus subito intenditur (§. 148), adeoque defluet per contiguum, actioni vis rarefacientis non obnoxium (§. 75. Mech.). Flabit ergo ventus ex loco, in quo aër subito rarefit.

COROLLARIUM VII.

193. Cum vires Solis in rarefaciendo aëre notissimæ sint; Solem in ventorum genesin influere manifestum est (§. 5. 6).

PROBLEMA XLII.

194. Ventum excitare adversus plagam desideratam spirantem.

RESOLUTIO.

- ib. II. g. 16. 1. Construatur vas cylindricum ABDC ex ligno, cujus diameter AB & altitudo AC eo major esse debet, quo impetuosior ventus excitandus.  
2. Vas ipsum sit undiquaque probe

clausum, solo foramine in E gaudens, cui tubus EF utrinque apertus ante immittendus.

3. Per medium cylindrum transeat axis mobilis HI quatuor brachii cum alis coriaceis K, L, M, N, & curriculo O extra vas instructus. Habeat vero curriculus 6 vel 7 bacillos.  
4. Curriculo occurrat rota dentata PQ cum axe curvato R 30 vel 28 dentes habens.

Dum ergo axis R curvatus semel convolvitur, alter erectus IH 5 vel 4 conversiones absolvit, adeoque alæ L, M, N, K per aërem inclusum celerrime feruntur eundemque per tubum expellunt. Cum adeo tubus versus plagam desideratam dirigi possit; ventus excitabitur (§. 166) adversus plagam desideratam spirans. Q. e. f.

SCHOLIUM.

195. Cum in molis frumentariis axis ferreus HI cum curriculo C occurrat (§. 925. Mech.); hoc artificio sub lapidibus molaribus facile excitatur ventus partes à granis frumenti abrasas à nucleo eorum separaturus. Tum vero tubus EF sacci vices sustinet, & basis GF declivis, in G vero foramen esse debet, ut grana graviora per hoc decidant, leviores autem partes abrasæ à vento per F ejiciantur. Hoc artificio uti quoque liceret ad paleas à frumento post triturationem separandas, additis addendis, quæ nunc fusius exponere non est nostri instituti.

## CAPUT VII.

*De Calore ac Frigore, itemque Humiditate ac Siccitate Aëris.*

## DEFINITIO XIV.

196. **T**hermoscopium est instrumentum caloris ac frigoris in aëre incrementa & decremента indicans. Thermometrum vero est instrumentum, quo calorem ac frigus aëris metiri licet.

## DEFINITIO XV.

197. Hygroskopium est instrumentum, quod humiditatis & siccitatis in aëre incrementa & decremента indicat. Hygrometrum vero est instrumentum, quo humiditatem & siccitatem aëris metimur.

## PROBLEMA XLIII.

198. *Thermoscopium construere.*

## RESOLUTIO.

- Tab. II. Fig. 17. 1. Tubo BC, qui globo vitreo AB cohæret, immittatur aqua communis regię permixta & ab orichalco in hac soluto viredine tineta (§. 149). Opera vero danda est, ut tantum aëris in globo & tubo relinquatur, qui hyeme maximam condensationem passus globum exacte repleat & astate ad summum rarefactionis gradum perductus non omnem ex tubo BC liquorem expellat.
2. Tubus immittatur vasculo vel alteri ejus extremo cohæreat globus CD

apertus, ut aër ejici, iterumque ingredi libere possit, & in quo similis liquor contineatur, qualis in tubum immiffus.

3. Ab utroque latere tubi applicetur scala EF in particulas quotcunque æquales dividenda.

## DEMONSTRATIO.

Si enim aër ambiens fit calidior, liquor in tubo descendit: si is frigidior evadit, hic ascendit (§. 151). Incrementa igitur caloris & frigoris indicat hoc instrumentum, adeoque Thermoscopium est (§. 196). *Q. e. d.*

*Aliter.*

1. Eodem artificio quo ante, & cum eadem cautione in tubum BC in varios gyros contortum commoditatis gratia (ne scilicet longior spatium nimis longum occupet nec facile damnum patiat) immittatur pauculum mercurii, pisi magnitudinem non excedens.
2. Tubulus dividatur in partes quotcunque æquales, quæ scalæ vicem sustineant.
- Accessus mercurii ad globum, frigoris; recessus vero ejusdem à globo, caloris incrementa indicabit.



DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ præcedens.

COROLLARIUM I.

199. Quia liquor in Thermoscopio primo & mercurius in altero etiam ascendit, si aer gravior redditur; contra vero descendit, si levior evadit (§. 151): caloris ac frigoris incrementa non satis fideliter exprimit.

COROLLARIUM II.

200. Quoniam tamen mutationes admodum sensibiles sunt; si aliorum corporum calor examinandus, commode Thermoscopio altero utimur: exiguo enim temporis spatio, quo experimentum instituitur, gravitas Atmosphæræ sensibilibiter non mutatur.

SCHOLIUM.

201. Quodsi in Thermoscopio primo liquorem colore intense rubro & admodum grato tingere volueris; aquam ferventem affunde foliis florum simplicium atque rubidorum malvæ hortensis arefactis, ut color extrahatur. Quodsi enim tincturæ aquam regiam affuderis, non sine jucunditate colorem intense rubrum emergendam contueberis, reliquos omnes longe antecellentem, quibus huc usque usi sunt artifices.

PROBLEMA XLIV.

202. Thermoscopium Florentinum construere.

RESOLUTIO.

Cum Academici Florentini perpendèrent incommoda, quibus Thermoscopium paulo ante descriptum premitur (§. 198); mensuram caloris & frigoris quæ vivere in rarefactione spiritus vini, utut rarefactione aeris longe minore (§. 152). Thermoscopium vero ab ipsis repertum ita construitur:

I. Frustulis ex radice curcumæ aut anchusæ resectis affundatur spiritus

vini rectificatissimus, seu qui, dum accensus conflagrat, pulverem pyrium accendit; à priori enim radice colore flavo, à posteriore autem rubro tingetur.

2. Postea spiritus vini iterum iterumque filtratur per chartam bibulam, ut particulae crassiores ex radice extractæ remaneant.

3. Spiritu vini tincto & filtrato impletur globus vitreus AB cum tubo BC. Ne autem hieme spiritus omnis in globum descendat; globum immittere juvat nivi multo sale conspersæ, aut (si æstivo tempore Thermoscopium parare volueris) aquæ fontanæ frigidæ, in qua multum nitrî solutum, ut spiritus condensatus indicet terminum, quem maximo frigore attingere valet.

4. Quodsi à globo longiore intervallo adhuc distet, aliqua ejus portio rursus expellenda. Ne autem tubus justo longior fiat, globum spiritu plenum aquæ calidæ carbonibus candentibus impositæ immittatur & notetur terminus, ad quem pertingit, ubi ebullitioni proximus.

5. Hoc ergo termino ad flammam lampadis admoto, tubus hermetice sigilletur.

6. A latere denique affigatur ut in Probl. præc. scala EF in particulas quotcunque æquales divisa.

DEMONSTRATIO.

Quoniam spiritus vini rarefit & condensatur (§. 152); calore crescente, in tubo ascendet (§. 8); decrecente, descendet (§. 6); Caloris igitur incre-

menta

Tab.  
III.  
Fig. 19.

menta & decremēta instrumentum indicat, consequenter Thermoscopium est (§. 196). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

203. Si spiritus vini per multos gradus scälæ ascendit, calorem multum crevisse constat; si descendit, idem multum decrevisse intelligitur: quoniam tamen ratio caloris hodierni ad hesternum non indicatur, instrumentum calorem non metitur (§. 23. *Geom.*) adeoque Thermometrum non est (§. 196).

## COROLLARIUM II.

204. Liquor in tubo vi gravitatis suæ deorsum nititur (§. 4. *Mechan.*), adeoque ex globo in ipsum ulterius ascendenti resistit tanto quidem magis, quo altius jam ascendit (§. 10). Præstaret itaque, situm tubi BC esse horizontalem.

## COROLLARIUM III.

205. Cum necessario aliquid aëris super liquore in parte tubi vacua existat, is vi elateris deorsum nititur (§. 26), adeoque ascensui liquoris resistit. A liquore ascendente comprimitur (§. 17). Quare elater ipsius augetur (§. 71), ab actione caloris forte ulterius intendendus (§. 146).

## COROLLARIUM IV.

206. Cum experientia constat, remissionem caloris gradum facilius cum spiritu vini in globo communicari, quam vehementiorem; rarefactiones spiritus vini viribus productricibus proportionales non sunt, inprimis cum & vehementior caloris gradus plus liquoris in tubo offendat, quam remissior, cui tamen facilius communicari potest calor, quam in globo stagnanti. Thermoscopium adeo Florentinum, accedente inprimis resistentia inæquali (§. 204. 205), Thermometrum non est (§. 196).

## SCHOLIUM I.

207. HALLEIUS autor est, se didicisse ex *his*, qui spiritum vini diu affervarunt, quod

is successu temporis partem vis expansivæ amittat (a). Sed meretur res accuratiori examini subjici, vi eorum, quæ de legibus experientiarum alibi tradidimus (b).

## SCHOLIUM II.

208. Varii variis modis gradum fixum caloris ac frigoris quæsi verunt, à quo utriusque gradus reliqui computentur, ut observationes, eodem vel diverso tempore, in pluribus locis factas conferre inter se liceat. Aliqui locum notant, in quo liquor hieme hæret, dum aqua congelare incipit; iterumque alterum tempore æstivo, dum butyrum juxta globum Thermoscopii positum liquefit. Spatium intermedium in duas partes aequales dividunt, quod divisionis punctum in ipsorum graduatone calori temperato respondet. Partem utramque in 10 gradus subdividunt, tandemque quatuor istiusmodi gradus infra gradum congelationis aquarum, quatuor itidem super gradum liquationis butyri transferunt. Notandum vero divisionem fieri Thermoscopio in umbra collocato, & ne observationes turbentur, versus eandem constantem plagam instrumentum dirigi debere, quam respiciebat, cum divisio absolveretur. Enimvero supponunt, congelationi aque cujusvis eundem gradum frigoris, & liquationi butyri cujusvis eundem gradum caloris respondere, ac singula Thermoscopia ab eodem caloris vel frigoris gradu eandem recipere impressiones. Posterius autem fallere non ignorant qui experientia edocti, Thermoscopia eidem parieti affixa non eundem constantem caloris gradum ostendere, utut eadem utriusque graduatio fuerit applicata. Et valde vereor, ne prius cum cura examinaturi contrarium similiter experiantur. Differunt enim aquæ inter se, differunt inter se butyra: id quod vel sola gravitatis specificæ variatio monstrat, ut alia taceamus, quæ meditantibus & experimentantibus se offerent.

## SCHOLIO

(a) Transact. Anglic. n. 197. p. 650.

(b) Act. Erudit. A. 1708. p. 163. & seqq. conf. Logica §. 664. & seqq.

SCHOLION III.

209. Suadent alii, ut globus Thermoscopii nivii vel glaciis multo sale conspersa immittatur, & gradus ad quem spiritus subsistit notetur. Hinc Thermoscopium in cellam profundam transferunt, quorsum aëris externi nihil pertingit, ut actionem aëris temperati recipiens gradum caloris temperati indicet. Denique spatium intermedium in 15 vel plures partes aequales dividunt, etiam supra gradum caloris temperati transfirandas, us graduatio integra absolvatur. Sed ut non urgeam, quae in Scholio precedente jam abunde dicta sunt, quis, quæso, respondeat querenti: an omni nivii idem sit frigoris gradus? An omni sali eadem vis corrodingi lamellas nivis glaciales? Suppono enim, frigus a sale nivii permixto produci, quatenus corrodit lamellas glaciales & abrasis superficieculis earundem interiorem nucleum summe frigidum corporibus frigefaciendis applicari facit.

SCHOLION IV.

210. Celebrissimus HALLEIUS pro termino fixo assumit eum caloris gradum, quo spiritus vini ebullire incipit. Enimvero jam supra monuimus, quamnam ratio sit suspicandi, forte nec hunc gradum esse usque adeo fixum. Et licet post ipsum AMONTONS (a) retinuerit ipsum gradum caloris, qui aqua ebullienti convenit, dum Thermoscopium mercuriale construit, & postea (b) hujus ope Thermoscopio Florentino talem graduationem applicare docuerit, quæ ab eodem caloris gradu reliquos computat: id tamen dubii remanet, cum diversa sit aquarum gravitas specifica, quæ massa ac textura diversitatem arguit, num calor aquarum ebullientium omnium idem sit: unde operatori pretium facient rerum naturalium scrutatores, si factis accuratis experimentis inquireant, quinam sit gravitatis fluidorum specificæ ad calefactionem eorundem respectus.

(a) Memoires de l'Acad. Royal. des Scienc. A. 1702. p. m. 210. & seqq.

(b) Memoires de la même Academ. A. 1703. p. m. 63. & seqq.

SCHOLION V.

211. Nondum excipere licet, istiusmodi minutias in praxi non esse attendendas: neque enim hætenus demonstratum, quod irregularitates a causis memoratis pendentes sint minusiæ. Lis adhuc pendens nonnisi pluribus experimentis, a pluribus, præsertim pluribus in locis, factis dirimenda.

SCHOLION VI.

212. CAROLUS RENALDINUS (c) tradidit modum integram graduationem methodo experimentaliter determinandi, ut habeantur gradus inæquales æqualibus gradibus caloris, dum intenditur, respondentes, quam collectores Actorum Eruditorum Lipsiensium (d) his verbis describunt: „Capiatur tubus gracilis, longitudinis circiter quatuor palmorum, „cam annexa bulla, eique infundatur „spiritus vini tantum ut sphaerula glacie circumdata omnino repleatur, neque tamen aliquid redundet, orificiumque tubi sigilletur hermetice. Deinde „parentur sex vasa, quorum quodlibet „aquæ libram & aliquid amplius potest „recipere, & in primum infundantur aquæ gelidæ uncia 11, in secundum uncia 10, in tertium 9, & sic porro. His peractis Thermometrum mergatur in vas primum, eique affundatur aquæ ferventis uncia una, observeturque quo usque ascendat spiritus in collo & locus unitate notetur. Porro transferatur in vas secundum, cui injectæ aquæ ferventis uncia duæ, de quoque notetur locus ad quem ascendit spiritus, noteturque binario; & sic deinceps. Quodsi cui placeat ulterius procedere, donec tota aquæ libra sit infumta, perfectius erit instrumentum elaboratum, nempe duodecim numeris, aut asteriscis distinctum, quibus caloris termini denotantur.

Sf 3

SCHO

(c) In Philos. Nat. dissert. 16. sect. 12.

(d) Supplement. Tom. 2. sect. 10. p. 453.

## SCHOLIION VII.

213. Facile incautis imponere poterat RENALDINUS, ut sibi persuaderent, hac ratione exactam caloris mensuram obtineri: Habes enim duodecim caloris gradus & effectus respondententes gradui uni, duplo, triplo, quadruplo &c. Unde vicissim cognoscuntur gradus simpli, dupli, tripli, quadrupli &c. caloris. Dabitur igitur ratio caloris hujus dici ad calorem cujuscunque alterius: consequenter calorem metiri licet (§. 23. Geom.). Atat! non nimis confidenter pronuntiandum. Examinemus, quæso, supposita, ne forte aliquid esse ponamus quod non est, sicque erroneam conclusionem pro vera eliciamus. Supponitur, nos habere gradum caloris simplicum, si 11 unciis aquæ gelidæ affundatur una ferventis; gradum duplum, si 10 affundantur duo; triplum, si 9 tres; quadruplum, si 8 quatuor &c. affundantur. Supponitur porro calorem simplicum vi simpla, duplum dupla, triplum tripla, quadruplum quadrupla &c. uniformiter agere in spiritum vini in globo contentum. Supponitur denique, si idem effectus in Thermoscopio a calore aëris ambientis producitur, qui ab aqua calida producebatur, aëri eandem competere caloris gradum, qui aquæ conveniebat. Enimvero nullum ex his suppositis verum est. Quod enim primum attinet, concedamus interea calorem aquæ ferventis, si frigida affundatur, per hanc æqualiter distribui. Distribuentur adeo unus caloris gradus per partes undecim; duo per 10; tres per 9; quatuor per 8 &c. Si itaque assumamus æqualia istarum aquarum volumina, e. gr. singularum partes duodecimæ, non erit calor duplus in altero, triplus in tertio, quadruplus in quarto casu &c. Fallit ergo suppositum primum. Sed non minus fallit alterum: neque enim calor aquæ ferventis per frigidam, cui affunditur, æqualiter diffunditur; nec calor aquæ calidæ in spiritum vini uniformiter agit, id est, eadem vi per omne tempus actionis suæ. Prius experientiam vulgi non fugit,

ut adeo id aliis experimentis & rationibus confirmari non opus sit. Posterius facillime ostenditur. Notum nimirum est, requiri aliquod temporis spatium, antequam calorem suum cum spiritu vini per globum vitreum communicet aqua calida. Sed per totum illud temporis spatium eundem calorem aqua non retinet, cum eam continuo exhalet. Nequaquam igitur habentur effectus veri graduum caloris simpli, dupli, tripli, quadrupli &c. si vel maxime efficeretur, ut calor in aquis diversis sub initium immersionis globi esset nunc simplicus, nunc duplus, nunc quadruplus &c. Calor denique ambientis aëris non modo in spiritum vini in globo, sed & in tubo contentum agit, adeoque non istum modo, verum etiam hunc rarefacit. Immo nondum constat, num omnia fluida, in quibus idem est gradus caloris, eadem facilitate cum alio corpore calorem suum communicent: nec forte hæc disquisitionio multum tractabilitatis promittit. Taceo alia, quæ hic urgeri possent. Sufficit satis constare, methodum RENALDINIANAM suppositis niti partim precariis, partim manifesto falsis; ut adeo ratio nulla sit, cur vulgari divisioni in partes æquales hæc in partes inæquales divisio Mechanica præferatur.

## SCHOLIION VIII.

214. Cæterum, quamvis mutationes Thermoscopii Florentini admodum sensibiles existant, ita ut spiritus vini per notabile intervallum ascendat, manu calida admota, iterumque descendat, ea remota: ubi tamen per insigne intervallum tempore hiemali descendit, ascensus intervalla decrementis frigiditatis non satis respondent. E. gr. hoc ipso (a) anno d. 9. Jan. h. 8. mat. liquor in Thermoscopio meo descenderat usque ad 72<sup>um</sup> gradum scale frigiditatis, cum consueta Phænomena frigus intensum loquerentur: sed cum d. 18. Jan. eadem hora tempestate jam multo mitiore ad gradum 80<sup>um</sup> subsisteret, hora tertia, qua  
nix

(a) Scilicet 1713. quo prima horum Elementorum editio prodiit.

nix & glacies ad pristinum fluiditatis statum reducebantur, spiritu ad 72<sup>um</sup> harebat. Scilicet ad eundem sæpius gradum depressus cernitur liquor, cum tamen Phenomena alia diversitatem caloris ac frigoris insignem manifesto prodant. Imo interdum depressio spiritus major, cum effectibus frigoris remissioris; minor vero, cum effectibus multo intensioris conjungi solet. Et hæc observantur, etiamsi Thermoscopium collocetur in loco, ad quem aëri externo liber patet aditus. Ratio Phenomeni hæc mihi videtur. Experientia constat, frigore invalescente, multum aëris ex fluidis expelli: id quod testantur vesicula tum superficibus vitrorum, in quibus continentur, adhaerentes. Extra dubium itaque positum videtur, frigore intenso ex spiritu quoque vini in Thermoscopia aërem ejici & per tubi vacuum partem expandi. Cum adeo aër ambiens calidior rursus redditur, inclusi elater augetur spirituique ascensuro resistit (S. 146). Quoniam vero per experimenta MARIOTTI (a) determinata quadam aëris quantitas in fluido salis instar dissolvitur; aër a frigore expulsus, crescente calore, sensim sensimque spiritui rursus permiscetur: quod antequam fiat, altitudines caloris incrementa indicantes semper erunt justis minores.

EXPERIENTIA VI.

215. Funem cannabinum ex duplici filo contortum humectavimus, & longitudinem ejus notabiliter minui animadvertimus: ubi vero denuo exsiccabatur, ad pristinam redibat dimensionem. Multo autem brevior evaderebat, ubi sub aqua per aliquod tempus ipsum detinueramus. Huc pertinent, quæ Schwen-terum expertum esse in Geometria (b) annotavimus. Et Guilielmus Molineux, Armiger atque Societatis Dublinensis Secretarius, istiusmodi funem

humectatum cum appenso pondere suspendit, eumque pro ratione exsiccationis resolvi animadvertit. Cum pelvim aqua calida plenam admovisset, ascendente vapore funis denuo velociter contortus, eoque cessante rursus resolutus. Immo halitu oris octies aut decies repetito, funem contorqueri didicit celeriterque resolvi admota prope uncum candela aut ferro ignito (c).

COROLLARIUM.

216. Sola igitur humiditas aëris funium cannabinorum longitudinem notabiliter abbreviare, ipsosque funes arctius contorquere valet.

SCHOLIUM.

217. Humor nimirum dimensionem funis secundum diametrum auget. Sed cum gyri spirales filorum contortorum fere in circulares abeant, autopsia teste, dimensio secundum longitudinem decrescit. Abbreviationis igitur causa non modo ab insinuatione humoris in poros funium, sed & imprimis a spirali eorundem textura petenda.

EXPERIENTIA VII.

218. Idem in nervo aliquo fidium; cujus longitudo erat 1' 14" circiter juxta mensuram Rhenanam, experti sumus. Cum enim eundem, duobus clavis utraque sui extremitate alligatum, juxta fenestram apertam extendissemus & ope paucula cera indiculum ligneum applicissemus, per complures dies non sine voluptate nervum contorqueri advertimus, cum Sole oriente ros decideret, ita ut fere semicir-

(a) Essay de la Nature de l'Air p. 97. & seqq.

(b) S. 129. p. 133.

(c) Philos. Transact. Anni 1685. n. 162. p. 1032. conf. Acta Erudit. A. 1686. p. 389.

micirculum intra exiguum temporis intervallum indiculus descripsisse notaretur. Ast Solis radiis illustratus nervus iterum resolvebatur atque indiculum ultra terminum reducebat, in quo eum sub ortum Solis conspexeramus, cum fenestram cubiculi noctu clausam primum aperiremus. Non tamen singulis diebus æquales indiculi itus reditusque notavimus. Eundem nervum sub aqua demersum sensibilibiter contorqueri didicimus: satis enim celeres ejus intra aquam convolutiones notavimus, non secus ac si duo manibus prehendentes ejus extremitates ipsum vi contorquerent. Extracti ex aqua minorem longitudinem notavimus, quam eum eundem aqua immitteremus, & radiis licet Solaribus exsiccatus ad pristinam longitudinem reducturi vires eludebat.

## SCHOLIUM.

219. Similia se expertum testatur STURMIUS (a). Non ignoro, quod alii (b) contrarium accidere affirmant, sed quid alii experti sint mihi quidem haud constat, cum circumstantias singulares non annotent. Mihi rem enarrare libuit, prouti eandem expertus sum.

## PROBLEMA XLV.

220. Hygroskopium construere.

## RESOLUTIO.

Tab. I. Funem cannabinum aut nervum fidium AB juxta parietem extende super rotula B, alterique ejus extremo

(a) In Colleg. Curios. part. 1. tent. 14. phen. 5. p. 124. & seqq.

(b) Traitez des Barometres, Thermometres & Notiomètres p. 94.

D pondus alliga, cui infixus sit stylus FG.

2. Eidem parieti affigatur lamina metallica HI; in partes quotcunque æquales divisa.

Dico Hygroskopium esse constructum.

## DEMONSTRATIO.

Cum enim humor funium & chordarum longitudinem sensibilibiter abbreviet, humore autem rursus expirato iterum resolvat (§. 214); pondus humore aëris aucto ascendet, imminuto descendet. Et quoniam index FG in lamina HI spatium monstrat per quod pondus ascendit vel descendit, intervalla vero ascensus & descensus decrementis ac incrementis longitudinis funis aut nervi fidium ABD æqualia sunt; instrumentum indicat, num dato hoc tempore aër plus alat humoris, quam alio habuit. Est igitur Hygroskopium (§. 197). Q. e. d.

*Aliter.*

Si Hygroskopium sensibilibus desideres, funem aut nervum fidium circa plures trochleas A, D, E, F & G circumvolve & reliqua fiant ut ante. Perinde vero est, sive partes funis AB, AD, DE, EF, FG sint horizonti parallelæ, ut in schemate expressimus, sive ad eundem perpendicularares: prouti nempe quolibet in casu commodum visum fuerit.

## DEMONSTRATIO.

Eadem est cum præcedente.

*Aliter.*

*Aliter.*

1. Funis cannabinus AC aut nervus fidium altera sui extremitate unco ferreo A alligetur, altera vero C in centro tabulae lignae FF horizontaliter positae firmetur.
2. Prope C infigatur pondus plumbeum D unius circiter librae cum annexa regula DG.
3. Ex centro C in tabula describatur circulus in partes quotcunque aequales dividendus.

DEMONSTRATIO.

Cum enim funis cannabinus atque nervus fidium levi quodam humore aëris, qualem secum vehit halitus oris, imbutus velociter contorqueatur, eodem autem exhalante rursus extemplo resolvatur ( §. 215. 218 ); evidens est quod, humore aëris aucto, index quantitatem contorsionis vel resolutionis monstrare, consequenter humiditatis & siccitatis incrementa indicare debeat. Est igitur instrumentum Hygroskopium ( §. 197 ). *Q. e. d.*

*Aliter.*

1. Funis cannabinus aut nervus fidium HI altero sui extremo suspendatur ex unco H.
2. Alteri extremitati I annectatur globus K unius circiter librae.
3. Limbo pedamenti LM inscribantur duae peripheriae circuli parallelae & spatium intermedium in partes quotcunque aequales dividatur.

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

4. Globo infigatur stylus NO, cujus extremitas O limbi divisionem fere attingit.

Dico, hunc indicem incrementa humiditatis & siccitatis aëris ostensurum.

DEMONSTRATIO.

Eadem prorsus est, quae proximè præcedens.

*Aliter.*

1. Parentur subscudes fulcatae AB & CD ex ligno quercino. Tab. III.
2. Intra crenas oppositas aptentur asserculi abietini AEFC & GBDH, ita ut ultro citroque facillime moveri possint. Fig. 24.
3. In extremitatibus subscudium A, B, C, D clavis firmetur asserculi, & inter utrumque relinquatur spatium EGHF, cujus latitudo EG unius circiter digiti.
4. In I firmetur lamina orichalcea dentata IK & in L rotula dentata, cujus axi in altera Machinae facie index inferatur.
5. Tandem ex centro axis in eadem facie describatur circulus in partes quotcunque aequales dividendus.

DEMONSTRATIO.

Cum enim experientia teste lignum abietinum humorem aëris facillime imbibat ac inde turgescat, humore autem rursus exspirato tabescat: si aëris humiditas augetur, asserculi AF & BH humore turgescentes propius ad se invicem accedunt; si illa rursus minuitur,

T t iidem

iidem asserculi tabescentes denuo à se invicem discedunt. Quoniam vero distantia asserculorum nec minui potest sine rotulæ L convolutione, nec augeri; index monstrabit incrementa humiditatis & siccitatis aëris. Est igitur machina constructa Hygroskopium (S. 197). *Q. e. d.*

*Aliter.*

Tab. II. Fig. 14. Manoscopium superius descriptum in Hygroskopium abit, si globo evacuato E substituas spongiam, aut materiam quandam aliam, quæ humorem facile imbibit. Solet autem spongia primum aqua communi, deinde ubi bonam partem rursus exsiccata fuerit, aqua vel aceto, in quo aliquid salis Ammoniaci seu salis Tartari dissolutum fuerit, macerari atque in loco umbroso denuo exsiccari.

#### DEMONSTRATIO.

Si enim aër humidus evadit, spongia gravior reddita præponderat; si ille levior redditur, hæc rursus altius tollitur experientia teste, adeoque index

incrementa & decrementa humiditatis indicat. Est ergo Hygroskopium (S. 199). *Q. e. d.*

#### SCHOLIION I.

221. *Omnia Hygroscofia, quæ hactenus descripta sunt, sensim sensimque à perfectione sua deficiunt, tandemque ab humiditate aëris parum aut nihil mutationis patiuntur. Usus ultimi est magis diuturnus, quam cæterorum omnium.*

#### SCHOLIION II.

223. *In Hygroscopio ultimo GOULDUS (a) loco spongiæ omnium maxime commendat oleum vitrioli, quod in dies in tantum augeri observavit, ut intra spatium 57 dierum à tribus drachmis ad drachmas novem & 30 grana ascenderet. Enimvero non annotat, num etiam humiditatem tam prompte rursus dimittat, quam eam attrahit: de quo valde dubito, adeoque præsentis instituto oleum vitrioli minime congruum judico.*

#### SCHOLIION III.

223. *Cæterum, quilibet, me non monente, videt structuram Hygroscoptiorum multis modis variari posse.*

(a) In Actis Erudit. A. 1685. p. 315.

FINIS AEROMETRIÆ.






Fig. 3.




Fig. 6.



Fig. 12.






Fig. 10.




Fig. 11.





Fig: 8.





Fig: 15.

Fig: 15. N. 3.

Fig: 17.

Fig: 15. N. 2.

Fig: 16.




Fig: 14.





Fig:

13.



Fig: 19.



Fig: 18.



Fig. 19.





Fig. 23.



Fig. 22.




Fig. 21.




Fig. 24.

Fig. 24.






Fig. 20.





# ELEMENTA HYDRAULICÆ.

## P R Æ F A T I O.



**I**N Hydraulica non modo Machinarum, quibus aqua elevatur, atque fontium salientium constructio edoceri debet; sed explicandæ sunt præterea leges motus corporum fluidorum. Quemadmodum vero argumentum prius stupenda diligentia jam olim excultum fuit, id quod vel soli Libri Spiritualium HERONIS aperte loquuntur; ita diffiteri non possumus, in posteriore excolendo posteris adhuc multum relictum esse, utut præclara jam dederint Viri de Hydraulica optime meriti MARIOTTUS, CASTELLUS, TORRICELLIUS, BORELLUS, GUILIELMINUS, MARIOTTUS & imprimis celeberrimus VARIGNONIUS (a). Immo ipsa Machinarum Hydraulicarum constructio Matheseos puræ opem adhuc flagitat. Dignum vero utrumque argumentum, quod in dies magis magisque excolatur. Si enim Machinas Hydraulicas fontesque salientes spectes, de Hydraulica non inepte dixeris, quod vulgo de Poëtis ingeminari solet,

T t 2

quod

(a) Mémoires de l'Academie Royale des Sciences An. 1703. p. 285.

quod non minus prodesse, quam delectare velit. Egregia scilicet vitæ humanæ commoda præstat, dum varias vias ostendit, per quas aqua ad locum datum derivari potest. Mirifice delectat, dum jucunda fontium salientium aliorumque admirandorum spectacula oculis objicit. Leges motus aquarum tum ad Scientiæ naturalis, tum ad Machinarum perfectionem tendunt: & si quando perfectam habebimus; motus fluidorum in corpore animali distinctius cognoscetur, unde multa commoda in genus humanum redundabunt. Quamvis vero mihi potissimum propositum sit, Machinarum Hydraulicarum constructionem exponere & ad causas suas revocare; non tamen leges motus fluidorum prorsus insuper habebo, sed eas propositurus sum, quæ ad ulteriorem disquisitionem viam sternunt & præ reliquis scitu necessariae sunt. Has meditentur imprimis illi, quos rerum naturalium cognitio solidior juvat. Nemo autem ad Hydraulicam accedat, nisi notionem virium ex Mechanica, æquilibrium fluidorum ex Hydrostatica; proprietates aëris ex Aërometria perspexerit.





# ELEMENTA HYDRAULICÆ.

## CAPUT PRIMUM.

### *De Motu Fluidorum à gravitate pendente.*

#### DEFINITIO I.

1. **H**Ydraulica est Scientia motus fluidorum, præsertim aquarum.

#### SCHOLION.

2. *Quare cum in Hydrostatica explicetur æquilibrium fluidorum, ex sublato autem æquilibrio motus nascatur; Hydraulica Hydrostaticam supponit. Unde contigit, ut nonnulli, qui de Hydraulica scripsere, Hydrostaticam cum ea conjunxerint.*

#### DEFINITIO II.

I. 3. Per *Tubum* atque *Canalem* intelligo cylindrum quemcunque AB intus cavum.

#### DEFINITIO III.

4. *Lumen* est apertura tubi.

#### DEFINITIO IV.

5. *Epistomium* vel *Clavicula* est instrumentum, quo lumen ad arbitrium obturari & aperiri potest.

#### SCHOLION.

6. *Quoniam in Machinis Hydraulicis epistomii creberrimus est usus, non inconsultum ducimus, ut ejus structura hic exponatur.*

#### PROBLEMA I.

7. *Epistomium vel claviculam construere.* Tab. I.  
Fig. 2.

#### RESOLUTIO.

1. Paretur ex orichalco cubus ABCD cum gemina tubi parte GH & EF, quartum altera GH cochlea instrui debet, ut ad arbitrium ad tubum vel vas firmari, iterumque ab eo removeri possit, aut si cochlea destituantur, tubo vel vasi afferruminetur.
2. Cubus cylindrice excavetur, ut cavitati ejus immitti possit cylindrus solidus HI perforatus in K & in L matrice, in O manubrio instructus, ut per cavitatem cylindri trajectus mediante cochlea M in hoc situ firmari, & ope manubrii O huc illucque versari possit.
3. Perforetur similiter uterque tubulus GH & EF.

Quodsi enim cylindrum solidum HI ita convertas, ut cavitas ejus K foraminibus tubulorum GH & EF respondeat; aqua in F effluere potest: si vero idem cylindrus HI soliditatem

foraminibus iisdem obvertat, nihil aquæ egredi poterit, adeoque instrumentum est epistomium vel clavicula (§. 5).

SCHOLIUM.

8. *Perfectissimam epistomii constructionem hic exponere libuit. In praxi enim facile apparebit ex circumstantiis singularibus, si qua omitti possint. Ita e. gr. communiter omittitur cochlea M cum matrice, qua cylindrum HI intra cavitatem cubi AC firmandum esse diximus. Neque cochlea F semper adest & tubus GF sæpius horizontalis est.*

THEOREMA I.

Tab. I. Fig. 3. 9. *Locus A, ad quem aqua ex loco alio B sive per alveum, sive per tubos aut canales derivanda, humilior seu centro Telluris propior esse debet hoc ipso altero.*

DEMONSTRATIO.

Cum enim aqua non fluat, nisi vi gravitatis, gravitas vero sit nisus versus centrum Telluris (§. 4. *Mechan.*): per alveum fluere nequit, nisi quamdiu ad centrum Telluris propius accedere potest. Necessè igitur est, ut locus, ad quem aqua per alveum fluere debet, centro Telluris propior sit altero, unde derivatur. *Quod erat unum.*

Quodsi aqua per canales BC & CA derivari debet ex B in A, ita ut primum descendat ex B in C, deinde rursus ascendat ex C in A: sit DE linea horizontalis per C ducta & BD atque AE ad eandem perpendicularis. Sit jam  $AE < BD$ , pressio aquæ in tubo BC major est pressione aquæ in tubo AC (§. 34. *Hydrost.*). Istà igitur prævallet, adeoque aquam AC impellit per A effluxuram. Enimvero si  $AE > BD$ ;

quamprimum aqua in tubo AC ascendit ad altitudinem ipsi BD æqualem, alteri in tubo BC æquilibratur (§. 34. *Hydrost.*), ab ea igitur ad ulteriorem ascensum sollicitari nequit (§. 75. *Mechan.*). Sed vi gravitatis deorsum nititur versus C (§. 4. *Mechan.*), adeoque nec vi intrinseca ascendere potest. Ibi igitur subsistit, consequenter aqua ex loco B in alium A per tubos aut canales recurvos derivari nequit, nisi A sit humilior B. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

10. Cum alveus vel tubus BC, per quem aqua fluit ex B in C, sit planum inclinatum (§. 258. *Mechan.*); ad aquas fluentes applicari possunt, quæ in *Mechanica*, cap. 6. de descensu gravium in plano inclinato demonstrata sunt.

COROLLARIUM II.

11. Sunt igitur velocitates aquarum per diversos tubos fluentium eodem tempore acquisitæ, ut tuborum longitudines reciproce (§. 302. *Mechan.*).

SCHOLIUM.

12. *Insuper hic & in sequentibus habemus resistantiam, quæ oritur ex affrictu in fundo alvei & parietibus tubi (§. 933. *Mechan.*).*

PROBLEMA II.

13. *Aquam ex loco uno derivare in alterum.*

RESOLUTIO.

I. Libelletur aqua (§. 912. *Mech.*) hoc est, investigetur quam propior centro Telluris sit locus, ad quem aqua derivanda est, altero unde derivatur. (§. 904. *Mech.*).

2. Quod-

2. Quodsi locus ille hoc humilior fuerit, non alia re opus est, quam ut aqua vel per canalem, vel per tubos declives ex loco excelso in humiliorem deducatur, prout vel magna, vel exigua ejus suppetit copia.
3. Ut aqua per intervalla nobis commoda visa effundatur, extremum tubi epistomio muniatur (§. 5).
4. Et quia, experientia teste, fontes naturales non omni tempore eandem aquæ copiam effundunt; non modo tubus capacior fieri debet, sed & circa fontem alveus quidam muro includendus, ut aqua intra ipsum affurgens inferius in tubum ruentem fortius premat, sicque per ipsum celerius fluat.
5. Si tubus vel canalis per intervalla sufficientem aquæ copiam non præbeat, aut præbeat nimis tarde; aqua, remoto epistomio continuo fluens, intra puteum ex faxis exstructum colligatur necesse est: qui tanto amplior vel profundior fieri debet, quo terminus ad quem fuerit termino à quo humilior.
- I. 3. 6. Si denique aqua ad terminum infimum C delapsa rursus ascendere debet, deducenda est per canales inclinatos BC & CA, ita ut altitudo AE fuerit minor altitudine BD (§. 9).

SCHOLIUM I.

14. Utimur autem in deducendis aquis tubis vel ligneis, vel plumbeis, vel argillaceis, aut canalibus lapideis. Luminis diameter in tubo ligneo est 4, 5 vel 6 digitorum pro quantitate aquæ effundendæ, conjungun-

tur autem annulo ferreo CD. Tubo plumbeo locus est, si aqua in altum elevanda ad fontes salientes: neque vero sanitati conducere deprehensa est aqua, quæ per plumbeos fluit. Argillaceorum interior superficies lithargyrio obducenda; immo & exterior, nisi sumtibus parcas. Longitudo eorum est duorum aut unius & dimidii pedum, crassities duorum digitorum, diameter luminis duorum aut trium. Commissuris pyxidatis conjunguntur, quæ calce viva oleo permixta obducuntur, ne noceat humiditas.

Tab. I.  
Fig. 4.

SCHOLIUM II.

15. In alveo, quem prope fontem construxisti, ita aptandus est tubus, ut aquam nec ex fundo, nec ex superficie hauriat, quia prope fundum turbida, gravioribus quæ in aquam incidunt eundem petentibus, superficiem vero insecta alique impuritates leviores innatant. Solent etiam ad arcendas sordes lumini canalis primo cribrum ferreum, sed stanno obductum apponere, immo ad percolandam aquam turbidam spongiam. Ut aqua conservetur limpida, alveum tecto aut fornice muniri præstat.

SCHOLIUM III.

16. Ne Aër interceptus cursum aquarum in canale intercipiat, sed exitus ei concedi queat, utque canalis ipse purgari possit, quoties opus fuerit; hinc inde est perforandus & obturaculo figuram coni truncati habente foramen obturandum.

SCHOLIUM IV.

17. Cæterum omni studio in deducendis aquis vitandus est aquarum ascensus, quia aqua ascendens majorem vim infert, quam descendens.

PROBLEMA XLIII.

18. Fontem naturalem arte construere.

RESOLUTIO.

1. In loco elevato paretur fossa aggregibus undiquaque cinctæ & variis meatibus

bus ex crustis lapideis excitatis hinc inde distincta, qui omnes in unum hient exiguo foramine instructum.

2. Fossa hæc desuper silicibus, calculis & ad duos tresve pedes glareæ operiatur, & quicquid aquæ pluvialis aliunde derivari potest, cum cura eo derivetur.

Ita enim per glaream & calculos in meatus distillabit aqua & filtrata ab exhalationibus immixtis purgabitur, atque per orificium meatus ultimi ad radicem foveæ profluat.

#### SCHOLIION.

19. Si intra meatus foveæ sat aquæ non contineatur, ut perennis fluat, orificio meatus ultimi tubus cum epistomio aptandus.

#### THEOREMA II.

20. Si duo tubi æquales altitudines *Tab. I. AB & CD* atque æqualia lumina *E & F Fig. 5.* habuerint, fuerintque ambo constanter pleni: æquali tempore æquales aquæ quantitates effundent.

#### DEMONSTRATIO.

Quoniam lumina *E & F* æqualia sunt & altitudines aquæ super iisdem etiam æquales, per *hypoth.* aquæ luminibus proxime imminentes eadem vi premuntur (§. 42. *Hydrost.*), adeoque æqualia volumina æqualem adhibent egrediendi conatum, consequenter si aqua actu egreditur, æquali tempore æquales quantitates fluunt. *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM.

21. Quoniam fundus tubi perpendicularis eadem vi premitur, qua fundus in-

clinati, ubi utriusque altitudo eadem fuerit, ipsique fundi inter se æquantur (§. 47. *Hydrost.*); si tuborum utcunque inclinatorum, modo æque-altorum lumina fuerint æqualia, tubique constanter pleni, eodem tempore eadem aquæ quantitas effluet.

#### THEOREMA III.

22. Si duo tubi æquales altitudines *Tab. I. AB & CD*, sed lumina inæqualia *E & F Fig. 5.* habuerint, fuerintque constanter pleni, quantitates aquarum effluentium eodem tempore, sunt ut lumina *E & F*.

#### DEMONSTRATIO.

Concipiatur lumen majus divisum in plura minora alteri *E* æqualia: per singulas majoris partes æquali tempore quantitates aquæ effundetur illi æquales, quæ per lumen minus effunditur (§. 20). Sunt adeo quantitates aquarum per utrumque lumen tempore æquali effusarum, ut lumen minus ad numerum partium in quas divisum concipitur majus; hoc est, ut lumen minus ad majus (§. 86. *Arithm.*). *Q. e. d.*

#### COROLLARIUM I.

23. Si lumina fuerint circularia: quantitates aquæ eodem tempore ex tubis æque altis & constanter plenis effusæ sunt in ratione duplicata diametrorum luminis (§. 409. *Geom.*).

#### COROLLARIUM II.

24. In tubis etiam inclinatis æque altis, quantitates aquarum eodem tempore effluentium sunt in ratione duplicata diametrorum. Patet eodem modo, quo Corollarium Theorematis præcedentis (§. 21).

SCHOLIION.

25. Legem hanc experimentis non exacte respondere autor est MARIOTTUS (a). Observavit enim, si diameter luminis  $F$  erat diametri luminis  $E$  dupla, ex tubo minore plus quam quartam aquæ ex majore effluentis partem eodem tempore effundi, tuborum altitudine modica existente. Enimvero in demonstratione abstrahimus ab omnibus obstaculis accidentalibus, quæ irregularitatem inducere solent, qualia plura hic concurrunt. Scilicet altitudo aquæ super lumine minor, quam ad latera vasis: aqua enim in ea voluminis parte, quæ lumini respondet, cavitatem assumit, cum effluentis non extemplo alia à lateribus succedere valeat. Quoniam vero hoc decrementum altitudinis majus est in tubo majore, quam in minore, pressura quoque seu exeundi conatus minor erit in majore, quam in minore, (§. 44. Hydrost.) Porro, dum aqua superior effluentis locum occupare nititur, vim qua premit ad descendendum impendit, non ad premendum. Unde denuo conatus ad exeundum minuitur. Tandem hic quoque habenda est resistentiæ aëris & affrictûs aquæ in superficie tubi & orificio inprimis ratio. Enimvero omnia illa impedimenta ad certas leges nondum revocata: immo hætenus nequidem constitutum est, quodnam eorum in casu quolibet dato prævaleat. DECHALES (b) affrictûs unice rationem habens, in aqua effundenda prærogativam majoribus luminibus tribuit, quia proportionaliter minorem superficiem habent, cum tamen ex modo dictis pateat, MARIOTTUM prorsus contrarium expertum esse. Ipse vero MARIOTTUS (c) non diffitetur dari subinde causas, quæ multas irregularitates inducant, ita ut nunc majoribus, nunc minoribus luminibus in aqua effundenda tribuenda sit prærogativa, & assertum suum experimentis confirmat.

(a) Traité du mouvement des Eaux part. 3. disc. 1. p. 267.

(b) In Traçt. de fontibus naturalibus prop. 30. f. 132. Tom. 2. Mund. Matthem.

(c) Loc. cit. disc. 2. p. 176.

THEOREMA IV.

26. Si duorum tuborum constanter Tab. I. plenorum  $AB$  &  $CD$  lumina  $E$  &  $F$  Fig. 7. aequalia fuerint; quantitates aquarum eodem tempore effluentium sunt ut celeritates.

DEMONSTRATIO.

Ponamus e. gr. aquam ex tubo  $AB$  effluere ea celeritate, quæ sit ad alteram ex tubo  $CD$  effusæ in ratione dupla. Quia hic tantum ratio habetur motus instantanei per foramen; motus aquæ ut æquabilis considerari potest, adeoque celeritates erunt ut spatia eodem tempore percursa (§. 33. *Mechan.*). Quodsi ergo filum aliquod aquæ in tubo  $AB$  extenderetur usque ad  $G$ ; filum ex altero usque ad  $I$ : erunt longitudines  $EG$  &  $FI$  in ratione dupla seu celeritatum. Enimvero quantitates aquarum eodem tempore effluentium sunt ut fila ista seu cylindri  $EG$  &  $FI$ , quorum bases  $E$  &  $F$  cum æquales sint, per hypoib. altitudinum  $EG$  &  $FI$  rationem habent (§. 573. *Geom.*). Sunt adeo etiam quantitates aquarum effluentium ut celeritates (§. 177. *Arithm.*) *Q. e. d.*

THEOREMA V.

27. Si duo tubi habuerint lumina Tab. I.  $E$  &  $F$  aequalia, sed altitudines  $AB$  & Fig. 7.  $CD$  inequales, fuerintque constanter pleni, quantitas aquæ effluentis ex majore  $AB$  erit ad quantitatem aquæ effluentis ex minore  $CD$  eod. m. vel aequali tempore, in ratione subduplicata altitudinum  $AB$  &  $CD$ .

## DEMONSTRATIO.

Cum vires aquas per lumina E & F expellentes sint gravitates absolutæ aquarum luminibus imminentium; ob luminum æqualitatem *per hypoth.* altitudinum AB & CD rationem habent (§. 573. *Geom.*). Sed quia gravia tantum prementia sunt vires mortuæ (§. 9. *Mechan.*), si quantitates aquarum eodem tempore effluentium fuerint ut A & a, celeritates ut C & c; erunt vires ut A. C ad a. c. (§. 278. *Mechan.*), consequenter A. C ad a. c = AB: CD (§. 167. *Aritbm.*). Est vero etiam A: a = C: c (§. 26), adeoque (cum porro sit A: a = A: a) A. C: a. c = A<sup>2</sup>: a<sup>2</sup> (§. 185. *Aritbm.*). Quare A<sup>2</sup>: a<sup>2</sup> = AB: CD (§. 167. *Aritbm.*) & hinc A: a = √AB: √CD (§. 124. *Analys. finit.*). Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

28. Altitudines aquarum AB & CD per æqualia lumina E & F effluentium sunt in ratione duplicata ipsarummet aquarum eodem tempore effusarum.

## COROLLARIUM II.

29. Et quia quantitates aquarum fluentium sunt ut velocitates (§. 26); velocitates quoque erunt in ratione subduplicata altitudinum.

## PROBLEMA IV.

Tab. I. 30. *Data ratione aquarum effluentium per utrumque tubum AB & CD, una cum altitudine unius, invenire altitudinem alterius.*

## RESOLUTIO.

I. Quærat<sup>r</sup> ad numeros qui rationem aquarum effluentium exprimunt,

& radicem altitudinis datæ, numerus quartus proportionalis (§. 302. *Aritbm.*).

2. Ducatur is in seipsum: erit factum altitudo CD quæsitæ (§. 28).

## SCHOLIUM I.

31. *Cum ex altitudine data rarissime radicem perfectam extrahere liceat, ut altitudo quæsitæ exacte inveniatur, per regulas Arithmetice irrationalium operandum. Sit e. gr. ratio data 3: 5, altitudo data 7, reperietur radix altitudinis quæsitæ  $5\sqrt{7:3}$ . Unde habetur altitudo ipsa quæsitæ  $\frac{25}{9} \cdot 7 = \frac{175}{9} = 19\frac{4}{9}$ .*

## SCHOLIUM II.

32. *Quodsi cui leges Algorithmi irrationalium non fuerint perspectæ, is faciat; ut 3, ad 5; ita 7 altitudo data, ad numerum quartum proportionalem  $\frac{35}{3}$  & porro ut 7, ad  $\frac{35}{3}$ , ita  $\frac{35}{3}$ , ad altitudinem quæsitam, quæ ut ante  $= \frac{5 \cdot 35}{9} = \frac{175}{9} = 19\frac{4}{9}$ . Sit enim universaliter 3: 5 = a: b, 7 = c; reperietur per resolutionem Problematis altitudo quæsitæ = b<sup>2</sup>c: a<sup>2</sup>. Sed quarta proportionalis ad a, b & c est bc: a & tertia proportionalis ad c & bc: a est ut ante b<sup>2</sup>c: a<sup>2</sup>. Unde patet inferri posse, ut quadrata numerorum datam rationem aquarum effluentium exprimentium, ita altitudo data ad quæsitam: id quod etiam ex demonstratione Theorematis quinti (§. 27) liquet. Atque hac analogia commodissime utuntur, qui a tricis Algorithmi irrationalium sibi metuent.*

## PROBLEMA V.

33. *Data ratione altitudinum tuborum constanter plenorum & per æqualia lumina aquas effluentium, una cum quantitate aque ex uno effusa, invenire quantitatem aque eodem tempore ex altero effluentem.*

RESO.

RESOLUTIO.

- I. Quærat<sup>r</sup> ad altitudines datas, & quadratum quantitatis aquæ per lumen unum effusæ, numerus quartus proportionalis (§. 302. *Arithm.*), qui erit quadratum quantitatis aquæ per lumen alterum effluentis (§. 28).
2. Inde itaque si radicem quadratam extrahas (§. 269. *Arithm.*), prodibit ipsa quantitas aquæ quæsitæ.

E. gr. Sint altitudines tuborum ut 9, ad 25, quantitas aquæ ex uno tubo effusa trium pollicum; erit quantitas aquæ ex altero effluens =  $\sqrt[4]{(9 \cdot 25 : 9)} = \sqrt[4]{25} = 5$ .

THEOREMA VI.

I. 7. 34. Si duorum tuborum constanter plenorum altitudines AB & CD fuerint inæquales, lumina E & F itidem inæqualia; erunt quantitates aquarum eodem tempore effluentium in ratione composita ex simplici luminum & subduplicata altitudinum.

DEMONSTRATIO.

Sit altitudo communis duorum tuborum lumina inæqualia L & l habentium = a, quantitates aquarum eodem tempore effluentium sint P & q. Porro altitudo tubi tertii = A, lumen = L, quantitas aquæ dato temporis effluentis Q: erit

$$P : q = L : l \quad (\S. 22).$$

$$Q : P = \sqrt{A} : \sqrt{a} \quad (\S. 27).$$

$$\text{Ergo } PQ : Pq = L \sqrt{A} : l \sqrt{a} \quad (\S. 213. \textit{Arithm.}).$$

$$\text{Unde } Q : q = L \sqrt{A} : l \sqrt{a} \quad (\S. 180. \textit{Arithm.}). \textit{Q. e. d.}$$

COROLLARIUM.

35. Si  $Q = q$ ; erit  $L \sqrt{A} = l \sqrt{a}$ , consequenter  $L : l = \sqrt{a} : \sqrt{A}$  (§. 299. *Arithm.*) &  $L^2 : l^2 = a : A$  (§. 260. *Arithm.*), hoc est, si quantitates aquarum ex duobus tubis constanter plenis & altitudines atque lumina inæqualia habentibus eodem tempore effluentes fuerint æquales; lumina sunt reciproce ut radices altitudinum, altitudines vero in ratione reciproca quadratorum luminum.

THEOREMA VII.

36. Si altitudines duorum tuborum Tab. I. constanter plenorum AB & CD æquales Fig. 6. fuerint, aquæ per lumina E & F utcumque inæqualia eadem celeritate effluunt.

DEMONSTRATIO.

Illud per se patet, si præter altitudines etiam lumina fuerint æqualia, aquam ex utroque tubo eadem celeritate egredi, cum nulla adsit disparitatis ratio. Concipiamus itaque lumen majus divisum in partes quotcumque, quæ singulæ minori lumini æquales sint. Quoniam aqua, quæ per partem luminis movetur, non aliter movetur, ac si per reliquas nihil flueret, cum impetus totus pendeat à pressione perpendiculariter imminentis aquæ (§. 225. *Mech.*); evidens est, eandem in singulis partibus lumini minori æqualibus eadem celeritate moveri, qua fertur per lumen minus. Aqua igitur per totum lumen majus eadem celeritate fluit, qua per minus. *Q. e. d.*

## THEOREMA VIII.

Tab. I. Fig. 7. 37. Si altitudines tuborum constant per plenoram AB & CD, itemque lumina E & F inæqualia fuerint; celeritates aquarum effluentium sunt in ratione subduplicata altitudinum.

## DEMONSTRATIO.

Sint altitudines trium tuborum  $a, a$  & A, lumina eorundem L, l, & L, velocitates aquarum effluentium  $u, v$  & c. Quia  $L = L$ ; erit  $u : c = \sqrt{a} : \sqrt{A}$  (§. 29). Est vero  $a = a$ , per hypoth. adeoque  $\sqrt{a} = \sqrt{a}$ . Ergo  $u : c = \sqrt{a} : \sqrt{A}$  (§. 168. Arithm.) Porro ob  $a = a$ , per hypoth. etiam  $u = v$  (§. 36). Ergo  $v : c = \sqrt{a} : \sqrt{A}$  (§. 168. Arithm. Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

38. Cum altitudinibus inæqualibus existentibus aquarum per æqualia lumina fluentium celeritates similiter sint in ratione altitudinum subduplicata (§. 29), hæc vero ratio æqualis fit, si altitudines æquales: patet in genere celeritates aquarum ex tubis constanter plenis effluentium esse in ratione altitudinum subduplicata.

## COROLLARIUM II.

39. Quadrata igitur velocitatum sunt ut altitudines (§. 260 Arithm.).

## SCHOLIUM

Tab. I. Fig. 8. 40. MARIOTTUS (a) multiplici experimento docuit, si ad vas ABCD applicetur tubus EF, plus aquæ per tubum æquali tempore effluere quam per idem lumen vasis E, tubo remoto, & motum aquæ eo magis accelerari, quo tubus EF longior. Cum altitudo vasis AC esset unius pedis, tubi vitrei EF longitudo trium pedum, diameter luminis trium linearum; intervallo unius minuti effundebantur

(a) Traité du mouvement des eaux part 3. disc. 6. p. 269. & seqq.

$6\frac{1}{2}$  sextarii aquæ, tubo autem remoto nonnisi 4 circiter. Cum longitudo tubi EF esset 6 pedum, diameter luminis F unius digiti, aqua omnis intra 37 minuta secunda effluxit. Cum vero tubi dimidium FH rescinderetur, vas integrum intra 45" ; tubo prorsus remoto intra 95" evacuatum est. Tubo nimirum applicato, altitudo aquæ incumbentis & egressum orificio tubi proxime urgentis major est, adeoque motus aquæ magis acceleratur.

## THEOREMA IX.

41. Si duo tubi AB & CD fuerint Tab. ejusdem altitudinis & lumina E atque Fig. F æqualia habuerint; tempora quibus deplentur, sunt in ratione basium.

## DEMONSTRATIO.

Sit basis tubi CD dupla basis tubi AB. Quoniam altitudines æquales sunt per hypoth. quantitates aquarum in tubis contentæ basium rationem habent (§. 573 Geom.), adeoque ex hypotesi aqua in tubo CD dupla est aquæ in tubo AB. Concipiatur altitudo utriusque tubi in partes infinite parvas divisa, erit cylindrulus ejusmodi altitudinis in tubo majore CD duplitis cylindruli in tubo minore AB. Uterque autem in utroque tubo eadem celeritate per lumen ejicitur (§. 36), & quia lumina æqualia sunt per hypoth. eadem quantitates aquæ eodem instanti fluunt per utrumque lumen. Ergo eodem tempore, quo cylindrulus HI effluit, nonnisi dimidium alterius LK ejicitur: ut adeo alterum dimidium expellatur opus est instanti altero. Tempuscula itaque quibus cylindruli HI & LK effluunt



fluunt, sunt in ratione subdupla, nempe ut bases tuborum AB & CD. Idem cum de cæteris eodem modo demonstraretur, patet tempora quibus integri tubi evacuantur, esse in ratione basium (§. 187. *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA X.

42. *Vasa cylindrica & prismatica ABCD ita depletur, ut quantitates aquarum temporibus equalibus effluentium decrescant secundum numeros impares ordine retrogrado sumptos.*

DEMONSTRATIO.

Velocitas nempe libellæ FG descendentis continuo decrescit in ratione subduplicata altitudinum decrescientium (§. 38). Velocitas gravis descendentis crescit in ratione subduplicata altitudinum crescentium (§. 87. *Mechan.*). Talis igitur est motus libellæ FG ex G in B descendentis, ac si inversa ratione ex B in G descenderet. Sed si ex B in G descenderet, æqualibus temporibus spatia crescerent secundum numerorum imparium progressionem (§. 86 *Mech.*). Ergo secundum eandem progressionem inversè sumptam altitudines libellæ FG æqualibus temporibus decrescunt. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

43. Libella igitur aquæ FG eadem lege descendit, qua vi impressa per altitudinem ipsi GB æqualem ascenderet (§. 329. *Mechan.*)

SCHOLIUM.

44. *Ex hoc principio multa alia de motu fluidorum demonstrari possunt, quæ nunc brevitate gratia omittimus.*

PROBLEMA VI.

45. *Vas quodcumque cylindricum dividere in partes singulis temporibus vacuandas, dato tempore quo depletur totum, itemque tempore quo depletur pars una.*

RESOLUTIO.

Sit e. gr. Vas cylindricum cujus omnis aqua intra 12 horas effluit, dividendum in partes singulis horis evacuandas.

1. Fiat; ut pars temporis I, ad tempus integrum 12; ita idem tempus 12, ad numerum quartum proportionalem 144.
2. Dividatur altitudo vasis in partes 144 æquales. Dico ultimam cedere horæ ultimæ, tres proxime superiores horæ penultimæ, quinque anteriores horæ decimæ &c. 13 denique postremas horæ primæ.

DEMONSTRATIO.

Cum enim tempora crescant in serie numerorum naturalium 1. 2. 3. 4. 5. &c. altitudines vero, si numeratio ordine retrogrado fiat ab hora duodecima, crescant in serie numerorum imparium 1. 3. 5. 7. 9 &c. (§. 42); erunt altitudines ab hora undecima computatæ ut quadrata temporum 1. 4. 9. 16. 25. &c. (§. 98. *Analys. finit.*). Quadratum ergo temporis integri 144 complectitur omnes altitudinis vasis evacuandi partes. Sed numerus tertius proportionalis ad 1 & 12 est quadratum ipsius 12 (§. 246. *Arithm.*), consequenter numerus partium æqualium, in quas altitu-

do dividenda, secundum feriem numerorum imparium per horarum intervala æqualia distribuendus (§. 42).

*Q. e. d.*

COROLLARIUM.

46. Cum partibus ejusdem vasis substituire liceat vasa minora ipsis æqualia; data altitudine vasis intra datum temporis spatium deplendi, inveniri potest altitudo vasis alterius intra tempus datum aliud evacuandi, faciendo nempe altitudines ut temporum quadrata.

SCHOLIUM.

47. Patet ergo methodus clepsydras construendi, quibus veteres usos esse constat.

THEOREMA II.

48. Aqua per foramen vasis ea celeritate erumpit, quam acquireret cadendo ex altitudine aquæ supra orificium.

DEMONSTRATIO.

Si aqua per foramen vasis vi solius gravitatis absolutæ exiret, foret celeritas ejus ad eam, qua egreditur ab aqua supra orificium consistente pressa, in ratione subduplicata altitudinis istius aquæ tempusculo infinite parvo per foramen exeuntis, seu, quod perinde est, altitudinis foraminis, & altitudinis aquæ supra orificium (§. 37). Enimvero si aqua eadem gravitate naturali caderet per altitudinem altitudini aquæ supra orificium æqualem, celeritas cadendo acquisita foret itidem ad eam, qua vi gravitatis ejusdem per foramen exiret, in ratione subduplicata altitudinis aquæ supra orificium ad altitudinem foraminis (§. 87. *Mechan.*). Aqua igitur per foramen vasis ea celeritate erumpit, quam ca-

dendo ex altitudine aquæ supra orificium acquireret (§. 177. *Arithm.*).  
*Q. e. d.*

THEOREMA XII.

49. Si aqua per tubum KE descendens per lumen G, cujus directio verticalis, profiliat, ad eam altitudinem GI ascendit, ad quam libella aquæ LM in vase ABCD consistit. Tab. 1  
Fig. 9

DEMONSTRATIO.

Quoniam aqua per lumen G, vi gravitatis columnæ EN impellitur; ea ipsius celeritas est, quam cadendo per altitudinem EN acquirit (§. 48): consequenter ea ipsi vis est, qua ad altitudinem ipsi EN æqualem ascendere valet (§. 322. *Mechan.*). Quare cum directio luminis sit verticalis per hypoth. adeoque aquæ per lumen G prorumpentis directio itidem verticalis existat; nec quicquam sit, quod eandem mutet extra tubum; aqua sursum feratur necesse est ad eam altitudinem GI ad quam libella aquæ LM in vase consistit. *Q. e. d.*

SCHOLIUM. I.

50. Experientia constat, aquam per lumen G proficientem elevari ad altitudinem ipsa GI minorem. Constat præterea, lumen G eo minus esse debere, quo minor est altitudo libellæ LM in vase ABCD. Immo propriis experimentis didici, minus esse debere lumen, si mercurius salire debet, quam ut aqua saliat, consequenter si fluidum majore vi urgetur, quam si minore: Inde vero non concluditur Theorematis falsitas; sed tantum colligitur, subesse impedimenta quadam, quæ ascensui resistent. In ea igitur inquirendum.

SCHO-

SCHOLIION II.

51. Plerique præcipuam resistentiæ causam aërem allegare solent, per quem aqua saliens ascendit. Enimvero quamvis non negem, aëris resistentiæ inter impedimenta locum aliquem esse concedendum, quæ obstant, quominus ad eam præcise altitudinem ascendat, unde decedit; causis tamen aliis majorem resistentiæ totalis partem tribuendam esse, mihi quidem satis probabile videtur. Aquas enim in vase ab aëre evacuato (S. 40. Aerom.) salientes non ulteriorem terminum attingere quam in libero aëre, ubi altitudo ascensus unius circiter pedis sit, vel etiam minor, iterato experimento didici: utut in hoc aqua saliens longe infra libellam ascensum susteret. Illud autem observare licuit, aquam in vacuo minime in tot guttulas ramulosque dividi, in quot in aëre dispergitur; sed fere unitam versus eam plagam defluere, versus quam lumen G parumper inclinatur. Unde apparet, figuram aquæ verticaliter salien-

tis magis ab aëre resistente immutari, quam celeritatem minui. In majoribus tamen saltibus, circa quos experimenta in vacuo capere non licet, aëris resistentiam sensibilio-rem esse puto. Ipsa enim aquæ in guttulas ramulosque divisio fieri nequit, nisi aliqua celeritatis parte imminuta, quemadmodum ex Regulis motus abunde constat.

SCHOLIION III.

52. Caterum hinc mirum non est, quod regula MARIOTTI defectum altitudinis a perpendiculo aquæ computandi, quam resistentia aëris potissimum superstruxit (a), & qua defectus isti in ratione duplicata altitudinum esse perhibentur, non satis exacte experientia respondeat. Quoniam tamen ejus aliquis esse potest usus; ideo non piget tabulam hic apponere, in qua altitudinibus aquarum salientium altitudines tuborum, per quos delabuntur, juxta illam assignantur, in pedibus quidem Parisinis & ejus digitis seu partibus duodecimis.

Altitudo aquarum salientium.	Altitudo tuborum.	Altitudo aquarum salientium.	Altitudo tuborum.
5'	5' 1"	55	55' 121"
10	10 4	60	60 144
15	15 9	65	65 169
20	20 16	70	70 196
25	25 25	75	75 225
30	30 36	80	80 256
35	35 49	85	85 289
40	40 64	90	90 324
45	45 81	95	95 361
50	50 100	100	100 400

SCHOLIION IV.

53. Ego quidem multum tribuo gravitati aquæ ascendenti, quia observavi quod argentum vivum ad minorem altitudinem elevetur, quam aqua. Nimirum guttarum anteriorum motus si languescit, posteriores in

eas incurrentes retardantur: id quod ipsismet oculis suis videre poterit, qui aquas salientes attentius contemplare voluerit. Atque inde est, quod, si lumen G angulo quantolibet exiguo inclinetur, ut aqua saliens a perpendiculo non admodum declinare videatur, saltus altitudo statim major evadat. Huc pertinet, quod

T O R-

(a) Traité du mouvement des eaux, pars. 4. disc. I. P. 304. & seqq.

TORRICELLIUS (a) à se observatum annotavit.

„ Quando, inquit, opposita manu foramen G  
 „ penitus occluditur, deinde retracta quam  
 Tab. I. „ citissime manu repente aperitur: videban-  
 Fig. 9. „ tur prima & præcuntes guttæ altius perve-  
 „ nire, quam sit deinceps culmen postquam  
 „ aqua deorsum fluere cæperit. Addo quod  
 dispersionem in guttulas ipsa gravitas aque  
 juvet.

### SCHOLION V.

54. Maximum autem impedimentum in  
 affrictu positum est: unde lumen seu orificium  
 G optime levigatum requiritur.

### SCHOLION VI.

55. Quamvis autem lumen non nimis in-  
 gens esse debeat, ut sufficiens aquæ copia  
 constanter affluere possit, cum alias saltus non  
 modo minuat, sed prorsus impediatur; idem  
 tamen nec nimis exiguum sit necesse est. Ex-  
 perimur enim, aquæ salientis altitudinem ma-  
 jorem esse si lumen majus, quam ubi minus  
 fuerit. Certe MARIOTTUS (b) observavit  
 aquam salientem per lumina in eadem linea  
 horizontali sita & in eodem tubo facta, quo-  
 rum diametri erant unius, 4, 6, 10, 12 &c.  
 linearum, notavitque altius ascendere eam  
 quæ per majora egreditur, quam quæ per mi-  
 nora ejicitur.

### THEOREMA XIII.

56 Aqua per tubum inclinatum AB  
 Tab. I. „ vel per tubum quomodocunque inflexum  
 Fig. 10. „ CD descendens per lumen G ad eam al-  
 titudinem in L vel M ascendit, ad quam  
 aqua in vase HK subsistit.

(a) De motu proj. & orum lib. 2. Oper. Geometr.  
 P. 192.

(b) Traité du mouvement des eaux part. 4. disc.  
 P. 303.

### DEMONSTRATIO.

Aqua ad lumen G in tubo inclinato  
 AB, vel inflexo CD eadem vi impellit-  
 tur, qua impellitur ad lumen G in tubo  
 NO (§. 34. *Hydrost.*). Sed vi impres-  
 sa per lumen istud ascendit ad altitu-  
 dinem altitudini libellæ ML æqualem  
 (§. 49.) Ergo etiam per lumen tu-  
 borum reliquorum saliens ad eandem  
 altitudinem ascendere debet. Q. e. d.

### SCHOLION.

57. Veritatem Theorematis experimento Tab.  
 confirmaturus fieri curavi ex lamina ferrea Fig. I  
 stanno obducta vas HK figuram parallelepi-  
 pedi habens. Ad fundum afferruminari jussi  
 quatuor tubos, quorum duo NO & ST sunt  
 ad fundum perpendiculares, sed inæqualium  
 diametrorum, tertius AB est inclinatus, quar-  
 tus vero CD ex pluribus partibus diversi-  
 mode inclinatis compositus; omnes una ad  
 fundum pelvis RZ aquam salientem excipien-  
 tis afferruminati. Denique in M & L ad  
 vas aptati sunt tubuli inclinati, ut, si per  
 canalem ab plus aquæ affluat, quam per  
 lumina tuborum G salit, superflua per  
 eos effluat: quo artificio quoque utendum,  
 si experiri volueris, quæ in antecedentibus  
 de motu aquarum in tubis constanter plenis  
 demonstrata sunt. Quamdiu igitur aqua ean-  
 dem libellam ML tuebatur altitudo salientium  
 per omnes tubos erat eadem, neque augebatur,  
 unius, duorum vel trium luminibus obturatis.  
 Quodsi vero libella ML vel descenderet, vel  
 obturatis tubulis in M & L ascenderet, sa-  
 lientium quoque altitudines omnes aqualiter  
 decreverant, vel augebantur.

### THEOREMA XIV.

58. Aquarum per lumen horizon- Ta  
 tale vel ad horizontem inclinatum D Fig.  
 salien-

*salientium longitudines DE & DF, vel IH & DG, sunt in ratione subduplicata altitudinum in vase vel tubo AB & AC.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam aqua per lumen D ejecta vi impressa per lineam horizontalem DF progredi nititur (§. 71. *Mechan.*), vi gravitatis autem deorsum tendit per rectas ad eam perpendiculares (§. 215. *Mechan.*), nec vis una alteram impedire potest, quia directiones non sunt contrariae; aqua à premente AB impulsà eodem tempore pervenit ad rectam IC ipsi DF parallelam, quo aqua à premente AC impulsà eandem attingit, suntque rectae IH & IG spatia, quae interea vi impetus impressi descripsissent eadem aquae. Sunt vero spatia IH & IG, quia motus per DF est uniformis (§. 490. *Mechan.*), ut celeritates (§. 33. *Mechan.*); celeritates in ratione subduplicata altitudinum AB & AC (§. 38): ergo longitudines quoque aquarum per lumina horizontalia vel inclinata salientium sunt

in ratione subduplicata altitudinum (§. 167. *Arithm. Q. e. d.*)

COROLLARIUM I.

59. Cum in medio non resistente omne corpus vel horizontaliter, vel oblique projectum parabolam describat (§. 480. 482. *Mechan.*); aqua etiam per lumen horizontale, vel ad horizontem inclinatum saliens parabolam describit.

COROLLARIUM II.

60. Aqua igitur per plures tubos inclinatos, in eadem recta collocatos, saliens arcuatum opus efficit, sub quo citra periculum madescendi deambulare licet, impetu, quo abripiuntur guttae, descensum impediens.

SCHOLION I.

61. *Jucundum admodum spectaculum praebent ejusmodi arcus aquei, dum radiis solaribus illustrati Iridis coloribus superbiunt.*

SCHOLION II.

62. *Equidem tum aëris resistentia, tum aquae facilis divisio impediunt; quominus arcus sint exacte parabolici; sed qui spectaculo ad oblectandum in hortis deambulantes utuntur, parum curant, quamnam figuram opus arcuatum referat.*

C A P U T II.

*De Motu Fluidorum vi Aëris contigui producendo.*

PROBLEMA VII.

63. **C**onstruere vas ad hortos irrigandos idoneum.

RESOLUTIO.

.I. I. Fiat vas cylindricum ABCD, exi-

12. *Wolfii Oper. Mathem. Tom. II,*

quo orificio E instructum, ut digito appposito claudi possit.

2. Fundus vasis CD, constet ex lamina exiguis foraminulis pertusa.

*Vel.*

Tab. I. *Fig. 13.* Fiat vas sphaericum HB collo tenui HE instructum, & hemisphaerium DCB sit, ut ante, foraminulis pertusum.

Dico, si utrumque vas in aquam demergas, eam per foraminula fundi intrare: si digito ad orificium E applicato vas extrahas, nihil aquæ effluere: si tandem digitum iterum removeas, aquam per foraminula instar roris stillare, adeoque ad hortos irrigandos adhiberi posse.

DEMONSTRATIO.

Si vas in aquam demergas, ut orificium E ultra libellam ejus extet, eo usque per foraminula fundi implebitur, donec aqua in vase cum ambiente in eadem libella existat (§. 34. *Hydrost.*). Ast si digito ad lumen E applicato idem extrahas, cum altitudo ejus unius alteriusve pedis longitudinem non excedat, & foraminula fundi adeo exigua sint, ut juxta aquam effluentem aëri in vas aditus denegetur; aër ambiens impedit, quominus quidpiam aquæ effluere possit (§. 95. *Aërom.*). Si digito removeas, aëris integra columna ab orificio E usque ad extremitatem Atmosphaeræ extensa in aquam in vase contentam & una cum aqua in aërem ad fundum AB gravitat. Quare cum pressio aëris per orificium in aquam æqualis sit resistentiæ aëris ad fundum (§. 34. *Hydrost.*); aquæ pondus hanc superabit, adeoque ea per fundum vasis rorabit. *Q. e. d.*

PROBLEMA VIII.

64. *Siphonem construere, hoc est, instrumentum, cujus ope liquor ex vase hauriri potest.*

RESOLUTIO.

Construatur vas FE, cujus pars media ABCD figuram cylindri, extre- <sup>Tab. Fig. 1.</sup> mæ autem AFB & CED figuram conorum truncatorum habeant: sintque orificia F & E utrinque aperta, nec majora, quam quæ digito apposito commode claudi possunt.

Dico, si vas in liquorem demergas, fore ut eodem repleatur, etsi superius orificium F existet: si digito ad F applicato extrahatur, fore ut per lumen E nihil effluat: si denique digitum removeas, fore ut totus effluat.

DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ problematis præcedentis.

*Aliter.*

Cum globo AB connectantur duo <sup>Tab. Fig. 1.</sup> tubuli graciles CD & EF arbitrariæ longitudinis, quorum lumina D & F sint aperta.

Dico, si tubuli EF extremum liquori immergas & aërem ex vase per tubulum CD ex fugas, liquorem in globum AB assensurum. Quod si jam digito ad lumen D applicato siphonem extrahas, fore ut nihil effluat: ast si digito removeas, fore ut totus liquor per tubulum EF rursus exeat.

DEMONSTRATIO.

Dum enim aërem ex fugis, perinde est, ac si vasis ab aëre evacuati orificium

cium F in liquorem demergas, adeoque liquor in globi AB cavitatem ascendere debet (§. 101. *Aërom.*). Quodsi digito ad orificium D applicato siphonem extrahas, liquor ex eo per lumen F effluere nequit (§. 95. *Aërom.*). Quamprimum vero digitum ab orificio D removes, cum in F tantum resistat pondus Atmosphæricum, liquor autem præter vim gravitatis ab eodem pondere Atmosphærico per tubulum DC impellatur: resistantia à vi majore utique vincetur, adeoque liquor per F effluet. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

65. Siphone secundo commodo utimur ad fluida specificè leviora à gravioribus, quibus innatant, separanda: unde Chymicis subinde non contemnendum præbet usum.

PROBLEMA IX.

66. Siphonem construere cujus ope totus liquor ex vase quolibet in aliud quodcumque educi potest.

RESOLUTIO.

Fiat tubus recurvus ABC, ita ut  
 b. I. orificio A in plano horizontali posito  
 16. altitudo minoris DB 31 pedes nunquam excedat. Ad communes usus altitudo dimidii, aut unius vel alterius pedis sufficit. Quodsi brachium minus AB liquori immergatur & per lumen C aër ex fugatur, liquor ex vase tamdiu per tubum BC effluet, quamdiu lumen A sub liquore constituitur.

DEMONSTRATIO.

Quando aërem ex Siphone ABC ex fugimus, in eo residuus dilatatur (§.

37. *Aërom.*), adeoque elater ejus debilior evadit (§. 79. *Aërom.*). Quare cum antea ponderi Atmosphærico æquaretur (§. 33. *Aërom.*); nunc eodem minor est. Aqua igitur in tubum AB impellitur, donec elater aëris inclusi cum fluidi ascendentis gravitate pondus Atmosphærae iterum adæquet (§. 93. *Aërom.*). Quodsi ergo non tanta fuerit altitudo BD, ut aqua intra tubum AB contenta, vi gravitatis respectivæ qua in Atmosphæram aquæ superficiæ extra tubum incumbentem gravitat (§. 28. *Aërom.* & §. 34. *Hydrost.*), defectum elateris suppleat; in tubum BC descendet. Si jam orificium C infra libellam aquæ, cui alterum A immersum est, subsistit; gravitas aquæ respectiva in crûre BC, est ad gravitatem respectivam aquæ in crûre AB; ut altitudo BE, ad altitudinem BD (§. 34. *Hydrost.*). Quoniam itaque nifus aëris in superficiem aquæ circa orificium A gravitantis & aquam ad ascensum urgentis continuatur per aquam in tubo BC contentam, utpote quæ ad descensum isto aëris nifu urgetur; aër ad orificium C resistens urgetur vi ponderis Atmosphærici & gravitate respectiva aquæ, quæ est ut altitudo BC. Et eodem modo patet aëris nifui prope orificium A resisti vi ponderis Atmosphærici (quod ob exiguam siphonis altitudinem BE pro eodem habere licet) & gravitate respectiva aquæ in tubo BA, quæ est ut altitudo BD. Cum igitur aëri ad orificium A minus resistatur, quam ad orificium C; nifus illius ibidem prævalet,

atque adeo aqua continuo per AB ascendit & per alterum BC descendit, quamdiu orificium A sub fluido demersum & alterum C sub libella constituitur. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

67. Quoniam vi ponderis Atmosphærici aqua non nisi ad altitudinem 32 pedum Rhenanorum elevari potest (S. 27. *Ærom.*); altitudo cruris AB, nempe BD, minor esse debet 32 pedibus Rhenanis, ut aqua per siphonem fluat.

## SCHOLION I.

68. Evidens adeo est, recte rejici artificium HERONIS ope Siphonis per montium vertices in oppositam planitiem aquas deducendi. Jubet enim HERON, ut extremitatibus Siphonis applicentur epistomia & ad nexum crurum infundibulum, per quod aqua infundi possit, utriusque siphonis cruri implendo sufficiens. Quoniam itaque aëris auxilio non modo est opus ad primum aqua in crus minus ascensum, verum etiam ad continuationem motus; fieri non potest, ut aqua altius attollatur, quam à pondere Atmosphærico elevari solet. Suffragatur experientia: notum enim nobis est artificium HERONIS irritò successu fuisse tentatum, ubi altitudo major fuerat 32. pedibus Rhenanis.

## SCHOLION II.

Tab. II. Fig. 17. 18. 19. 69. Illud quoque notatu dignum est, figuram siphonis ad arbitrium variari posse, modo orificium C sit infra libellam fluidi ex-hauriendi. Quanto autem longiori intervallo ab ea removetur, tanto celeriore motu fluidum fertur. Et, si ex fluido extrahitur orificium A, fluidum omne per lumen inferius C egreditur & quod in minore crure AB continetur, secum veluti trahit. Quod si siphonem plenus ita constituatur, ut lumen utrumque A & C sit in eadem linea horizontali, fluidum in utroque crure pendulum hærebit. Vi-

dentur adeo fluida in siphonibus unum veluti continuum formare, ita ut pars præponderans descendens instar catenæ secum trahat levio-rem.

## SCHOLION III.

70. Si vas quodpiam æquabiliter exhaurire volueris, tabula lignea AB insiga alterum siphonis orificium C, qua aqua innatans & cum imminuta descendens id constanter ad eandem profunditatem demerget. Tab. II. Fig. 20.

## SCHOLION IV.

71. Denique notandum, fluere aquam per siphonem etiam interruptum, si nempe crura AD & EC conjungantur mediante tubo capaciore DE, aëre pleno. Tab. II. Fig. 18.

## PROBLEMA X.

72. Diabete[m] construere, hoc est, vas, quod plenum liquorem omnem effundit, non plenum vero retinet.

## RESOLUTIO.

Fundo vasis AFGB afferruminetur Siphonem inversus CDE ea lege, ut crus longius DE ultra basin vasis exporrigatur, aut minimum ejus orificium sit in basi vasis: crus vero minus CD eandem non prorsus attingat: altitudo denique siphonis minor sit altitudine vasis AG. Tab. II. Fig. 21.

*Aliter.*

Fundo vasis AFBG afferruminetur tubus DE, qui cruris majoris vicem sustinet, loco autem cruris minoris imponatur tubus alius capaciore DC in C apertus. Tab. II. Fig. 21.

Dico, si vas AFBG aqua [vel alio] liquore impleas, quamdiu non fuerit plenum, nihil inde effundi; quamprimum vero plenum extiterit, liquorem omnem effluere.



DEMONSTRATIO.

II. Dum enim aqua infunditur, in tubo DC seu crure minore siphonis ad eandem altitudinem ascendit, ad quam in vase consistit (§. 34. *Hydrost.*). Quamdiu igitur vas non fuerit plenum, aqua infra orificium D tubi DE seu cruris longioris subsistit, consequenter per hoc nihil ejus effluere potest. Quamprimum vero plenum extiterit, ultra orificium D subsistit, adeoque vi gravitatis propriæ per tubum DE descendit, dumque semel fuit per siphonem CDE, tamdiu fluere debet, quamdiu lumen cruris minoris C fuerit aquæ immersum (§. 66). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

73. Quodsi vas non fuerit plenum, ad orificium E ore applicato aërem ex siphone CDE exugas; liquor itidem omnis ex vase effluet (§. 66).

COROLLARIUM II.

II. 74. Hinc construi potest poculum KL, quo bibenti illuditur. Si nempe tu bibis, postquam sufficienter vinum hausisti, per tubum HI ulterius fluxurum flatu oris repelle & paulisper expecta, donec nihil amplius effluere sentis. Tum poculum KL alteri porrige & jube, ut ore ad orificium I applicato liquorem exugat. Ubi igitur haustu absoluto poculum ab ore removerit, vinum adhuc fluens vestem madidabit.

SCHOLION I.

II. 75. Si tubus CD vitreus fuerit, aërem in suprema ejus parte residuum, una cum aqua fluente per tubum DE successive abripi observabis. Jucundum imprimis spectaculum, ubi aërem per tubulum vitreum fundo vasis in E infixum magna celeritate cum aqua

defluentem conspicies. Hoc Phenomenon primus observavit R. P. DE LA ROCHE (a), cumque experimentum repeterem, varias ad huc circumstantias annotavi, unde usus in praxin redundat (b). Expertus inter alia sum, quod, cum diameter orificii D esset 6 lineæ seu digiti dimidii, diameter vero inferioris E unius saltem lineæ, aër tubum DE per superius D ingressus per inferius egredi non potuerit & aquæ fluxum impediverit. Hinc vero jam constat ratio, cur in diabetis istiusmodi aquæ fluxus interdum sistatur, antequam omnis effluerit, continuandus tamen aliquantisper, si tubus DC elevetur, atque hinc manifestum mihi videtur, quod luminis tam superioris D, quam inferioris E, diameter eadem esse debeat, nec ipse tubus luminibus capacior.

SCHOLION II.

76. Quodsi altitudo tubuli DE major fuerit altitudine vasis AG, hoc non obstantes aqua per eum fluit. Ut vero fluxus initium fiat, digito ad E appposito, tubus DC attollatur, ita enim aër in tubo DE contentus dilatabitur ac, elatere ejus imminuto (§. 71. Aerom.), aqua intra tubum DC altius assurgens in tubum DE sese precipitem dabit. Quodsi itaque poculi KL operculo K tubus afferruminetur, ubi bibere volueris, non opus est ut sugas; sed operculum attollere sufficit.

PROBLEMA XI.

77. Aquam per siphonem interruptum elevare.

RESOLUTIO.

I. Duo vasa æqualia AB & IK in Tab. II, eadem planitie collocentur, quorum Fig. 24, unum AB sit apertum, alterum vero clausum; utrumque aqua plenum.

Xx 3

2. Ex

(a) Vid. Diarium Trevoltienſe A. 1709. art. 85. P. 1709  
(b) In Actis Erudit. A. 1711. p. 13.

2. Ex vase tertio QR undique clauso & ab aqua vacuo tendant duo tubi DC & SH, (quorum longitudo minor quidem, sed non major quam 31 pedum esse potest) in vasa AB & IK, quorum prior fundum vasis AB fere attingit, alter SH operculo vasis IK afferruminatur.
3. Denique vasi IK afferruminetur tubus alius LN epistomio M instructus & tubo DC longior.

Dico, dum aqua per tubum LN descendit, epistomio M aperto, aliam ex vase AB in vas QR per tubum DC ascendere debere.

#### DEMONSTRATIO.

Cum enim gravitas aëris in tubo SH contenti, respectu gravitatis aquæ tubum LN implentis, fere nulla sit, motum vero aquæ continuum per tubos LN & DC non impediatur; perinde est ac si tubus DC jungeretur cum tubo LN. Sed in hoc casu, ubi tubus DC alteri LN immediate jungitur, aqua per tubum LN descendit, per alterum DC ascendit (§. 66). Ergo etiam in altero casu, ubi tubus LN alteri DC mediante tubo SH & vase QR jungitur, aqua per DC ascendere debet, dum per LN descendit. *Q. e. d.*

#### SCHOLIUM I.

78. Poterat idem eodem modo demonstrari, quo ascensum & descensum aquæ continuum in curribus siphonis communis supra evicimus.

#### COROLLARIUM.

Tab. II. Fig. 25. 79. Data igitur qualibet exigua cadu-  
cite, aqua ad maximam altitudinem ele-

vabitur, si in eadem altitudine collocentur plura vasa A, B, C, D &c. & in locis editioribus alia E, F, G &c. vasaque G & D, F & C, E & B tubis Pa, Mb, Ic, vasa vero G & F, F & E, E & A tubis GN, FK, EL jungantur, tandemque vasis D, C & B tubi R, S, T cum epistomiis V afferruminentur, qui tubis GN, FK, EL longiores sint. Epistomiis enim apertis, aqua fluens per tubum T elevabit aquam ex A in E; fluens per tubum S eandem attrahet ex E in F; fluens denique per tubum R eam ex F in G attollit, atque ita porro.

#### SCHOLIUM.

80. Aut magnum requiritur precipitii perpendicularum, aut ingens vasorum apparatus, si ad notabilem altitudinem aqua evehenda. Equidem si in vasa B, C, D, mercurius infunderetur, tubus BT 27 digitorum responderet tubo AE 31 pedum (§. 29. Aerom.); sed hac ratione elevatio aquæ nimis sumptuosa foret. Praxi adeo in altitudinibus majoribus hic aquam elevandi modus parum respondet.

#### THEOREMA XV.

81. Fluidum per siphonem ABC eodem modo acceleratur, quo acceleratur fluidum per foramen vasis effluens à fluido intra vas ad altitudinem profunditatis orificii C cruris longioris BC infra libellam fluidi AD, cui crus siphonis minus BA immersum, aequalem consistente.

#### DEMONSTRATIO.

Patet ex demonstratione Problematis 9 (§. 66), vim qua fluidum per siphonem urgetur, esse ut gravitatem fluidi absolutam in ea cruris longioris parte contenti, qua excedit longitudinem cruris minoris supra libellam fluidi cui immersum, consequenter ut altitudinem

DE

DE (§. 34. *Hydrost.*), quæ est excessus istius profunditas infra libellam. Eodem igitur modo motus fluidi per siphonem accelerari debet, quo acceleratur fluidum per vasis foramen effluens, si intra ipsum ad altitudinem DE consistat. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

82. Quoniam aqua per foramen vasis ea celeritate erumpit, quam acquireret cadendo ex altitudine aquæ supra orificium (§. 48); celeritas, qua eadem per siphonem fertur, eadem est, quam acquireret cadendo per profunditatem orificii extra aquam infra ipsius libellam DE.

COROLLARIUM II.

83. Et quoniam aquarum per foramina ex diversis vasis erumpentium celeritates sunt in ratione subduplicata altitudinum earum super foraminibus (§. 38); celeritates aquarum per diversos siphones fluentium erunt in ratione subduplicata profunditarum orificiorum per quæ effluunt, infra libellam aquarum quibus crura minorum siphonum immersa.

COROLLARIUM III.

II. 84. Eodem modo patet, in siphone interrupto CDSN celeritatem aquæ per orificium N effluentis eam esse, quam acquireret cadendo per altitudinem, quæ est aequalis differentiæ tubi LN & partis tubi DC ultra libellam aquæ in vase contentæ (§. 77).

COROLLARIUM IV.

85. Similiter patet, per diversos siphones interruptos aquam fluere in ratione subduplicata earundem differentiarum tuborum LN & DC, longitudine hujus à libella aquæ in vase AB computata.

SCHOLIUM.

86. *Hinc prono alveo fluunt alia in Theoria & Praxi siphonum utilia, quæ antecedentium gnarus sua sponte inde inferet.*

PROBLEMA XII.

87. *Aquam vi elastica aeris compressi movere.* Tab. II. Fig. 26.

RESOLUTIO.

Sit vas quodcumque ABCD, è cujus medio assurgat tubus EF fundum non profus contingens, sitque apertura aliqua in G epistomio ad arbitrium obturanda. Quodsi jam per aperturam G sive ope follis, sive syringis, sive Antliæ Pneumaticæ, sive flatu oris vehementiore aërem intruseris in vas CD ad medietatem AB aqua repletum, aër comprimetur in parte vasis reliqua (§. 17. *Aerom.*) adeoque elater ejus intendetur (§. 78. *Aërom.*). Cum adeo elater externi ambientis minor sit, si clauso epistomio G epistomium F aperias, aqua ex vase AD per tubum EF ab aëre sese expandente expelletur.

SCHOLIUM.

88. *Si aër ope Antliæ comprimitur, non opus est epistomio G, sed sufficit cochlea muniri aperturam. Tubus vero FE in cochleam desinit, ut ad Antliam firmari possit.*

PROBLEMA XIII.

89. *Vi aeris loco suo expulsi aquam movere.* Tab. II. Fig. 27.

RESOLUTIO:

1. Sit vas quodcumque PQ per diaphragma EH in duo receptacula distinctum.
2. In superiori sit catinus DB foramine in K pertusus, quod cochlea obturari possit.

3. Per

3. Per ejus medium transeat tubus AC diaphragma CE non profus attingens & epistomio I munitus.
4. Fundo catini conferruminetur tubus DEL ultra diaphragma ad fundum fere vasis inferioris HQ protensus, tuboque AC longior.
5. Denique diaphragmati conferruminetur alius tubus GF in vas inferius HQ hians & ad catinum fere assurgens.

Dico, si receptaculum superius PR aqua repleas per foramen K & illo obturato aquam etiam catino infundas, fore ut omnis ex receptaculo superiore PR ejiciatur & per tubulum DL in inferius descendat.

#### DEMONSTRATIO.

Dum enim aqua per tubum DL defluit, aër in receptaculo inferiore comprimitur (§. 17. *Aërom.*), adeoque elater ejus intenditur (§. 78. *Aërom.*). Quodsi ergo epistomium I aperias, elater aëris inclusi fortior magis premit aquam in vase PR, quam externus ad A resistit. Aquam igitur ex vase PR per tubum AC expellit. *Q. e. d.*

#### SCHOLIION.

90. Quodsi tubulus AB exiguo lumine fuerit instructus, ut aqua ex eo saliat; ingeniosa hæc machina ab inventore HERONE Alexandrino FONS HERONIS appellatur. Patet ex demonstratione aquam hic urgeri ad saltum vi elastica aëris compressi, quemadmodum in Problemate præcedente: consequenter fontem HERONIS pendere à modo ingenioso aërem intra vas vi structuræ fontis comprimendi.

#### PROBLEMA XIV.

91. *Aquam per rarefactionem aëris expellere.*

#### RESOLUTIO.

1. Sint duò vasa ABCD & CDEF per diaphragma CD à se invicem separata habeatque superius ABCD catinum AGHB conferruminatum ejusdem cum ipso capacitatis. Tab. Fig.
2. Ex diaphragmate CD ascendat tubulus IK fundum catini non profus attingens.
3. Per fundum catini exfurgat alius tubulus LM, cujus lumen L à diaphragmate exiguo intervallo distet. Dico, si vas CF prunis imponatur, aut faces ardentes fundo ejus EF supponentur, fore ut aqua ex vase AD per tubulum LM ejiciatur.

#### DEMONSTRATIO.

Dum enim aër in vase CEFD incallescit, rarefit (§. 23. *Aërom.*) ejusque elater intenditur (§. 146. *Aërom.*). Elater igitur aëris inclusi fortius premit aquam in vase AD contentam, quam externus ad M resistit, consequenter aqua per tubulum LM ejicitur. *Q. e. d.*

#### THEOREMA XVI.

91. *Si aqua vi aëris compressi per tubum ejicitur, motus eodem modo acceleratur, quo acceleraretur pressione aquæ ad tantam altitudinem consistentis, quanta sufficit ad æquilibrium cum excessu elateris aëris compressi supra elaterem primitivi, seu ejus qui ad orificium tubi resistit.*

DEMONSTRATIO.

Si enim aqua vi aëris compressi per tubum ejicitur, vis, quæ impenditur ad eam ejiciendam, est excessus vis elasticæ aëris compressi supra vim elasticam aëris ad orificium tubi resistentis, reliqua ad vincendam resistentiam imfuita. Quoniam igitur perinde est, sive aqua ejicienda urgeatur vi elastica aëris, sive vi gravitatis aquæ eidem æquali; motus ejus eodem modo accelerari debet, quo acceleratur pressione aquæ ad tantam altitudinem consistentis, quanta sufficit ad æquilibrium cum excessu elateris aëris compressi supra elaterem ejus, qui ad orificium tubi resistit. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

93. Ea igitur celeritate ejicitur, quam acquireret cadendo per altitudinem, ad quam constituta aqua æquilibrium cum excessu elateris aëris compressi supra elaterem ad orificium resistentis servat (§. 48).

COROLLARIUM II.

94. Et si diversimode compressus aër ejicit aquam; celeritates, quibus ejicitur, sunt in ratione subduplicata altitudinum, ad quas constituta aqua cum excessu elateris aëris compressi supra elaterem ad orificium resistentis æquilibrium servat (§. 38.).

COROLLARIUM III.

95. Quoniam elater aëris magis compressi, est ad elaterem minus compressi; ut massa aëris magis compressi, ad massam aëris minus compressi sub eodem volumine (§. 80. *Aerom.*); si aër primitivus in vase antequam comprimitur, fuerit idem cum exteriori ad orificium tubi per quem aqua ejicitur resistente, vis qua aqua ejicitur est ut differentia massarum aëris compressi & primitivi.

THEOREMA XVII.

96. Si aqua vi aëris compressi salit, ad eam altitudinem ascendit, ad quam constituta aqua æquilibrium servat cum excessu elateris aëris compressi supra resistentiam aëris ad orificium tubi.

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim aqua vi aëris compressi saliens ea celeritate ejicitur, quam acquireret cadendo per altitudinem ad quam constituitur aqua æquilibrium servans cum excessu elateris aëris compressi supra elaterem ad orificium resistentis (§. 92); dum vi aëris compressi urgetur, perinde est ac si per illam altitudinem descendisset. Enimvero si per eam ascendisset, ad altitudinem saliret isti æqualem (§. 322. *Mechan.*). Ad tantam igitur etiam salire debet, dum vi aëris compressi impellitur. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

97. Quia in fonte HERONIS vis elastica Tab. aëris in vase PR compressi æquilibratur II. columnæ aquæ in tubo DL contentæ (§. Fig. 89); aqua ex eodem salit ad altitudinem 27. æqualem altitudini orificii D à libella aquæ in vase HQ.

COROLLARIUM II.

98. Quoniam tantundem aquæ per tubum DL descendit, quantum per orificium A ejicitur, adeoque altitudo orificii D supra libellam aquæ in vase HQ continuo decrescit; altitudo quoque saltus continuo decrescit.

## COROLLARIUM III.

Tab. II. 99. Et cum in vase AD aër continuo  
 Fig. magis magisque dilatetur, dum aqua per  
 26. tubum EF salit (§. 36. *Aerom.*), ac præ-  
 terea, aquæ libella in eodem vase AD con-  
 tinuo descendente, resistentia aquæ in tu-  
 bo EF crescat (§. 34. *Hydrost.*); altitu-  
 do quoque aquæ salientis continuo de-  
 crescere debet (§. 95).

## SCHOLIUM.

100. Nimirum gravitas aquæ in tubo EF  
 ultra libellam in vase AD consistentis su-  
 peraccedit resistentiæ aëris ad orificium F &  
 cum eadem unita agit, ita ut resistentia tota-  
 lis, quam experitur vis elastica aëris com-  
 pressi aquam in vase ad ascensum per tubum.  
 urgens, componatur ex elatere aëris ad orifi-  
 cium F resistentis & gravitate aquæ in tubo  
 EE ultra libellam in vase consistentis eleva-  
 ta. Sed quoniam, aqua in aëre saliente, resistentia  
 ista æquatur columnæ aquæ 32 pedes  
 Rhenanos altæ (§. 28. *Aerom.*), tubus ve-  
 ro EF vix dimidii vel unius pedis in vase  
 vacuo existit; resistentia aquæ in tubo vulgo  
 non attenditur.

## PROBLEMA XV.

101. Data ratione aëris primitivi  
 ad compressum, invenire altitudinem  
 saltus.

## RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

I. Quoniam aër comprimitur in ra-  
 tione ponderum (§. 73. *Aerom.*),  
 vis autem elastica aëris primitivi I

æquilibratur columnæ aquæ 31 pe-  
 dum Rhenanorum (§. 28. *Aerom.*);  
 ex data ratione aëris primitivi ad  
 compressum inveniri potest altitudo  
 aquæ cum compresso æquilibrium  
 servantis in vacuo (§. 302. *Arithm.*).

2. Quodsi ergo aqua in aëre libero  
 salit, cum resistentia aëris prope ori-  
 ficium æquetur columnæ aquæ 31  
 pedum Rhenanorum (§. 28. *Aerom.*);  
 altitudo inventa multiplicanda est 31  
 pedibus Rhenanis, ut relinquatur al-  
 titudo saltus.

E. gr. Sit aër compressus duplus aëris  
 primitivi, adeoque ratio primitivi ad com-  
 pressum ut 1 ad 2; reperietur columna  
 aquæ compresso æquilibratæ 62 pedum  
 Rhenanorum. Quodsi ergo aqua in aë-  
 re libero salit, resistentia est 31 pedum,  
 adeoque altitudo saltus itidem 31 pedum.  
 Eodem modo patet, si aër compressus sit  
 triplus vel quadruplus primitivi; fore al-  
 titudinem saltus in casu priore 62, in pos-  
 teriore 93 pedum & ita porro.

## COROLLARIUM.

102. Quoniam data ratione voluminis  
 aëris rarefacti ad volumen condensati seu  
 primitivi, datur ratio elateris quo rarefiens  
 expanditur, ad elaterem primitivi (§. 148.  
*Aerom.*); eodem modo inveniri potest al-  
 titudo saltus, si constet quantum eo gra-  
 du caloris, qui aëri incluso inest, idem  
 dilatari possit.

## SCHOLIUM.

103. Ex his principiis alia bene multæ  
 deducere licet: sed nobis dicta sufficiant.

C A P U T III.

*De Machinis quibus aqua elevatur.*

DEFINITIO V.

104. **V**alvula seu Assarium est obturaculum vasis vel tubi, quod introrsum aperiri potest; ast quo magis contra fundum seu diaphragma comprimitur, eo exactius foramen claudit.

COROLLARIUM.

105. Valvula igitur fluidum in vas vel tubum admittit, regressum vero impedit.

PROBLEMA XVI.

106. *Valvulam seu assarium construere.*

RESOLUTIO.

b.II. Valvulae simplicissimae C conficiuntur ex corio, habentque figuram circularem & ansula D clavis affigitur fundo vasis aut diaphragmati, ubi ad obturandum foramen aptantur.

b.II. Fieri etiam possunt ex aliquot orbibus coriaceis intra duos orichalceos firmiter compressis AB & foraminibus circum circa pertusis; quae alio orbiculo orichalceo CD sursum deorsumque mobili teguntur.

g. 31. Parantur porro ex lamina cuprea E, & corio tenui obducuntur, circa cardinem in H mobiles. Ut autem certius relabantur, elatere G instruuntur.

Quemadmodum vero hactenus descriptae valvulae embolis potissimum con-

veniunt, ita in fundo vasorum vel tuborum sequente utendum:

1. Foramen A torno excavetur, tantisper in conum desinens.
2. Eidem immittatur corpus conicum orichalceum B torno itidem elaboratum & clavo aut tigillo transverso D impediatur, ne inverti possit. Vel foramen hemisphaericum excavetur eique globus orichalceus immittatur.

Tab. II.  
Fig.  
32.

PROBLEMA XVII.

107. *Syngem, hoc est, Machinam construere, ex qua aqua attracta violenter expelli potest.*

RESOLUTIO.

1. Construatur cylindrus ABDC ex materia solida, intus cavus, inferius tubulo CDF instructus.
2. Immittatur embolus K ex corio vel alia materia, quae humorem facile imbibit, confectus; qui cavitatem cylindri exacte repleat, ita ut inter ipsum & cylindrum aëri vel aquae nullus concedatur transitus.

Tab.  
III.  
Fig.  
33.

Quodsi tubulo F aquae immisso embolum K extrahas, in cavitatem ab aëre vacuum ea ascendet (§. 101. *Aerom.*). Embolo igitur intruso, per tubulum EF violenter expelletur.

COROLLARIUM I.

108. Impetus aquae eo major ipsaque aqua per longius spatium propellitur, quo major fuerit vis embolum detrudens.

## COROLLARIUM II.

109. Quare cum vis major celerius intrudat embolum, quam minor; quo celerius embolus intruditur, eo majore impetu eoque per longius spatium aqua propellitur.

## PROBLEMA XVIII.

110. *Construere Antliam attractivam, cujus ope aqua ex loco profundo in altum evehi potest.*

## RESOLUTIO.

1. Paretur cylindrus cavus ex materia solida in aqua verticaliter erigendus, cujus inferior basis I valvula introrsum hiantē instruat ( §. 105 ).
2. Immittatur embolus EK valvula sursum hiantē in I instructus.
3. Pro ejus faciliore extractione & depressione vectis FG applicetur.

## DEMONSTRATIO.

Dum enim embolus EK attollitur, aqua valvulam I elevat & in cavitate cylindri seu tubi AD ruit ( §. 101. *Aerom.* ). Quodsi ergo idem rursus deprimatur, valvula I aquæ exitum negante ( §. 104 ), valvula L aperitur & aqua ultra embolum ascendit, repetita emboli agitatione per tubum MH effluxura. *Q. e. d.*

## PROBLEMA XIX.

111. *Construere Antliam, quæ per meram expulsionem aquam elevat.*

## RESOLUTIO.

1. Cylindrus AB diaphragmate CD, ad quod valvula E aptata est, divisus in aqua collocetur.

2. Embolus F valvula G instructus ita immitatur & regulæ ferreæ IH circa cardinem H mobili affigatur, ut manu in K applicata commode attolli ac deprimi possit.

## DEMONSTRATIO.

Embolo enim F depresso, valvula G aperitur ( §. 104 ) & aqua in cavitate cylindri BC ascendit ( §. 34. *Hydrost.* ). Sed dum rursus elevatur, valvula G clauditur, ut per embolum nullus ei exitus concedatur: aperitur vero valvula E ( §. 105 106 ), & sic aqua vi emboli, agitatione sæpius repetita, per tubum M expellitur. *Q. e. d.*

## SCHOLIUM.

112. *Si quod vitium contrahit hoc Antliarum genus, non commode id corrigere licet. Unde non libenter eodem utuntur, utut ad quamlibet altitudinem datam aquam elevet, si vis sufficiens in K applicetur: ea enim attolli aquam palam est.*

## PROBLEMA XX.

113. *Construere Antliam, quæ aquam attractam violenter aliorsum expellit.*

## RESOLUTIO.

1. Paretur cylindrus ex orichalco ABCD in fundo valvula L instructus & in aqua collocetur. Tab. III. Fig. 36.
2. Immittatur embolus K sine valvula ex ligno viridi, quod humore inhibito non amplius intumescit, tor-natus & corio vel stupa vestitus.
3. In H afferruminetur tubus alius NH cum valvula sursum hiantē I.

## DEMONSTRATIO.

Dum enim embolus K attollitur, aqua valvulam L aperit ( §. 105 ) & in cavitate

Tab. III. Fig. 34.

Tab. III. Fig. 35.



cavitatem cylindri ascendit (§. 34. *Hydrost.*). Sed cum rursus deprimitur, valvula I aperitur (§. 105) & per tubum HN aqua expellitur. *Q. e. d.*

SCHOLIION I.

114. *Ingeniose hujus machinæ inventor fuit CTESIBIUS, qui primus de aqua Antliarum ope elevanda cogitavit, plurimis inventis Mechanicis & Hydraulicis suo ævo celebris, VITRUVIO autore (a). Ab eo Antliæ dicuntur Machinæ CTESIBIANÆ.*

SCHOLIION II.

115. *Ejus vires, sublato affricctu, multiplicare studuit diu multumque in Theoria & Praxi aquarum elevandarum versatus MORLANDUS (b). Virga nimirum ferrea D inter trochleas B & C, evitandi affricctu gratia, sursum deorsum movetur (§. 956. *Mechan.*) & ponderibus E, F, G, H oneratur, ut aquam fortius per tubum plumbeum TV expellat embolus LM ex orichalco tornatus & intra exiguum circulum coriaceum ad basin superiorem NO cylindri orichalcei RN dextre aptatum sine omni fere fricctione mobilis, ad quam tollendam & duodecim annorum studium, & multum argenti se impendisse fatetur laudatus inventor.*

PROBLEMA XXI.

116. *Aquam ope catenarum. fitulis instructarum elevare.*

RESOLUTIO.

1. Intra aquam horizontaliter collocetur cylindrus aut prisma sexangulare MN circa axiculum ferreum mobile.
2. Eo in loco quo aqua elevari debet, constituatur cylindrus aut prisma simile OP alteri parallellum & circa axiculum ferreum itidem mobile.

3. Situlæ S catenis connectantur, quæ utrumque cylindrum vel prisma ambiant. Alii situlas coriaceas funibus connexas præferunt, tum ne facile diffringantur, tum ne hieme (quod sæpius accidit) catenis dissilientibus fundum aquæ petant.

Quodsi cylindrum superiorem OP convertas, inferior similiter convolvitur & situlæ per aquam trajectæ aquam hauriunt superius effundendam.

SCHOLIION.

117. *Quoniam situlæ utrinque vacuæ in æquilibrio sunt; pondus elevandum est aqua in situlis ex altera parte contenta, ubi ab affricctu discesseris, quæ in his Machinis non exigua est.*

PROBLEMA XXII.

118. *Rosarium construere ad elevandam aquam.*

RESOLUTIO.

1. Tubus ligneus AB in aqua constituatur tantæ altitudinis, ad quam aqua elevanda. Tab. III. Fig. 39.
2. Tum sub aqua, tum in superiori loco, quo aqua elevanda, collocentur ut in Problemate præcedente duo cylindri GH & ED circa axiculos ferreos mobiles.
2. Ad funem, cujus extremitates inter se connexæ, circa cylindros GH & ED circumductum, aptentur globi ex corio aliaque materia molli compacti, aut (ut minor sit fricctio) hemisphæria circulo coriaceo tecta, qui cavitatem tubi exacte replet.

(a) Lib. 10. c. 12. conf lib. 9. c. 9.

(b) *Elevation des Eaux* c. 4. art. 1. p. 35. & seqq.

Dum enim cylindris circumvolutis globi aut hemisphæria per tubum AB trahuntur, aquam binis interjectam una attollunt, in L effluentem.

## S C H O L I O N.

Tab. III. *119. Alii utuntur prismatibus quadratis loco tuborum & tabulis ligneis quadratis loco globulorum. Immo & in tubis nonnulli orbiculos ligneos catena connexos globulis substitunt. Ceterum hæc Machina usum quoque habet in fossis & fluminibus à sæcibus purgandis. Ingens tamen affricus esse solet, quem parum curare solent, ubi virium ad aquam elevandam compendium quæri necessitas nulla jubet: id quod & de aliis machinis, in quibus ingens affricus est, notandum.*

## P R O B L E M A XXIII.

120. *Aquam tympano vel rota situlis instructa elevare.*

## R E S O L U T I O.

Structura admodum variari solet pro diversitate quantitatis aquarum elevandarum, & altitudinis ad quam evhenda.

Tab. III. *Fig. 40.* Si magna aquæ quantitas ad exiguam altitudinem elevari debet; tympanum constructur AB in 8 cavitates divisum, quæ aperturas habent tum in peripheria tympani C ad hauriendum aquam, tum ad tubum DE, qui axis vices sustinet, ut aqua per ejus foramina E in cistam G effundi possit.

Tab. IV. *Fig. 42.* Si minor aquæ quantitas ad majorem altitudinem elevanda, situlæ lignæ pice obductæ A ad peripheriam rotæ aptantur, quæ aquam hauriunt, dum per eam trajiciuntur, rota circumacta, & superius in B effundunt.

Quodsi rotæ palmulas non in fronte gerant, spatium binis interjectum IV. hinc inde clauditur, non nisi foramine in palmula superiori A relicto, per quod aqua hauritur, & apertura B ad latus facta, per quam rursus effunditur.

Sunt qui situlas coniales A vel (quod præstat, ne scilicet tantum aquæ perdatur) capsas quadratas unico foramine instructas B ad latus rotæ aptant: sunt & qui helicibus CD à peripheria ad centrum fere tendentibus instruunt. Alios modos silentio præterimus.

## S C H O L I O N.

121. *Rota istiusmodi structura plurimum inter se variant: non tamen omnes ejusdem notæ. Sunt enim, quæ multum aquæ inutiliter dissipant, antequam in receptaculum commune effundatur. In praxi tamen ejus non semper habetur ratio, modo aquæ sufficiens copia elevari possit.*

## P R O B L E M A XXIV.

122. *Cochlea ARCHIMEDIS aquam elevare.*

## R E S O L U T I O.

1. Circa cylindrum AB circumvolvitur tubus plumbeus ea lege, qua helicem in cochlea designare solemus (§. 854. *Mech.*).
2. Cylindrus inclinetur ad horizontem sub angulo 45 circiter graduum, sitque orificium tubi B sub aqua demersum.

Quodsi cochleam ita circumagas, ut orificium B contra aquam volvatur; aqua per helicem ascendet tandemque in A effundetur.

*Aliter.*

*Aliter.*

1. Basis cylindri tam superior, quam inferior dividitur in 4 vel 8, partes æquales & puncta divisionum D & E, F & G, B & L &c. connectuntur rectis DE, FG, BL &c. in superficie cylindri descriptis, in quas transfertur ex F in O, ex O in M &c. dimidium latus quadrati FN. Intervallo FO, MO &c. dividuntur in tot partes æquales, quot sunt lineæ verticales DE, FG, BL &c. & in primam DE transferatur pars una, in HE partes duæ, in CK tres &c. transferantur, ut adeo tota cylindri superficies in areas quadratas sit divisa.
2. Anguli diagonaliter oppositi connectantur lineis, quæ filo ab uno angulo usque ad alterum extenso facile designantur, & juxta harum ductum helice suicetur cylindrus.
3. Ad helicem firmentur asserculi admodum tenues, quorum longitudo 8 circiter digitorum, & pice oblinantur.
4. Basibus denique circum circa affigantur asseres tenues & annulis ferreis minuantur, totaque superficies exterior pice vel bitumine oblinatur.

SCHOLIION I.

123. *Peripheria basium cylindri dividi potest in quotcunque partes æquales & in lineas verticales puncta divisionum conjungentes transfertur distantia helicum, quoties fieri potest, in tot partes æquales subdividenda, quot sunt lineæ verticales, ut inde divisiones earum determinentur quemadmodum in resolutione Problematum præcepimus.*

*Si diameter totius cochleæ 18 digitorum diameter axis 6 vel 4, distantia helicum 9 digitorum esse solet.*

SCHOLIION II.

124. *Hac Machina exigua vi multum aquæ attolli posse, experientia dudum docuit: unde ad exhauriendos lacus eadem utuntur.*

COROLLARIUM.

125. Si ad ingentem altitudinem aqua elevanda, una cochlea non sufficit; sed quæ ab una effunditur, haurienda est ab altera & ita porro.

PROBLEMA XXV.

126. *Aquam ex loco humiliore in excelsiorem deducere.*

RESOLUTIO.

1. Construatur turre, aut aliud ædificium, prout elevatio locorum ultra libellam aquarum eo derivandarum requisiverit.
2. Intra turrim seu ædificium aqua elevetur vel ope rotæ ingentis situlis instructæ (§. 121), vel sitularum catenis connexarum (§. 116), vel rosarii (§. 118), vel cochlearum ARCHIMEDEARUM (§. 122.), vel antliarum (§. 110: 112), viribus vel animatis vel inanimatis legitime applicatis, juxta regulas c. 17. *Mechanica* (§. 876. & seqq.) traditas.
3. Aqua effusa in aheno cupreo colligitur, ad cujus fundum aptati sint tubi, per quos iterum descendet.
4. Ne aqua ultra latera aheni unquam assurgat, unus alterve ad summitatem fere protendatur tubus, per quem nimia in fluvium refluat, unde hauritur.

5. Hi tubi verticales connectantur cum aliis horizontalibus vel inclinatis intra terram defossis, & ad eum usque locum protensis (§. 14), in quem aqua deducenda.
6. Iis denique in locis, in quæ aqua deducitur, erigantur tubi verticales quantalibet amplitudinis, in quos hient lumina horizontalium epistomio munita, quod ope virgæ ferreæ aperire ac claudere licet, ut aqua ad arbitrium admitti possit (§. 5).

Aperto enim epistomio aqua in tubo verticali ascendet (§. 34. *Hydrost.*).

SCHOLIION.

127. *Antliarum emboli agitantur ope axis curvati duplicis, ita ut unus deprimatur, dum alter attollitur. Inseritur autem axis curvatus axi rotæ aquariæ. Cochlea ARCHIMEDIS ac cylindri superiores rosariorum & catenarum situlis instructarum instruuntur rotis radiatis, quibus aliæ dentatæ occurrunt.*

*E. g. Ponamus rosarium calcando moveri debere. Construendum igitur erit tympanum ingens (§. 886. Mechan.), cujus axi unâ insigenda rota stellata, occurrens radiatæ, de qua ante diximus. Jungitur autem rotæ radiatæ verticalis ad conservandum impetum. Quodsi equus eandem Machinam movere deberet, axi verticali temone instructo (§. 888. Mechan.) insigi deberet rota dentes in plano habens, reliquis manentibus ut ante. Quodsi homo partim trabendo, partim deprimitendo aquam ope rosarii elevare teneretur, tympano substitueretur axis cum scyrtalis & rota verticali (§. 882. Mech.). Si vero motus partim trabendo, partim protrudendo fieri debeat, axi curvato ope vectis homodromi versando (§. 884. Mech.) insigenda rota radiata, quæ circumagat stellatam, cui communis cum alia radiata axis, alii dentatæ dentes in plano, axem cum cylindro rosarii communem habenti, occurrente. Unde facile intelligitur, quid in aliis casibus fieri debeat, modo Problemata Mechanica de potentiarum ad Machinas applicatione fuerint perspecta.*

C A P U T I V.

*De Fontibus Salientibus.*

PROBLEMA XXVI.

128. **C**onstruere fontes salientes.

RESOLUTIO.

1. Elevetur aqua ex loco humiliore in altiore (§. 110. & seqq.) & intra vas satis capax colligatur, ex quo per tubos applicatos rursus descendat.
2. Cum tubis hisce connectantur alii horizontales sub terra defossi, per

quos aqua usque ad originem fontium salientium deducatur.

3. Denique tubis horizontalibus jungantur alii verticales, quorum tamen altitudo sit multo minor altitudine tuborum, per quos aqua in horizontales defluit.

Aqua per hos in altum profiliet, quomodocumque fuerint inflexi (§. 56).

SCHOLIION I.

129. *Quodsi aqua saliens ad altitudinem datam ascendere debet, quæsito satisfieri potest per Schol. 3. Theor. 22. (§. 52).*

SCHO-

SCHOLIION II.

130. *Quodsi desideretur, ut tubi dato tempore datam aqua quantitatem effundant, vel plures tubi ejusdem fontis in data ratione aquas emittant; id obtinere licebit per Theor. 3. Cor. 1. (§. 23) & per Theor. 5. (§. 27).*

SCHOLIION III.

131. *Si denique aquarum ex diversis unius fontis tubis salientium altitudines inaequales requirantur; quæsi: o potiemur per Theor. 12. (§. 49) & Theor. 13. (§. 56): ubi & observasse juvabit quæ superius in Scholiis Theor. 12. (§. 50 & seqq.) monuimus.*

PROBLEMA XXVII.

132. *Fontem construere, ex quo aqua erumpens pilam aeneam projiciat, descensumque parantem continuo repellat.*

RESOLUTIO.

- V. I. Fiat globus æneus intus cavus A  
 19. ex lamina tenui, ne gravitate sua impetum impressum eludat.  
 2. Tubus, per quem aqua salit, BC fit ad horizontem exacte perpendicularis.  
 3. Aquæ sufficiens copia ex insigni altitudine in tubum BC deducatur. Dico, aquam ex tubo erumpentem globum projicere in altum & descendentem constanter in altum repellere.

DEMONSTRATIO.

Cum enim tubus sit ad horizontem exacte perpendicularis, per *hypoth.* aqua per eum prorumpens perpendiculariter ascendit. Quoniam vero ex insigni altitudine delapsa per *hypoth.* & ex tubo ea celeritate erumpit, quam cadendo per istam altitudinem acquireret (§. 48), magna quoque celeritate moveretur (§. 91. 473. *Mechan.*) adeo-

*Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.*

que globo impetum imprimit in linea ad horizontem perpendiculari ascendendi (§. 534. *Mechan.*). Sed dum ad eam altitudinem pervenit, ad quam vi impressa ascendere licet (§. 317. *Mech.*), vi gravitatis suæ juxta eandem perpendicularem relabitur (§. 215. *Mechan.*), In descensu igitur aqua eidem occurrit novoque impetu impresso, ut ante, ascendere cogit. Quamobrem globus in aëre pendulus sursum deorsum feretur, quamdiu aqua ex tubo saliens satis impetus ad globum repellendum habet. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

133. Cum ad globi ascensum descensumque reciprocum figura nil conferat; corpus quodcunque alterum non nimis grave eidem substituere licet, e. gr. avem cum alis expansis.

SCHOLIION.

134. *Quoniam globus, ut ex alto rursus descendens in aquam salientem incurrat, in eadem constanter linea perpendiculari ascensus descensusque reciprocos continuare debet; hoc fontium genus amat loca ventorum libidini minime exposita.*

PROBLEMA XXVIII.

135. *Construere fontem, quæ aquam versus diversas plagas projiciat.*

RESOLUTIO.

Sit tubus AB aquam advehens verticalis & ipsi infixi sint alii horizontales DE & GH, alii, ad horizontem versus diversas plagas inclinati OP & MN, alii denique infra horizontem versus plagas illis intermedias reclinati, ut FL.

Tab. V.  
Fig.  
50.

Z z

Quo-

Quoniam aqua directionem luminis, per quod prorumpit, retinet; per lumen A saliens perpendiculariter ascendet, per lumina vero L, H, N, P, E prorumpens arcus diversæ amplitudinis (§. 59) & ad diversas plagas tendentes describet. Fons igitur aquam versus diversas plagas eicit.

*Aliter.*

Tab. IV. Fig. 51. Tubus AB, per quem aqua salire debet, sit superius clausus in A, & luminis loco vel undiquaque, vel in dimidia superficiei parte foraminulis exiguis pertusus.

Quodsi tubus fuerit ad horizontem perpendicularis, aqua versus omnes plagas per foraminula saliet, eruntque jactus horizontales pro altitudine lapsus (§. 58) fatis ampli.

#### COROLLARIUM.

136. Quodsi ergo tubum AB ad altitudinem hominis fere assurgentem epistomio C instruas; eo aperto, spectatores veluti ab imbre improvise madidati recedent.

#### SCHOLIUM.

137. Probe autem tenendum est, luminum, per quæ aqua egreditur, diametros ipsorum tuborum aquam advehentium diametris minores fieri debere, ne aëris resistentia aliaque impedimenta (§. 50. & seqq.) impetum aquæ statim eludant. Ipsi quoque fontes sufficientem aquæ copiam suppeditare; aquæ impetu sufficiente gaudere debent.

#### PROBLEMA XXIX.

138. Fontem construere, ex quo aqua instar pluvie profiliat.

#### RESOLUTIO.

Tab. IV. Fig. 52. Tubo, ex quo aqua salire debet, afferruminetur globus, vel corpus lenticulare ex duobus segmentis spheri-

cis compositum AB, ex lamina metallica confectum, cujus superior superficies minimis foraminulis pertundatur.

Ita enim futurum, ut aqua cum impetu versus superiorem laminam AB propulsa sub forma tenuissimorum filamentorum in varias guttulas mox dispergendorum profiliat.

#### PROBLEMA XXX.

139. Fontem construere, ex quo aqua proficiens ad modum lintei expanditur.

#### RESOLUTIO.

Tubo AB afferruminentur duo segmenta spherica C & D, quæ fere se invicem tangant & mediante cochlea E, ad eum situm facile reducuntur, ut crena ambobus interjecta vel arctior, vel latior fiat, prout usus postulaverit.

Alii vel in tubis lumine destitutis, vel in corporibus sphericis aut lenticularibus tubo afferruminatis crenam efficiunt bene politam.

Aqua per crenam saliens ad modum lintei expanditur, si impetus fuerit sufficiens.

#### PROBLEMA XXXI.

140. Fontem construere, quæ aquam spumescentem jucundo spectaculo ejiciat.

#### RESOLUTIO.

Sit tubus AB & paulo infra lumen in ejus medio matrix DE, ut ope cochlea globus C ita ad lumen B firmari possit, quo omnis fere exitus aquæ denegetur.

Aqua intra contactum globi & tubi prorumpens spumescet ac fere nivis aërem opplentis floccos amulabitur.

PROBLEMA XXXII.

141. *Fontem construere, ubi è variis animantium vel hominum figuris aqua erumpit.*

RESOLUTIO.

Cum aqua per tubos quomodocunque fitos derivari possit & directionem luminis retineat; non alia re opus est, quam ut intra hominum animantiumque figuras tubi abscondantur, quorum orificia hient per eas partes, unde aqua profilire debet.

SCHOLIION.

142. *Ex traditis hactenus principiis haud difficulter eruitur, quicquid de fontium ornatu, quo aquae salienti figuras varias conciliare licet, concipi potest. Omnia nimirum à luminum magnitudine, figura & directione pendent.*

PROBLEMA XXXIII.

143. *Construere fonticulum salientem, qui ubi salire desit, clepsydrae instar inverti potest.*

RESOLUTIO.

- b. 1. Fiant duo vasa LM & NO tanto quidem majora, quanto plus temporis aqua saliens consumere debet, tantoque majori intervallo PN à se invicem remota, quanto major aquae salientis altitudo desideratur (§. 49).
- g. 2. Sit BAC tubus recurvus in C epistomio instructus & DEF tubus alius itidem recurvus in D epistomio munitus.
- i. 3. In I & K sint tubuli alii utrinque aperti, & fundos vasorum NO & LM fere attingentes: quousque similiter tubi QR & ST pertingunt.

Quodsi jam vas LM fuerit aqua plenum, aperto epistomio C, ea profiliet fere ad K, & delapsa per tubulum I apertum in vas NO ruet aëremque contentum per tubum QR expellet. Ubi vero aqua omnis ex vase LM effluerit; machina inversa, delapsa ex vase NO salientem efficiet.

COROLLARIUM.

144. Si vasa LM & NO tantam aquae copiam contineant, quae intra horae spatium tota effluat; Clepsydram habebimus salientem in suas graduationes (§. 45) legitime dividendam.

PROBLEMA XXXIV.

145. *Construere malluvium cum fonticulo saliente.*

RESOLUTIO.

1. Sit ABCD receptaculum vasis, cui Tab. V. aqua infunditur. Fig. 56.
2. Ex vase descendat tubus ab L usque ad M, ubi versus I inflectitur.
3. In K applicetur epistomium quo aperto aqua profiliet fere ad L usque (§. 49).
4. FG sit catinus aquam excipiens; mox per foramina P & Q in vas quodpiam defluentem.

SCHOLIION.

146. *Me non monente apparet, si aquae salienti varias figuras inducere volueris, id fieri per artificia superius exposita (§. 135. & seqq.).*

PROBLEMA XXXV.

147. *Flatu oris aquam salientem efflicere.*

RESOLUTIO.

1. Sit AB sphaera vitrea vel metallica Tab. V. & Fig. 57.

2. In ea firmetur tubulus CD exiguu orificio in C instructus & in D. infimum sphaeræ punctum fere attingens. Dico: si aërem per tubulum CD ex fugas, & orificium C in frigidam statim demergas, fore ut aqua per tubulum eundem in sphaeram ascendat. Quodsi iteratis suctionibus ultra medietatem fuerit repleta, & ore in C applicato aërem per tubulum infles, remoto ore aqua profiliet.

## DEMONSTRATIO.

Si enim aërem ex fugis, in sphaera AB inclusus rarior evadit externo, adeoque orificio C in aquam immerso tantum fere aquæ ascendere debet, quantum aëris fuerit eductum (§. 95. *Aërom.*). Quodsi vero per tubulum CD aërem infles, is per aquam specificè graviorem (§. 57. *Aërom.*) ascendet (§. 99. *Hydrost.*), consequenter aër inclusus comprimetur (§. 5. *Aërom.*). Saliat ergo aqua per tubulum CD (§. 87). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

148. Quodsi hanc sphaeram aquæ ebullienti immittas; aër rarefiet (§. 23. *Aërom.*), adeoque denuo aqua per tubulum CD salire debet.

## SCHOLIUM.

149. *Fonticulus hic ab inventore HERONE nomen Pilæ HERONIS sortitus est.*

## PROBLEMA XXXVI.

150. *Fonticulum construere accensis candelis salientem.*

## RESOLUTIO.

Tab.V. Fig. 58. 1. Ex lamina metallica fiant duo vasa cylindrica AB & CD.  
2. Jungantur tubis utrinque apertis KL,

ut aër ex superiore in inferius descendere possit.

3. Tubis afferruminentur candelabra H.
4. Operculo vero basis inferioris CF in formam catini efformato tubus FE epistomio G instructus & ad fundum fere vasis protensus.
5. In Q sit foramen cochlea munitum, ut aqua in vas CD infundi possit. Dico, candelis in H accensis, aquam per tubum EF salire debere.

## DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ Problematis 14. (§. 91).

## SCHOLIUM.

151. *Hoc eodem artificio efficies statuam ad presentiam Solis, vel candelis accensis, lachrymas effundentem. Neque enim alia re opus est, quam ut ex cavitate, in qua aër rarefit, tubulos ducas ad quasdam alias cavitates oculis vicinas & aqua repletas.*

## PROBLEMA XXXVII.

152. *Fontem intermittentem construere.*

Tab.V  
Fig. 59

## RESOLUTIO.

1. Per axem vasis AB ascendat tubus EF utrinque apertus, foramine in M exciso.
2. Tubus hic afferruminetur tam vasi superiori in H, quam inferiori in E.
3. Vas superius in L habeat foramen cochlea munitum, per quod aqua infundi possit; in basi autem inferiore multa foraminula, per quæ destillare queat.
4. In vase inferiore sit foramen G ita aptatum, ut aqua per eam non defluat, nisi ad altitudinem EM constituta.

Dico.



Dico, aquam ex hoc fonte per intervalla fluere.

DEMONSTRATIO.

Cum enim foramine M aperto aëri externo per tubum EF in vas superius AB aditus pateat; aëris inclusi elater aequalis est ponderi Atmospherico (§. 33 *Aerom.*). Gravitas igitur aquæ in eodem vase contentæ ipsi juncta pressionem majorem efficit, quam resistentia ponderis Atmospherici ad foraminula, adeoque aqua destillare debet. Quam primum vero aqua delapsa foramen M occludit, ut nullus amplius aër in locum aquæ delapsæ succedere possit; perinde est, ac si vas quoddam exiguo orificio instructum inverteres, adeoque fluxus aquæ per foraminula sistetur (§. 95. *Aerom.*). Sed dum aqua ad altitudinem EM usque assurgit, per foramen G in cavitatem vasis CD descendit. Ea igitur desfluente, foramen M rursus aperitur, aërique aditus in vas superius AB denuo conceditur. Unde patet, aquam denuo per foraminula ejusdem effluere debere. Habemus adeo fontem intermittentem. *Q. e. d.*

*Aliter.*

Quodsi fonticulum per intervalla salientem desideres, fiant omnia ut ante, nisi quod loco foraminulorum aptandi sint tûbi recurvi PQT & RSV.

*Aliter.*

1. Sit tubus EF aquam advehens in cavitatem vasis AB.
2. Ex hoc vase descendat siphon GH I in minus CD lumine conveniente in L instructus.

Quamprimum aqua ultra siphonem AB descenderit, per siphonem fluere, donec vas exhauriatur, (§. 72) adeoque tamdiu per lumen L saliet. Quodsi igitur efficias, ut plus aquæ per lumen L saliat, quam per tubum EF advehitur; fontem habebis intermittentem.

SCHOLIUM I.

153. Hoc posteriori artificio haud difficulter efficias, ut statua aquas evomant ex improvise in adstantes.

SCHOLIUM II.

154. Priori autem superstructa est lampas, quam in gratiam amici inventam publici deinde juris feci (a), & in sequenti Problemate denuo exhibeo.

PROBLEMA XXXVIII.

155. Lampadem construere, quæ eandem quantitatem olei ellychnio constanter affundit, & in qua largius pabulum flammam nunquam extinguit, multo minus receptaculum ellychnii egreditur, maximo licet calore urgente.

RESOLUTIO.

1. Fiat vasculum cylindricum ACDB, Tab. VI. cui oleum infundi possit, & ipsi affer-  
ruminetur aliud minus formam paral-  
lelepidi habens FED & rostro FH Fig. 62.  
instructum, pro recipiendo ellychnio.
2. Illud diaphragmate KL dividatur fundo DB multo propiore, quam fornici AC.
3. Tubulus PO in P & O utrinque apertus interiori vasculi AB parieti adhæreat, quem *tracheam* appello.

Zz 3 ) Ejus

(a) In Actis Erudit. A. 1711. p. 30. & seqq.

- Ejus opusculum superius P fornicem AC propemodum attingit; inferius vero O superficiem olei ad libellam HI constituti lambit.
4. Diaphragmati afferruminetur tubulus alius MN, utrinque similiter apertus & ad eandem olei libellam HI protensus.
  5. Fundo vasis DB afferruminetur tubulus QR, cujus osculum superius Q ultra libellam olei tantilo emineat & transeat per matricem cochleæ, qua vas ABDC ad pedamentum VTX firmatur.
  6. Intra hoc fiat vasculum cavum ab & in G foramen exiguum, per quod aëri externo in cavitatem DKLB pateat aditus.
  7. Denique in fornice fiat foramen cochlea S munitum, ut lampas (si quando opus fuerit) à fordibus purgari queat.

Dico, si lampas à pedamento avulsa invertitur & digito ad foramen G applicato oleum per tubulum QR altero MN paulo ampliorem infunditur, fore ut oleum cavitatem GB ingressum per tubulum NM, vase in latus DC inclinato, in proprium receptaculum AK delabatur, & lampas repleta & ad pedamentum VT rursus firmata munere suo, ut decet, fungatur.

#### DEMONSTRATIO.

Quamdiu enim oleum ad libellam HI consistit, ne guttula quidem una per MN effluere potest, vi eorum, quæ ad Problema præcedens demonstrata sunt (§. 152). Insensibili autem ejus

quantitate absumta, aër per tracheam OP ingreditur & oleum per MN destillat. Eandem itaque quantitatem olei lampas constanter ellychnio affundit. *Quod erat unum.*

Quodsi lampas in locum calidum deferatur, aër supra oleum rarefit (§. 23 *Aërom.*), adeoque oleum per tubulum MN expellitur (§. 91): quod cum ultra libellam HI affurgat, per tubulum QR in vasculum ab defluit, consequenter nec flammam extinguere, nec extra receptaculum ellychnii egredi potest. *Quod erat secundum & tertium.*

#### SCHOLIUM.

156. *Ut demonstratio ocularis evaderet, vas ABCD ex vitro fieri curavimus observavimusque, tracheam PO non nimis arctam esse debere, si desideres, ut olei vel minima quantitas absumta statim refundatur. Etenim gutta olei aëri in tubulum nimis arctum aditum non concedit, nisi ejus vi per totam tubuli longitudinem in vas ACKL abripiatur. Unde simul colligitur, operam dandam esse ut orificium tracheæ sit bene politum.*

#### PROBLEMA XXXIX.

157. *Construere fonticulum salientem, in quo avicula tantum aque sorbeat, quantum ex illo profluit.*

#### RESOLUTIO.

1. Fiat vas BF per diaphragma ED in Tab. VI. duas cavitates divisum, quarum superior AEPD in duas alias AC & CB Fig. 63. per diaphragma CN subdividitur.
2. In Q, R & S fiant foramina cochleis munienda ut aqua infundi & effundi possit, prout usus postulaverit.

3. Ex vase AB in vas EF descendat tubus GH fundo illius afferruminatus, fundum vero hujus non prorsus contingens atque clavicula p instructus.
4. Ex vase DF assurgat tubus KI basi illius superiori afferruminatus, hujus vero basin superiorem non prorsus attingens.
5. A fundo fere vasis CB ascendat alius tubus LM transiens per fundum phialæ O aquam salientem excipientis, epistomio T instructus.
6. Denique per rostrum, corpus & pedes aviculæ vasi AB insistentis ducatur siphon inflexus ZV.

Dico si epistomia p & T aperias, vasis A & B aqua repletis & rostro aviculæ aquæ immerso, fore ut aqua per tubulum LM saliat & avicula eam sorbeat.

DEMONSTRATIO.

Dum epistomio p aperto aqua per tubulum GH, ex vase AC in vas DF descendit; aqua ex phiala per rostrum avis ascendere debet (§. 77). Dum vero per siphonem ZV semel fluit, motus continuatur, donec aqua omnis ex phiala fuerit exhausta (§. 66). Enimvero quamdiu aqua per tubum GH descendit, aqua ex cavitate CB per tubum LM salire debet (§. 89). Habemus ergo fonticulum salientem & aviculam tantum aquæ sorbentem, quantum ex illo profluit. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

158. Eadem prorsus structura est fontis KIRCHERIANI, in quo avis tantum aquæ sorbet, quantum a serpente in poculum exspuitur. Absconde enim tubum LM intra corpus serpentis & eum inflecte, ut lumen

M per os hiet: nec difficulter forma fontis in KIRCHERIANI mutabitur.

PROBLEMA XL.

159. Fontem construere in vase vitreo clauso salientem.

RESOLUTIO.

1. Sit sphaera vitrea A, cujus orificium Tab. cochlea BE munitum. VI.
2. Per cochleam transeat tubulus DC, Fig. exiguo lumine in C, sed ampliore <sup>64.</sup> in D instructus, cujus pars major sit extra vitrum.
3. Eidem cochleæ afferruminetur tubulus admodum gracilis, sed altero CD multo longior EF.
4. Sint duo vasa IK & LM mediante tubo HN inter se connexa & basi superioris IK afferruminetur tubulus GH,
5. Per quem ad vas inferius demittatur tubus EF.

Dico, si vas IK & aliquam sphaeræ A partem aqua repleas, aquam ex sphaera per tubulum EF in vas LM descensuram & per tubulum DC in sphaeram ascensuram, per lumen exiguum C saliendo.

DEMONSTRATIO.

Dum enim aqua per tubulum EF descendit, aër in sphaera dilatatur (§. 36. *Aerom.*), adeoque elater ejus minuitur (§. 78. *Aerom.*). Quare cum inclusus ante dilatationem ponderi Atmosphaerico æqualis existeret (§. 33. *Aerom.*), quo aqua in vase IK premitur (§. 21. *Aerom.*); inclusus post dilatationem ad lumen C minus resistit, quam externus aquam in vase IK premit. Aqua igitur per tubulum DC ascendere & quia

quia lumen C exiguum per *hypoth.* salire debet (§ 55). *Quod erat unum.*

Cum vero fonticulus hic saliens sit siphon interruptus, cujus crus minus BD, majus EF; motus aquæ salientis continuatio intelligitur per ea, quæ de continuatione motus fluidorum in

siphonibus demonstrata sunt (§. 66). *Quod erat alterum.*

SCHOLION.

160. Ex demonstratione apparet, aquam per tubulum DC salire debere, modo orificium D in aquam immergatur, orificio F extra eam constituto. Unde structura fontis multis modis variari potest.

C A P U T V.

*De variis Machinamentis Hydraulicis.*

PROBLEMA XLI.

161. **F**ores construere, quibus apertis aqua conspergatur ingrediens.

RESOLUTIO.

1. Ad latera valvarum juxta superliminare collocentur vasa AB & CD aqua plena, quibus
2. Tubus recurvus EFGH ita adaptetur, ut pars FG sub limine lateat tubulis I, K, L per foramina liminis hiantibus.
3. In M & N tubo FG applicentur epistomia cum valvis P & Q ita connexa, ut iis apertis & ipsa aperiantur.

Quo facto, aqua per tubulos I, K & L profiliet & ingredientem madidabit (§. 49).

SCHOLION.

162. Eodem artificio risicum construes, quo aperto, facies aperientis aqua conspergatur.

PROBLEMA XLII.

163. Efficere, ut in horto vel crypta deambulans subito aquis ex terra profilientibus conspergatur.

RESOLUTIO.

1. Sub terra ita abscondatur antlia AB. Tab. VI. ut virga ferrea GE, qua depressa VI. embolus movetur, paulo ultra ip- Fig. 66. sius superficiem promineat.
  2. Embolus F sit valvula instructus & ita aptetur, ut a pede calcantis depressus a lamina elastica H rursus attollatur.
  3. Sit CD tubus aquam in cylindrum AB advehens, contra pulverem terræ ac arenæ granula probe muniendum.
  4. Fundo antliæ afferruminetur tubus ILM, cujus orificium M ultra superficiem terræ paulo promineat.
- Dico, aquam per M profilire debere, si pede in G insistas.

DEMONSTRATIO.

Aqua nimirum per tubum CD in superiorem antliæ AB partem delapsa urget valvulam E, quæ cum in partem inferiorem hiet, aperitur & aquæ illuc transitum concedit, in tubo LM usque ad K ascensuræ (§. 34. *Hydrost.*). Quod si jam pede calcantis embolus

bolus F deprimatur, valvula E clausa aquæ regressum in superiorem antliæ partem impedit (§. 104) quare per tubum LM cum impetu ejicitur. Remoto autem pede ab embolo GF, pistillum situi suo restituitur ope elateris H. Saliens itaque aqua ex M, quoties pes calcantis admovetur embolo G. *Q. e. d.*

SCHOLIION I.

164. Cum aqua ex altitudine quadam delapsa, ad eam fere rursus ascendat (§. 49); quæ tubo CD advehitur, ex vase intra terram defosso & in planitie replendo illuc derivari debet.

SCHOLIION II.

165. Quodsi vero aqua per tubum CD advecta ex altitudine quadam fuerit delapsa; in I aptanda valvula, cui deprimendæ solum aquæ pondus non sufficiat: vel totum Machinamentum alia ratione construi deberet.

PROBLEMA XLIII.

166. Construere Machinam, quæ aquam insigni cum impetu elevet.

RESOLUTIO.

1. Construatur antlia compressiva AB (§. 113).
2. Ex ea transeat tubulus CD in vas cylindricum HI, cujus ex orichalco parati altitudo sit 2 pedum, diameter octo digitorum.
3. Tubus CD sit valvula in D instructus, quæ in cavitatem vasis HI hiet.
4. Denique in K afferruminetur tubus recurvus KL, mediante epistomio O pro arbitrio claudendus & aperendus.

Dico, hanc Machinam aquam ad insignem altitudinem elevaturam.

DEMONSTRATIO.

Embolo enim EF elevato, valvula G aperitur & aqua in antliam AB ascendit (§. 36. *Aerom.*): quo rursus depresso, illa clauditur & valvula D aperta aqua per tubum CD in vas HI ejicitur (§. 105). Quo facto, cum epistomium O sit clausum, aër in cavitatem vasis HI comprimitur (§. 17. *Aerom.*). Quodsi itaque sufficienter fuerit compressus; aperto epistomio, aqua insigni cum impetu per tubum KL prorumpet (§. 87). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

167. Quoniam agitatione emboli continuata, aër in eodem compressionis gradu conservari potest; hæc Machina aquam continuo ejicit.

PROBLEMA XLIV.

168. *Hydraconstiterium, hoc est; Machinam construere, quæ aquam ad incendia ressinguenda ad datam altitudinem & in datum locum evomat.*

RESOLUTIO.

1. Fiat cista AB figuram parallelepipedii Tab. VII. habens & rotis C instructa, ut com- Fig. 68. mode ad locum incendii advehi possit. Sunt & qui cistam trahæ imponunt, firmitatis gratia, quia non tam facile damnum patitur, quam rota.
2. Intra cistam firmetur Machina CRESIBIANA cum gemino cylindro (§. 113).
3. Ad agitandos embolos applicentur vectes DE cum axe curvato, ita ut embolus alter deprimatur, dum unus attollitur.

4. Tubus, per quem aqua ejaculatur, immittatur alteri mobili GH, qui ad locum desideratum commode dirigi potest.

Si enim continuo aqua in cistam AB infundatur & emboli nunc eleventur, nunc deprimantur; aqua per tubum GH ad locum desideratum ejaculabitur (§. cit.). Machina igitur ad restinguenda incendia commode utimur.

#### SCHOLION I.

169. Belgæ aliique ipsorum exemplo excitati tubo mobili GH substituunt tubum longum, flexilem, ex materia velorum vel corio factum, qui manu arreptus ad quævis loca incendio infestata trahitur ab homine ex conclavi uno in alterum libere deambulante, prout necessitas postulaverit. (Vocatur tubus istiusmodi Germanis ein Schlauch). Unde apparet, hac ratione hydracontisteriis esse locum, etiamsi flamma in conclavibus aedificii tantum seviat, nec per tectum ac fenestras foras erumpat.

#### SCHOLION II.

170. Non inutiliter Machinæ CTEBISIANÆ substituere licet alteram in probl. 43. (§. 166) descriptam, quia aquam non per intervalla, sed continuo ejaculatur.

#### PROBLEMA XLV.

171. Efficere, ut ad speculum aut objectum aliud accedens aqua ex improvise conspergatur.

#### RESOLUTIO.

- Tab. VI. Fig. 69.
1. Sit AB cista aqua plena, cujus fundo afferruminetur tubus recurvus CDEF.
  2. Pars tubi intra cistam AB paulo infra embolum elevatum foraminibus nonnullis pertundatur.
  3. Denique embolus G ita immittatur, ut cessante vi deprimente, per elaterium rursus attollatur.

#### DEMONSTRATIO.

Aqua enim per foraminula in tubum CD defluet ac in tubo EF eo usque ascendet, donec in eadem altitudine subsistat, ad quam aqua intra cistam AB constituitur (§. 34. *Hydrost.*). Quodsi vero embolum in H pede deprimas, aquam per F ejiciet, adeoque eadem ex improvise conspergeris, Q. e. d.

#### SCHOLION

172. Quodsi aqua ex alto delabatur, sufficit, ut pede deprimatur valvula, quæ aquæ aditum in tubum EF concedat (§. 85).

#### PROBLEMA XLVI.

173. Construere speculam, in qua speculator constitutus sonum ingentem cornu edat.

#### RESOLUTIO.

- Tab. VI. Fig. 70.
1. In superiore loco speculæ constituitur vas aqua plenum AB & in inferiore aliud aëre plenum CD, contra omnem vero aëris accessum optime munitum.
  2. Ex vase superiori AB in inferius CD transeat tubus EF epistomio L instructus.
  3. Ex vase inferiori CD ascendat tubus HG per vas, pedem, corpus & os speculatoris, cui cornu K sit afferruminatum.
- Etenim laxato epistomio L, aqua ex vase AB per tubum EF descendit & ingenti celeritate aërem ex vase CD per tubum HG expellit, qui dum per cornu egreditur eundem sonum parit, qui aëre in cornu inflato audiretur.

SCHO-

SCHOLIION. I.

174. *Simili artificio sonos alios produces.*  
 KIRCHERUS (a) cantum singularum fere avicularum notis musicis exprimere & in cylindrum phonotacticum aquis per tubos delabentibus facile convertendum transferre docuit: unde multa excerptit SCHOTTUS (b) quæ ad hoc argumentum Hydraulicum perficiendum tendunt.

SCHOLIION II.

175. *Huc referenda quoque sunt organa Hydraulica jam veteribus nota & à VITRUVIO (c) descripta, à PERRALTIO in notis schematico nitido egregie illustrata: de quibus, cum non amplius in usu sint, hic dicere non attinet.*

PROBLEMA XLVII.

176. *Ventum excitare ad flammam conservandam aptum.*

RESOLUTIO.

1. Ad basin dolii superiorem AB aptetur tubus CE, cujus altitudo 5 minimum aut sex pedum, amplitudo ea, ut tota aqua continuo affluente repleatur.
2. Tubus EC hinc inde instruendus est tubulis F aut, si mavis, foraminulis, ut ab aqua descendente aër una in dolium abripiatur.
3. In basi inferiori CG e regione luminis E sita sit tabula marmorea aut lapidea alia polita, in quam aqua perpendiculariter incidat.
4. In G aptetur tubus I angustior eo per quem aqua delabitur ut delapsa ex dolio iterum effluat.
5. Denique in H sit tubus ad eum locum protensus, quo ventus spirare debet.

(a) Musurgia lib. 9. part. 5.

(b) In Magia Universali Naturæ & Artis part. 2. lib. 6.

(c) Lib. 10. c. 13. f. m. 325.

Dum enim aqua cum impetu in tabulam lapideam M incidit ac dispergitur, aër ingenti impetu per tubum H expellitur. Habes ergo ventum valide spirantem (§. 166. Aërom.).

SCHOLIION I.

177. FRANCISCUS TERTIUS DE LANIS (d) autor est, se vidisse, hoc artificio ventum majorem fuisse excitatum, quam qui foliis decem aut duodecim pedibus longis efficiebatur. Hinc in fornacibus majoribus ad liquandum ferrum aliaque metalla eodem utuntur.

SCHOLIION II.

178. Enimvero opus non est, ut tubus CE sit rotundus & vas ABCG figuram dolii habeat. Utriusque figura ad arbitrium variari, e. gr. quadrata fieri potest. Unde quidam loco dolii cameram ex lateribus construunt. Opera tantummodo danda, ne aër ex vase ABCG ullibi, quam per tubum H erumpere possit.

SCHOLIION III.

179. *Succedit etiam artificio, si nullum Tab. VII. Fig. 72.*  
 adsit dolium; sed aqua per tubum quadratum AB nullis spiraculis instructum tantum delabatur, ad quem aptatus sit tubus GH, unde ventus spirat. Quodsi usus postulerit, ut ventus interrumpatur, obturato orificio H, aperiatur aliud I, vento exitum concedens.

PROBLEMA XLVIII.

180. *Duo vasa construere, quorum unum utrumque plenum vino, nihil tamen ejus effundit, nisi alterum fuerit aqua plenum eamque effundat: quæ Vasa concordia vocantur.*

RESOLUTIO.

1. Sint AB & CD duo Vasa, quæ mediante tubo recurvo EFGH inter se communicent. Tab. VII. Fig. 73.

A a a 2

2. In

(d) In Magisterio Naturæ ac Artis lib. 5. c. 3. artif. 25. f. 197.

2. In utroque vase aptetur ad fundum diabetes (§. 72.), ita ut orificium tubi minoris I sit infra orificia E & H tubi recurvi EFGH.

Quodsi vas AB vino repleatur, donec lumen I sit in libella ejus; nihil effluet (§. 72.). Sed si vas alterum CD aqua adimpleas totum; per tubum EFGH vas alterum AB ingreditur (§. 34. *Hydrost.*) & quantitatem liquoris ibidem auget. Quare cum jam utrinque liquor ultra orificium I ascendat; per M omnis aqua ex vase CD, per L vero vinum omne ex Vase AB effluet (§. 72.). *Q. e. d.*

PROBLEMA XLIX.

181. *Vas construere, quod tantum vini effundit, quantum aqua infunderis.*

RESOLUTIO.

Tab.  
VII.  
Fig.  
74.

1. Fiat Vas ADBC in duas cavitates per diaphragma GF divisum & undiquaque contra accessum aëris probe munitum.
2. Operculo AC afferruminetur tubulus HI per cavitatem unam GB ad fundum fere vasis CB pertingens.
3. Cavitates duæ inter se communicent tubo recurvo LFK.
4. Denique cavitati alteri immittatur tubulus NM, & utraque cavitas instruat foramine cochlea munito, ut, si opus fuerit, liquor infundi, & rursus effundi possit.

Quodsi enim cavitatem AF vino repleas, nihil infusi per MN effluet (§. 34. *Hydrost.*). Enimvero si per tubulum HI aquam cavitati alteri affun-

das; aër per tubum KFL in cavitatem alteram propellitur, adeoque vinum per tubum MN expellit.

PROBLEMA L.

182. *Vas construere, quod liquorem excipit, donec fuerit plenum, si constanter eum affuderis; sed ne guttam amplius admittit, ubi semel cessaveris.*

RESOLUTIO.

1. Vas AB per diaphragma CD in duas cavitates ACD & CDB dividatur, quarum superior aperta esse potest.
2. Ad diaphragma in cavitate superiore AD aptetur diabetes GF: sub diaphragmate autem in cavitatem inferiorem hiet tubulus H.

Tab.  
VII.  
Fig.  
75.

Quodsi aquam constanter affundas ea per diabetem GF defluet in cavitatem inferiorem BCD aëremque per tubulum H expellet (§. 72.). Sed si aliquamdiu desistas, aër tubum longiorem diabetæ replebit, excepta parte FE aquæ immersa. Nihil ergo amplius per tubum istum in cavitatem BCD defluet.

PROBLEMA LI.

183. *Vas construere, ex quo per idem orificium vel aqua vel vinum fluit, prout desideraveris, vel etiam mixtum ex aqua & vino.*

RESOLUTIO.

1. Sit vas AB per diaphragma CD in duas cavitates divisum.
2. In operculo vasis AE fiant duo foramina F & G, per quæ aëri in utramque cavitatem aditus patet.

Tab.  
VII.  
Fig.  
76.

3. In.



3. In fundo fiant duo alia L & D, per quæ liquores in cavitatem IHB descendere possunt.

4. Ex tertia hac cavitate procedat tūbulus M.

Quodsi foramen G obtures, per tūbulum M effluet vinum ex cavitate CI. Si foramen F obtures, fluxus vini ces-

sabit, fluetque aqua ex cavitate CD per eundem tubulum M. Quodsi denique utrumque foramen F & G fuerit apertum; aqua & vinum una per tubulum M effluent.

SCHOLION.

184. Ex his principiis innumera alia derivare licet.

CAPUT VI.

De Cursu Fluminum.

DEFINITIO VI.

185. **A**lveus Fluminis est cavitas in superficie Telluris effecta, intra quam aqua continuo decurrit.

DEFINITIO VII.

186. Alveus naturalis est, qui à natura effectus est. Alveus vero artificialis vocatur, qui arte effectus fuit.

SCHOLION.

187. Istiusmodi alveos artificiales parant molitores ad aquas in rotas molares derivandas (S. 925. Mech.). Germanico idioma te alveus naturalis der Wilde Bach, alveus autem artificialis derMuhlgraben appellatur.

DEFINITIO VIII.

188. Sectio alvei est planum ad fundum perpendicularare, cujus termini aquam per alveum decurrentem non egrediuntur.

SCHOLION.

189. Ponamus aquam intra alveum totam subito abire in glaciem & secari plano ad fundum alvei perpendicularari. Quæ hinc prodit sectio, erit ea quæ nobis hic sectio alvei vocatur.

DEFINITIO IX.

190. Sectio naturalis est sectio alvei naturalis: Sectio vero artificialis sectio alvei artificialis.

SCHOLION.

191. Definitio adeo sectionis Fluminis, quam dedimus cum de molendinis ageremus (S. 914. Mech.), est sectionis artificialis, quoniam ibi cum alveo artificiali, per quem aqua ad rotas molares deducitur, nobis fuit negotium.

COROLLARIUM I.

192. Quoniam constat alveos naturales figuram habere profus irregularem, quæ ad aliquam Geometricam commode reduci nequit; sectio naturalis figura plana irregularis est.

COROLLARIUM II.

193. Quia vero alvei artificiales figuram parallelepiedi habent; sectio artificialis est rectangulum parallelogrammum (S. 162. Geom.)

SCHOLION.

194. Qualis figura sit sectio artificialis jam ostendimus alibi, (S. 915. Mech.). Potest vero figura quæcunque irregularis ad parallelogrammum reduci, cujus basis latitudini fluminis aqualis. Unde in sequentibus per sectionem intelligemus rectangulum, cujus

latitudo eadem cum latitudine fluminis, nisi res ipsa loquatur posse quamcumque sectionem supponi.

## DEFINITIO X.

195. *Sectiones* dicuntur *æqueveloces*, per quas aqua eadem celeritate media fluit. Quid vero sit *velocitas* seu *celeritas* media, commodius docebitur deinceps.

## DEFINITIO XI.

196.  *Sectio velocior* est, per quam aqua celerior fluit;  *Sectio tardior*, per quam fluit tardior.

## DEFINITIO XII.

197.  *Flumina in statu manente* sunt, si superficies aquæ intra alveum nullibi nec attollitur, nec deprimitur, sed eadem manet in eodem loco profunditas.

## SCHOLIUM.

198.  *Neque enim repugnat, ut propter alvei irregularitatem flumen alibi sit profundius, alibi minus profundum.*

## DEFINITIO XIII.

199.  *Flumen intumescit*, si superficies aquæ intra alveum attollitur;  *detumescit*, si eadem deprimitur.

## THEOREMA XXVIII.

200.  *Aquæ libere fluentis in alveo declivi cursus acceleratur propter declivitatem fundi; in horizontali propter pressionem, quam inferior sustinet à superiori.*

## DEMONSTRATIO.

Aqua enim fluidum grave est & quidem gravitatis eximiæ (§.64. *Hydrost.*). Sed gravia per declivia seu ad horizontem inclinata motu accelerato deorsum ruunt (§.384. *Mech.*). Ergo etiam aqua per alveum declivem motu acce-

lerato ruere debet, atque adeo cursus fluminis acceleratur per fundi declivitatem.  *Quod erat unum.*

Cum aqua in alveo horizontali ad aliquam à fundo altitudinem assurgit; inferiori incumbit superior. Enimvero motus aquæ ob pressionem, quam à superiore sustinet, perinde ac cadendo per aliquam altitudinem, acceleratur (§.48). Ergo cursus fluminis acceleratur quoque per pressionem, quam aqua inferior à superiore sustinet.  *Quod erat alterum.*

## COROLLARIUM I.

201. Quo declivior adeo fundus alvei est, eo celerius aqua per eundem decurrit.

## COROLLARIUM II.

202. Quo profundior aquæ in alveo horizontali altitudo est, ad quam intra alveum assurgit, eo celerior cursus fluminis.

## COROLLARIUM III.

203. Quoniam aqua fundo propior magis premitur, quam ab eo remotior; quo fundo propior, eo cursus ejus magis acceleratur.

## COROLLARIUM IV.

204. Quoniam celeritas per planum inclinatum AB a gravi in B acquisita est ut radix altitudinis AD (§.288. *Mechan.*);  *Fig. 77.* aqua etiam, si libere fluit per canalem declivem AB, in B eandem celeritatem acquirere debet, quæ est ut radix altitudinis AD.

## COROLLARIUM V.

205. Quodsi aqua per foramen B egrederetur ex vase, in quo ad altitudinem BF ipsi AD æqualem consisteret; ejus quoque celeritas esset ut radix altitudinis BF five AD (§.48). Aqua igitur per canalisi inclinati sectionem eadem velocitate movetur, ac si flueret ex vase per lumen sectioni

congruens à superficie aquæ tantundem remotum, quantum sectio ab horizontali per initium canalis ducta distat,

THEOREMA XXIX.

206. *In qualibet sectione canalis inclinati, celeritas aquæ libere fluentis major est in fundo, quam in superficie.*

DEMONSTRATIO.

Ducatur per originem canalis A linea horizontalis AE, sitque sectio, per quam aqua fluit BC, quæ est ad fundum AB perpendicularis (§. 188). Demittantur ex B & C perpendiculares ad AE, ducaturque HC ipsi DB parallela: erit GF perpendicularis ad HC (§. 230. *Geom.*) &  $FG = EC$  (§. 326. *Geom.*), consequenter  $FB > FG$  vel EC. Enimvero aquæ in C celeritas ea est, quam cadendo per altitudinem EC acquisivisset, aquæ autem in B ea, quam cadendo per FB haberet (§. 287. *Mechan.*). Major igitur celeritas in B quam in C (§. *cit.*). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

207. *Sequitur ex iis, quæ demonstrata sunt, fluminis cursum continuo celeriore fieri debere, quo longius juxta fluvium progredieris: id quod tamen experientie parum convenire videtur. Tenendum itaque & ripas, & fundi inæqualitates causari resistentias, per quas celeritas continuo imminuitur, immo modo acquisita rursus extinguitur. Sed de his impedimentis accidentalibus nostrum jam non est dicere. Id tantummodo inculcandum esse censemus, cum declivitas fundi exigua sit, gravitatem quoque acceleratricem exiguam esse, cum maxima pars ad actionem in fundum, minima autem ad descensum impediatur (§. 161. *Mech.*).*

DEFINITIO XIV.

208. *Per celeritatem seu velocitatem mediam intelligo eam, qua si aqua flueret omnis per sectionem, tantundem eodem tempore per eam effunderetur, quantum celeritate inæquali per eandem fertur.*

SCHOLIUM.

209. *Hinc intelligitur, cur sectiones æqueveloces definiiverimus per eas, per quas aqua eadem celeritate media fluit (§. 195). Quoniam enim aqua inferior celerior fluit superiori ob diversam pressionem, & fundi declivitas diversa diversa quoque celeritatis causa est; per sectiones eadem celeritate variabili non fluit aqua, nisi eadem & æquales, & similes fuerint, adeoque Theoremata de sectionibus æquevelocibus non eam acciperent latitudinem, quam habere possunt, nisi variabilis celeritas ad mediam quandam constantem reduceretur.*

THEOREMA XXX.

210. *Per sectiones æquales & æqueveloces eodem tempore æquales aquarum quantitates fluunt.*

DEMONSTRATIO.

Per sectiones enim æqueveloces aqua fluit eadem celeritate media (§. 195). Quare cum vi celeritatis mediæ tantundem aquæ per sectionem fluat, quantum celeritate variabili eodem tempore per eandem fluit (§. 208), & sectiones æquales sint per hypoth. per sectiones æquales & æqueveloces eodem tempore æquales aquarum quantitates fluunt. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

211. *Quodsi ergo sectiones æqueveloces fuerint inæquales, cum minor parti majoris*

oris æquetur (§. 20. *Arithm.*); per partem majoris tantundem aquæ eodem tempore fluit, quantum per minorem: consequenter per majorem totam plus fluit.

## COROLLARIUM II.

212. Et quoniam per sectionem æque-velocem duplam dupla, per triplam tripla, per quadruplum quadrupla aquæ quantitas fluere debet, ac ita porro in quacunque ratione inæqualitatis (§. 210); Quantitates aquarum per æqueveloces sectiones fluentes eodem tempore sunt inter se ut sectiones.

## THEOREMA XXXI.

213. *Per sectiones æquales eodem tempore fluentes aquæ sunt ut velocitates mediæ.*

## DEMONSTRATIO.

Sint duæ sectiones æquales A & B, & aqua fluat per B dupla celeritate, qua fluit per A. Concipiatur sectio infinite parvæ crassitiei & huic respondens aqua transeat tempusculo infinite parvo per sectionem A. Quoniam celeritas media in sectione B dupla est *per hypoth.* dum aqua a sectione A distat intervallo crassitiei isti respondente, altera a B duplo istiusmodi intervallo distare debet (§. 33. *Mechan.*). Dupla igitur quantitas aquæ, tempusculo infinite parvo eodem, fluit per sectionem B. Jam cum tempus quodcunque in istiusmodi tempuscula æqualia resolvi possit, & singulis per B dupla fluat aquæ quantitas *per demonstrata*; evidens est quod omnibus istis tempusculis simul sumtis, hoc est dato quocunque tempore, aquæ per sectionem B dupla quantitas fluere debeat: quod cum eodem modo fieri intelligatur in ratione celeritatum quacunque;

per sectiones æquales eodem tempore fluentes aquæ sunt ut velocitates mediæ. *Q. e. d.*

## THEOREMA XXXII.

214. *Si sectiones fuerint inæquales; nec æqueveloces; quantitates aquarum per eas eodem tempore fluentes sunt in ratione composita sectionum & celeritatum mediarum.*

## DEMONSTRATIO.

Fluat dato tempore per sectionem S, celeritate media C, quantitas aquæ Q & eodem vel æquali tempore per aliam quamcunque sectionem *f* alia quacunque, celeritate *c*, quantitas aquæ *q*. Fluat vero eodem tempore per sectionem S, celeritate *c*, quantitas aquæ *m*. Quoniam aquæ quantitates *q* & *m* per sectiones inæquales *f* & S eadem celeritate media fluunt; erunt eadem in ratione sectionum (§. 212). Et quia quantitates Q & *m* per æquales sectiones S diversa celeritate C & *c* fluunt; erunt eadem in ratione celeritatum C & *c* (§. 213). Habemus adeo  $Qm : mq = SC : fc$  (§. 213. *Arith.*), & hinc  $Q : q = SC : fc$  (§. 181. *Arithm.*): consequenter quantitates aquarum Q & *q* per sectiones inæquales, nec æqueveloces fluentes sunt in ratione composita sectionum S & *f*, atque celeritatum mediarum C & *c* (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## COROLLARIUM.

215. Si  $Q = q$ , erit  $SC = fc$ , adeoque  $S : f = c : C$  (299. *Arithm.*), hoc est, si eodem tempore quantitas aquarum per inæqua-

inæquales sectiones diversa celeritate media fluunt, erunt sectiones in ratione celeritatum mediarum reciproca.

COROLLARIUM II.

216. Quodsi præterea fuerit  $S = f$ , erit etiam  $C = c$ , adeoque si quantitates aquarum eadem per æquales sectiones fluunt; celeritas media eadem est: consequenter sectiones æqueveloces sunt (§. 195).

COROLLARIUM III.

217. Quodsi ponatur  $C = c$ ; erit etiam  $S = f$ , adeoque si celeritas media eadem, & quantitates aquarum eodem tempore per utramque sectionem fluentes æquales: consequenter si sectiones æqueveloces eodem tempore æquales aquarum quantitates fundunt (§. 195); æquales sunt.

COROLLARIUM IV.

218. Quoniam  $Q: q = SC: sc$  (§. 214); erit  $qSC = Qsc$  (§. 297. *Aritbm.*) & hinc  $C: c = Qf: qS$  (§. 299. *Aritbm.*) hoc est, celeritates mediæ sunt in ratione composita ex reciproca sectionum & directa quantitatum aquarum, quas eodem tempore fundunt.

THEOREMA XXXIII.

219. Si fluvius fuerit in statu manente, per omnes sectiones quomodocunque inæquales AB, CD, EF, GH aqua eadem quantitas eodem tempore fluit.

DEMONSTRATIO.

Ponamus enim per sectionem CD eodem tempore minorem quantitatem aquæ fluere quam per sectionem AB: inter sectiones AB & CD aquæ quantitas continuo major fieri debet, adeoque fluvius in alvei ABCD parte continuo intumescit (§. 199): quod idem cum eodem modo pateat de sectione

Wolfii Oper. Mathem. Tom. II.

quacunque inferiore EF, GH &c. fluvius non erit in statu manente (§. 197). Hoc cum sit contra hypothefin, aquæ per sectionem aliquam inferiorem minor quantitas fluere nequit, quam per superiorem quamcunque.

Ponamus ex adverso per sectionem CD aquæ majorem quantitatem eodem tempore fluere, quam per sectionem AB: inter sectiones AB & CD quantitas aquæ continuo minor fieri debet, adeoque fluvius in parte alvei ABCD continuo detumescit (§. 199): quod idem cum eodem modo pateat de sectione quacunque inferiore EF, GH &c. fluvius non erit in statu manente (§. 197) *contra hypothefin*. Aquæ igitur per sectionem aliquam inferiorem major quantitas fluere nequit, quam per superiorem quamcunque.

Quoniam itaque per sectionem inferiorem aliquam nec minor, nec major quantitas fluere potest, quam per superiorem quamcunque, per omnes omnino sectiones quomodocunque inæquales eodem tempore eadem fluere debet. Q. e. d.

COROLLARIUM I.

220. Quoniam sectiones AB, CD, EF, GH inæquales sunt, eodem tamen tempore æquales aquæ quantitates per singulas fluunt; aqua per sectiones minores celerius fluere debet, quam per majores.

COROLLARIUM II.

221. Flumen igitur coarctando, aquæ celeritas augetur: consequenter cum declivitas fundi non mutetur *per hypoth.* aqua ibidem altius affurgere (§. 206), adeoque fluvius intumescere debet (§. 199).

B b b

COROL-

## COROLLARIUM III.

222. Ex aduerso, flumen dilatando aquæ celeritas imminuitur: consequenter cum decliuitas fundi non mutetur *per hypoth.* aquæ ibidem altitudo imminui (§. 206), adeoque fluuius detumescere debet (§. 199).

## COROLLARIUM IV.

223. Quoniam in quibuscunque fluuii sectionibus æquali tempore æquales aquæ quantitates fluunt (§. 219), sectiones vero inæquales sunt *per hypoth.* celeritates mediæ in duabus quibuscunque fluminis sectionibus sunt ut sectiones reciproce (§. 215).

## SCHOLIION.

224. *Quæ Corollariis tribus prioribus continentur, experientiæ consona sunt. Videmus enim aquam ibidem celerius fluere & profundiorum esse, ubi minor est fluuii latitudo: ibi autem fluere tardius & minus profundam deprehendi, ubi major ejus latitudo, nisi forsitan ex accidente adsit quædam vorago. Usu quoque in praxi receptum est, ut ad accelerandum motum fluminis alueus coarctetur.*

## THEOREMA XXXIV.

225. *Si fluuius intumescit, aqua fluens per quamlibet sectionem dato quodam tempore, est ad aquam que ante intumescentiam ibidem fluxerat, in ratione composita sectionis ac celeritatis mediæ auctæ, ad sectionem & celeritatem mediam pristinam.*

## DEMONSTRATIO.

Dum enim fluuius intumescit, aqua intra alveum fit altior, consequenter non modo sectio, verum etiam celeritas media (§. 199. 206) augetur. Nova igitur sectio majorem quantitatem aquæ eodem tempore fundit quam pristina. Quoniam vero sectio major

jam facta & pristina spectari possunt instar sectionum duorum fluminum, per quas aqua diuersa celeritate fluit, cum fluuius intumescens a seipso differat, quemadmodum a fluuio altero profundiori, sed ejusdem decliuitatis, quæ tamen hic attendenda non venit; aqua fluens per sectionem auctam celeritate media aucta, erit ad aquam fluentem æquali tempore per sectionem pristinam celeritate pristina, in ratione composita sectionis auctæ, ad sectionem pristinam, & celeritatis mediæ auctæ, ad celeritatem mediam pristinam. (§. 214.).  
*Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

226. Erit adeo augmentum aquæ fluentis, ad aquam pristinam æquali tempore fluentem; ut differentia factorum ex velocitatibus mediis in sectiones, ad factum ex sectione pristina in celeritatem (§. 193. *Arithm.*).

## COROLLARIUM II.

227. Quodsi sectio in eodem alvei naturalis loco ad parallelogrammum propius accedit, cum parallelogramma ejusdem basis altitudinum rationem habeant (§. 389. *Geom.*), augmentum aquæ fluentis post intumescentiam, erit ad aquam fluentem ante eandem; ut differentia factorum ex altitudine aquæ aucta in celeritatem mediam auctam & ex altitudine pristina in celeritatem pristinam, ad factum posterius; id quod in alveo artificiali. semper locum habet (§. 193).

## SCHOLIION.

228. *Quando de altitudinibus sectionum vel aquæ in alveo fuerit sermo, per eam intelligitur ea perpendiculari a superficie aquæ in fundum demissi pars, per quam aqua continuo fluit, ita ut, si fluxus omnis protinus cessare ponatur, nulla aqua in desluentis locum succedente, nihil prorsus aquæ in ea remanere intelli-*

telligatur. Etenim aqua in cavitatibus fundi stagnantis nulla in fluxu habenda ratio est, cum perinde sit ac si prorsus abesset, fundo plano existente. Vulgo Autores, qui de aquis currentibus scripsere, perpendicularum istud, per quod aqua fluit, Altitudinem vivam vocare solent, quod sit altitudo aquæ vivæ: aqua enim currens ad differentiam stagnantis viva appellari solet (§. 10. Mech.).

THEOREMA XXXV.

Tab. VIII. 229. Si fuerit AB canalis delivis & BC altitudo sectionis continuetur, do- g. 79. nec linea horizontali AL per initium ejus A ducta, ubi superficies aquæ canalem secat, in L occurrat, & circa axem LB describatur Parabola quæcunque LGH; semiordinata CG exponet celeritatem aquæ in C, BH celeritatem fundo proximam & semiordinata intermedia inter CG & BH celeritates quas- cunque in perpendiculari BC inter C & B intermedias.

DEMONSTRATIO.

Celeritas enim aquarum in C & B sunt in ratione subduplicata rectarum EC & FB (§. 204). Et quoniam CE & BF perpendiculares ad AL per hypoth. erit CE ipsi BF parallela (§. 296. Geom.) Quamobrem cum sit LC : LB = CE : BF (§. 268. Geom.): celeritas in C & B etiam in ratione subduplicata rectarum CL & LB existunt (§. 124. Anal. fin. & §. 156. Arithm.). Enimvero semiordinatæ Parabolæ CG & BH sunt itidem in ratione subduplicata rectarum CL & BL (§. 412. Analys. fin.). Ergo etiam celeritates in C & B sunt ut semiordinatæ CG & BH (§. 156. Arithm.), adeoque semiordinatæ CG

& BH celeritates in C & B exponunt. Et quoniam de singulis semiordinatis intermediis idem eodem modo constat; semiordinatæ quoque intermediae celeritates intermedias exponunt. Q. e. d.

COROLLARIUM I.

230. Si ergo BC fuerit perpendicularum sectionis fluminis; spatium Parabolicum CGHB est complexus omnium velocitatum istius sectionis.

COROLLARIUM II.

231. Quoniam  $CG^2 : BH^2 = CL : BL$ . (§. 412. Anal. fin.) adeoque  $BH^2 - BG^2 : BH^2 = BC : BL$  (§. 193. Arithm.); sunt vero celeritates aquæ in B & C ut BH ad CG perpendiculari sectionis existente CB (§. 229); datis celeritatum in C & B ratione ac altitudine sectionis BC, inveniri potest axis Parabolæ BL.

COROLLARIUM III.

232. Cum ducta IG ipsi BC parallela sit  $CG = BI$  (§. 238. Geom.), adeoque IH differentia semiordinatarum CG & BH, consequenter ut BC ad HI ita  $CG + BH$  ad parametrum (§. 404. Anal. fin.); datis CG & BH in eadem mensura, qua datur perpendicularum sectionis BC in eandem quoque mensura reperietur parameter parabolæ mensurantis celeritates & amplitudo ejus erit definita.

PROBLEMA LII.

233. Dato angulo inclinationis al- Tab. VIII. vei seu canalis ABD, una cum altitudi- VIII. ne seu perpendicularo sectionis BC, & ce- Fig. 79. leritatum in C & B ratione, invenire distantiam fundi ab horizontali AL per initium alvei ducta, atque distantiam AF ab initio alvei una cum hujus longi- tudine BA.

## RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Quoniam BD parallela ipsi AL *per hypoth.* angulus BAL angulo inclinationis ABD æqualis est (§. 233. *Geom.*). Et quoniam rectus ABL recto FBD æqualis; demto communi ABF; erit FBL angulo inclinationis ABD æqualis (§. 91. *Arithm.*). Dantur itaque in triangulo BFL præter rectum ad F anguli obliqui FBL & FLB, itemque in triangulo ABF præter rectum ad F obliqui BAF & FBA,
2. Ex datis CG & BH una cum BC inveniatur axis seu altitudo Parabolæ BL (§. 231). Unde porro
3. Calculo trigonometrico definietur recta BF (§. 36. *Trigon.*) & hinc tandem
4. Recta AF, atque AB (§. *cit. Trig.*).

## THEOREMA XXXVI.

234. Si semiordinata Parabola mensurantis celeritates aque intra minutum secundam seu tempus quodcumque datum per perpendicularum sectionis fluentis CB & GH sint æquales spatiis, quæ aqua per extrema perpendiculari sectionis BC fluens dato tempore describit, & in partibus hujus assignentur; spatium Parabolicum BCGH definit quantitatem aque per sectionis perpendicularum BC tempore isto fluentem.

## DEMONSTRATIO.

Concipiatur perpendicularum sectionis BC divisum in particulas infinite parvas, quæ designabunt aquæ particulas eodem tempore in perpendiculo BC constitutas. Quoniam vero semiordi-

nata ad BC applicatæ sunt æquales spatii intra tempus datum, veluti minutum secundum, descriptis ab iisdem particulis aquæ, arcus Parabolicus GH terminabit omnem aquam, quæ initio hujus temporis in BC constituebatur; consequenter spatium BCGH definit quantitatem aquæ per perpendicularum BC intervallo unius minuti secundæ fluentis. *Q. e. d.*

## COROLLARIUM I.

235. Quoniam spatium parabolicum  $GCL = \frac{2}{3} LC$ . CG &  $BLH = \frac{2}{3} BL$ . BH (§. 104. *Anal. infin.*), BCGH vero illorum spatiorum differentia; si ex datis spatiis, quæ aqua per extrema perpendiculari sectionis fluens intra tempus datum describit, quæratu axis parabolæ (§. 231.); quantitas aquæ intra tempus datum per perpendicularum fluens determinari potest.

## COROLLARIUM II.

236. Quoniam in sectione artificiali perpendiculara omnia æqualia sunt (§. 193); aqua fluens per totam sectionem reperitur, si quantitas fluentis per perpendicularum ducatur in latitudinem alvei. Quomobrem cum hæc inveniri possit (§. 235); etiam quantitas per totam sectionem artificialem fluens definiiri potest.

## DEFINITIO XV.

237. Velocitates aquæ transeuntis per extrema C & B perpendiculari sectionis & co brevitalis gratia celeritates terminales. Dantur autem celeritates terminales per spatia CG & BH, quæ intra tempus datum aqua fluens per B & C describit.

## PROBLEMA XXXVII.

238. Datis celeritatibus terminalibus una cum perpendiculo sectionis invenire celeritatem mediam.

Tab.  
VIII,  
Fig. 79.



RESOLUTIO.

1. Ex datis celeritatibus terminalibus & perpendicularo sectionis investigetur quantitas aquæ per perpendicularum istud tempore dato fluens (§. 235).
2. Quantitas hæc inventa dividatur per perpendicularum sectionis: dico quod tum definire celeritatem mediam in partibus perpendiculari sectionis. *Q. e. i.*

DEMONSTRATIO.

Etenim si ex datis celeritatibus terminalibus & perpendicularo sectionis investigetur quantitas aquæ dato tempore per perpendicularum istud BC fluens, spatium parabolicum BCGH prodit (§. 234). Quoniam vero celeritate media eadem quantitas aquæ per BC fluit eodem tempore, quæ variabili fluit (§. 280); & ob celeritatem eandem in singulis perpendiculari partibus, etiam infinite parvis (§. cit.), per parallelogrammum rectangulum exprimitur, cujus altitudo perpendicularum sectionis BC; area rectanguli, cujus altitudo BC, celeritas media basis, æquatur spatio parabolico BCGH. Quamobrem si area spatii hujus parabolici dividatur per perpendicularum sectionis BC; prodibit celeritas media quæsita (§. 375. *Geom.*), *Q. e. d.*

PROBLEMA XXXVIII.

239. *Datis celeritatibus terminalibus CG & BH una cum sectionis perpendicularo BC, punctum K in eodem definire, per quod aqua celeritate media fluit.*

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Quærat celeritas media (§. 238) &
2. Ex semiordinata Parabolæ velocitates exhibentis BH, quæ maximam celeritatem repræsentat, refecetur recta BM mediæ æqualis.
3. In M erigatur perpendicularis MO secans Parabolam in O.
4. Denique ex puncto O demittatur perpendicularis ad axem Parabolæ OK, quæ erit semiordinata puncto O respondens (§. 370. *Anal. fn.*): atque adeo BK est distantia puncti perpendiculari à fundo, in quo aqua celeritate media movetur.
5. Hinc porro calculo definitur profunditas puncti K, in quo aqua movetur celeritate media, inferendo (§. 404. *Anal. fn.*) ut parameter quam ex datis reperire licet (§. 232), ad aggregatum ex celeritate minima CG & mediâ KO; ita harum celeritatum differentia MI, ad profunditatem quæsitam KC.

PROBLEMA XXXIX.

240. *Data longitudine canalisi inclinati AB, una cum angulo inclinationis BAF, & perpendicularo sectionis BC, invenire celeritates terminales, atque mediam, una cum axe Parabolæ celeritates mensurantis BL, & verticis L, ab initio canalisi A distantia,*

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Ex data longitudine canalisi inclinati AB & angulo inclinationis BAF, invenitur in triangulo ABF distantia fundi ab horizontali BF, & in

triangulo ABL ad B rectangulo (§. 188) distantia verticis Parabolæ ab initio canalıs AL, una cum axe Parabolæ BL (§. 36. *Trigon.*).

2. Subducta altitudine sectionis BC ab axe Parabolæ BL modo invento, relinquitur CL. Unde datis abscissis LC & LB reperitur semiordinatarum CG & BH ratio (§. 402. *Anal. fin.*); quæ cum celeritates terminales exprimant, tandem quoque
3. Celeritatis mediæ ad illas ratio inveniri potest (§. 238.).

#### AXIOMA I.

241. *Eadem vi, uno eodemque momento, duplex motus produci nequit.*

Ponamus vim totam A impendi in accelerando motu corporis B, fieri non poterit, ut eodem tempore impendatur in accelerandum motum corporis C. Nempe si simul agat in B & C, pro parte una in B, pro altera autem in C agit. Alias effectus foret vi major: quod merito absurdum habetur.

#### SCHOLIION.

242. *Veritas hujus axiomatis per experimenta Hydrostatica confirmatur. Etenim corpus grave in fluido specificè leviori descendit excessu ponderis sui supra pondus fluidi mole aqualis (§. 88. Hydrost.); quod vim gravitatis reliquam impendat in pressionem fluidi motui resistentis (§. 114. Hydrost.) experimentorum consensu. Vis igitur, qua fluidum subiectum premitur, non simul impenditur in descensum; nec vis, qua motus descendens acceleratur, una impenditur ad premendum aquam subiectam.*

#### THEOREMA XXXVII.

243. *Aquæ per canalem declivem ruentis celeritas non augetur ob pressionem, quam inferior à superiori sustinet.*

#### DEMONSTRATIO.

Ponamus celeritatem aquæ per canalem declivem ruentis augeri ob pressionem, quam inferior à superiori sustinet, ita ut inferior celerior moveatur, quam vi descensus per declive acquisivit (§. 284. *Mechan.*). Quoniam motus per declive descendens acceleratur gravitate respectiva, pars vero reliqua in actionem in fundum impenditur declivem (§. 261. *Mech.*); aut vis illa, qua agitur in planum inclinatum, simul impendi deberet ad descensum, aut vis, qua acceleratur motus descendens, simul impendenda esset pressioni aquæ subiectæ. Quicquid horum accidat, eadem vis eodem tempore in duplicem effectum impendi debet, seu duplex motus eadem vi eodem tempore producitur: id quod absurdum (§. 241). *Q. e. d.*

#### SCHOLIION I.

244. *Alii ita adstruunt veritatem propositionis præsentis. Si aqua in B omnem VIII. habet celeritatem, quam descensu per planum Fig. inclinatum AB, acquisivit, ea est, quam ca- 79. dendo perpendiculariter ab eodem termino A ad eandem horizontalem DB, nempe per altitudinem AD vel BF acquisivisset (§. 303. Mech.). Ponamus jam aquæ B motum quoque accelerari ob altitudinem incumbentis superioris: erit ergo major celeritas, quam perpendiculariter cadendo acquirere poterat. Sed hoc absurdum existimant, cum fluxus aquæ sit effectus gravitatis, quæ in descensum*

sum perpendiculararem tota insumitur. Sed evidentia hujus demonstrationis pendet ab axiomate nostro. Tacite enim supponitur in descensu perpendiculari nullum esse effectum aquæ superioris in inferiorem, sed quamlibet aquæ guttam ita accelerari, ac si sola descenderet in medio non resistente. Id vero recte supponi, ex eo intelligitur, quod vis, quæ ad accelerandum motum guttæ superioris impenditur, non una impendi possit in pressionem, qua inferioris guttæ acceleratur motus: quemadmodum fit, ubi aqua superior vel quiescit, vel lente admodum descendit inferioris motu per foramen accelerato. Hic enim vis, quæ ad motum per pressionem accelerandum impenditur, non una consumitur in descensu prementis.

SCHOLION II.

245. Hinc & aqua in fundo fluminum tardius moveriprehenditur, quam in superficie, propterea quod motus ob declivitatem plerumque non differat in superficie & in fundo; major vero cum ibidem sit resistentia, quam prope superficiem, magis quoque retardetur.

SCHOLION III.

246. Inprimis autem notandum est, quod MARIOTTUS (a) annotavit aquam in alveo naturali fluminis ob eam, quam patitur, resistentiam (§. 207) brevi temporis spatio acquirere celeritatem non augendam, quamdiu eadem manet declivitas. Unde porro infert, si declivitas alvei imminuatur, celeritatem denuo successive, sed brevi temporis spatio imminui, ut per istam alvei partem lentius fluat aqua, quam per anteriorem. Et eodem modo intelligitur, quomodo in eodem alveo naturali motus fluminis accelerari possit, ut in sequente alvei parte aqua celerius fluat, quam in anteriore. Atque hinc porro intelligitur, cur in diversis alvei naturalis partibus diversa sit aquæ fluentis celeritas.

(a) Traité du mouvement des Eaux, part. 4. disc. 4. p. 430. Oper.

SCHOLION IV.

247. Nulla in hoc difficultas posita est, quod manente eadem declivitate fundi motus evadat celerior flumine coarctato, ut minor evadat ejus latitudo (§. 221), experientia suffragante (§. 224). Etenim tum initium canalis ob altitudinem aquæ auctam cui pars alvei naturalis respondet, è longinquiori intervallo petendum. Initium canalis inclinati A Tab. ibi statuitur, ubi planum inclinatum ejusdem BA concurrat cum superficie aquæ AC, Fig. quemadmodum ex demonstrationibus anterioribus intelligitur, ut determinari possit descensus perpendicularis EC aquæ in superficie. Etenim aqua in C dici nequit descendisse intervallo EC, nisi aliquo tempore fuerit in A. Sed idem mox ostendemus apertius (§. 249).

SCHOLION V.

248. Ceterum hinc intelligitur in motu fluminum plerumque assumi posse aquam perpendicularum sectionis eadem celeritate moveri; non tamen assumere licet, quod per totam sectionem eadem celeritate moveatur, propterea quod juxta ripas motus ob majorem resistentiam tardius esse soleat quam in medio. Quodsi istiusmodi canales inclinati, quales in Theorematis antecedentibus supponimus, essent in Theorematis naturalibus, eadem quoque ad hos alveos transferre liceret sine ulla immutatione.

THEOREMA XXXVIII.

249. Si in canale inclinato AB sec- Tab. tio BC obstruatur, ut aqua nonnisi VIII. per partem BI fluere possit, aqua in Fig. tumescet & ad statum manentem re- So. ducta celerius fluat per sectionem BI, quam ante, initio canalıs G ultra priorem A promotō.

## DEMONSTRATIO.

Etenim dum Sectio BC ex parte obstruitur, per partem residuam apertam BI pristina aquæ quantitas eadem celeritate fluere eodem tempore nequit, quo fluxerat per integram BC (§. 211). Quoniam tamen aquæ eadem quantitas affluit, quæ ad sectionem BC nondum obstruam ferebatur; necesse est aliquid ejus continuo remanere adeoque altitudinem fieri majorem, consequenter aqua intumescit (§. 199). *Quod erat primum.*

Enimvero quando ad statum manentem reducitur, non amplius intumescit (§. 197), adeoque per sectionem minorem BI eodem tempore eadem aquæ quantitas fluit, quæ ante fluxerat per totam BC. Necesse igitur est ut fluat celerius (§. 215). *Quod erat secundum.*

Jam dum aquæ superficies AC attollitur in OG *vi num. I* evidens est, quod ea canalem BA non amplius in A, sed in G secet. Initium adeo canalus G ultra terminum pristinum A promovetur. *Quod erat tertium.*

## COROLLARIUM I.

250 Quoniam ibi vertex Parabolæ FKE, ubi sectionis perpendicularum BI productum horizontalem GF per initium canalus declivis AB secat, & semiordinatæ BE & IK exponentes celeritatem in punctis B & I majores sunt rectis BD & IL, quæ ante intumescentiam aquæ seu obstructionem sectionis eadem in iisdem punctis exponentant (§. 249); Parabola FKE metitur celeritates in perpendicularo IB & majoris amplitudinis est, quam altera HLD quæ metitur velocitates in perpendicularo majoris sectionis BC.

## COROLLARIUM II.

251. Quodsi impedimentum, quo obstruitur sectio, fuerit minor IO, veluti IN; aqua ad O usque intumescere nequit adeoque per NO supra impedimentum effluit.

## COROLLARIUM III.

252. Celeritas aucta aquæ per sectionem minorem fluentis BI in B ea est, quam cadendo per altitudinem BM acquirere poterat, & celeritas pristina in B ea erat, quam cadendo per altitudinem BN acquisivisset (§. 303. *Mech.*). Quare cum celeritates per BN & BM acquisitæ sint in ratione subduplicata rectarum BN & BM (§. 87. *Mech.*); erit celeritas aucta in B, ad celeritatem pristinam; ut radix rectæ BN, ad radicem alterius BM.

## THEOREMA XXXIX.

235. *Aqua per sectionem canalus horizontalis eodem modo fluit, qua fluit ex vase pleno cujus eadem, qua sectionis altitudo.*

## DEMONSTRATIO.

Etenim in tubo horizontali, cum nulla sit declivitas, aqua non fluit nisi quatenus sustinet pressionem inferior à superiori. Ex vase aqua pleno per foramen similiter fluit aqua vi pressionis ejusdem; quod utrumque per se manifestum est. Quodsi ergo lumen vasis sit sectioni canalus æquale ac simile, & altitudo fluidi utrobique eadem sit; cum motus totus pendeat ab altitudine fluidi prementis, nulla adest diversitatis ratio. Quamobrem aqua per sectionem canalus horizontalis eodem modo fluere debet, quo fluit ex vase pleno, cujus eadem quæ sectionis altitudo. *Q. e. d.*

SCHOLIION. I.

254. Sane si canalem horizontalem tegas quodam operimento, convenit is cum vase pleno, cujus eadem quæ sectionis altitudo. Equis vero non videt experimentum nihil facere ad motum aquæ, cum eadem maneat fluidi altitudo, quæ ante: consequenter pressio ab eadem pendens nullo modo varietur.

COROLLARIUM I.

Tab. VIII. Fig. 81. 255. In sectionis adeo perpendicularo BC canalís horizontalis AB quodlibet punctum, D, E, vel B eandem celeritatem habet, quam acquireret per altitudinem aquæ incumbentis; nimirum aqua in B habet celeritatem, quam acquisivisset cadendo per altitudinem BC; aqua in E celeritatem habet quam cadendo per altitudinem EC acquisivisset, & similiter aqua in D celeritatem habet, quæ cadendo per altitudinem BD acquiritur.

COROLLARIUM II.

256. Erunt igitur celeritatum in B, E & D quadrata ut rectæ BC, EC, DC, (§. 86. *Mechan.*), seu celeritates ipsæ in ratione subduplicata earundem rectarum BC, EC, DC (§. 87. *Mechan.*).

COROLLARIUM III.

257. Quare si circa altitudinem sectionis BC describatur Parabola CFGH, exponent semiordinatæ BH, EG & DF celeritates aquæ per perpendicularum BC fluentis in punctis B, E, D, C (§. præc. & §. 402. *Anal. fin.*).

COROLLARIUM IV.

258. Quodsi ergo celeritas BH in partibus perpendiculari sectionis BC determinetur; spatium parabolicum BCH quantitatem aquæ exhibet, quæ eodem tempore per sectionem fluit, quo aqua per B fluens describit spatium BH; id quod eodem modo patet, quo supra idem in canale inclinato evicimus (§. 234).

COROLLARIUM V.

259. Quantitas igitur aquæ fluentis per  
*Wolffii Oper. Mathem. Tom. II.*

perpendicularum BC eo tempore, quo aqua per B fluens ex B in H progreditur, est æqualis rectangulo ex BH in duas tertias partes altitudinis sectionis BC, vel ex BC in  $\frac{2}{3}$  BH (§. 104 *Anal. infn.*), consequenter in ratione composita ex ratione celeritatis maximæ & duarum altitudinis partium.

SCHOLIION II.

260. Hinc jam porro eodem, quo supra, modo determinantur alia fluxum aquæ in canali horizontali concernentia.

SCHOLIION III.

261. Resistentias, quas patitur cursus fluminis, cum ab obstaculis accidentalibus pendeant, ad regulam quandam generalem revocare minime licuit.

SCHOLIION IV.

262. Ceterum quæ de motu aquarum per canales horizontales dicta sunt ad fluxum quoque aquarum per lumina vasorum lateribus insculpta applicari possunt atque solent (§. 48).

THEOREMA XL.

263. Si aqua per canalem horizontalem fluit, celeritas media est ad maximam, ut 2 ad 3.

DEMONSTRATIO.

Aquæ enim quantitas est ut  $\frac{2}{3}$  BH.BC (Tab. VIII. Fig. 81. §. 259). Quare cum rectangulum BCMI exprimat quantitatem aquæ per sectionis perpendicularum fluentis, si BI =  $\frac{2}{3}$  BH (§. 375. *Geom.*); eadem adhuc aquæ quantitas per idem fluere debet, si per singula puncta eadem celeritate BI moveatur. Est igitur BI celeritas media (§. 208). Enimvero BI =  $\frac{2}{3}$  BH per demonstrata. Ergo BI: BH =  $\frac{2}{3}$ : 1 = 2:3 (§. 178. *Arithm.*).  
Q. e. d.

## COROLLARIUM I.

264. Quoniam aucta altitudine sectionis BC, augetur celeritas maxima BH (§. 256); aucta altitudine sectionis augetur quoque celeritas media (§. 263).

## COROLLARIUM II.

265. Similiter quia imminuta altitudine sectionis BC, imminuitur celeritas maxima BH (§. 256); imminuta altitudine sectionis imminuitur celeritas media (§. 263).

## COROLLARIUM III.

266. Si ex semiordinata maxima Parabolæ celeritates aquæ per sectionem canalis horizontalis fluentis BH refecetur BI =  $\frac{2}{3}$  BH & super BI construatur rectangulum CBIM, cujus latus IM Parabolam in K secat; demisso ex K in altitudinem BC perpendiculari KL; erit in L locus celeritatis mediæ.

## COROLLARIUM IV.

267. Quod si jam porro inferatur, ut quadratum spatii EH quod aqua celeritate maxima fluens dato tempore emittitur, ad quadratum spatii LK quod celeritate media describit eodem tempore; ita altitudo sectionis BC, ad numerum quartum proportionalem; exprimet is profunditatem CL puncti L, per quod aqua celeritate media fluit, infra superficiem aquæ LC (§. 402. *Anal. fn.*).

## SCHOLION.

268. *Punctum istud à nonnullis Centrum velocitatis appellari solet, quia velocitas ipsæ conveniens in locum omnium velocitatum inæqualium assumi potest.*

## CAPUT VII.

*De Percussione Fluidorum.*

## DEFINITIO XVI.

269. **P**ercussio fluidi est actio, qua fluidum aliquod in aliud corpus sive fluidum, sive solidum impingens in idem agit. Quando directe, quando indirecte impingat, dictum est alias (§. 523. 526. *Mechan.*).

## COROLLARIUM I.

270. Quoniam percussio dato aliquo tempore absolvitur, fluida vero impingentia in continuo motu sunt; tota illa quantitas impingit, adeoque corpus percudit (§. 270), quæ tempore isto affluit, ac ideo percussio fluidorum successiva est.

## SCHOLION.

271. *Fluida nempe consideranda veniunt instar multitudinis globulorum quorum diversæ series sibi mutuo succedentes in corpus, quod percuitur, impingunt. Ut adeo appareat pro diversa densitate variari globulorum simul incumbentium, pro diversa celeritate serierum sibi invicem succedentium numerum.*

## COROLLARIUM II.

272. Quoniam plus massæ simul impingit, si fluidum fuerit densius, quam si fuerit rarius, plus autem massæ in densiore sub eodem volumine contineatur, quam in rariore (§. 8. 10. *Hydrost.*); in percussione fluidorum habenda est ratio densita-

densitatis fluidi, seu cæteris paribus major fit percussio a fluido densiori, quam a rariori.

COROLLARIUM III.

273. Quoniam dato tempore quo percussio successiva absolvitur, plus massæ in corpus percussum incurrit, si fluidum aliquod celerius, quam si tardius moveatur; in determinanda massa percutientis non solum densitatis, (§. 273, verum etiam celeritatis ratio habenda, seu, densitate existente eadem, major est massa percutientis si fluidum celerius moveatur, quam si tardius; massæ scilicet in ratione celeritatum sunt.

COROLLARIUM IV.

274. Quoniam vis qua fluidum in aliud corpus incurrens idem urget, e genere mortuarum est, utpote cujus actio non nisi in nisu quodam sese exerente consistit (§. 9. *Mechan.*), istiusmodi autem vires, massa existente eadem, in ratione celeritatum sunt (§. 250) in moleculis quoque simul incurrentibus major est vis percutiendi, si fluidum aliquod celerius movetur, quam si movetur tardius.

SCHOLION.

275. Patet adeo celeritatem fluidi bis spectandam esse in percussione: nimirum primo in determinanda massa multitudine, quæ agit in corpus percussum, & secundo in determinando gradu, quem vis a motu habet.

DEFINITIO XVII.

276. Si fluida in duo plana vel directe, vel sub eodem angulo obliquo incurrunr; eodem modo incurrere dicuntur.

SCHOLION.

277. Non tamen ideo eodem quoque modo plana percutiunt, quia in percussione spectatur potissimum vis percutientis, quæ non modo a directione impingentis, verum etiam a massa & celeritate pendet.

AXIOMA II.

278 *Si idem fluidum eadem celeritate eodem modo in plana equalia incurrit, eadem vi eadem percutit.* Nulla enim adest diversitatis ratio.

SCHOLION.

279. *Vis percutientis pendet a celeritate, massa & directione percutientis, nec non a plani percussi magnitudine. In hypothesi adeo axiomatis omnia eadem præsupponuntur, a quibus quantitas vis pendet, qua fit percussio. Ex generalibus adeo principiis Metaphysicis (§. 193. Ontol.) constat, vim percutiendi hoc in casu differre minime posse.*

THEOREMA XLI.

280. *Si idem fluidum eadem celeritate latum in plana inæqualia eodem modo incurrit, vires quibus percutiuntur, sunt in ratione planorum.*

DEMONSTRATIO.

Ponamus planum A esse duplum plani B: erit adeo pars dimidia illius huic toti æqualis (§. 142. *Arithm.*), five  $B = \frac{1}{2} A$ . Quoniam itaque B &  $\frac{1}{2} A$  eadem vi percutiuntur (278), atque eadem adeo vi utraque pars ipsius A percuti debet (§. 87. *Arithm.*); planum duplum A vi dupla percutitur; B vero simpla, hoc est, vires percutientes sunt in ratione dupla: consequenter in ratione planorum percussorum A & B. Idem cum eodem modo ostendatur, in quacunque alia planorum ratione; patet in genere esse vires, quibus plana percutiuntur ab eodem fluido eodem modo & celeritate eadem incurrente, in ratione planorum percussorum. *Q. e. d.*

## THEOREMA XLII.

281. *Si idem fluidum diversa celeritate, sed eodem modo, in plana equalia incurrit; vires quibus percutiuntur, sunt in ratione duplicata celeritatum.*

## DEMONSTRATIO.

Sint duo plana equalia A & B, ac in A incurrat aqua dupla celeritate ejus, qua in B incurrit; in A & B autem directe, vel oblique sub eodem angulo incurrat. Dico vires, quibus percutiuntur plana A & B, esse ut quadrata celeritatum, seu vim qua percutitur planum A esse quadruplo majorem ea qua percutitur planum B. Quoniam enim fluidum diversa celeritate in plana A & B incurrit *per hypoth.* massa percutientis planum A, est ad massam percutientis planum B; ut celeritas qua movetur fluidum in planum A incurrens, ad celeritatem qua movetur quod fertur in B (§. 273). Quamobrem fluida percutientia spectari possunt tanquam corpora inæqualis massæ. Enimvero si massæ inæquales sunt, vires sunt in ratione composita massarum & celeritatum (§. 523. *Mechan.*), adeoque in casu præsentis, ubi massæ sunt ut celeritates *per demonstrata*, in ratione duplicata celeritatum, veluti in casu speciali vis qua percutitur A, quadruplo major est ea qua percutitur planum B (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA XLIII.

282. *Si fluidum idem diversa celeritate in plana inæqualia eodem modo incurrit, vires quibus percutiuntur, sunt in ratione composita ex simplici planorum & duplicata celeritatum.*

## DEMONSTRATIO.

Incurrat fluidum quodcumque in plana quæcumque A & B celeritatibus quibuscumque C & c, dicanturque vires V & v. Incurrat idem fluidum in planum B celeritate C, dicaturque vis percutiens f. Quoniam fluidum in A & B eadem celeritate C incurrit; erit  $V : f = A : B$  (§. 280). Et si idem fluidum in planum B diversa celeritate C & c incurrit; erit in diversis istis percussionibus  $f : v = C^2 : c^2$  (§. 281). Habemus adeo  $fV : fv = A : B \cdot C^2 : B \cdot c^2$  (§. 213. *Arithm.*), consequenter  $V : v = A \cdot C^2 : B \cdot c^2$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, vires percutientes sunt in ratione composita ex simplici planorum A & B, atque duplicata celeritatum C<sup>2</sup> & c<sup>2</sup>. *Q. e. d.*

## THEOREMA XLIV.

283. *Si fluida diversa densitatis eadem celeritate in plana inæqualia eodem modo incurrant; vires percutientes sunt in ratione composita densitatum fluidorum atque planorum.*

## DEMONSTRATIO.

Incurrant duo fluida diversæ densitatis D & d in plana quæcumque A & B eadem celeritate, dicanturque vires percutientes f & v: erit  $f : v = D : d$  (§. 272). Incurrat jam fluidum densitatis D in planum aliud A, quod alteri B inæquale sit, dicaturque vis percutiens V; erit  $V : f = A : B$  (§. 280). Erit itaque  $fV : fv = A : B \cdot D : B \cdot d$  (§. 213. *Arithm.*), consequenter  $V : v = A \cdot D : B \cdot d$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, vires percutientes sunt in ratione composita planorum A & B, atque densitatum fluidorum D & d. *Q. e. d.*



THEOREMA XLV.

284. Si fluida diversæ densitatis, diversa celeritate, sed eodem modo, in plana inæqualia incurrant: vires percutientes sunt in ratione composita ex rationibus planorum percussorum, & densitatum fluidorum simplicibus, atque duplicata celeritatum.

DEMONSTRATIO.

Sint duo plana æqualia B & B, in quæ incurrat fluidum idem seu ejusdem densitatis  $d$  diversis celeritatibus  $C$  &  $c$ , dicanturque vires  $f$  &  $v$ : erit  $f:v = C^2:c^2$  (§. 281). Incurrant jam fluida diversæ densitatis  $D$  &  $d$  eadem celeritate  $c$  in plana inæqualia A & B, dicanturque vires percutientes  $V$  &  $f$ ; erit  $V:f = A.D. : B.d$  (§. 283). Habemus itaque  $fV : fv = A.D. C^2 : B.d.c^2$  (§. 213. *Arithm.*), consequenter  $V:v = A.D. C^2 : B.d.c^2$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, vires percutientes fluidorum diversæ densitatis in plana utcumque inæqualia celeritatibus quibuscumque incurrentium, sunt in ratione composita ex simplicibus planorum A & B, densitatum fluidorum  $D$  &  $d$ , atque duplicata celeritatum  $C^2$  &  $c^2$ . *Q. e. d.*

SCHOLION.

285. Habemus adeo mensuram virium directe planum aliquod percutientium: etenim si indirecte impingit fluidum aliquod in planum, tum variatio non una de causa accidit, et si Theoremata in comparandis viribus sub eodem angulo impingentibus locum habeant.

THEOREMA XLVI.

286. Si aqua per declivem AD lapsa directe incurrat in palmulam, rotæ

circa centrum C convertibilis; erit vis percutiens ut palmula ducta in radium EC, densitatem aquæ & altitudinem lapsus AB.

DEMONSTRATIO.

Etenim aquæ in palmulam irruentis vis percutiens absoluta est ut factum ex magnitudine palmulæ in densitatem aquæ & quadratum celeritatis, qua fluit (§. 274). Sed celeritas aquæ per declivem AD delapsæ est in ratione subduplicata altitudinis lapsus AB (§. 204), adeoque quadratum ejusdem ut ipsa hæc altitudo. Quare vis percutiens absoluta erit ut factum ex magnitudine palmulæ in densitatem aquæ & in altitudinem lapsus AB. Enimvero quia palmula circa centrum C convertibilis per *hypoth.* illa jam consideranda venit tanquam potentia ad axem in peritrochio applicata, cujus centrum motus in C, atque tum vis respectiva erit ut absoluta ducta in radium (§. 792. 153. *Mechan.*). Est igitur vis palmulam percutiens ut palmula ducta in densitatem aquæ, altitudinem lapsus AB & radium rotæ EC. *Q. e. d.*

SCHOLION.

287. Atque hinc patet modus ad mensuram revocandi vires percutientes aquarum: rotas molares agitantium easque inter se conferendi: quod ut evidentiùs pateat, sequentia adjicere lubet Corollaria.

COROLLARIUM I.

288. Sint radii rotarum R & r; palmulæ P & p, altitudines lapsus A & a; cum densitatis, quæ eadem hic supponitur, in comparandis viribus percutientibus non habenda sit ratio (§. 181. *Arithm.*); erunt vires percutientes V & v ut R. P. A : r. p. a (§. 286).

## COROLLARIUM II.

289. Quodsi ponamus palmulas rotarum esse æquales, erit  $P = p$ , adeoque  $V : v = R : r$ ,  $A : a$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est, vires percutientes æquales palmulas rotarum inæqualium sunt in ratione composita radiorum rotarum & altitudinum lapsus.

## COROLLARIUM III.

290. Quodsi ulterius fuerit  $R = r$ , hoc est, si rotæ fuerint æquales; erit  $V : v = A : a$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est vires aquarum rotas molares æquales percutientium sunt in ratione altitudinum lapsus.

## COROLLARIUM IV.

291. Si fuerit  $R = r$ , hoc est, si altitudines rotarum fuerint æquales, palmulæ vero inæquales; erit  $V : v = P : p$ ,  $A : a$ , hoc est, vires, quibus palmulæ percutiuntur, sunt in ratione composita palmularum & altitudinum lapsus.

## COROLLARIUM V.

292. Quodsi fuerit  $A = a$ , hoc est, si aqua per æquales declivitates feratur in rotas inæquales; erit  $V : v = R : r$ ,  $P : p$ , hoc est, vires percutientes sunt in ratione composita palmularum & radiorum rotarum.

## COROLLARIUM VI.

293. Quodsi præterea  $R = r$ ; erit  $V : v = P : p$ , hoc est, si rotæ fuerint æque altæ & aqua per eandem declivitatem in palmulas irruat; vires percutientes sunt in ratione palmularum.

## COROLLARIUM VII.

194. Si vero fuerit, præter  $A = a$ , etiam  $P = p$ ; erit  $V : v = R : r$ , hoc est, si aqua per eandem declivitatem irruit in rotas, quæ palmulas æquales habent; erunt vires percutientes in ratione radiorum rotarum.

## COROLLARIUM VIII.

295. Si ponatur  $V = v$ , erit etiam  $R : P = r : p$ ,  $A : a$  (§. 288), adeoque  $A : a = r : p$ ,  $R : P$  (§. 299. *Arithm.*), hoc est, si altitudines lapsus aquarum in rotas irruentium fuerint in ratione composita reciproca palmularum & radiorum seu altitudi-

num rotarum; vires percutientes æquales sunt, & contra.

## COROLLARIUM IX.

296. Quodsi præterea fuerit  $r = R$ ; erit:  $A : a = p : P$  (§. 181. *Arithm.*), hoc est si aqua incidit in rotas æque altas per declivitates, quarum altitudines rationem palmularum reciprocam habent; vires percutientes æquales sunt; & contra si rotæ æqualis altitudinis æqualiter percuti debent ab aquis directe impingentibus, aquæ delabi debent per altitudines palmulis reciproce proportionales.

## COROLLARIUM X.

292. Si vero fuerit  $P = p$ ; erit  $A : a = r : R$ , hoc est, si aqua directe impingens in palmulas æquales rotarum inæqualis altitudinis labatur per altitudines radiis rotarum reciproce proportionales, æquali vi percutiuntur; & contra si rotæ palmulas æquales habentes ab aqua æquali vi percuti debent, delabi debent per altitudines radiis reciproce proportionales,

## COROLLARIUM XI.

298. Si denique fuerit  $A = a$ ; erit  $r : p = R : P$  (§. 293), adeoque  $R : r = p : P$  (§. 299. *Arithm.*), hoc est, aqua per eandem declivitatem delapsa æquali vi percutit palmulas rotarum, quæ sunt in ratione reciproca radiorum seu altitudinum earundem.

## COROLLARIUM XII.

299. Cum palmulæ figuram parallelogrammi habeant, adeoque, si ejusdem fuerint latitudinis, longitudinis rationem habeant (§. 389. *Geom.*); in eodem alveo declivi rotæ molares eadem vi agitantur, seu duæ rotæ sibi mutuo æquipollent, si habeant longitudines palmularum radiis rotarum reciproce proportionales.

## SCHOLIUM.

300. *Hinc videmus in fluminibus admodum latis construi rotas molares, quæ exiguæ sunt altitudinis, sed magnæ longitudinis, latitudine defectum altitudinis compensante.*

THEOREMA XLVII.

301. Si plana per fluida diverse densitatis celeritatibus quibuscunque ferantur; resistentiæ quas experiuntur, sunt in ratione composita ex rationibus planorum, & densitatum fluidorum simpla, & celeritatum duplicata.

DEMONSTRATIO.

Etenim fluidum quiescens eadem vi resistit plano per ipsum lato, qua impingeret in idem planum, si ipsum quiesceret & fluidum moveretur ea celeritate qua planum fertur, eadem in utroque casu supposita directione: id quod per se manifestum assumitur. Jam vero vires, quibus plana percutiuntur quiescentia à fluidis directe impingentibus, sunt in ratione composita densitatum & planorum simpla atque celeritatum duplicata (§. 284). Ergo etiam vires, quibus fluida directe resistunt planis per ea latis, sunt in ratione composita densitatum fluidorum, ac ipsorummet planorum simpla, & celeritatum quibus per eadem feruntur duplicata. Q. e. d.

COROLLARIUM I.

302. Quodsi ergo plana ferantur per idem fluidum, veluti per aquam, densitate existente eadem; vires quibus ipsis resistitur, sunt in ratione simplici planorum & duplicata celeritatum quibus ea per fluidum feruntur (§. 181. Arithm.),

COROLLARIUM II.

303. Quodsi porro plana fuerint æqualia; resistentiæ, quas patiuntur, erunt ut quadrata celeritatum.

COROLLARIUM III.

304. Si vero celeritates fuerint æquales; vires, quibus planis resistitur, erunt in ratione planorum.

DEFINITIO XVIII.

305. Celeritatem absolutam appellamus, qua fluidum fertur & directe impingit in planum; Respectiveam vero, qua fluidum impingit in planum indirecte.

SCHOLIUM.

306. Ponamus fluidum ferri celeritate ut Tab: AC, sed oblique incurrere in planum AB VIII. sub angulo incidentiæ BAC; celeritas illa respectiva dicitur, quæ in impactu directo æquipollente eidem substituenda venit. Fig. 83.

THEOREMA XLVIII.

307. Si fluidum indirecte impingit in rectam AB juxta lineas parallelas AC & DB: celeritas absoluta, est ad respectiveam; ut sinus totus, ad sinum anguli incidentiæ.

DEMONSTRATIO.

Exponat recta AC celeritatem absolutam, & ex C demittatur perpendicularis CF; celeritas per AC resolvitur in laterales CF & AF eidem simul æquipollentes (§. 245. Mechan.). Quoniam vero fluidum oblique impingens in AB in rectam hanc non agit secundum directionem AF, sed tantummodo secundum perpendicularem CF, juxta quam fluidi motui resistit; evidens est celeritatem respectivam exprimi per rectam CF (§. 305). Quodsi AC sinatur pro sinu toto, erit CF sinus anguli incidentiæ CAF (§. 2. Trigon.). Quare cum sit celeritas absoluta, ad respectivam; ut AC, ad CF per demonstrata; erit illa quoque, ad hanc; ut sinus totus, ad sinum anguli incidentiæ (§. 156. Arithm.). Q. e. d.

THEO.

## THEOREMA XLIX.

Tab. VIII. Fig. 83. 308. *Si fluidum indirecte impingit in rectam AB juxta lineas parallelas CA & BD: massa ejus, qua percussio indirecta fit, est ad massam qua eadem linea directe ab eodem fluido eadem celeritate lato percuteretur, ut sinus anguli incidentiæ, ad sinum totum.*

## DEMONSTRATIO.

Ducatur BE ad AC perpendicularis: evidens est eodem tempore non majorem fluidi quantitatem deferri ad rectam AB, quam ad rectam BE, consequenter si BD exponat celeritatem fluidi qua fertur, veluti spatium quod decurrit fluidum isto tempusculo, quo absolvitur percussio; erit quantitas seu massa fluidi, quæ defertur ad AB juxta directiones obliquas, ad massam quæ ad eandem juxta directionem perpendiculararem afflueret, ut BE.BD, ad AB.BD, consequenter ut BE, ad AB (§. 181. *Arithm.*). Jam si AB sumatur pro sinu toto, erit BE sinus anguli incidentiæ EAB (§. B. *Trig.*). Est igitur BE ad AB, consequenter massa fluidi qua percussio indirecta fit, ad massam qua eadem linea AB ab eodem fluido directe percuteretur; ut sinus anguli incidentiæ, ad sinum totum (§. 156. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA L.

Tab. VIII. Fig. 83. 309. *Si fluidum aliquod in rectam AB indirecte impingit, vis qua indirecte percutitur, est ad eam qua eadem recta AB ab eodem fluido CABD juxta directiones ipsi perpendiculares affluente percuteretur, in ratione duplicata sinus anguli incidentiæ, ad sinum totum.*

## DEMONSTRATIO.

Etenim vires, quibus recta AB directe vel indirecte percutitur, sunt in ratione composita massarum & celeritatum (§. 278. *Mech.*), scilicet vis directa, est ad indirectam; ut massa quæ in percussione directa ad rectam AB defertur, ad massam quæ ad eandem in indirecta affluit, & ut celeritas absoluta, ad respectivam. Enimvero & massa in percussione directa, est ad massam in indirecta; & celeritas absoluta, ad respectivam; ut sinus totus, ad sinum anguli incidentiæ (§. 308. 209). Est igitur vis percutiens directa, ad indirectam; in ratione duplicata sinus totius, ad sinum anguli incidentiæ (§. 159. *Arithm.*). *Q. e. d.*

## THEOREMA LI.

310. *Si fluidum oblique impingat in rectam AB juxta directiones parallelas AC & BD in ipsam delatum, & ex B demittatur perpendicularis BE in AC, ex E vero denuo demittatur EG ad AB perpendicularis; vis qua fluidum urget directe rectam AB, est ad vim qua eam urget indirecte; ut tota AB, ad segmentum ejus BG.*

## DEMONSTRATIO.

Est enim  $AB:BE=BE:BG$  (§. 330. *Geom.*) & AB, ad BE; ut sinus totus, ad sinum anguli incidentiæ BAC (§. 2. *Trigon.*) consequenter BG est tertia proportionalis ad sinum totum & sinum anguli incidentiæ. Habet igitur AB ad BG rationem duplicatam sinus totius ad sinum anguli incidentiæ (§. 216. *Arithm.*). Quare cum sit vis qua percutitur recta AB directe, ad eam qua indirecte percutitur, in ratione duplicata sinus totius ad

ad finem anguli incidentiæ (§. 309); erit etiam illa ad hanc, ut tota recta AB ad segmentum ejus GB (§. 156. *Arithm.*).  
*Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

311. Quoniam  $AB > GB$  (§. 84. *Arithm.*); vis quoque, qua recta AB à fluido directe percutitur, est ea, qua indirecte percutitur, major.

COROLLARIUM II.

312. Quodsi angulus incidentiæ fuerit IAB, rectæ AB segmentum vi indirectæ respondens erit BK (§. 310). Quare cum sit, sub angulo incidentiæ CAB, vis directa ad indirectam, ut AB ad GB &, sub angulo incidentiæ minore HAB, ut AB ad KB (§. *cit.*); vis directa ad indirectam, sub angulo incidentiæ majore, minorem rationem habet quam sub minore (§. 205. *Arithm.*): consequenter vis indirecta, sub angulo incidentiæ minore, minor est, quam sub majore (§. 206. *Arithm.*): unde crescente angulo incidentiæ etiam vis percussionis decrescit, atque directione AC coincidente cum AB, hoc est, si fluidum juxta directionem AB movetur, percussio nulla est.

COROLLARIUM III.

313. Quoniam vis directa sub angulo incidentiæ CAB, est ad indirectam; ut AB ad GB: sub angulo vero incidentiæ HAB, ut AB ad KB (§. 310); vires indirectæ, sub diversis angulis incidentiæ, eandem rectam AB percipientes sunt inter se ut rectæ GB & KB (§. 196. *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

314. Quodsi fluidum feratur celeritate V, vis directa, qua percutitur recta AB, exponitur per  $V^2 \cdot AB$  (§. 282). Quare cum sit vis directa ad indirectam, ut AB ad GB, angulo incidentiæ existente CAB (§. 309); reperietur vis indirecta  $\frac{V^2 \cdot AB \cdot GB}{AB} = V^2 \cdot GB$ , adeoque vis indirecta exponi-

tur per  $V^2 \cdot GB$ , angulo incidentiæ existente CAB.

PROBLEMA XL.

315. *Determinare vim, quam ventus indirecte impingens in alas molendini exerit ad eas convertendas.*

Tab. VIII. Fig. 84.

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

Repræsentet recta IO axem atque planum ADCB alam, iu quam ventus secundum directiones obliquas KA & HB agit. Ala axem, cui perpendiculariter insitit, secet ad angulum obliquum AEI (§. 929. *Mech.*). Quoniam itaque ventus secundum directionem obliquam IE in planum AC circa axem IE convertendum agit *per hypoth.* ideo investiganda est vis, quam ventus ad planum ADCB circa axem IE convertendum adhibet, dato angulo obliquitatis AEI, magnitudine alæ ADCB, ejus latitudine AB & celeritate, qua aër movetur.

1. Ducatur AG ad HB perpendicularis: cum aër secundum directiones parallelas KA & HB deferatur ad rectam AB, non plus aëris ferit planum obliquum ad axem ADCB, cujus latitudo AB, quam planum æque altum axem ad angulos rectos secans, cujus latitudo AG. Exponit igitur recta AG quantitatem aëris planum simul ferientis. Jam porro exponat EL celeritatem, qua movetur aër, cujus densitas sit  $= d$ ; erit massa aëris, qua percussio absolvitur in puncto E, ut AG ducta in densitatem, ac porro in LE.
2. Demittatur ex L recta LM ad AB perpendicularis: evidens est perpendicularem LM exponere celeritatem

D d d

ref-

respectivam, qua ventus in planum secundum directionem obliquam in E incurrens agit (§. 245. *Mech.*).

3. Quoniam vero ventus planum ADCB movere nequit nisi circa axem IE, circa quem convertendum: non omnem vim, quam habet à celeritate respectiva LM, in actionem suam impendit. Demittatur ergo perpendicularis MN ex puncto M in axem IE; evidens est celeritatem LM resolvi in duas alias LN & MN & eam, quæ est secundum directionem MN tantummodo proficere ad axem convertendum.
4. Denique cum in P sit centrum magnitudinis, idemque centrum gravitatis (§. 245. *Mechan.*), adeoque massæ totius plani ADCB; patet vim, quam ventus adhibet ad planum ADCB circa axem IE convertendum, concipi posse tanquam applicatam ad punctum P, & PE tanquam radium Axis in peritrochio, cujus centrum E. Unde liquet vim, quam adhibet ventus, exprimi per *d. AG. LE. MN. EP* (§. 153. *Mech.*). *Q. e. i.*

PROBLEMA XLI.

316. *Determinare situm alarum mollandini vi venti indirecte impingentis agitati, in quo ventus vim maximam adhibet adeas convertendas, seu eas maxima celeritate convertit.*

RESOLUTIO.

Tab. VIII. Fig. 84. I. Sint omnia ut in Problemate præcedente, dicaturque  $AB = a$ ,  $LE = b$ ,  $EP = c$ , densitas aëris  $= m$ ,  $GB = x$ ; erit, ob  $AE = EB = \frac{1}{2} a$  per *hypothesis*.

& IE rectæ HB parallelam,  $EO = \frac{1}{2} GB = \frac{1}{2} x$  (§. 268. *Geom.*), &  $AG = \sqrt{(a^2 - x^2)}$  (§. 417. *Geom.*).

2. Quoniam in  $\triangle\triangle AGB$  &  $LME$  anguli ad G & M recti per *constr.* &  $MEL = ABG$  (§. 255. *Geom.*); erit (§. 267. *Geom.*).

$$AB : AG = LE : LM$$

$$a : \sqrt{(a^2 - x^2)} = b : \frac{b \sqrt{(a^2 - x^2)}}{a}$$

3. Similiter quia in  $\triangle\triangle AEO$  &  $LMN$  anguli ad O & N recti per *constr.* & ob rectum LME per *constr.* & obliquum L  $\triangle\triangle LMN$  & LME communem, angulus  $LMN = AEO$  (§. 246 *Geom.*); erit (§. 267. *Geom.*).

$$AE : EO = LM : MN$$

$$\frac{1}{2} a : \frac{1}{2} x = \frac{b \sqrt{(a^2 - x^2)}}{a} : \frac{bx}{a} \sqrt{(a^2 - x^2)}$$

4. Quoniam vis, quam ventus adhibet ad planum ADCB circa axem IE convertendum, est ut *m. AG. LE. MN. EP* (§. 315); erit ea

$$= bm \sqrt{(a^2 - x^2)} \frac{bcx}{a^2} \sqrt{(a^2 - x^2)}$$

$$= b^2 cmx - \frac{b^2 cmx^3}{a^2}$$

5. Habemus itaque (§. 63. *Analys. infn.*)

$$b^2 cm dx - \frac{3b^2 cm x^2 dx}{a^2} = 0$$

$$I - \frac{3x^2}{a^2} = 0$$

$$a^2 = 3x^2$$

$$\sqrt{\frac{1}{3} a^2} = x$$

6. Quodsi jam  $a$  sumatur pro sinu toto, erit  $\sqrt{\frac{1}{2} a^2}$  sinus anguli GAB (§. 2. *Trigon.*), cujus complementum ad rectum est angulus AEI sub quo planum ADCB axem EI fecat. Sit itaque  $a = 10000000$ , erit  $\frac{1}{2} a^2 = 33333333333333$ , adeoque  $x = 5773502$ , cui in tabulis finuum quam proxime respondent  $35^\circ 16'$ . Est itaque angulus GAB  $35^\circ 16'$ , consequenter AEI, qui quaeritur,  $54^\circ 44'$ .

SCHOLIION I.

317. *Cum de constructione molendinorum vi venti agitandorum ageremus (§. 929. Mechan.); angulum IEA  $54^\circ$  graduum fieri praecepimus appendicem minorum negligentes: in praesente nimirum negotio parum refert, sive is fiat  $54^\circ$ , sive  $55^\circ$ . Vulgo faciunt  $45^\circ$ , sed nulla Theoria nixi.*

SCHOLIION II.

318. *Quoniam resistentia, quam patitur corpus intra fluidum motum, aequipollet percussioni eadem celeritate, qua ipsum movetur, a fluido facta; non absimili modo determinari potest optimus situs gubernaculi, cujus ope naves in aqua convertuntur. Et enim hic quoque angulus obliquitatis idem deprehenditur, qui ante,  $54^\circ 44'$ .*

PROBLEMA XLV.

319. *Datis radio basis majoris AE, & altitudine segmenti conici EF, invenire altitudinem conii, cujus segmentum ACDB ita per fluidum motum, ut basis minor eidem occurrat & axis EF sit ad sectionem fluidi perpendicularis, seu horizonti parallelus, minimam patiatur resistentiam.*

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

I. Quoniam perinde est, sive aqua in frustum conicum ACDB quiescens

impingat, sive ipsum in fluido quiescente moveatur; ponamus aquam in quiescens impingere juxta rectas EG & HI. Impinget ergo in basin CD directe, in superficiem indirecte (§. 269), eodem semper manente angulo incidentiae HCG vel ACI (§. 156. *Geom.*), quod directiones rectae IH constanter parallelae rectam AC in quocunque puncto sub eodem angulo secent (§. 255. *Geom.*). Quodsi jam AC sumatur pro sinu toto, erit AI sinus anguli incidentiae ACI (§. 2. *Trigon.*). Sit  $EF = IC = a$ ,  $AE = b$ ,  $AI = x$ ; erit  $AC = \sqrt{(a^2 + x^2)}$  (§. 417. *Geom.*). Enimvero cum sinus totus quantitas constans esse debeat, sumatur FE vel IC pro sinu toto: erit itaque ut AC, ad AI; ita IC, ad sinum anguli incidentiae, qui adeo reperitur  $ax : \sqrt{(a^2 + x^2)}$ .

2. Porro patet in rectam AC non plus aquae impingere, quam ad rectam CL ipsi AI aequalem deferretur, adeoque ad totam superficiem non plus aquae allabi, quam quae annulum, cujus AI latitudo est, directe percuteret. Percussiones directae in eodem fluido eadem celeritate lato sunt ut plana quae percutiuntur (§. 280), adeoque annulus exponit percussio-nem directam ipsius, & circulus minor CD percussio-nem quam ipse patitur directam. Et quoniam hic tantummodo attenditur ratio percussio-num, circuli autem sunt ut quadrata radiorum (§. 409. *Geom.*); resistentia directa, quam patitur circulus minor CD, recte exponitur per

Tab. VIII. Fig. 85.

CF<sup>2</sup> five IE<sup>2</sup> = b<sup>2</sup> - 2bx + x<sup>2</sup> & resistentia annuli per AE<sup>2</sup> - EI<sup>2</sup> = 2bx - x<sup>2</sup>.

3. Quodsi jam infertur: ut quadratum sinus totius a<sup>2</sup>, ad quadratum sinus anguli incidentiæ a<sup>2</sup>x<sup>2</sup>: (a<sup>2</sup> + x<sup>2</sup>), ita resistentia directa annuli 2bx - x<sup>2</sup>, ad resistentiam indirectam quam patitur superficies frusti conici (§.309); reperietur hæc (2bx<sup>3</sup> - x<sup>4</sup>)(a<sup>2</sup> + x<sup>2</sup>).
4. Quodsi jam addatur resistentia directa basis minoris b: - 2bx + x<sup>2</sup> vi num. 2. prodibit integra resistentia frustri

$$b^2 - 2bx + x^2 + \frac{2bx^2 - x^4}{a^2 + x^2}$$

$$= \frac{a^2b^2 - 2a^2bx + a^2x^2 + b^2x^2}{a^2 + x^2}$$

5. Quoniam resistentia minima, quam istiusmodi frustum patitur, per hypoth. differentiale ejus nihilo æquale (§.63. Anal. infin.), adeoque (-2a<sup>2</sup>bdx + 2a<sup>2</sup>xdx + 2b<sup>2</sup>xdx)(a<sup>2</sup> + x<sup>2</sup>) - 2xdx(a<sup>2</sup>b<sup>2</sup> - 2a<sup>2</sup>bx + a<sup>2</sup>x<sup>2</sup> + b<sup>2</sup>x<sup>2</sup>) per (a<sup>2</sup> + x<sup>2</sup>)<sup>2</sup> div. = 0, hoc est,

$$\frac{2a^2bx^2dx - 2a^4bdx + 2a^4xdx}{(a^2 + x^2)^2} = 0$$

$$\frac{bx^2 - a^2b + a^2x = 0}{}$$

$$x^2 + \frac{a^2x}{b} = a^2$$

$$x^2 + \frac{a^2x}{b} + \frac{a^4}{4b^2} = a^2 + \frac{a^4}{4b^2}$$

$$x + \frac{a^2}{2b} = \frac{a}{2b} \sqrt{(4b^2 + a^2)}$$

$$x = \frac{a}{2b} \sqrt{(4b^2 + a^2)} - \frac{a^2}{2b}$$

6. Jam ob IC rectæ EG parallelam per hypoth. erit (§.268. Geom.).

$$AI: IC = AE: EG$$

$$x: a = b: \frac{ab}{x}$$

$$\text{Ergo } EG = \frac{2ab^2}{a\sqrt{(4b^2 + a^2)} - a^2}$$

$$= \frac{2ab^2}{b^2 \sqrt{(b^2 + \frac{1}{4}a^2)} - \frac{1}{2}a}$$

Enimvero b<sup>2</sup> = √(b<sup>2</sup> +  $\frac{1}{4}$ a<sup>2</sup>) -  $\frac{1}{2}$ a in √(b<sup>2</sup> +  $\frac{1}{4}$ a<sup>2</sup>) +  $\frac{1}{2}$ a. Quare si hic valor substituatur; erit EG = (√(b<sup>2</sup> +  $\frac{1}{4}$ a<sup>2</sup>) +  $\frac{1}{2}$ a).

7. Fiat itaque EO =  $\frac{1}{2}$ a; erit AO = √(b<sup>2</sup> +  $\frac{1}{4}$ a<sup>2</sup>): cui si æqualis fiat OG, erit EG = √(b<sup>2</sup> +  $\frac{1}{4}$ a<sup>2</sup>) +  $\frac{1}{2}$ a, atque adeo in G vertex conici, cujus frustum ACDB minimam patitur resistentiam, si ea conditione in fluido moveatur, quam fert hypothesis Problematis.

Finis Hydraulica & totius Tomi II. Elementorum Matheos.



# E R R A T A,

Ante quàm legas corrigenda.

Pag. 6. col. 2. lin. ult. duobus lege duobus  
 p. 13. §. 90. lin. 12. quodlibet lege quotlibet  
 p. 16. col. 1. lin. 4. triangulis lege trianguli  
 p. 20. col. 2. lin. 4. invenire lege inveniri

Ibid. lin. 9.  $(a+y)\sqrt{(2ay+y^2)}$  lege

$$\frac{1}{2}(a+y)\sqrt{(2ay+y^2)}$$

p. 28. col. 1. §. 185. lin. 7. EB lege CB

p. 37. §. 191. N. 3. lin. 4. EF lege ED

p. 40. §. 212. N. 11. lin. 4. Continuatur  
 lege Continuata

p. 41. §. 216. N. 2. lin. 2. AD lege CD

p. 42. col. 2. lin. 4. FG lege CG

p. 45. §. 281. lin. 2. AG lege AC

p. 56. §. 301. lin. 10. AB & AC lege  
 AB ad AC

pag. 64. col. 1. lin. 18.  $-dx$  lege  $-dx^2$

p. 67. col. 2. lin. 18. æquitatione lege  
 æquatione

p. 73. col. 1. lin. 6. à fine,  $a^2 - z$  lege  
 $a^2 - z^2$

p. 74. col. 1. lin. ult.  $\frac{a^2 dz}{az^2 - z^3}$  lege  $\frac{a^2 dz}{a^2 z - z^3}$

p. 75. col. 1. lin. 13. & 14.  $\frac{dz\sqrt{a^3}}{\sqrt{(2a^2z - z^3)}}$

$$\text{lege } \frac{dz\sqrt{a^3}}{\sqrt{(2a^2z - z^3)}}$$

p. 80. col. 1. lin. 3. à margine scribatur  
 Tab. III. Fig. 39.

Ibid. col. 2. lin. 12.  $\sqrt{dx}$  lege  $\sqrt{dx^2}$

p. 91. col. 2. lin. 21. CHD = ang. RHS  
 lege HCD = ang. HRS

p. 97. col. 2. in margine Tab. XIV. lege  
 Tab. XVI.

p. 104. col. 2. lin. 18. AH lege AM

p. 108. col. 1. lin. 12.  $+12bx$  lege  
 $+12bx^4$

p. 112. col. 1. lin. 1.  $\int \frac{b^3 x^3 dx}{24a}$  lege

$$\int \frac{b^3 x^3 dx}{24a^3}$$

p. 112. col. 2. lin. penult.  $x^{(r+n):n}$  lege  $x^{r+2n):n}$

p. 134. col. 2. in margine Fig. 50. lege  
 Fig. 53.

p. 150. §. 591. lin. 6. demonstrans lege  
 demonstrant.

p. 153. §. 603. lin. 14. fit lege si

p. 155. col. 2. lin. 15.  $+BC^2$  lege  $+BC$

p. 160. col. 1. lin. penult. puncta lege punctis

p. 168. col. 1. lin. 5. à fine,  $\frac{MO \cdot D^3 \cdot DC}{AM^3 \cdot OM^3}$

$$\text{lege } \frac{MO \cdot AD^3}{AM^3 \cdot OM^3 \cdot DC}$$

p. 171. col. 2. lin. 1.  $a^2 c^2 dx^2$  lege  $a^2 c^2 dx^3$

p. 173. col. 1. lin. 11.  $\sqrt{a b}$  lege  $\sqrt{a^3 b}$

p. 174. col. 2. lin. 9. in denominatore fractionis  
 $4c^2 b^2 x^2$  lege  $4c^4 b^2 x^2$ .

Ibid. lin. 13.  $4c^2 b^2 x^2$  lege  $4c^4 b^2 x^2$ .

p. 175. col. 1. lin. penult. Padeo arabolæ  
 lege adeo Parabolæ

p. 180. col. 1. lin. 6.  $dy =$  lege  $dx =$

p. 183. col. 2. lin. 5. accoque lege adeoque

p. 184. col. 1. inter lineas 1. & 2. hæc insere  
 constans est. Ipsa adeo

p. 212. §. 790. lin. 8. 2250 lege 225000

p. 222. col. 2. §. 344. lege 844.

p. 224. col. 2. lin. 3. 175|00 lege 157|00

p. 238. col. 1. lin. 8. rata lege rota

Ibid. col. 2. lin. 6. aliis lege alius

p. 257. lin. penult. meditare nur lege  
 meditarentur

p. 281. §. 8. lin. 2. coloris lege caloris

p. 286. §. 41. lin. 4. malefactum lege  
 maledactum

p. 290. §. 54. lin. 17.  $(v+a^n)$  lege  $(v+a)^n$

Ibid. lin. 23.  $(lv+a)$  lege  $l(v+a)$

p. 292. §. 65. lin. 6. Pneumatica lege  
 Pneumatica

Ibid. N. 2. lin. 1. & 2. communicato  
 lege communicatio

p. 294. col. 2. lin. 3. comprimit lege  
 comprimi

# E R R A T A.

p. 301. col. 1. lin. 21. ponderet lege pon-  
dere

p. 310. §. 144. lin. 1. scalia lege scala

p. 316. §. 168. lin. 4.  $c = 2$  lege  $s = 2$

p. 345. col. 1. lin. 2. DG lege IG & lin. 5.  
IC lege IG

p. 351. §. 89. lin. 4. PQ lege BQ

p. 352. col. 1. lin. 12. 16. 25. 26. PR  
lege BR

*Ibid.* col. 2. in margine Fig. 23. lege Fig. 28.

p. 359. col. 1. lin. 13. HE lege HI

p. 366. col. 1. lin. 1. opusculum lege oscu-  
lum

*Ibid.* lin. 11. tantilo lege tantillo

p. 368. §. 163. N. 1. lin. 4. supetficiem lege  
superficiem

*Ibid.* lin. penult. K lege N

p. 384. §. 252. lin. ult. BN lege BM, BM  
lege BN

p. 369. §. 168. lin. 3. ressinguenda lege  
restinguenda

p. 385. §. 255. lin. ult. BD, lege DC

*Ibid.* §. 256. lin. 2. Ec lege EC





Fig. Hydraul: Tab: I.

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 12.




Fig. 8.



Fig. 9.

Fig. 14.



Fig. 7.




Fig. 11.





Fig. 10.



Fig. 13.




Fig. 15.



Fig. 16.



Fig. 17.




Fig. 18.



Fig. 19.



Fig. 20.



Fig. 22.



Fig. 26.




Fig. 24.




Fig. 23.




Fig. 21.



Fig. 28.



Fig. 29.




Fig. 27.




Fig. 31.



Fig. 30.



Fig. 32.







Fig. 33.



Fig. 34.




Fig. 35.




Fig. 36.




Fig. 37.




Fig. 38.












Fig. 39.



Fig. 40.










Fig. 49.



Fig. 50.




Fig. 54.



Fig. 55.



Fig. 56.




Fig. 58.




Fig. 61.




Fig. 57.





Fig. 60.



Fig. 59.











Fig. 65.










Fig: Hydraul: Tab: VII.

Fig: 68.




Fig: 71.





Fig: 75.




Fig: 74.




Fig: 76.

